



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

2 45 0174 0129



LAMAR MEDICAL LIBRARY STANFORD

**LANE**

**MEDICAL**



**LIBRARY**

Gift of  
Dr. Leonard W. Ely.









Konrad L. O. Ch.,  
Wien  
1894.





DIE THERAPIE  
AN DEN  
WIENER KLINIKEN.

Als Ergänzung jedes Recept-Taschenbuches erscheint  
in jährlichen Ausgaben das

# THERAPEUTISCHE JAHRBUCH.

Kurze therapeutische Angaben

entnommen der

deutschen medicinischen Journal-Literatur.

Zusammengestellt und geordnet

von

**Dr. med. Ernst Nitzelnadel,**

prakt. Arzt in Russdorf S. A.

*Bisher erschienen Band I u. II (die Jahre 1890 u. 91).  
Preis Mk. 3.50. Der III. Jahrgang (1892) Preis ca.  
2 Mk. gelangt im Jänner 1893 zur Ausgabe.*

Das kleine Büchlein — den Bedürfnissen der Praxis  
entsprungen und für die Praxis gearbeitet — hat schon  
mit seinem ersten Erscheinen sich ein weites Absatzfeld  
zu erringen gewusst.

Was an Fortschritten der Krankenbehandlung im  
Laufe eines Jahres bekanntgegeben, was an neuen Medi-  
camenten erprobt und bewährt, wird hier dem praktischen  
Arzte, — dem es nicht möglich ist, alle Fachzeitungen zu  
lesen, — in handlicher Form und eleganter Ausstattung  
geboten, bereits übersichtlich nach Krankheiten geordnet, zum  
Gebrauch fertig: ein Büchlein, das eine Vervollständi-  
gung aller schon existirenden Receptsammlungen bildet.

**Zu beziehen durch jede Buchhandlung.**

Verlag von Franz Deuticke in Wien.

# DIE THERAPIE

AN DEN

## WIENER KLINIKEN

VON

DR. ERNST LANDESMANN,

GEW. SECUNDARARZT DES WIENER ALLGEMEINEN KRANKENHAUSES,  
DERZEIT PRAKT. ARZT IN BRÜNN.

---

VIERTE VERMEHRTE UND UMGEARBEITETE AUFLAGE.

HERAUSGEGEBEN VON

Dr. KONRAD GROSS, und Dr. ALEXANDER SCHMELZ,

Operations-Zögling an der Klinik Hof-  
rath Prof. Gustav Braun, gew. Secundar-  
arzt des Wiener allgem Krankenhauses.

Operations-Zögling an der Klinik Prof.  
Schaeta, gew. Secundararzt des Wiener  
allgem. Krankenhauses.

---

LEIPZIG UND WIEN.

F R A N Z D E U T I C K E.

1893.



• • • • •

**K. und k. Hofbuchdruckerei Karl Prochaska in Teschen.**

• • • • •

## Vorwort zur ersten Auflage.

---

Indem ich das vorliegende Werkchen der Oeffentlichkeit übergebe, gereicht es mir zur angenehmen Pflicht, einem Gefühle innigen Dankes Ausdruck zu geben. Die Herren Professoren, deren Behandlungsmethoden und Heilformeln hier in Kürze dargestellt erscheinen, haben mir nicht nur bereitwilligst die Veröffentlichung gestattet, sondern es wurden auch die einzelnen Abschnitte des Buches theils von den Herren Professoren selbst zur freundlichen Durchsicht übernommen, theils von einem ihrer Herren Assistenten einer Ueberprüfung unterzogen, wodurch die Arbeit manche werthvolle Bereicherung und Verbesserung erfahren hat. Auch viele der an Kliniken beschäftigten jungen Aerzte haben mich bei der Zusammenstellung des Werkes durch wichtige Informationen und Rathschläge wesentlich unterstützt. Ich erlaube mir daher, allen den Herren Professoren, Assistenten und Collegen, welche in zuvorkommendster Weise das Gedeihen meiner Arbeit fördern halfen, hiemit meinen ergebensten und herzlichsten Dank auszusprechen.

Wien, August 1888.

Der Herausgeber.





# Inhalt.

---

<i>Prof. Kahler, Innere Krankheiten</i>	1
<i>Hofr. Nothnagel, Innere Krankheiten</i>	121
<i>Prof. v. Schrötter, Laryngoskopie</i>	159
<i>Weil. Hofr. Meynert, Psychiatrie</i>	173
<i>A. Ausstellung von Parere's</i>	173
<i>B. Therapie der Geisteskrankheiten</i>	175
<i>Prof. Freiherr v. Krafft-Ebing, Psychiatrie</i>	189
<i>Hofr. Freiherr v. Widerhofer, Kinderkrankheiten</i>	201
<i>A. Diätetik des gesunden Kindes</i>	201
<i>B. Therapie von Kinderkrankheiten</i>	208
<i>Prof. Monti, Kinderkrankheiten</i>	269
<i>A. Diätetisches</i>	269
<i>B. Therapie von Kinderkrankheiten</i>	274
<i>C. Wachstumsverhältnisse bei gesunden Kindern</i>	332
<i>Hofr. Billroth, Chirurgische Krankheiten</i>	337
<i>Hofr. Albert, Chirurgische Krankheiten</i>	373
<i>Weil. Prof. Ultzmann, Krankheiten der Harnorgane</i>	413
<i>Prof. Schauta, Geburtshilfe und Gynäkologie</i>	439
<i>A. Geburtshilfe</i>	439
<i>B. Gynäkologie</i>	459
<i>Prof. Kaposi, Hautkrankheiten</i>	485
<i>Prof. Neumann, Syphilis und venerische Krankheiten</i>	545
<i>A. Der Tripper und seine Complicationen</i>	545
<i>B. Die venerische Helkose und Adenitis</i>	563
<i>C. Syphilis</i>	566
<i>Prof. Fuchs, Augenkrankheiten</i>	589



Aus

## Prof. Dr. Otto Kahler's

Klinik und Ambulatorium für innere Krankheiten.

**Laryngitis acuta. Acuter Kehlkopfkatarrh.** Prophylaktisch, bei zu Katarrhen disponirten Individuen, namentlich bei Kindern, rationelle Abhärtung. Bei bereits vorhandenem Katarrh in leichten Fällen: Hüten des Zimmers bei schlechtem Wetter; bei Fieber Bettruhe, ein diaphoretisches Verfahren: Trinken eines Fluder-, Lindenblüthen- oder Eibischthees vor dem Schlafengehen, warme Bedeckung des Körpers im Bett, um den Hals ein Priessnitz'scher Umschlag (in gestandenes Wasser getauchtes, gut ausgedrücktes Tuch oder besser eine Lage in kaltem Wasser getränkter Verbandwatte, darüber Guttaperchapapier oder ein wasserdichter Stoff, wie der sogenannte Billroth Battist, hierauf eine Lage trockener Verbandwatte und eine Mullbinde) Zur Linderung des Hustenreizes:

Rp. 1.

*Decoct. Althaeae* 150·0,  
*Tinct. Opii simpl.*

*gtts.* 10,

*Syr. Althaeae* 20·0.

*S.* 2stündlich 1 Esslöffel.

Rp. 2.

*Emulsion. Amygd.* 150·0,  
*Morph. mur.* 0·015,

*Syr. Amygdalar.* 20·0.

*S.* 2stündlich 1 Esslöffel.

Bei stärkerem Hustenreiz, zugleich zur Anregung der Secretion:

Rp. 3.

*Pulv. Doveri* 1·0,

*Natr. bicarbon.* 2·0.

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ.* No. 6.

*S.* 3—4 Pulver täglich.

Bei sehr starkem, fortwährendem Hustenreiz:

Rp. 4.

*Aqu. Laurocerasi* 15·0,  
*Morph. mur.* 0·1.  
S. 3—5 mal täglich 10 Tropfen.

Rp. 5.

*Extr. Hyoscyami* 0·2,  
*Morph. mur.* 0·05,  
*Linct. gummosi* 70·0,  
*Aqu. Amygdalar. amarar.* 20·0.  
S. Stündlich ein Kaffeelöffel.

Linderud wirken auch Einathmungen von Dämpfen warmen Wassers, dem man etwas Opium-Tinctur zusetzen kann. Nach den ersten Tagen bei trockenem Husten behufs Anregung der Secretion Inhalation 1—3° iger Lösungen von Chlornatrium oder *Natr. bicarbonic.* oder Salmiak. Zugleich Gebrauch von Giessstübler, Gleichenberger oder Emser Wasser (am besten des Morgens ein Glas voll zu gleichen Theilen mit warmer Milch gemischt, der Rest der Flasche tagüber schlackweise zu trinken) oder bei häufigem Hustenreiz Anwendung von:

Rp. 6.

*Natrii bicarbon.*  
*Sacch. lactis an* 2·0,  
*Codeini* 0·2.  
M. f. p. Div. in doses aequ.  
No. 10.  
S. 3 Pulver täglich.

Oder:

Rp. 7.

*Natr. bicarbon.* 2·0,  
*Extr. Hyoscyam.* 0·2.  
M. f. pulv. Div. in dos.  
aegu. No. 10.  
S. Täglich 3 Pulver.

In schweren Fällen: Energische Antiphlogose, kalte Umschläge, Leiter'scher Kühlapparat um den Hals, bei Dyspnoë ein in heisses Wasser getauchter Schwamm auf die Kehlkopfgegend zu legen, allenfalls ein Senfteig am Hals zu appliciren. Bei Erwachsenen Ableitung auf den Darm, bei kräftigen Kindern, wenn heftige Erstickungsanfälle und reichliche Secretion bestehen, ein Brechmittel:

Rp. 8 *Inf. rad. Ipecacuanh.* c 10 : 100·0,  
*Syr. Ipecacuanh.* 20·0  
S. Jede Viertelstunde den 3. Theil bis z. Wirkung.

Rp. 9. *Apomorphin. mur.* 0·05—0·1,  
*Aqu. dest.* 10·0.  
*S. 1 Pravaz'sche Spritze voll zu injiciren.*

### **Laryngitis chronica. Chronischer Kehlkopfkatarrh.**

Beseitigung der Ursachen, namentlich der äusseren Schädlichkeiten. Bei Leuten, deren Beruf sie nöthigt, viel zu sprechen oder zu singen, mehrwöchentliche Enthaltung von Berufsarbeiten. Rauchen, Schnupfen, schwere Alcoholica, scharfe, gewürzte Speisen zu meiden, ebenso rauch- oder stauberfüllte Locale.

Bei spärlichem Auswurf und Gefühl von Kratzen im Halse Inhalationen von:

Rp. 10.  
*Ol. Terebinthin. rect.* 25·0,  
*Ol. Juniperi* 5·0.  
*S. 20 Tropfen in eine Schale dampfenden Wassers zur Inhalation.*

Rp. 11.  
*Natr. bicarbon,*  
*Natr. chlorat.  $\overline{ui}$*  2·0,  
*Aqu. font.* 100·0.  
*S. Zur Inhalation.*

Rp. 12.  
*Ammon. chlorat.* 1·0,  
*Natr. chlorat.* 3·0,  
*Aqu. font.* 100·0.  
*S. Zur Inhalation.*

Bei reichlicher Secretion Inhalation astringirender Mittel, wie:

Rp. 13.  
*Alum. crud. (oder Acid. tannic.)* 2·0,  
*Aqu. font.* 100·0.  
*S. Zur Inhalation.*

(Die Inhalationen nach Rp. 11—13 mittelst Siegle'schen Apparates auszuführen.)

In hartnäckigen Fällen, die auf Inhalationen nicht zurückgehen, Einblasungen von Alaun oder Tannin (zu gleichen Theilen mit Zucker), z. B.

Rp. 14.

*Extr. Belladonn. 0·5,*  
*Alum. crud. pulv.,*  
*Sacch. alb. aa 5·0*  
*S. Zum Einblasen.*

Rp. 15.

*Morphin. mor. 0·1,*  
*Acid. tannic.,*  
*Sacchar. alb. aa 5·0*  
*S. Zum Einblasen.*

Oder endlich Bepinselungen der Kehlkopfschleimhaut mit Argent. nitr. in 2—10 % iger Lösung. Ferner Gebrauch von Mineralwässern, wie: Gleichenberg, Giesshübl, Ems, Selters, Preblau, Rohitsch.

**Laryngitis crouposa Häutige Bräune. Croup.** Siehe unter „Diphtheritis faucium“ S. 41 f.

**Oedema glottidis, Glottisödem** (als Begleiterscheinung von verschiedenen ulcerirenden oder abscedirenden Kehlkopferkrankungen, oder bei Angina Ludovici, oder bei Nephritis mitunter als erste hydropische Erscheinung). Eispillen, Eisunschläge etc. oder Leiter'scher Kühlapparat um den Hals, bei kräftigen Individuen Blutegel. Bei nephritischem Oedem antihydropisches Verfahren, wie energische Diaphoresis, Erzielung reichlicher wässeriger Darmentleerungen durch Darreichung von:

Rp. 16.

*Inf. folior. Sennae c*  
*10·0:150·0,*  
*Cremor. Tartari 10·0.*  
*Syr. rub. Idaci 20·0.*  
*S. Die Hälfte davon auf*  
*einmal zu nehmen; ern*  
*tlich nach einer Stunde*  
*die 2. Hälfte.*

Rp. 17.

*Ol. Croton. gtt. 3,*  
*Sacch. alb. 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 6.*  
*S. Jede halbe Stunde*  
*1 Pulver bis zu aus*  
*giebiger Wirkung*

Bei drohender Erstickungsgefahr ein Brechmittel:

Rp. 18 *Inf. rad. Ipecac c 2·0:80·0,*

*Tartar. emetic. 0·2,*

*Syr. rub. Idaci 20·0.*

*S. 1/2 stündlich 1 Esslöffel bis zur Wirkung*

Rp. 19.

*Apomorphin. mur. 0·1,*  
*Aqu. dest. 8·0.*

*S. 1 Pravaz'sche Spritze voll zu injiciren.*

Wenn all' die genannten Maassregeln nicht nützen und Gefahr im Verzuge, zunächst *Scarification* der Wülste am Kehlkopfcingang mittelst bis zur Spitze gedeckten Messers unter Leitung des Spiegels oder des linken Zeigefingers; wenn auch dies erfolglos, *Tubage* oder *Tracheotomie*.

**Spasmus glottidis. Stimmritzenkrampf** (bei Erwachsenen). Als selbständige schwere Neurose oder als Theilerscheinung im Symptomenbilde schwerer Erkrankungen des centralen Nervensystems. Behandlung der Neurose, wenn möglich mit Berücksichtigung der causalen Momente. Systematische Bromsalztherapie. (Vergl. den Abschnitt über Hysterie). Während des Anfalles:

Rp. 20.

*Morph. muriat. 0·1—0·2,*  
*Aqu. destill. 10·0.*  
*S. Zur subcutanen In-*  
*jection.*

Rp. 21.

*Chloral. hydrat. 4·0,*  
*Aqu. dest. 80·0,*  
*Syrup. cort. Aurant. 20·0.*  
*S. Stündlich 2 Esslöffel.*

Rp. 22.

*Infus radic. Valerianae e*  
*3·0 ad Aqu. dest. 150·0,*  
*Asae foetidae 1·5.*  
*S. Zum Klystier.*

**Bronchitis acuta. Acuter Lungenkatarrh.** Bei leichtem, nur die grösseren Bronchien betreffenden, fieberlos oder mit geringem Fieber verlaufendem Katarrh: Durch einige Tage Verweilen im Zimmer, Trinken alkalischer Mineralwässer (s. *Laryngitis acuta*). Inhalation von Wasserdämpfen oder von 1—3%igen Lö-

sungen von Natr. bicarbonic., Natr. chlorat. Bei starkem Hustenreiz:

Rp. 23.

*Extr. Hyoseyami* 0·2,  
*Sacch. alb* 2·0.  
*M. f. pulv. Dic. in dos.*  
*aqu. No. 10.*  
*S. 3mal tagl. 1 Pulver.*

Rp. 24.

*Morph. muriatic.* 0·1,  
*Sacchar alb.* 4·0.  
*M. f. pulv. Dic. in dos.*  
*aqu. No. 10.*  
*S. 3—4 Pulver täglich.*

Rp. 25.

*Mixtur. gummos.* 150 0,  
*Morph. mur.* 0·03.  
*S. 2stündlich 1 Ess-*  
*löffel.*

Rp. 26

*Codeini* 0·3,  
*Pulv. gummos.,*  
*Sacchari lact.* aa 2·5.  
*Dic. in dos. aqu. No. 10.*  
*S. 3 Pulver täglich*

Bei frischer Erkältungsbronchitis auch milde Diaphoresis angezeigt.

Rp. 27.

*Spec. pectoral.* 50·0.  
*S. Thee; Früh 1, Abends 2 Tassen zu trinken.*

Bei schwerem, acut fieberhaften Bronchialkatarrh Bettruhe, bei hohem Fieber Anwendung antipyretischer Mittel gestattet, kühle Bäder etc. Feuchthaltung der Zimmerluft durch Aufstellen von Gefässen mit heissem Wasser im Zimmer, fleissiges Inhaliren der oben erwähnten alkalischen Lösungen; innerlich:

Bei starkem Husten-

reiz:

Rp. 28.

*Inf. rad. Ipecacuanh.*  
*e* 0·3 : 150,  
*Morph. mur.* 0·02,  
*Syrup. emulsivi* 20·0.  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel*

Rp. 29.

*Mixtur. oleos.* 150 0,  
*Extr. Opi aquos* 0·1,  
*Syr. Amygdalar.* 20 0.  
*S. 2stündlich 1 Ess-*  
*löffel.*



Rp. 30.

*Pulv. Doveri* 2·0,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3mal täglich 1 Pulv.*

Oder:

Rp. 31.

*Extr. Belladonn.* 0·2,  
*Natr. bicarbon.,*  
*Sacch. alb. aa* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 12.*  
*S. 3 – 4mal täglich 1 Pulv.*

Bei quälendem, die Nachtruhe störendem Hustenreiz auch:

Rp. 32.

*Morph. muriat.* 0·05,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. Alle 3 – 4 Stunden*  
*1 Pulver.*

Bei Hustenreiz und trockenem Husten:

Rp. 33.

*Mixtur. gummos.* 150·0,  
*Tinct. Opii simpl. gtts.* 15,  
*Syr. Ipecacuanh.* 20·0.  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Rp. 34.

*Apomorphin. mur.* 0·03,  
*Morph. mur.* 0·02,  
*Aqu. dest.* 150·0,  
*Acid. mur. dilut. gtts.* 5,  
*Syrup. emulsivi* 20·0.  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Bei reichlicher Secretion, aber erschwerter Expectoration: rasch gewechselte kalte Ueberschläge auf die Brust. Ferner:

Rp. 35.

*Infus. rad. Ipecacuanh.*  
*e* 0·5 *ad.* 150·0,  
*Syrup. cort. Aurant.* 20·0.  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Rp. 36.

*Inf. rad. Polygalae Senegae e* 10·0:150·0,  
*Syr. Senegae* 20·0,  
*Liquor. Ammon. anisati*  
*1·0.*  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Rp. 37.

*Acid. benzoic.* 1·5,  
*Sacch. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3stündl. 1 Pulver.*

Bei drohender Herzschwäche und steigender Cyanose Wein, Excitantia, laues Bad mit kalter Uebergiessung der Brust, kräftige Expectorantia,

eventuell eine Injection von Aether oder Oleum camphoratum.

Rp. 38.

*Inf. rad. Valerianae*  
*e 100:2000,*  
*Liquor. Ammon. anisati*  
*30,*  
*Syr. rub. Ilicis 200.*  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Oder:

Rp. 39

*Inf. rad. Ipecacuanh.*  
*e 10:1500,*  
*Liqu. Ammon. anis 40,*  
*Syr. cort. Aurant. 200*  
*S. Stündlich 1 Esslöffel*

Bei Bronchitis capillaris Anwendung energischer Expectorantia, Brechmittel, Inhalationen von Wasserdampf, Sauerstoffinhalationen.

Bei der chronischen Form der fibrinösen Bronchitis:

Rp 40.

*Kal. iodat. 10,*  
*Aqu. font. 600,*  
*Syr. cort. Aurant. 150.*  
*S. Tagsüber zu verbrauchen*

### **Bronchitis chronica. Chronischer Lungenkatarrh**

(Selbständiger chronischer Lungenkatarrh mit oder ohne Lungeneinphysem, entstanden auf Grund von Staubinhalation, Bronchialasthma etc.) Entfernung der zu Grunde liegenden Schädlichkeit, Verwendung entsprechender Schutzapparate gegen Staubinhalation. Winteraufenthalt im Süden, zweckmässig an einer Seeküste (Riviera). Im Sommer Aufenthalt an einer warmen Seeküste (Abbazia). Curgebrauch in Ems, Gleichenberg, Soolinhalation in Aussee, Ischl, Gmunden, Giesshübl. Aufenthalt bei den Salinen in Reichenhall, Kissingen.

Zur Beförderung der Expectorations Erhaltung einer feuchten Zimmeratmosphäre durch Wasserdampf oder Spray; ferner innerlich:

## Rp. 41.

*Acid. benzoic.* 0·5 ~ 1·0,  
*Sacch. alb.* 4·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aqu. No. 10.*  
*S. 3-4 Pulver täglich.*

Oder:

## Rp. 42.

*Inf. rad. Ipecacuanh.*  
*c 0·5:100·0,*  
*Syr. capillor. Veneris*  
*20·0.*  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

## Rp. 43.

*Acidi benz.* 0·5,  
*Extract. Belladonn.* 0·1,  
*Morph. mur.* 0·05,  
*Natrii bicarb.,*  
*Sacch. alb. aa 2·0*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aqu. No. 10*  
*S. Täglich 3 Pulver.*

## Rp. 44.

*Extr. Hyoscyami* 0·25,  
*Pulv. rad. Ipecac.* 0·2,  
*Elucos. Menth. pip.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aqu. No. 10.*  
*S. 3mal tägl. 1 Pulv*

Bei sehr starkem Hustenreiz auch:

## Rp. 45

*Morph. mur.* 0·1,  
*Aqu. Lauracerasi* 20·0  
*S. 3mal tagl. 5-10 Tropf.*

Bei reichlicher Secretion Zerstäubung von Conferenssprit im Zimmer, Verdampfen von Kiefernadel-extract, Latschenkieferöl etc. oder innerlich:

## Rp. 46.

*Chinini tannici* 1·0,  
*Acid. benzoic.* 0·5,  
*Natrii bicarbon.*  
*Sacchar. alb. aa 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aqu. No. 10.*  
*S. 4 Pulver täglich.*

## Rp. 47.

*Creosoti* 0·05,  
*Sacchari alb.* 0·2,  
*Misce, dentur ad capsulas*  
*gelatin. tal. dos. No. 100.*  
*S. 5-10 Stück des Tages.*

## Rp. 48.

*Guajacoli carbonici,*  
*Sacchar. alb. aa 0·1.*  
*Dentur ad capsul. gelatinos. tal. dos. No. 100.*  
*S. 4-8 Stück im Tage*

Um die Expectoration des reichlich angesammelten Secrets (Bronchoblennorrhoe, Bronchiectasie) zu erleichtern:

## Rp. 49.

*Inf. rad. Polygal. Senegae*  
*c 10·0-200·0,*  
*Liqu. Amm. anisat* 1·0,  
*Syr. cort. Aurant.* 15·0.  
*S. 2stündl. 1 Esslöffel.*

Rp. 50.

*Apomorphini mur.* 0·05,  
*Aq. destill.* 150 0,  
*Syrup. Ribium* 15 0.  
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

Rp. 51.

*Natrii iodati* 2 0,  
*Aqu. destill.* 150 0,  
*Syr. simpl.* 15 0.  
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

Bei Bronchitis mit  
foetidem Secret In-  
halationen von:

Rp. 52.

*Ol Terebinth. rectific.* 25 0,  
S. 10-20 Tropf in ein Ge-  
fäß mit heissem Wasser  
zu gießen und aus dem-  
selben einzuathmen.  
Ebenso auch das soge-  
nannte Latschenöl:

Rp. 53

*Ol. Pini pamil. acth* 10 0.  
S. Wie das Vorige.

Rp. 54.

*Acid. carbonic.* 0·5,  
*Spir. vin.* 10 0,  
*Aqu. dest.* 100 0  
S. Zur Inhalat. mittelst  
Siegle'schen Apparats.  
Innerlich:

Rp. 55.

*Ol. Terebinth. rectific.* 10 0.  
S. 3—4 mal täglich 10  
Tropfen in warmer  
Milch oder in Zucker-  
wasser zu nehmen.

Rp. 56.

*Balsami peruviani* 0·1,  
*Ol. Amygd. dulc.* 15 0,  
*Gummi Arabici* 10 0,  
*Syr. simpl.* 50 0.  
*Aqu. dest. q. s. ut fiat*  
*emulsio* 200 0.  
S. 2ständl. 1 Esslöffel.

**Asthma nervosum. Bronchialasthma. Im Anfalle:**

Rp. 57.

*Chloral. hydrat.* 2 0,  
*Aqu. Tiliac* 40 0,  
*Syr. simpl.* 25 0.  
S. Die Hälfte, nach 1  
Stunde die zweite.

Rp. 58.

*Morph. mur.* 0·1,  
*Aq. destill.* 10 0  
S. Z. Inject., 1 Spritze voll.  
(Vors. wegen ev. Gefahr  
d. chron. Morphinismus.)

Rp. 59. *Kali iodati* 2 0,

*Aq. destill.*

*Syr. simplic. aa* 20 0.

S. Auf einmal zu nehmen

Rp. 60.

*Chloral. hydrat.*  
*Kali iodati aa 20,*  
*Aq. destill.*  
*Syrup. cort. Aur. aa 200.*  
*S. Auf zweimal zu nehmen.*

Ferner medicamentöse Cigarren und Cigarretten mit Stramonium, Cannabis indica. Z. B. (nach Trousseau):

Rp. 61.

*Folior. Stramon. 300,*  
*Extract. Opii aquos. 20,*  
*Aqu. destill. 250.*  
*S. Eingetrocknet als Cigarettentabak zu gebrauchen.*

Oder die Espin Cigarretten nach Trousseau:

Rp. 62.

*Folior. Belladonn. 0.3*  
*Folior. Hyoscyam. 0.15,*  
*Folior. Stramonii 0.15,*  
*Extr. Opii aquos. 1.5,*  
*Aqu. Lauroceras 0.5*  
*S. Cigarettentabak.*

In manchen Fällen von Erfolg:

Rp. 63.

*Tinct. Lobel inflat. 150,*  
*Tinct. Opii benzoe 300.*  
*S. 30 Tropfen in Zuckerwasser, er nach  $\frac{1}{2}$  1 Stunde zu wiederholen.*

Weiters Einathmung der Dämpfe von Charta nitrata (ungeleimtes Papier mit einer wässrigen Lösung von Salpeter (1 : 5) getränkt und getrocknet), von der man ein Stück in der Grösse einer Octavseite auf einem Teller verglühen lässt. Zweckmässig auch ausserhalb der Anfälle regelmässig vor dem Schlafengehen zu machen.

Zur Verhütung neuer Anfälle: Luftveränderung, Domicilwechsel. Behandlung des Grundleidens (Nasenschleimbaut, Kehlkopf, Genitalorgane). Wenn das Asthma ein secundäres, Winteraufenthalt im Süden. Vermeidung der Gelegenheitsursachen für den Anfall

Innerlich:

Rp. 64.

*Natr. iodat. 50,*  
*Aqu. dest. 1500,*  
*Syr. capillor. Vener. 300.*  
*S. Täglich 3 Esslöffel,*  
*allmählig auf das Doppelte zu steigen.*

Oder:

Rp. 65.

*Acid. arsenicos 0.12,*  
*Extr. Gentian. 40.*  
*M. f. pil. No. 60.*  
*S. Täglich 2 Pillen; allmählig zu steigen auf 6 Pillen.*

Rp. 66.

*Sol. arsenic Fowleri* 5·0,*Aq. dest.* 20·0.*S. Morgens und Abends 10 Tropfen, steigend  
bis auf das Doppelte*

**Tussis convulsiva. Keuchhusten.** Ortsveränderung, und zwar bei jeder Jahreszeit zu empfehlen. Besonders wirksam dann, wenn bereits einige Wochen der Erkrankung vorbei sind. In warmer Jahreszeit fleissiger Aufenthalt im Freien, im Winter Verweilen in stets gleichmässig warmem, gut gelüfteten Zimmer. Achtung vor Infection anderer Individuen auch im folgenden katarhalischen Stadium. In letzterem Behandlung wie bei acutem Bronchialkatarrh. Im Stadium convulsivum:

Rp. 67.

*Chinini mur.* 0·5—1·5,*Sacchari alb.* 3—4.*F. p. Div. in dos. aequ. No. 10.**S. 4—6mal tägl. ein Pulv.*

Rp. 68.

*Chinini tannici* 1·5,*Elacosacch. Aurant.* 3·0.*M. f. pulv. div. in dos.  
aegu. No. 10.**3—4 Pulver täglich.*

Rp. 69.

*Antipyrini* 0·1—1·0,*Sacchar. lact.* 3·0—4·0,*F. p. Div. in dos. aegu.  
No. 10.**S. Societ Centigr. pro dosi,  
als das Kind Monate,  
societ Decigr. pro dosi  
als das Kind Jahre zählt  
Täglich 3—4 solche Ein-  
zelgaben*

Rp. 70

*Ertr. Belladonn.* 0·03—  
0·15,*Natr. bicarbonic.* 1·0,*Sacch. alb.* 2·0*M. f. pulv. Div. in dos.  
aegu. No. 10.**S. 2-3mal tägl. 1 Pulv.*

Rp. 71

*Tinct. Belladonn.*

2·0—5·0,

*Tinct. Chinæ compos.*

15·0.

*S. 3mal tägl. 10 Tropfen.*

Rp. 72.

*Chlorid. hydrat* 0·3—1·0,*Mist. gumm.* 70·0—100·0.*S. Abends als Klysma.*

Morphinpräparate nur bei älteren Kindern und bei Erwachsenen.

Im Stadium decrementi kräftige Kost, Wein, Eisen, antikatarrhalische Behandlung.

**Emphysema pulmonum chronicum. Chronisches Lungenemphysem.** Sorgfältige Vermeidung der zu Grunde liegenden Ursachen (Staubinhalation, respiratorische Belastung des Lungengewebes durch Sprechen, Singen, Blasen von Blasinstrumenten, schwere Arbeit). Behebung oder Besserung zu Grunde liegender Krankheitszustände (chron. Bronchialkatarrh). Im Winter Aufenthalt an einem südlichen klimat. Curort, vor Allem an den Küsten der Adria und des mittelländ. Meeres. Im Sommer Vermeidung von Hochgebirgsaufenthalt, hingegen Aufenthalt in windgeschützten waldreichen Gegenden oder an warmen Seeküsten (Abbazia). Gebrauch von salinischen Mineralwässern (Gleichenberg, Ems.)

Versuch mit Behandlung in pneumatischen Kammern; bei erschwerter Expectoratio mitunter Anwendung des transportablen pneumatischen Apparates von Waldenburg u. A. nützlich.

Bei starkem Hustenreiz:

Rp. 73.

*Extr. Belladonnae* 0·1,  
*Pulv. rad. Ipecacuanh.*  
0 2,  
*Pulv. gummos.,*  
*Sacch. alb. aa* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aegu. No. 10.*  
*S. 3mal tägl. 1 Pulv.*

Rp. 74.

*Extr. Hyoscyami* 0·3,  
*Pulv. et extr. Liquiritiae*  
*aa q. s. ut f. pil.*  
*No. 50.*  
*S. Früh, Mittag und*  
*Abend je 3 Pillen.*



Rp. 75.

*Pulv. Doveri* 1·5,  
*Pulv. gummos.*,  
*Sacchar lact.* aa 2·0.  
*F. p. Div. in dos. æqu.*  
*No. 10.*  
*S. 3 Pulver täglich.*

Rp. 76.

*Pulv. Doveri* 1·5,  
*Pulv. gummosi* 10·0.  
*M. f. p. Detur ad scutulam.*  
*S. Messerspitze weise.*

Rp. 77.

*Morph. mur.* 0·05 0·1,  
*Sacchar. albi* 4·0,  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*æqu. No. 10.*  
*S. 3 Pulver täglich.*

Bei starker Dyspnoë ist  
*Extr. Quebracho* oft von guter  
 Wirkung.

Rp. 78.

*Tinct. Quebrach.* 100·0.  
*S. 2 Mal des Tages*  
*1 Theelöffel in etwas*  
*Himbeerwasser zu neh-*  
*men.*

Rp. 79.

*Cort. Aspidosperm. Que-*  
*brach.* 50·0,  
*Macer. per dies 7*  
*in ritr. bene claus.*  
*c. Spir. cin. rectificatissim.*  
*500·0.*  
*Dein filtra et inspissa.*  
*Solve in:*  
*Aqu. ferri* 100·0.  
*S. 3mal täglich 1—2*  
*Kaffeelöffel.*

In den späteren Stadien  
 gegen den *Hydrops Dm-*  
*retica:*

Rp. 80.

*Decoct rad. Ononid.*  
*spinos e* 20·0:200·0,  
*Liqu. Kali aëtic.* 10·0,  
*Oryz. Scillae* 20·0.  
*S. 2 stündlich 1 Ess-*  
*löffel.*

Rp. 81.

*Inf. baccar. Juniperi e*  
*10·0:200·0,*  
*Extr. Scillae* 0·2,  
*Liqu. Kali aëtic.*  
*Syr. rub. Idaci* aa 15·0.  
*S. Stündlich 1 Ess-*  
*löffel.*

Rp. 82.

*Diuretini* 5·0,  
*Aquæ dest.* 150·0,  
*Syr. simpl.* 15·0.  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel*



Zeitweilig auch Digitalis durch einige Tage, oder andere Herzmittel. Zur Beseitigung eines hartnäckigen Hydrops auch Calomelaur. (siehe S. 35, Rp. 190.)

**Oedema pulmonum. Lungenödem.** Bei drohendem acutem Lungenödem Anwendung von Excitantien, (Wein, Cognac, Herzmitteln und kräftigen Gegenreizen, Senfteig auf die vordere Brustgegend, kalter Wasserstrahl ebenda

Rp. 83.

*Olei camphorati* 10·0.  
S. 1 — 3 Pravaz'sche  
Spritzen subcutan

Rp. 84

*Aether. sulfur* 10·0.  
S. 1 — 2 Pravaz'sche  
Spritzen subc. (mit Ver-  
meidung der Nähe grö-  
sserer Nerven)

Rp. 87.

*Inf. folior. Digitalis* e 0·6  
ad *Aqu. dest.* 150·0.  
S. Stündlich 1 Esslöffel.

Bei bereits entwickeltem Oedem kräftige Expectorantia in Verbindung mit Stimulantien:

Rp. 88.

*Inf. rad. Ipecacuanh.*  
e 0·8 200·0,  
*Liqu. Ammon. anis* 3·0,  
*Syr. cort. Aurant.* 20·0.  
D. S. Stündl. 1 Esslöffel.

Rp. 89.

*Inf. rad. Valerianae*  
e 10·0 150·0,  
*Aether. acetic.* 2·0,  
*Syr. Senegae* 15·0.  
D. S. Stündl. 1 Esslöffel.

Rp. 85.

*Plumbi acetici* 1·0,  
*Sacchar. alb.* 3·0.  
F. p. Dic. in doses aequ.  
No 10 (decem).  
S. 4 — 5 Pulver des Tages

Rp. 86

*Tinct. Strophanti* 16·0  
S. 2 — 3mal täglich 15  
20 Tropfen.

Bei noch kräftigem Puls und Ueberfüllung der Bronchien mit Secret ein Brechmittel, am besten:

Rp. 90.

*Apomorphin. mur.* 0·1,  
*Aqu. dest.* 10·0.

S. 1 — 2 Pravaz'sche  
Spritzen zu injiciren

**Haemoptoë. Bluthusten.** Strenge Ruhe im Bett, möglichstes Vermeiden des Sprechens; nur kalte Flüssigkeiten, kalte Milch oder Suppe zu geniessen. Aufregende Getränke streng zu meiden. Kalte, häufig zu wechselnde Umschläge auf die Brust, besser Leiter'scher Kühlapparat oder Eisbeutel. Innerlich Eispillen. Bei aufgeregter Herzaction Kalte auf die Herzgegend, keine Digitalis. In leichten Fällen genügen diese Maassnahmen; man gibt allenfalls zur Beruhigung:

Rp. 91.

*Elixir. acid. Haller.* 2·0,  
*Syr. rub. Idae* 10·0,  
*Aqu. font.* 150·0,  
S. Zweistündlich 1 Ess-  
löffel.

Bei starkem Hustenreiz:

Rp. 92.

*Morphii muriatici* 0·1,  
*Sacch. alb.* 1·0,  
M. f. p. Dir. in doses  
aequ. No. 10.  
S. 3–4 Pulver.  
Oder auch eine *Morphium-*  
*injection*

Bei stärkerer Haemoptoë  
gewöhnlich Styptica mit Nar-  
cotieis combinirt:

Rp. 93.

*Extract. Secal. cornuti*  
*dialysati* 1·0,  
*Sacchar. lact.* 4·0  
M. f. pulv. Dir. in doses  
aequ. No. 10.  
S. Stündlich 1 Pulver.

Rp. 94.

*Extract. Secal. cornuti*  
*dialysati* 1·0,  
*Morph. mur.* 0·05,  
*Sacch. alb.* 4·0  
M. f. pulv. Dir. in dos.  
aequ. No. 10.  
S. 2stündl. 1 Pulver.

Rp. 95.

*Extr. Secal. cornuti dia-*  
*lysat.*  
*Pulv. rad. Liquir. aa* 1·5,  
*Extr. Opii* 0·3,  
*Succ. Liquir. q. s. ut fiant*  
*pilulae* No. 20  
S. 2–3stündlich 1 Pille.

In schweren Fällen am  
besten Ergotin-Injection-  
en mit oder ohne Morphinum:

Rp. 96.

*Extr. Secal. cornuti dia-*  
*lysat* 2·0,  
(*Morph. mur.* 0·1),  
*Aqu. dest.* 8·0,  
*Acid. carbonici* 0·08.  
S. 1 Pravaz'sche Spritze  
zu injiciren, eventuell  
nach 2 Stunden eine  
zweite.

Bei trotz der erwähnten Mittel lange andauerndem Bluthusten:

Rp. 97

*Ol. Terebinthin. gtts. 6,*  
*Exhibe in capsul. gelatinos.*  
*Dent tales doses No. 30.*  
*S. Alle 2 Stunden 1 Kapsel.*

### **Pneumonia crouposa Genuine Lungenentzündung.**

Das Krankenzimmer in gleichmässiger Temperatur (14—15° R.) zu erhalten. Bis zum Aufhören des Fiebers nur flüssige, aber namentlich bei geschwächten Individuen möglichst ausreichende Nahrung: Milch, Eier, starke Fleischbrühe. Bei halbwegs geschwächter Herzkraft auch vom Beginn an Wein (sehr zweckmässig die Verwendung der Stokes'schen Mischung vide unt.). Zur Beseitigung und Mässigung der pneumonischen Stiche locale Application von Kälte (Eisbeutel, Leiter'scher Kühlapparat). Antipyretische Mittel kommen bei der Pneumonie am besten nicht zur Verwendung; bei excessiver Fiebersteigerung Bäder von 20—22° R., eventuell kalte Einpackungen neben fortgesetzter Darreichung kräftiger Weine.

Rp. 98.

*Cognac vel. vin. Xerensis 50·0,*  
*Aqu. Cinnamomi 100·0.*  
*Vitell. oror. duor.*  
*S. Stündlich 1 Esslöffel. (Stokes'sche Mischung.)*

Bei sehr starken Stichen und sehr schmerzhaftem Husten subcutane Morphininjection von 0·005 bis 0·01 oder

Rp. 99

*Chinin sulfuric. 1·0,*  
*Morph. mur. 0·05,*  
*Sacch. alb. 3·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aque. No. 10.*  
*S. 3—4 Pulv. täglich.*

Als erfrischendes Getränk:

Rp. 100.

*Acid. phosphoric. 4·0,*  
*Syr. rub. Idari 40·0.*  
*S. Dem Trinkwasser*  
*kaffeeelöffelweise zuzusetzen.*

Rp. 101.

*Mixtur. gummos. 200·0,*  
*Syr. acetos. Citri 20·0.*  
*S. Zum Getränk.*

Wenn die Herzthätigkeit unregelmässig, der Puls klein und sehr frequent wird, neben Alcoholicis:

Rp. 102.

*Inf. folior. Dig. purp.*  
*e 0·6:200·0.*  
*S. 2stündl. 1 Esslöffel.*

Rp. 103.

*Tinctur. Strophanti 10 0.*  
*S. 3mal täglich 15 -*  
*20 Tropfen*

Bei Greisen und Potatoren ganz besonders auf die Erhaltung der Herzkraft zu sehen, reichlich Wein zu geben. Wenn Zeichen von beginnendem Collaps eintreten, Cognac, Portwein, schwarzer Kaffee, Thee mit Rum, als Medicamente ebenfalls Excitantia:

Rp. 104.

*Inf. rad. Valerianae*  
*e 10·0 ad 150·0,*  
*Liquor. Ammon anis. 3 0,*  
*Syrupi capill Vener 20·0.*  
*S. Einhalb- bis einstündl.*  
*ein Esslöffel.*

Rp. 105.

*Aqu. Melissae 150·0,*  
*Spir. Aether. nitric. 3·0,*  
*Syr. cort Aurant. 20·0.*  
*S. Stündl. 1 Kinderlöffel.*

Rp 106

*Aether. sulfuric. 10·0,*  
*Camphor. ras. 1 0.*  
*D S. 1—2 Præaz'sche*  
*Spritzen zu inspiriren.*

Bei stockender Expectoration und starker Ueberfüllung der Bronchien:

Rp. 107.

*Acid. benzoic. 1·5,*  
*Camphor. trit. 0·3,*  
*Sacchar. alb. 4 0*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*æqu. No. 10.*  
*S. 2stündlich ein Pulver.*

Rp. 108.

*Inf. rad. Ipec. e 0·6 -*  
*1·0 : 150·0,*  
*Liqu. Amm. anis. 2 0 3 0,*  
*Syrup. simpl 15·0.*  
*S. Stündl. 1 Esslöffel*

Bei drohendem Lungenödem vide den betreffenden Abschnitt (§ 15.)

Bei Ausbruch von Delirium potatorum.

Rp. 109.

*Opii puri 0·3 0·5,*  
*Sacch. alb 3·0.*  
*M. f. pulv Div in dos.*  
*æqu. No. 10.*  
*S 2 3 Pulver am Abend*

Bei kräftiger Herzaction  
auch:

Rp. 110.

*Chloral. hydrat.* 3·0,  
*Aqu. dest.*  
*Mucilag. gummi. Arab.*  
    *ad* 30·0,  
*Syr. cort. Aurant.* 15·0.  
S Die Hälfte auf ein-  
mal; wenn nöthig, in  
2 Stunden den Rest.

Oder in Klysmenform:

Rp. 111.

*Chloral. hydrat.* 6·0,  
*Mucilag. gummi. Arabic.*  
*Aqu. font. aa* 100·0.  
S. Zu 2 Klysmen

Bei meningalen  
Symptomen: Eisblase  
oder Leiter'scher Kühlappa-  
rat auf den Kopf, Ab-  
leitung durch Abführmittel:

Rp. 112.

*Inf. folior. Sennae*  
    *r* 20·0:200·0,  
*Ol. Ricini* 30·0.  
S. Zu 2 Klystieren.

Oder:

Rp. 113

*Aqu. laxativ. Viennens.*,  
*Mixtur. oleos. ad* 60·0,  
*Aqu. Lauracr.* 2·0.  
S In 2 Hälften im  
Verlauf einer Stunde  
zu nehmen.  
Bei complicirendem Ga-

strointestinalkatarrh  
gegen die Diarrhöe:

Rp. 114.

*Opii puri* 0·1,  
*Sacch. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos*  
    *aequ. No. 5*  
S 2–3 Pulver des Tages

Rp. 115.

*Bismuthi subnitric.* 1·5,  
*Opii puri* 0·2,  
*Sacchari alb.* 3·0  
*M. f. pulv. Div. in dos*  
    *aequ. No. 10.*  
S. 2stündlich 1 Pulver.

Im Stadium der Lö-  
sung zur Beförderung der  
Expectoration.

Rp. 116.

*Inf. rad. Ipec. e* 0·3:150·0,  
*Syrup. emulsiv.* 15·0  
S. Stündlich 1 Esslöffel

Rp. 117.

*Inf. rad. Polygal. Seneg.*  
    *e* 10·0:150·0,  
*Syr. capillor. Ven.* 20·0  
S. 2stündl. 1 Esslöffel.

Rp. 118.

*Apomorphin. mur* 0·03,  
*Aqu. dest.* 150·0,  
*Syrup. rub. Idaei* 15·0.  
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

Rp. 119.

*Liqu. Ammonii anis* 10·0.  
S. 6–10 Tropfen in 1 Löff-  
fel Zuckerwasser einige-  
mal des Tages.

**Pneumonia catarrhalis. Catarrhalpneumonie** Vom Beginne an Bedacht zu nehmen auf das Verhalten der Herzkraft. Neben Anwendung der entsprechenden Excitantien Verwendung von Expectorantien; vgl. „Pneumonia crouposa“ S. 18.

Rp. 120.

*Infus. rad. Valerianae* 10·0 : 150 0,  
*Liquor. Ammon. anisat.* 3·0,  
*Syrup. capillor. Veneris* 20·0.  
*½—1stündlich ein Esslöffel.*

Rp. 121.

*Rad. Valerianae* 20·0.  
*Infunde cum aquae ferv. q. s. ad colat.* 150 0,  
*Cui refrigeratae adde Aether. acetic.* 2·0.  
*Syrup. Cinnamomi* 30·0.  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Rp. 122.

*Rad. Valerian.* 15 0,  
*Rad. Ipecac* 1·5,  
*Fiat infus. ad colaturam* 250·0,  
*Adde syrup. simpl.* 25 0.  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

**Gangraena pulmonum. Lungenbrand.** Kräftige Nahrung, reichlich Wein, tonisirende Medicamente Ausserdem:

Rp. 123.

*Olei Terebinth. rect.* 30·0.  
*S. 12 Tropfen auf 1 Glas Zuckerwasser tagsüber.*

Rp. 124.

*Olei Terebinth. rect.*  
*Olei Amygdalarum aa* 4 0,  
*Mucilag. gummi Arabici.*  
*Syrup. simplic. aa* 20 0.  
*Sensim terendo affunde aq. destill.* 180 0  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*



Rp. 125.

*Olei Terebinth. guttas 5.*  
*Dentur ad capsul. gelatinos. tal. dos. No. 20.*

*S. 4 — 5 Kapseln des Tages.*

Rp. 126.

*Acidi carbolici 0·5,*  
*Solve in spir. vini q. s.*  
*Rad. Althaeae,*  
*Extract. Gentian. āā 5·0.*  
*M. f. pilulae No. 100.*  
*Consp. pulv. Lycopod.*  
*S. 2stündlich 1—2 Pillen.*

Rp. 127.

*Acidi carbol. 0·05,*  
*Aq. destill. 150·0,*  
*Syr. Cinnamom. 30·0.*  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Rp. 128.

*Myrtoli 0·2.*  
*D. tales doses ad caps.*  
*gelatin. No. 20.*  
*S. 3—4 des Tages.*

Rp. 129.

*Balsam. peruv. 0·1,*  
*Ol. Amygdal. dulc. 15·0,*  
*Gummi Arab. 10·0,*  
*Syr. simpl. 50·0,*  
*Aqu. destill. qu. s. u. f.*  
*emulsio 200·0.*  
*S. 2 stündlich 2 Esslöffel.*

Zur Inhalation Terpentinöl; am besten 20 Tropfen auf dampfendes Wasser gegossen. Zerstäubung von Coniferensprit oder Latschenkieferessenz in der Umgebung des Kranken.

Ferner:

Rp. 130.

*Acid. carbolici 5·0,*  
*Spirit. vin. 25·0,*  
*Aq. destill. 100·0.*  
*S. 2 Esslöffel auf 1½ Lit.*  
*Wasser zur Inhalation*  
*mit Hilfe eines Spray.*

oder:

Rp. 131.

*Acid. carbolici 2·0,*  
*Spirit. vin. rectificat.*  
*Glycerin. āā 10·0,*  
*Aq. font. 100·0.*  
*S. Zur Inhalation mit*  
*Hilfe des Siegle'schen*  
*Apparates.*

In der Umgebung des Kranken Carbolspray mit 1% Carbollösung.

Die Spuckgläser mit conc. Carbollösung oder Kaliumpermanganatlösung zu desinficiren.

**Tuberculosis pulmonum. Lungentuberculose.**

Propylaxis namentlich bei hereditär belasteten Individuen strenge zu beobachten. Vor Allem Entfernung des Kindes aus der unmittelbaren Nähe tuberculoser Eltern und Geschwister. Kleine Kinder lange bei guter Ammenmilch zu erhalten; später reichliche und zweckmässige Ernährung mit stärkerer Zufuhr von Fetten. Im vorgeschrittenen Kindesalter rationelle Abhärtung gegen Witterungseinflüsse, zugleich aber möglichste Vermeidung von jeder Art Schädlichkeiten, besonders von starken Erkältungen, Traumen, Infectionskrankheiten. Ferner wenn möglich, Vermeidung von Aufenthalt an Orten, wo viele Menschen wohnen, demnach Gelegenheit zur Infection mit Tuberkelbacillen gegeben ist. Dauernder Landaufenthalt, Schulbesuch nur unter günstigen Verhältnissen.

Bei Erwachsenen mit phthisischem Habitus vor Allem zweckmässige Wahl der Berufsart. Vermeidung einer der gelehrten Berufsarten und solcher, welche dauernden Aufenthalt in grösseren Städten erfordern. Ferner Vermeidung von Aufenthalt in staubigen Localen etc.; Verhütung von katarrhalischen Bronchialerkrankungen. Vermeidung von Excessen jeder Art.

Bei bereits manifester, jedoch auf die Lungenspitzen beschränkter fieberloser Lungenkrankung in erster Linie, wenn es die Verhältnisse gestatten, klimatische Curorte zu empfehlen. Im Sommer Aufenthalt im Mittelgebirge oder an gut geschützten Orten des Hochgebirges (Aussee, Ischl, Gmunden, Berchtesgaden, Reichenhall, Madonna di Campiglio etc., die comfortableren Höhencurorte der Schweiz). Bei Neigung zu Haemoptyse sind mild gelegene Stationen wie Rožnau in Mähren, Lieberwila in Böhmen, Vöslau bei Wien etc. vorzuziehen. Bei stärkerem Husten und reichlicherem Auswurf Curgebrauch von längerer Dauer vor Allem in Gleichenberg, Eins, Giesshübel, Labatschowitz etc. Im Falle stark vortretender Dyspepsie und heruntergesetzter Ernährung Gebrauch von



Milcheuren im Gebirge, d. h. reichlicher Milchgenuss neben sonst zweckmässiger Nahrung. Molkeuren, welche an den meisten der bisher genannten Orte durchgeführt werden können, eventuell auch Kumys- und Kefireuren, haben versuchsweise bei Idiosyncrasie gegen Milch oder bei Anomalieen der Verdauung an Stelle der Milcheur zu treten.

Im Winter klimatischer Curort im Süden, u. zw. mit Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse des Kranken und mit Vermeidung aller schlecht eingerichteter derartiger Orte. Zu empfehlen Meran, Gries, Arco, Gorz, Abbazia, Lussinpiccolo, die Orte der Riviera, Montone, Cannes, San Remo, Nervi, ferner Ajaccio auf Corsica, Palermo, Egypten, Cairo, Helouan, Luxor, bei Neigung zu Haemoptyse Madeira. Aufenthalt in Winterhochstationen (Davos, St. Moritz), bei gut erhaltenem Kräftezustand, stärker hervortretender Anaemie und günstigem Verhalten der Gemüthsstimmung, fehlender Neigung zu Haemoptyse zu empfehlen.

Als massgebend für den Erfolg dieser klimatischen Sommer- oder Wintercuren ist das Verhalten der Patienten selbst zu bezeichnen. Strenge Einhaltung der gegebenen Vorschriften in Rücksicht des Aufenthaltes im Freien, kräftige, dem Zustand des Verdauungsapparates angepasste Ernährung, Vermeidung aller Excesse, Anwendung allgemeiner kräftigender Verfahren. Hier besonders auch entsprechend abgestufte Wasserbehandlung hervorzuheben. Bei Individuen, deren Verhalten in der eben genannten Richtung nicht sicher steht, ist die Behandlung in den Sanatorien für Lungenkranke sehr zu empfehlen und gibt mitunter nicht ungünstige Resultate. (Görbersdorf, Falkenstein).

Für Patienten, welche völlig frei über ihren Aufenthalt zu disponiren in der Lage sind, ist eine durch Jahre ununterbrochen fortgesetzte derartige klimatische Cur zu empfehlen und dadurch lassen sich sehr bemerkenswerthe Resultate erzielen. Hier wären

auch und zwar als sehr empfehlenswerth lange fortgesetzte Seereisen auf mit dem entsprechenden Comfort ausgestatteten Schiffen zu erwähnen.

Bei fieberhaft verlaufender Tuberculose gibt das Fieber an und für sich keine Contraindication gegen eine klimatische Sommercur oder gegen einen Winteraufenthalt im Süden, wohl aber in Rücksicht der Hohencurorte. Sehr hohes hektisches Fieber, oder solches, welches eine acute Miliartuberculose begleitet, schliesst selbstverständlich jeden Ortswechsel des Kranken aus.

Eine bis zur Cavernenbildung vorgeschrittene Lungentuberculose lässt sich bei nicht allzuweit gediehener Ausdehnung des Processes und bei gutem Kräftezustand gleichfalls durch klimatische Curen immerhin günstig beeinflussen. Hier muss man im Sommer den weniger hochgelegenen Curorten, Reichenhall, Aussee, Ischl, den Vorzug geben, im Winter die Kranken an die Küsten des mittelländischen Meeres senden.

Eine sicher begründete causale Behandlung der Tuberculose im Sinne einer directen Beeinflussung des Tuberkelbacillus oder der gesetzten Krankheitsproducte existirt bis heute nicht. Von verschiedenen Seiten wird die Behandlung Lungentuberculöser mit Creosot und Guajacol energisch empfohlen und gibt diese Behandlungsmethode in der That mitunter anscheinend recht günstige Resultate. Ob diese im Sinne des Effectes einer Causaltherapie aufzufassen sind, ist jedoch fraglich.

Rp. 132.

*Creosoti* 0·1,

*Olei jecor. Aselli* 0·4.

*Dentur ad caps. gelatinos. tales doses 100.*

*S. Täglich zuerst 1 Kapseln, dann bis auf 20 zu steigen, (wenn nicht schon bei geringeren Dosen Störungen des Appetites auftreten) Monatelange Fortsetzung der Behandlung.*

Rp. 133.

*Guajacoli carbonici (Guajacolcarbonat) 0·2,*  
*Dentur ad caps. gelatinos. tales doses. No. 50.*  
*S. 2—4 des Tages.*

Die Frage über die Wirksamkeit der Koch'schen Tuberculinbehandlung ist vorläufig noch als ungelöst zu betrachten.

Die medicamentöse Behandlung hat ferner im Sinne eines roborirenden Verfahrens stattzufinden. Reichliche Zufuhr von Fettsubstanzen hat sich dabei nach klinischer Erfahrung gut bewährt. Für Kinder ist der Gebrauch von Leberthran zu empfehlen. Von sehr gutem Erfolge ist oft der Gebrauch von Leberthran im Winter:

Rp. 134.

*Ol. iecoris Aselli 50·0.*  
*S. Anfangs 1—2 Kaffeelöffel im Tag, allmählig bis auf*  
*einige Esslöffel zu steigen.*

Wenn die Anämie hochgradiger ist, als dem Stadium des Krankheitsprocesses entsprechen würde (Pseudochlorose), und bei Fehlen jeder dyspeptischen Störung ein leichtes Eisenpräparat:

Rp. 135.

*Tinct. Ferr. pomat.,*  
*Tinct. amar. āā 15·0.*  
*S. 3mal täglich 10—15 Tropfen.*

Rp. 136.

*Ferri lact. 0·7,*  
*Sacchar. lact.,*  
*Elaeosacch. Calami āā 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in doses aequ. No. 10.*  
*S. 2 Pulver täglich.*

(NB. Bei Hämoptoë und Neigung zu derselben ist Eisen contraindicirt.)

Mit gutem Erfolg braucht man in solchen Fällen auch Arsen in Form des Wassers von Levico, Roncegno,

Guberquelle (täglich 2 Esslöffel unmittelbar nach der Mahlzeit, allmählig steigend bis zu 4 Esslöffeln), oder auch:

Rp. 137.

*Solut. arsenical. Fowleri 5·0,*

*Tinct. amar. 25·0.*

*S. Morgens und Abends 10 Tropfen, steigend auf 40 Tropfen im Tag.*

Bei ausgesprochener Dyspepsie Gebrauch von Pepsin-Salzsäure (s. Rp. 235—237) angezeigt, ebenso Anara:

Rp. 138.

*Tinct. Nucis com. 5·0,*

*Tinct. Chin. comp. 15·0.*

*S. 2mal täglich 20 Tropfen.*

Bei bestehendem Fieber braucht der Kranke eine leicht verdauliche aber ausreichende Ernährung und zwar nicht allein Eiweisssubstanzen, sondern auch Kohlenhydrate, Wein. Gegen mässige nur einige Stunden des Tages ausfüllende Temperatursteigerungen am besten keinerlei medicamentöse Behandlung. Bei starken abendlichen Fieberexacerbationen, namentlich, wenn dieselben mit Frösteln einsetzen und den Kranken in subjectiver Beziehung sehr belastigen, Gebrauch von Antipyretics zu empfehlen. Dabei ist zeitweiliges Aussetzen und zeitweiliger Wechsel des Medicamentes zu empfehlen. Zur Unterstützung dieser antipyretischen Therapie am besten häufige (lauwarne) Essigwaschungen.

Rp. 139.

*Antipyrini 5·0.*

*Div. in doses aequ. No. 5.*

*S. 1 Pulver in 1 Glas Weisswein (oder in caps. anglar.), 2 Stunden vor Beginn des Fiebers.*

Rp. 140.

*Phenacetin.* 5·0.  
*Div. in dos. aequ. No. 10*  
*Dent ad caps. amyl.*  
*S. 2—3 Pulv. während des*  
*Ansteigens des Fiebers.*

Rp. 141.

*Chinin. mur.* 1·0,  
*Sacchar. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in doses*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3 Pulver täglich.*

Bei starkem Husten-  
 reiz Narcotica:

Rp. 142.

*Codeini* 0·2—0·4,  
*Sacchar. alb.* 4·0,  
*M. f. pulv. Div. in doses*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3 Pulver täglich.*

Rp. 143.

*Codeini* 0·2,  
*Alcohol.* 5·0,  
*Syrup. simpl.* 95·0  
*S. Codeinsyrup.*  
*Einige Esslöffel des Tages.*

Rp. 144.

*Morphin. mur.* 0·1,  
*Sacchar.* 4·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 2—3 Pulver täglich.*

Rp. 145.

*Aqu. Laurocer.* 15·0,  
*Morphin. mur.* 0·1.  
*S. 3mal täglich 15 Tropf.*

Rp. 146.

*Extr. Belladonn.* 0·15,  
*Elaeosacch. Cinnam.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3mal tägl. 1 Pulv.*

Rp. 147.

*Extr. Hyoscyami* 0·1,  
*Extr. Cannabis Indic.* 0·5,  
*Elaeosacch. Foenicul.* 5·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 12.*  
*S. Wie das Vorige.*

Rp. 148.

*Lactucarii austr.* 1·0,  
*Sacch alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3mal tägl. 1 Pulv.*

Bei gleichzeitig bestehen-  
 der Darmtuberculose:

Rp. 149.

*Extr. Opii aquos.* 0·5,  
*Elaeosacch. Calami* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3mal tägl. 1 Pulv.*

Bei zähem Auswurf  
 und erschwerter Expec-  
 toration neben den früher  
 erwähnten Mineralwässern:

Rp. 150.

*Inf. rad. Ipecac.*  
*e* 0·5 : 180 0,  
*Syr. cort. Aurant.* 20·0.  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Bei erschwerter Expectoration und gleichzeitigem Hustenreiz:

Rp. 151.

*Apomorphin mur.* 0.1,  
*Morph mur* 0.05,  
*Sacch alb.* 3.0.  
*M. f. pulv. Div. in dos*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 3 Amal tagl 1 Pulv.*

Bei Haemoptoe Ruhe, Kälte. (Näheres siehe unten „Haemoptoe S. 16 f.)

Gegen reichliche Nachtschweisse: Der Kranke soll sich nicht zu warm zudecken, in möglichst kühlem Zimmer schlafen. Kalte Waschungen, aber nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen, sondern etwas früher. Ferner Waschungen mit Franzbranntwein während der Nacht wiederholt vorzunehmen.

Rp. 153.

*Mum. crud.* 2.0,  
*Spir. cin. Gallie.* 180.0,  
*Glycerin.* 5.0,  
*Spir. Lavandul.* 20.0  
*S. Zum Betupfen der*  
*schwitzenden Körperstellen.*

Ferner als Streupulver:

Rp. 154.

*Acid. salicylic.* 3.0,  
*Amyl pur* 10.0,  
*Talc. venet.* 90.0.  
*S. Streupulver.*

Innerlich vor dem Schlafengehen:

Rp. 155.

*Inf. fol. Salviae*  
*e* 10.0, 100.0,  
*Syr. aetos. Citri* 15.0,  
*S. Abends kalt zu trinken*

Rp. 152.

*Inf. rad. Ipecac.*  
*e* 0.5 : 200.0,  
*Tinct. Opii simpl. gtts.* 15,  
*Syr. capillor. Vener.* 20.0.  
*S. Zweistündlich 1 Ess-*  
*löffel.*

Rp. 156.

*Atropini sulfur.* 0.01  
*Centigramma unum,*  
*Pulv. et extract. Liq. q.*  
*s. ut fiant pilulae No. 20*  
*(viginti.)*  
*Consp. pulv. rhiz. Irid.*  
*florentin*  
*S. Abends 1-2 Pillen*

Rp. 157.

*Agaricin.* 0.1,  
*Pulv. Dover.* 1.0.  
*Pulv. et extr. Acori q. s.*  
*ut f. pil. No. 20.*  
*D. S. Abends 1-2 Pillen.*

Rp. 158.

*Hyoscyamin.* 0.01,  
*Pulv. et extr. Acori q. s.*  
*ut f. pill. No. 20*  
*D. S. Abds. 1-2 Pillen.*

Im Beginn der Krankheit auch Arsen gegen die Schweisse zu versuchen:

Rp. 159.

*Sol. arsenic. Fowleri,*

*Tinct. Belladonn. aa 3·0,*

*Aqu. Laurocer. 20·0.*

*S. Abends 15—20 Tropfen auf 1—2mal.*

**Pleuritis. Rippenfellentzündung.** Im Beginn gegen die Schmerzhaftigkeit: Kälte, kalte Umschläge, Eisblase, Leiter'scher Kühlapparat; manchmal werden besser Priessnitzumschläge vertragen, welche jedoch möglichst leicht anzulegen sind (Watte, Billroth-Battist, Gazebinde).

Bei sehr hochgradiger Schmerzhaftigkeit:

Rp. 160.

*Morph. muriatic. 0·2,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*S. 1 Pravaz'sche Spritze voll zu injiciren.*

Gegen das Fieber nur bei excessiven Temperaturgraden Chinin, Antipyrin, Phenacetin, daneben ein säuerliches Getränk, etwa:

Rp. 161.

*Acid. tartaric. 1·0,*

*Aqu. font. 200·0,*

*Syr. rub. Idaei 20·0.*

*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Mit Ablauf des Fiebers zur Beförderung der Resorption des gesetzten Exsudates Einpackungen mit in Bu-

row'scher Lösung getränkter Watte. Darüber Billrothbattist, eine Lage trockener Watte und Einwicklung mit einer Gazebinde.

Rp. 162.

*Alum. crud. 5·0,*

*Plumb. acet. bas. sol. 25·0,*

*Aq. destill. 500·0.*

*S. Burow'sche Lösung.*

Rp. 163.

*Jodoform. 2·0,*

*Ungu. simpl. 50·0,*

*(Ol. Bergamott. gtts. 3).*

*S. Zur Einreibung.*

Innerlich:

Rp. 164.

*Inf. baccar. Juniperi*

*e 8·0 : 150·0,*

*Liqu. Kal. acetic.*

*Oxymell. Scillae aa 15·0.*

*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*



**Rp. 165.**

*Decoct. Ononid. spin. c 20·0 : 200·0,*

*Kal. nitr 4·0,*

*Roob. Juniperi 15 0.*

*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Von grösster Bedeutung ist die operative Behandlung der Pleuraexsudate. Für die serös fibrinösen Exsudate bestehen folgende Indicationen zur operativen Entleerung, welche am besten mit Capillartroicart und Aspiration, oder mit dem Dieulafoy'schen Apparate vorgenommen wird. 1. Vitalindication, bei Bestehen hochgradiger Dyspnoe, Cyanose, Verdrängungssymptomen, bei sehr rasch entwickeltem Exsudate. 2. Ein vorne bis zur dritten Rippe reichendes Exsudat, welches nach 3—4 wöchentlichem Bestehen der Krankheit und eingetretener Fieberlosigkeit sich nicht zu rascher Spontanresorption anschickt. 3. Kleinere Exsudate, welche nach mehrwöchentlichem Bestehen fortdauernd fieberhaften Verlauf zeigen. Die Punction wird, wenn möglich, im 7. Intercostalraum in der vord. Achsellinie vorgenommen. Die Menge der entleerten Flüssigkeit soll keine allzu grosse sein. Bei eitrigen Exsudaten tritt an Stelle der Punction die Thoracotomie mit Rippenresection oder die Büllau'sche Aspirationsdrainage. Wichtig ist die Nachbehandlung pleuritischer Exsudate schon wegen der so häufig tuberculösen Grundlage derselben. Klimatische Curen, Aufenthalt in Egypten, Davos etc.

**Pneumothorax.** Bei plötzlichem Entstehen desselben vor allem kräftigste Excitantia. Subcutane Application von Reizmitteln. Dann möglichst ausgiebige Narcose durch Morphininjectionen zur Herabsetzung der Athemfrequenz und Verminderung der Schmerzhaftigkeit. Bei sehr kleinem frequenten Pulse Tinet. Strophanti und Digitalisinfus. Bei Bestehen eines Ventilpneumothorax mit starken Verdrängungserscheinungen eventuell Versuch einer Thoracopunction.



**Pericarditis. Herzbeutelentzündung.** Vermeidung aller psychischen Erregung sowie jeder körperlichen Anstrengung, reizlose Kost. Energetische Kälteapplication in die Herzgegend. Bei bestehendem Fieber Vermeidung von inneren Antipyreticis. Digitalis vgl. Rp. No. 169.

Statt Digitalis auch:

Rp. 166.

*Tinct. Strophanti hisp.*  
1·5 2·0,

*Aqu. font.* 180·0,  
*Syr. cort. Aur.* 20·0.  
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

Zur Anregung der Resorption des Exsudates Einreibung von:

Rp. 167.

*Jodoform.* 3·0,  
*Ungu. simpl.* 20·0.  
S. Zum Einreiben.

Bei rasch wachsendem Exsudat und dadurch entstandener Lebensgefahr: Punction des Pericards.

**Endocarditis. Entzündung des Endocardiums.** Behandlung symptomatisch. Kälteapplication in die Herzgegend. Bei starker Steigerung der Pulsfrequenz Digitalis. Sonst siehe „Rheumatismus acut.“ S. 101.

**Vitium valvularum cordis. Herzklappenfehler.** Im Stadium der Compensation nur diätetische Behandlung: Vermeidung zu starker körperlicher Thätigkeit, des Bergsteigens, Schwimmens, Tanzens, Reitens, sowie geistiger Aufregung und Ueberanstrengung; dagegen massige systematische Bewegung im Freien indicirt. Nahrung leicht verdaulich, Vermeidung blähender Speisen, starker alkoholischer und erregender Getränke, hingegen reichlicher Genuss von Milch. Excesse jeder Art verboten. Berufswahl zu berücksichtigen. Wenn möglich, Winteraufenthalt im Süden, Sommeraufenthalt sonst in guter Luft. Vermeidung von Erkältungen, namentlich von Bronchitiden sehr wichtig. Alle Infectiouskrankheiten bringen gesteigerte Gefahr, ebenso Gravidität. Im Sommer Soolbadeuren (Glenchenberg, Ischl, die Thermalsoolbäder wie Nauheim, Homburg) sehr zweckmässig (25–26°). Bei einfachen

Mitralinsufficienzen und gut compensirten Aorteninsufficienzen werden auch milde Kaltwasserproceduren gut vertragen und mit Vortheil gebraucht.

Ausserdem Molken- und Traubencuren gelegentlich von Vortheil, namentlich bei Neigung zu Stypsis oder bei dyspeptischen Beschwerden.

Bei anämischen Individuen, speciell bei Mitralklappenfehlern jugendlicher Individuen systematische Eisenbehandlung (Siehe „Chlorose“ S. 114 f.) z. B.:

Rp. 168.

*Ferr. lactic.* 0·5,  
*Chinin mur.* 1·0,  
*Elaeosacch. Calami* 5·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*S. 3mal täglich nach dem Essen 1 Pulver*

Bei Störung der Compensation, zunächst also bei Herzklopfen und Arythmie Eisenpulver oder Leiter'scher Apparat auf die Herzgegend. Ferner Digitalis oder ein verwandtes Mittel.

(Digitalis immer nur unter strenger Beobachtung des Arztes anzuwenden, bei abnorm verlangsamtem oder schwachem oder arhythmisch gewordenem Puls anzusetzen.)

Rp. 169.

*Inf. fol. Dig. purp.*  
*e* 0·5 1·0:150·0,  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Rp. 170.

*Pulv. folior Digitalis* 1·0,  
*Elaeosacch. Aurant.* 3·0.  
*P. p. Div. in dos. aequ.*  
*No. 10.*

*S. 4—5 Pulv. des Tages.*

Wenn wegen stärkeren Vortretens der Nebenwirkung

die Digitalis nicht anwendbar ist, an Stelle derselben:

Rp. 171.

*Tinct. Strophanti* 10·0.  
*S. 2mal täglich 15—20 Tropfen.*

Rp. 172.

*Tinct. Strophanti* 2·0,  
*Aqu. font.* 150·0,  
*Syrup. simpl.* 20·0.  
*S. Stündl. 1 Esslöffel.*

## Rp. 173.

*Herb. Convall. majal.* 5·0,

*Mucera per horus ser cum*

*Aqu. dest* 180·0,

*Dein filtra et adde:*

*Tinct. Opii simpl. gttis.* 15,

*Syr. rub. Idaei* 20·0.

S. 2stündlich 1 Esslöffel.

(Bei Diarrhöen auszu-  
setzen. Wirkung unsicher).

## Rp. 174.

*Inf. herb. Adonid. vernal.*

*e* 40·200·0,

*Syr. cort. Aurant.* 20·0.

S. 2stündlich 1 Esslöffel.

(Wirkung unsicher).

## Rp. 175.

*Coffein natrosalicyl.,*

*Elaeosacch Citr. aa* 2·5

*M. f. pulv. Dir. in dos.*

*aegu. No. 10.*

S. 4mal tägl. 1 Pulver.

## Rp. 176.

*Coffein natrobenzoic.* 1·5,

*Aqu. destill.* 150·0,

*Syr. capillor. Veneris* 15·0.

S. Stündlich 1 Esslöffel.

Wenn Digitalis aus-  
gesetzt wird, empfiehlt es

sich, noch durch längere Zeit  
kleinere Dosen von Tinct.  
Strophanti (2mal täglich 10  
Tropfen) gebrauchen zu  
lassen oder:

## Rp. 177.

*Pulv. folior. Digital.* 0·5,

*Coffein. natrobenz.* 1·0,

*Sacchar. lact.,*

*Elaeosacch Calam aa* 1·5,

*M. f. pulv. Dir. in dos*

*aegu. No. 10.*

S. 3—4 Pulver täglich.

Bei starken subjecti-  
ven Beschwerden, Schlaf-  
losigkeit, Schmerzen in der  
Herzgegend neben den früher  
erwähnten Mitteln:

## Rp. 178.

*Morph. mur* 0·2,

*Aqu. Lauroceras.* 10·0.

S. 2mal täglich 6—

10 Tropfen.

Oder ausschliesslich:

## Rp. 179.

*Inf. fol. Dig. purp.*

*e* 0·6:150·0.

*Morph. mur.* 0·02.

S. 2stündlich 1 Esslöffel.

Bei durch die lange Dauer der Krankheit herabge-  
kommenen Individuen mässiger Gebrauch von Wein

und Bier indicirt, daneben Chinapräparate und die früher genannten Mittel. Ferner:

Rp. 180

*Pulv. fol. Digit. purp.* 0·3,  
*Chinin. sulf.* 1·0,  
*Elaeosacch. Foenic.* 3·0,  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3mal tägl. 1 Pulv*

Bei starkem Stauungs-  
katarrh in den Lungen:

Rp. 181

*Fol. Digit. purp.* 0·6,  
*Rad. Ipecac.* 0·5,  
*Infunde cum Aqu. dest.*  
*150·0,*  
*Syrup. simpl.* 15·0,  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Bei hochgradig ent-  
wickelter Stauungsleber  
mit Stauungs-Katarrh  
des Magens und hochgra-  
digen dyspeptischen Be-  
schwerden, starken hepa-  
tischen Schmerzen:

Rp. 182.

*Chloroformii* 100·0,  
*Olei Olivar.* 50·0,  
*Fiat linimentum.*  
*S. In die Oberbauchgegend*  
*aufzustreichen. Darüber*  
*Billroth-Battist.*

Rp. 183.

*Natri bicarbon.* 4·0,  
*Morph. mur.* 0·1.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 4 Pulv. täglich.*

Rp. 184.

*Herb. Cent. minor.* 100·0,  
*Cortic. Aurant. crud.*  
*concis.* 15·0.  
*Fiat species*  
*S. Thee.*

Bei drohendem Lun-  
genödem (Vgl den spe-  
ziellen Abschnitt hierüber)

Bei Anfällen von Tachy-  
cardie einige Tassen schwar-  
zen Kaffee's, Sinapismen in die  
Oberbauchgegend: mitunter  
erweist sich reichliches war-  
mes Getränk (Limonade) bis  
zum Eintreten von Erbrechen  
sehr nützlich.

Rp. 185.

*Spirit. Aetheris* 50·0.  
*S. 30 Tropfen in etwas*  
*Zuckerwasser.*

Rp. 186.

*Spirit Mindereri (Liqu.*  
*Ammon. arctic.)* 50·0  
*S. 25 Tropfen in etwas Thee*  
*einige mal des Tages.*

Bei Oedemen und Albuminurie, wenn Digitalis und die betreffenden Ersatzmittel nicht genügen:

Rp. 187.

*Decoct. rad. Ononid spin.*  
c 20·0:200·0,

*Liqu. Kal. acetic.,*  
*Syr. simpl. aa 20 0.*  
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

Rp. 188.

*Inf. baccar Juniperi*  
c 20·0:200·0, ,  
*Oxymel. Scillae 15·0.*  
S. 2stündlich 1 Esslöffel.

Wenn diese Mittel versagen:

Rp. 189.

*Theobromini natriosalicyl.*  
(*Diuretini*) 5·0,  
*Aqu. dest. 180 0,*  
*Syr. simpl. 15 0.*  
S. In 24 Stunden zu verbrauchen.

Bei sehr starkem Hydrops und stark verminderter Diuresis, wenn alle anderen Mittel nicht wirken.

Rp. 190.

*Calomelanos laurigt.* 4 0,  
*Dis in doses aequa No 20.*  
S. 4—5 Pulver des Tages  
Durch 3—4 Tage, dann aussetzen.

Ausnahmsweise kann Calomel in etwas kleinerer Dosis durch 6—8 Tage mit Vortheil gereicht werden. Die diuretische Wirkung stellt sich in der Regel erst am dritten oder selbst vierten Tage der Behandlung oft ganz plötzlich ein. Sehr wichtig ist dabei die Pflege des Zahnfleisches. Mundwasser mit Kali chloricum, Reinigen der Zähne mit der Bürste nach jeder Mahlzeit. Adstringirende Pinselungen des Zahnfleisches (Tct. gallarum). Vor Beginn der Behandlung ist es zweckmässig, Zähne und Zahnfleisch genau zu revidiren und in Stand zu setzen. Gegen eventuell bei der Behandlung auftretende Diarrhöe Opium pur. 0·02, dreimal des Tages, Extract. Opi aquos 0·01, dreimal des Tages. Bei bestehender parenchymatöser Nephritis ist die Calomelcur contraindicirt.

Bei Eintreten eines hämorrhagischen Lungeninfarctes: Kälteapplication auf die Herzgegend und auf den Sitz des Infarctes. Bei starkem Hustenreiz und



und Bier indicirt, daneben Chinapräparate und die früher genannten Mittel. Ferner:

Rp. 180.

*Pulv. fol. Digit. purp.* 0·3,  
*Chinin. sulf.* 1·0,  
*Elaeosacch. Foenic.* 3·0,  
*M. t. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3mal tägl. 1 Pulv*

Bei starkem Stauungs-  
katarrh in den Lungen:

Rp. 181

*Fol. Digit. purp.* 0·6,  
*Rad. Ipecac* 0·5,  
*Infund. cum Aqu. dest.*  
*150·0,*  
*Syrup simpl.* 15·0.  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Bei hochgradig ent-  
wickelter Stauungsleber  
mit Stauungs-Katarrh  
des Magens und hochgra-  
digen dyspeptischen Be-  
schwerden, starken hepa-  
tischen Schmerzen:

Rp. 182.

*Chloroform* 100·0,  
*Olei Olivar.* 50·0.  
*Fiat linimentum.*  
*S. In die Oberbauchgegend*  
*aufzustrichen. Darüber*  
*Billroth-Battist.*

Rp. 183.

*Natri bicarbon.* 4·0,  
*Morph. mur.* 0·1.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 4 Pulv. täglich.*

Rp. 184.

*Herb. Cent. minor.* 100·0,  
*Cortic. Aurant. crud.*  
*concis.* 15·0.  
*Fiat species*  
*S. Thee.*

Bei drohendem Lun-  
genödem (Vgl. den spe-  
ciellen Abschnitt hierüber)

Bei Anfällen von Tachy-  
cardie einige Tassen schwar-  
zen Kaffee's, Sinapismen in die  
Oberbauchgegend: mitunter  
erweist sich reichliches war-  
mes Getränk (Limonade) bis  
zum Eintreten von Erbrechen  
sehr nützlich.

Rp. 185.

*Spirit. Aetheris* 50·0  
*S. 30 Tropfen in etw.*  
*Zuckerwasser.*

Rp. 186.

*Spirit. Minc.*  
*Ammon*  
*S. 25 Tropf.*  
*einigen*

kleinem Puls Digitalis mit Morpium. Bei auffallender Cyanose und Herzschwäche, starker Dyspnoë energische Anwendung von Excitantien, Glühwein, Oleum camphoratum subcutan

Bei Erlahmung des Herzmuskels: Reizmittel.

Ferner:

Rp. 191.

*Inf. rad. Valerianae 10·0:200·0,*

*Aether. sulfuric. 2·0,*

*Syr. cort. Aurant. 20·0.*

*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Oder Aether- und Campherinjectionen.

**Myocarditis chronica. Degeneratio adiposa myocardi.** Chronische Herzmuskelerkrankung. Im ersten Stadium bei Fehlen von Stauungserscheinungen, Bestehen von vorwiegend subjectiven Symptomen, Herzrhythmie und cardialem Asthma: strenge Regelung der Diät und Lebensweise. Am zweckmässigsten ausschliessliche Milchdiät, Milch und Milchspeisen durch längere Zeit, daneben regelmässige Bewegung im Freien, systematische Gehrübungen. Bei bestehender Obesitas universalis Entfettungsdiät und hier zweckmässig Oertel'sche Terraineur. Am besten in Meran, Ischl, Aussee. Unter Umständen Beschränkung in der Zufuhr von Flüssigkeit sehr nützlich, namentlich bei Fettleibigen. Innerlich zeitweilig:

Rp 192.

*Coffein natrobenzoic.,*

*Sacchar. lact.,*

*Elacosacch. Aurant. aa 1·5.*

*M. f. p. Div. in doses aequ. No. 10.*

*S. 3 Pulver täglich.*

Bei entwickelten Stauungserscheinungen, Hydrops, Stauungsleber, Stauungsbronchitis: Anwendung der ge-  
läufigen Herzmittel und Diuretica. Doch Digitalis mit



Vorsicht, wegen der nach diesem Mittel hier häufig eintretenden hämorrhagischen Lungeninfarcte. In diesem Stadium ist die Anwendung von Excitantien, Wein, schwarzem Kaffee häufig indicirt.

**Angina pectoris. Stenocardia. Herzkrampf.** Während des Anfalles Frottirungen oder Essigwaschungen in der Herzgegend, Einreibung mit Spir. sinapis, Schlucken von Eisstückchen, Eintauchen der Hände in heisses Wasser; innerlich etwa:

Rp. 193.

*Tinct. Lobel. inflat.,*  
*Tinct. Val. aether. aa 15·0.*  
*S. 15—20 Tropfen wäh-*  
*rend des Anfalls.*

Rp. 194.

*Tinct. Strophanti 10·0,*  
*Aqu. Laurocerasi 20·0,*  
*Morphii mur. 0·1.*  
*S 20 Tropfen 1—2mal.*

Rp. 195.

*Amyleni nitrosi guttas 2.*

*In zugeschmolzenen Glasröhrchen (Bernatzik), die*  
*im Taschentuch zerdrückt werden, zur Einathmung.*

Ferner nach G. Sée Aethyljodür in Dosen von 5—10 Tropfen einzuathmen.

Unter Umständen auch eine Morphin-Injection oder vorsichtige Chloroform-Inhalationen. Bei Zeichen von Herzschwäche Excitantia, Wein, Aether, Kampher.

Bei rein nervösen Formen von Angina pectoris am zweckmässigsten Luftveränderung. Bei anämischen Symptomen Eisen-Arsenwässer und Eisenpräparate. Ferner:

Rp. 196.

*Natrii bromati 5·0,*  
*Aqu. dest. 150·0.*  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Bei von Herzmuskel-Aortenerkrankungen und Coronarsclerose abhängigen Anfällen:

**Rp. 197.**

*Natrii iodati* 1·5,

*Aqu. dest.* 100·0.

*S. Früh, Mittag, Abend je 1 Drittel davon.*

**Rp. 198.**

*Pastill Nitroglyc. à 0·001,*  
*dentur No. 25.*

*S. Durch 5 Tage 1 Pa-*  
*stille, 5 Tage 2 Pastillen*  
*etc. bis 4 Pastillen im*  
*Tage, dann in abstei-*  
*gender Dosis alle 5 Tage*  
*um eine Pastille weniger.*

**Rp. 199.**

*Coffein. natriobenzoic.* 2·0,  
*Sacchar. lact.* 2·5.

*M. f. pulv. Dic. in dos.*  
*aequ. No. 10.*

*S. 2—3 Pulver des Tages,*  
*durch 11 Tage zu ge-*  
*brauchen, dann auszu-*  
*setzen).*

**Cardiopalmus und paroxysmale Tachycardie. Ner-  
vöses Herzklopfen.** Mitunter Causal indication er-  
füllbar: Behandlung bestehender Anämie, Beseitigung von  
Wurmleiden und von eventuellen Localerkrankungen (Ge-  
nitalien.) Während der Anfälle Anwendung von Kälte  
in der Herzgegend, Compression der Vagi am Halse, oder  
starke Faradisation der Vagi in der Herzgegend. Ein-  
tauchen der Hände in heisses Wasser, systematische tiefe  
Emathnungen. Innerlich:

**Rp. 200.**

*Aqu. Lauracerr.* 20·0,

*Tinct. Strophanti* 10·0.

*S. 2mal tägl. 20—30*  
*Tropfen.*

**Rp. 201.**

*Tinct. Veratri viridis* 1·0,

*Aqu. font.* 80·0,

*Syr. cort. Aar.* 20·0

*S. 3mal tägl. 1 Esslöffel.*

**Morbus Basedowii. Basedow'sche oder Glotz-  
augenkrankheit.** Zweckmässige Lebensweise, gute Er-  
nährung, Landaufenthalt, am wirksamsten lange fortgesetzter  
Hochgebirgsaufenthalt, wenn möglich über 1000 Meter  
Seehöhe, St. Moritz, Davos (auch im Winter), Schnecks

(Tatra Füred), Brennerbad, Madonna di Campiglio. Milde hydropathische Behandlung. Innerlich:

Rp. 202.

*Coffeini natrosalicyl.* 1·0,  
*Ferri lactici* 0·5,  
*Elaeosacch. Foenic.* 4·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*S. 3 Pulver täglich.*

Rp. 203.

*Acidi arsenicosi* 0·1, (*Decigramma unum*).  
*Pulv. radic. Altheae* 8·0,  
*Aqu. destill. q. s.*  
*Sacchar. alb.* 4·0.  
*Fiat massa pilul. e qua formantur pilul. No. 100. (cent.).*  
*Consp. pulv. Lycopod.*  
*S. 1—5 Pillen in steigender, bei Beendigung der Behandlung in absteigender Dosis. (Nicht mehr als 200 Pillen.)*

Ferner consequente Application von Kälte auf die Herzgegend. Galvanisation des Halssympathicus. Kathode unter dem Unterkieferwinkel, Anode in der fossa supraclavicul. Beiderseits je 5 Minuten lang mit Ein- und Ausschleichen des Stromes, 2—4 Milliampère. Faradisation (nach Vigouroux) des Halssympathicus, der Herzgegend und des Orbicularis oculi. Die Behandlung muss lange fortgesetzt werden, 100 und mehr Sitzungen.

Bei profusen Durchfällen:

Rp. 204.

*Natrii tannic.* 1·0,  
*Sacchar. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*S. 4 Pulver täglich.*

**Endarteriitis chronica deformans. Arteriosclerosis universalis. Atheromatose der Gefässe.** Regelung der Lebensweise, speciell Sorge für ausreichende Stuhlentleerung. Vermeidung starker Anfüllung des Magens. Regelmässiger Genuss leichter Weinsorten. Im Herbst Traubeneuren, im Sommer vorsichtiger Gebrauch von gewärmtem Marienbader od. gewärmtem Kissinger Brunnen.

Bei Neigung zu Schwindelanfällen.

Rp. 205.

*Chinini bromati,*

*Sacchar lactis aa 2·0.*

*M. f. pulv. Div. in doses aequ. No. 10.*

*S. Täglich 3 - 4 Pulver.*

Bei sich einstellenden Zeichen von Herzschwäche siehe „Myocarditis chronica“ S. 36 f.

**Aneurysma aortae.** Täglich mehrere Stunden vor und nach Mittag ruhige Rückenlage. Dabei Eisbeutel oder Kühlapparat über der betreffenden Brustgegend. Vermeidung jeder körperlichen Anstrengung. Enthaltung von Alcoholicis und erregenden Getränken. Innerlich:

Rp. 206.

*Natri jodati 1·5 - 3·0,*

*Aqu. destill. 150·0,*

*Syr. simpl. 15·0.*

*S. Tugsüber zu nehmen.*

**Gingivitis. Zahnfleischentzündung** Prophylaktisch sorgfältige Reinigung der Zähne mittelst Bürste und eines passenden Zahnpulvers. Nach Ausbruch der Krankheit häufiges Reinigen mittelst eines nassen Läppchens und fleissiges Ausspülen des Mundes mit kaltem Wasser oder besser mit:

Rp. 207.

*Kal hypermangan. 0·02,*

*Aqu. font. 200·0.*

*S. Mundwasser.*

Rp. 208.

*Kal. chloric. 5·0,*

*Aqu. font. 200·0*

*S. Mundwasser.*

Ferner Bepinseln des Zahnfleisches mit:

Rp. 209.

*Borac. venet.* 5·0,  
*Mel. Rosar.* 50·0,  
*S. Pinselsaft.*

Rp. 210.

*Tinct. Ratanhiae,*  
*Tinct. Gallar. aa* 10·0,  
*Tinct. Opii simpl.* 1·0  
*S. Zum Bepinseln.*

**Angina lacunaris. Halsentzündung.** Eispillen, Priessnitz'sche Umschläge um den Hals. In kaltem Wasser getränkte Verbandwatte um den ganzen Hals gelegt. Darüber Billroth-Battist. Dann eine entsprechende Lage trockener Watte, Befestigung mit Gazebinden, welche auch den Kopf einbegreifen. Gebrauch eines Gurgelwassers wie:

Rp. 211. *Kal. chloric.* 8·0,  
*Aqu. font.* 1000·0,  
*S. Gurgelwasser.*

Bei starker Schmerzhaftigkeit:

Rp. 212.

*Kali chlor.* 8·0,  
*Aqu. font.* 1000·0,  
*Tinct. Opii simpl.* 1·0,  
*S. Gurgelwasser.*

Rp. 213.

*Inf. fol. Salviae*  
*c* 20·0:200·0,  
*Tinct. Opii simpl.* 1·0,  
*Syr. Moror.* 20·0,  
*S. Gurgelwasser.*

Bei der phlegmonösen Form der Angina frühzeitige Incision.

Zur Verhütung von Recidiven Entfernung der Tonsillen zu einer Zeit, wo dieselben nicht entzündet sind

**Diphtheritis faucium. Rachendiphtherie.** Isolirung des Kranken. Einreibungen von grauer Salbe auf die ganze Halsgegend, insbesondere auf die geschwellenen Drüsen. Darüber Watta getränkt mit essigsaurer Thonerde (s. Rp. 162). Betupfen der Membranen mit:

Rp. 214 *Mercur. bichlor. corrosiv.* 1·0,  
*Aq. destill.* 200·0.

*S. Mit Wattetampon aufzutupfen, oder mit Charpiepinzel aufzutragen.*

Daneben Gebrauch von Kali chloricum (bei älteren Kindern) oder:

**Rp. 215**

*Aqu. Calcis,*  
*Aq. destill. aa 300·0.*  
*S. Gurgelwasser.*

Dauernd Dampfspray in der Nähe des Patienten. Innerlich: Wein, Cognac, Weinsuppe. Möglichst kräftige flüssige Nahrung.

**Rp. 216.**

*Chm. mur. 1·0,*  
*Aq. destill. 60·0,*  
*Acid. mur q s ad. solutionem.*  
*S. 2stündlich 1 Kaffeelöffel.*

Bei fortschreitender Membranbildung auf dem Larynx und Beginn der Stenose Inhalation von:

**Rp 217.**

*Aq. Calcis 100·0,*  
*Aq. destill 200·0.*  
*S. Inhalation mit dem*  
*Siège'schen Apparat.*

Bei stärkerer Stenose ein Brechmittel:

**Rp. 218.**

*Cupr. sulfur. 0·5 - 0·8,*  
*Aq. font. 80·0,*  
*Syrup acetos. Citr. 20·0.*  
*S. Alle 10 Min. 1 Kinder-*  
*löffel bis zur Wirkung.*

Beim Fehlschlagen der innern Medication: Apomorphin-injection.  $\frac{1}{2}$  Spritze einer 1<sup>o</sup>igen Lösung. Möglichst frühzeitig O'Dwyer's Tubage oder Tracheotomie.

Bei sehr erschwelter Expectoration nach der Tracheotomie und anhaltender Cyanose laues Bad mit energischem Anspritzen des Thorax mit kaltem Wasser. Ausserdem Excitantien innerlich und subcutan.

**Rp 219**

*Pulv. rad. Ipecac. 0·6,*  
*Tartar. emet. 0·03.*  
*F. pulv. Div. in dos.*  
*aequal No 3*  
*S. Alle 10 Minuten 1 Pul-*  
*ver bis zur Wirkung.*

**Rp 220.**

*Infus. rad. Ipecac. e 1·0*  
*ad 100·0,*  
*Syr. emulsiv. 20·0.*  
*S. Halbstündl. 1 Esslöffel*  
*bis zur Wirkung.*

**Parotitis epidemica Mumps.** Einpackung mit Burow'scher Lösung. Nur bei starker Spannung und Rothung der Haut Anwendung von Kalte (Leiter'scher Apparat). Sorge für ausreichende Stuhlentleerung, Innerlich:

Rp. 221.

*Natrii salicyl. 30,*  
*Aq. destill. 1200,*  
*Syrupi rubi Idaei 100.*  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

**Catarrhus ventriculi acutus. Acuter Magenkatarrh.**

Wenn der Magen noch nachweisbar mit Ingestis erfüllt ist und starker Brechreiz besteht, Hervorrufen des Brechactes durch Kitzeln des Rachens, Trinken von warmem Wasser oder Kamillenthee; wenn dies keine Wirkung hat, ein Brechmittel, am besten eine Apomorphin-Injection, oder:

Rp. 222.

*Pulv. rad. Ipecac. 15,*  
*Tart. stibiut. 01.*  
*M. f. pulv. Div. in dos. aeqq. No. 3.*  
*S. 1/2stündl. 1 Pulver bis zur Wirkung*

Im Uebrigen in leichten Fällen nur diätetische Maassregeln, strenge Diät, nur flüssige Speisen, Fleischbrühe oder Schleimsuppen, verdünnte Milch, in kleinen Quantitäten öfters zu reichen, etwas Wein. In schweren Fällen sogar absolute Nahrungsentziehung, zum Getränk frisches Wasser, Limonade. Bei noch weiter andauerndem Brechreiz Eispillen, ferner:

Rp. 223.

*Aqu. Laurocer 100,*  
*Morph. pur. 0.05.*  
*S. 2stündlich 10 Tropfen (auf Eispillen).*



Weiterhin Soda-, Selters oder Giesshübler Wasser. Bei Schmerzhaftigkeit der Magengegend Application von Kälte oder in anderen Fällen wieder von warmen Katalpasmen auf dieselbe, innerlich:

Rp. 224.

*Aqu. Laurocer. 10 0,*  
*Tinct Nuc. vom. gtts. 10.*  
*S 3mal tägl. 15 Tropfen.*

Im weiteren Verlauf bei Sodbrennen und saurem Aufstossen:

Rp. 225.

*Natr bicarbon.,*  
*Magnes. ust. aa 5 0,*  
*Sacch. alb. 10 0.*  
*Da ad scatul.*  
*S 3mal täglich 1 Messerspitze voll.*

Der zum Magenkatarrh etwa hinzutretende Darmkatarrh nach den unter „Catarrh intestin. acut.“ (S. 53 f.) angegebenen Regeln zu behandeln. Wenn der acute Magenkatarrh in chronischen überzugehen droht, bei fortwährend strenger Diät (Thee, Bouillon, Schinken, leichtes gebratenes Fleisch, Rothwein) ein bis zwei Becher Carlsbader Mühlbrunn (gewärmt) des Morgens im Bette, eine Stunde vor dem Verlassen desselben.

Wenn nach Ablauf der acuten Erscheinungen noch Appetitlosigkeit zurückbleibt, ein Bittermittel, etwa:

Rp. 227

*Herb Centaurei minor.*  
*Fol. Trifolii fibrini,*  
*Fol. Menthae pip.*  
*Fruct Foenic. aa 20 0.*  
*M. f. species.*  
*S Thee Ein kl. Tasse 1 -*  
*1/2 Stde v. d. Mahlzeiten.*

Vorhandene Verstopfung durch Klystiere zu bekämpfen, mit Wasser, Glycerin, oder:

Rp. 226.

*Calomelanos 0 2—0 4,*  
*Extr. Colocynth.*  
*Sacch. alb. aa 0 1.*  
*M. f. p. D. tales doses*  
*No. 4.*  
*S 2 Pulver des Tages.*

Rp. 228.

*Herb. Centaurei minor.*  
*50 0,*  
*Cort. Aurant. crud. conc.*  
*10 0.*  
*M. f. species.*  
*S. Wie das Vorige.*

Rp. 229

*Tinct Rhei Darelli*  
60·0.  
S. 1 — 2 Esslöffel einge-  
male des Tages.

Rp. 230.

*Tinct Absynthii comp.*  
*Tinct. amar. aa* 20·0.  
S. 3mal tägl. 1 Theelöffel  
vor der Mahlzeit.

**Catarrhus ventriculi mucosus chronicus. Chronischer schleimiger Magenkatarrh.** Behandlung in erster Linie diätetisch. Bei Trinkern der Alkoholenuss auf ein Minimum zu reduciren, bei Leuten mit sitzender Lebensweise regelmässige Bewegung im Freien, Sorge für täglichen Stuhlgang. Die Kost in schweren Fällen nur aus ganz leicht verdaulichen Speisen bestehend, speciell Eiweissnahrung nur in einer Consistenz zu reichen, welche leichte Verdaulichkeit garantirt; leicht verdauliche Kohlehydrate zu empfehlen. In zahlreichen Fällen wird saure Milch gut vertragen. Vichy, Wiesbaden (Kochbrunnen), Ems, Marienbad, Kissingen. In leichteren Fällen gebratenes Fleisch, Eier etc. gestattet; dagegen Vermeidung fetter Speisen, schwerer Mehlspeisen, schwerer Gemüse, namentlich der blähenden Hülsenfrüchte. Bei lange andauernden Fällen mit milderem Symptomen leichte Reizmittel, Zusatz von etwas Gewürz zu den Speisen angezeigt, auch etwas alter Wein oder gut abgelagertes Bier gestattet. Von bestem Erfolge ist der Gebrauch einer Carlsbader Trinkeur, ferner Tarasp. Sehr gut wirkt auch der häusliche Gebrauch des Carlsbader Salzes, bei Stuhlverstopfung besser Marienbader Salz. Früh 1 — 2 Becher gewärmten Carlsbader Schlossbrunn mit 1 Kaffeelöffel bis 1 Esslöffel Carlsbader Sprudelsalz darin gelöst. Bei empfindlichen Patienten ebenso gewärmt Emser Kränchen- oder Victoriaquelle, Marienbader Kreuzbrunn oder Kissinger Rakoczy. In veralteten Fällen Kaltwassercuren oder Seebäder von grossem Nutzen. In allen Fällen von chron. Magenkatarrh Sorge für regelmässigen Stuhl, derselbe eventuell durch hochgehende Klysmen oder durch Glycerin-Klystiere zu erzielen.

Bei Atonie der Magenmuscularis mit davon abhängiger Gastrektasie: tägliche Magenheberung mit der Schlundsonde, darauffolgende Magenausspülung mit etwas alkalisch gemachtem Wasser (Carlsbader Salz), Faradisation der Magengegend, Massage. Bei Sodbrennen, saurem Aufstossen, Ueblichkeiten passen am besten Alkalien, also etwa:

Rp. 231

*Natr. bicarbon. 50*

*Dir in dos aequ. No. 10.*

*S. 3mal tägl. 1 Pulver nach der Mahlzeit*

Oder als Speisepulver:

Rp. 232.

*Natr. bicarbon.,*

*Crem Tartari,*

*Elucos. Menth pip. aa 100.*

*S. 3mal täglich 1 Messerspitze n der Mahlzeit.*

Oder bei gleichzeitiger Stuhlverstopfung:

Rp. 233.

*Magn carbonic. 20,*

*Natr bicarbon.,*

*Pulv rad Rhei aa 100,*

*Elucos Foeniculi 200.*

*S. Wie das Vorige.*

Rp. 234.

*Pulv rad. Rhei 200,*

*Natrii sulfur.,*

*Natrii bicarbonic. aa 100.*

*M. f. p. S. Kaffelöffelweise einigemal des Tages.*

Sehr wichtig ist folgende Medication:

Rp. 235.

*Acidi muriatici 500.*

*S. 15—20 Tropfen in*

*1/4 Glas Wasser 10—20*

*Min nach dem Mahle.*

Oder:

Rp 236.

*Acidi muriat. gtts. 5,*

*Bol. alb. qu. s a. f. pil*

*Dent. tal. No. 100.*

*Consp pulv. rad. Rhei.*

*S. 4—6 Pillen nach der Mahlzeit*

Zweckmassig verbindet man damit:

Rp 237.

*Pepsin German. 0.3—0.6.*

*D tales doses ad caps angl. No. 15.*

*S. Nach jeder Mahlzeit 1 Pulver.*

Endlich ist der Gebrauch verschiedener Amara zu empfehlen:

Rp. 238.

*Tinct. Nucis vomicae,*

*Tinct. Chin. comp. aa 200.*

*S 3mal tägl 15 Tropfen.*

Rp. 239.

*Inf. ligni Quassiae*  
*e 10·0 ad 150·0,*  
*Tinct. cort. Aurant. 15·0,*  
*Acidi muriat. 0·5.*  
*D. S. 2stündlich 1 Ess-*  
*löffel.*

Rp. 240.

*Cort. Chinae pulver.*  
*20·0.*  
*S. Mit 1½ Flasche Ma-*  
*laga anzusetzen u. nach*  
*Ablauf einiger Tage*  
*liqueurgläschenweise zu*  
*nehmen.*

Bei Magendrücken  
 und saurem Aufstossen  
 auch:

Rp. 241.

*Bismuth. subnitric. 1·0,*  
*Natr bicarbon.,*  
*Sacch. alb. aa 2·0.*  
*M f. pulv. div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3mal tägl. 1 Pulver*  
*nach der Mahlzeit.*

Rp. 242.

*Decort. cort. Chinae*  
*e 10·0:200·0,*  
*Tinct. amar. 10·0.*  
*S. 3mal tägl. 1—2 Ess-*  
*löffel.*

Rp. 243.

*Cort. Chin. regiae*  
*15·0—20·0,*  
*Macera per horas sex*  
*cum vino gallic. (oder*  
*malacensi) 150·0,*  
*Dein filtra et adde:*  
*Tinct. Rhei Darelli 10·0,*  
*Syr. Cinnamomi 20·0.*  
*S. Wie das Vorige.*

Rp. 244.

*Chin. ammoniat. pur. 0·2,*  
*Pulv. Acori 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10*  
*S. 3 Pulver täglich.*

Rp. 245.

*Tinct. Quassiae 20·0,*  
*Tinct. Cassiae Cinnam.*  
*10·0.*  
*S. 3mal tägl. 15 — 20*  
*Tropfen v. d. Mahlzeit.*

Rp. 246.

*Tinct. Cascarill.*  
*Tinct. cort. Aur. aa 15·0,*  
*Tinct. Nuc. vom. 2·0,*  
*Acid. mur. dil. 3·0.*  
*S. 3mal tägl. 15 Tropfen.*

Bei Gasansammlung  
 im Magen:

Rp. 247.

*Aqu. Carvi 200·0.*  
*S. Nach der Mahlzeit*  
*1 Liqueurgläschen voll.*

Rp. 248.

*Aqu. carminativ. 100·0,*  
*Syr. Cinnamom. 20·0.*  
*S. Nach jeder Mahlzeit*  
*1—2 Esslöffel.*

*Aeusserlich:*

Rp. 249.

*Balsam. vit. Hoffmann.*  
*Aqu. Coloniens. ui 50·0.*  
*S. In der Magengegend*  
*einzureiben*

Bei starker Magengährung:

Rp. 250.

*Creosoti 2·0*  
*Micæ pan. et Mac. gummi*  
*Arab. qu. s. u. f. massa pil.*  
*e qua form pil No. 20*  
*Consp. pulv. cort. Cinn.*  
*S. N. d. Mahlz. 1—2 Pill.*

Rp. 251.

*Bismuth. salic. 2·5,*  
*Sacch. albi 2·0.*  
*M. f. p. Div. in dos. aequ.*  
*No. 10.*  
*S. 2stündlich 1 Pulver.*

**Ulcus ventriculi chronicum. Rundes Magengeschwür.** Strenge Milcheur, alle 1—2 Stunden 2 bis 4 Esslöffel warme Milch, bei Widerwillen mit einigen Tropfen Cognac oder einigen Löffeln Thee versetzt. Dabei absolute Bettruhe, Stuhlentleerung durch Klysma. Wird diese Diät gut vertragen, schwinden die Schmerzen dabei, dann 4mal des Tages  $\frac{1}{2}$  Glas Milch, oder: 2mal des Tages  $\frac{1}{3}$  Glas Milch zur Hälfte mit Carlsbader Wasser verdünnt. Noch einige Tage später neben der Milch zweimal täglich Milchbrei, einmal Bouillon mit Ei. Bei anhaltendem guten Befinden nach 14 Tagen Kalbsbries, Hirn, Kartoffelpurée sowie dann allmählig gebratenes Fleisch.

Diese Diät bei schweren Fällen, namentlich nach Blutungen. Bei leichten Fällen Milch und Milchspeisen von Anfang an. Bei sehr schweren Fällen absolute Vermeidung von Speiseeinfuhr in den Magen. Dann Ernährung durch Klystiere von Fleischpepton, Leube-Rosenthal'scher Solution zu besorgen oder durch Fleischpankreas klystiere: 150 Gramm frisches Ochsenpankreas („weisse Milz“), 300 Gramm Rindfleisch fein geschnitten, in etwas Suppe aufgekocht, nach vorausgegangenem Reinigungsklystier mittelst Irrigateurs in das Rec-

tum einzubringen. Ein zweckmässiges Ernährungsklysma ist ferner folgendes: 3 - 5 Eier werden mit 150 Ccm. einer warmen 20% Traubenzuckerlösung verquirlt und ein Weinglas Rothwein zugesetzt.

Consequenz in Durchführung der Diätet!

Bei Idiosynkrasie gegen Milch oder bei Individuen, welche bei fortgesetzter absoluter Milchdiät sehr herunterkommen und zunehmend anaemisch werden, einige-male des Tages 2 Esslöffel Lenbe-Rosenthal'scher Fleischsolution in einer Tasse Bouillon, oder eines der Fleisch-Peptonpräparate (Kemmerich oder Kochs' Pepton), welche wegen des Geschmackes jedoch häufig bald zurückgewiesen werden.

Im Anschluss an diese Cur ist sehr wirksam eine nachfolgende Karlsbader Cur oder Gebrauch des Karlsbader Salzes od eines Surrogates desselben: Rp. 252.

*Natr. sulfuric.* 50·0,

*Natr. chlorat.* 3·0,

*Natr. bicarbon.* 6·0,

S 1 - 2 Theelöffel auf  
<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Lit. warm. Wassers,  
 in 3-4 Portionen am  
 Morgen zu trinken.

In andern Fällen auch die Wasser von Marienbad oder Vichy von Vortheil.

Zur Bekämpfung der heftigen Kardialgien:

Rp. 253.

*Natr. bicarbon.* 5·0,

*Morphii muriat.* 0·1.

M. f. p Div in dos. aequ.  
 No 10.

S. 1-3 Pulver täglich.

Ferner:

Rp. 254.

*Liqu Ferr. sesquichlorat.* 10·0.

S. 5 Tropfen auf 1 Wein-  
 glas voll warmen  
 (Zucker-) Wassers.

Rp. 255.

*Opii pur.* 0·2,

*Subige c vitell. ori unius*  
*Add*

*Decoct. Althaeae*

r 10 0 · 200 0.

S. Zu 2 Klystieren.

Bei excessiven Schmerzen besser:

Rp. 256.

*Morph. mur* 0·3,

*Aqu. dest.* 10·0.

S. 5-10 Theilstriche einer  
*Pravaz'schen Spritze* zu  
 injiciren.



Bei **Haematomesis**: Vor Allem absolute Ruhe, Entfernung von den Magen drückenden Kleidungsstücken. Eispillen innerlich, sowie energische Application von Kalte auf die Magengegend. Gänzliche Enthaltung von Nahrungsmitteln, später nur kalte Getränke in kleinen Mengen. In leichteren Fällen genügen diese Massregeln, sonst:

Rp. 257.

*Extr. Secal. cornut. dialys. 1·0,*

*(Morphii muriat. 0·1),*

*Aqu. destill. 8·0,*

*Acidi carbolici 0·08.*

*S. 1—2 Pravaz'sche Spritzen subcutan zu injiciren.*

Bei Eintritt von Ohnmacht Frottirungen des Körpers, Erwärmen der Extremitäten, Klystiere mit gewärmtem Rothwein, 150 gm. und Wasser 50 gm., darin 2 — 3 Eidotter, eventuell eine Aether- oder Kampher-Injection.

Nach Sistirung der Blutung die oben beschriebene strenge Diät, wobei Anfangs nur in Eis gekühlte Milch esslöffelweise gestattet wird.

Bei nicht zu stillenden oder sich wiederholenden Blutungen Laparatomie und Resection des erkrankten Magenbeiles indicirt.

Zurückbleibende anaemische Zustände erfordern Eisen-therapie, Gebrauch von Eisenwässern, Frauensbad, Levico, Guberquelle (Srebrenica).

**Carcinoma ventriculi. Magenkrebs.** Die Ernährung in ähnlicher Weise wie bei *Ulcus ventriculi* (s. das.): Mileheur, Leube-Rosenthal'sche Fleischsolution, Fleischpeptonpräparate. Ferner eventuell Fleischpankreas-Klystiere. Stuhlverstopfung durch Klystiere zu beheben. Ein gutes Stomachicum, aber natürlich kein Specifium gegen Magen-Carcinom ist.



Rp. 258.

*Cort. Condurango 20·0,*  
*Maceru per horas sex cum Aqu. dest. 200 0*  
*Decm filtr. et adde:*  
*Acidi mur. dil. 1·0,*  
*Syr. Zingiberi 12·0.*  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Bei starker Schmerzhaftigkeit:

Rp. 259.

*Aqu. Laurocer. 10·0,*  
*Morph. mur. 0·1.*  
*S. 4stündl. 10 Tropfen.*

Oder subcutane Morphin-Injection.

Bei consecutiver Magenerweiterung und Stauung des Mageninhaltes Ausspülung mit lauem Wasser, eventuell 2<sup>o</sup> Salicylwasser.

Wenn das Carcinom frühzeitig diagnostiziert werden kann, möglichst bald Resection des Pylorus.

**Gastrectasia e stenosi pylorica.** Magenerweiterung in Folge von Pylorusstenose. Vor allem vollständige Ausheberung des Magens, Entfernung des ganzen Inhaltes, zum Schlusse Ausspülung mit schwachem Salicylwasser. Möglichst kräftige, aber flüssige oder breiige Nahrung (zweimal des Tages zu reichen). Sechs Stunden nach der Mahlzeit regelmässig wiederholte Ausheberung und Auswaschung des Magens. Zur Unterstützung Nährklysmen. Dieses Verfahren so lange fortzusetzen, bis die chirurgische Behandlung möglich ist, Pylorusresection oder Gastroenterostomie.

**Dyspepsia nervosa.** Nervöse Dyspepsie. Ermittlung der Ursache und causale Behandlung der zu Grunde liegenden Neurasthenie oder Hysterie. Untersuchung auf etwa vorhandene Genitalleiden (bei Frauen), ferner auf Helminthen, Intermittens, Gicht. Regelung des Stuhls. Bei Chloro-

tischen und Anämischen unverzüglich Eisenpräparate oder Gebrauch eines Eisenwassers (Franzensbad, Cudowa, Pyrawarth, Pyrmont, Levico, Guberquelle). Ferner:

Rp. 260.

*Sol. arsenic. Fowleri* 5·0,

*Aqu. dest.* 10·0.

*S.* 2mal täglich 5 Tropfen, dann steigend bis auf 30 Tropfen im Tag.

Zugleich Luftveränderung, Hochgebirgsaufenthalt (St. Moritz, Brennerbad, Semmering etc.), in anderen Fällen Seebadekur, (Norderney, Borkum, Sylt, Ostende), bei reizbaren Individuen ein Ostseebad (Heringsdorf, Heiligendamm, Misdroy etc.) Vor Karlsbader Curen dringend zu warnen, hingegen sehr vorthellhaft Kaltwassercuren.

Bei sehr heruntergesetzter Ernährung in Folge von Hyperaesthesie des Magens und Anorexie ist das Weir-Mitchell'sche Verfahren indicirt und von Erfolg. Dieses Curverfahren besteht hauptsächlich in Isolirung des Patienten, einer progressiv gesteigerten Ernährung bei völliger körperlicher wie geistiger Ruhe und allgemeiner Massage sowie Faradisation. Es ist zweckmässig nur in gut geleiteten Nervenheilstätten durchzuführen.

### **Gastrodynia Kardialgia. Magenkrampf.**

Rp. 261.

*Morphii mur.*,

*Cocuiini mur. ad* 0·25,

*Aqu. Laurocerasi* 25·0

*S.* 10 – 15 Tropfen.

**Hypersecretio continua mucosae ventriculi. Continuirliche Magensaftsecretion** Während des Schmerzanfalles (Gastroxynsis) etwas Eiweissnahrung und ein Kaffeelöffel bis Esslöffel Natr bicarbon. in Wasser gelöst. In hartnäckigen Fällen tägliche Magenausspülung mit alkalischem Wasser. Gebrauch von Carlsbader Wasser in geringen Mengen.

**Vomitus nervosus. Nervöses, habituelles Erbrechen.**

Sehr wichtig Isolirung der Kranken, Entfernung aus der Familie und aus den häuslichen Verhältnissen

Behandlung wie bei Gastrodynie. Nicht selten Schlundsondenernährung von auffallend günstigem Einfluss. Ausserdem Brombehandlung.

Rp. 262.

*Cocain. mur.* 0.1,*Sacch. alb.* 3.0.*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.**S. 3mal tagl. 1 Pulver.*

Rp. 263.

*Chloroformii* 25.0.*S. 5 Tropfen mit einem Stückchen Eis öfters zu nehmen.*

Zweckmässig ferner milde Kaltwassereuren, Priessnitzbinde ab. Nacht zu appliciren.

Im Anfall selbst warme Umschläge auf die Magengegend, Trinken eines warmen Thees. Ferner:

Rp. 264.

*Tinct. Castorei,**Tinct. Nuc. vom. aa* 5.0.*S. Während des Anfalls 1 2mal je 5 Tropfen.*

Rp. 265.

*Tinct. Valerian. aeth*

15.0,

*Tinct. Opi crocat.* 5.0.*S. Während des Anfalls 15 – 20 Tropfen.*

Vor subcutanen Morphin injectionen sei wegen der Gefahr des Morphinismus gewarnt.

Wenn Morphium nicht vertragen wird:

Rp. 266.

*Chloral. hydrat* 3.0,*Mucilag. gum. Arab.,**Aqu. font. aa* 20.0,*Syr. rub. Idaei* 10.0.*S. Die Hälfte auf einmal; wenn nothig, nach 1 Stunde den Rest.***Catarrhus intestinalis acutus. Acuter Darm**

**katarrh** Restrictirte Diät, im Beginn die Nahrung auf Bouillon, Schleimsuppen, Cacao, etwas Rothwein zu beschränken. Warme Tücher oder Kataplasmen auf den Unterleib; bei Fieber Bettruhe. Warme Bäder. Bei heftigem Stuhl drang Sitzen über einem mit dampfen-

dem Wasser gefüllten Gefäß. Wenn im Dickdarm angesammelte Fäcalmassen den Katarrh unterhalten, Klystiere, eventuell mit Zusatz von Ol. Ricini. Bei starker Diarrhöe mit wässrigen Stühlen auch Amylum-Klystiere mit Zusatz von einigen Tropfen Opiumtinctur. Zu Beginn der Behandlung ist dagegen in der Regel ein Abführmittel zu reichen. Am besten

**Rp. 267.**

*Calomelanos* 0·2 0·4.  
*Dentur tales doses* No. 5.  
*S. 2—3 Pulver des Tages.*

Später gegen die Durchfälle:

**Rp. 268**

*Dec. tub. Sal. c* 3·0 300 0,  
*Extr. Opii aquos* 2·0,  
*Syr. simpl* 20·0.  
*S. Zum Getränk.*

**Rp. 269.**

*Bismuth subnitric.*,  
*Sacchar. alb. aa* 2·0,  
*Opn puri* 0·1.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 2stündlich 1 Pulver.*

**Rp. 270.**

*Bismuthi salicylici* 2·0,  
*Sacchar. lact* 2·5.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 2stündlich ein Pulver.*

**Rp. 271.**

*Chinini tannici* 1·5,  
*Opn puri* 0·1,  
*Sacchari albi* 3·0.  
*M. f. p. Div. in dos. aequ.*  
*No. 10*  
*S. 3—4 Pulver.*

**Rp. 272.**

*Aluminis crudi* 2·0—3·0,  
*Opn puri* 0·2,  
*Sacch. albi* 2·0.  
*M. f. p. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3 Pulver täglich.*

**Rp. 273.**

*Mixtur. gummos.* 150·0,  
*Tinct. Opii simpl. gtts* 15,  
*Syr. Diacodii* 15·0.  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

**Rp. 274.**

*Natr. (od. Acid.) tannic.* 1·0,  
*Opn pur.* 0·1,  
*Sacch. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 2stündl 1 Pulver.*

**Rp. 275.**

*Pulv. Dover* 1·0,  
*Sacch. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 2stündlich 1 Pulver*

Bei vorwiegender Betheiligung des Dickdarmes:

Rp. 276.

*Decoct. Salap e 5·0 : 500·0,*

*Tinct. Opii simpl. 2·0.*

*S. Zu 2 Klystieren.*

**Catarrhus intestinalis chronicus. Chronischer Darm-**

**katarrh.** Regelung der Diät, Vermeidung von reichlich kothbildenden Speisen (Brod, schniges Fleisch, Gemüse, Obst, Kartoffel) und grosser Einzel-Mahlzeiten (auch bei normalem Appetit). Mitunter Milcheur von gutem Erfolg. Achtung auf gutes Trinkwasser. Warme Bekleidung, Tragen von Leibbinden. In vielen Fällen, namentlich wenn Diarrhoe und Verstopfung abwechseln, Trinkeuren in Karlsbad oder Marienbad angezeigt. Wechsel des Klimas oft von grossem Erfolg. Kühle Sitzbäder. Bei Anhäufung von Fäeces im Darin erweichende Klystiere oder leichte Abführmittel (Ol. Ricini, Calomel etc.) Im Uebrigen Astringentia mit Opium (wie bei Catarrhus intestinalis acutus) Ferner:

Rp. 277.

*Natr. tannic.,*

*Extr. Colombo aa 1·0,*

*Opii pur. 0·1,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*

*S. 3mal tägl. 1 Pulver.*

Rp. 278.

*Extr. Colombo 2·0,*

*Pulv. Doveri 1·0,*

*Elacac. Cinnamon 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*

*S. 3mal tägl. 1 Pulver.*

Rp. 279.

*Decoct. rad. Colombo e 10·0*  
*ad 150·0,*

*Tinct. Opii simpl. gtts. 10,*

*Syrupi cort Aurant.*  
*15·0.*

*D S. 2stündl. 1 Esslöffel.*

Rp. 280.

*Decoct. ligni Campech.*

*e 20·0 : 200·0,*

*Tinct. Opii simpl. gtts. 15,*

*Syr. Diacodii 20·0.*

*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

## Rp. 281

*Decoct. rad. Ratanh. e* 200 : 200·0,  
*Tinct. Opii crocat.* 1·0,  
*Syr. Cinnamonomi* 20·0.  
*S.* 2stündl. 1 Esslöffel.

Bei starkem Meteorismus und sauren Stühlen Einreibung aromatischer Salben (siehe „Catarrhus ventriculi chronicus“ S. 48), sowie innerlich.

## Rp. 282.

*Magnes. ust.*,  
*Sacch. alb. aa* 2·0,  
*Pulv. rad. Rhei* 1·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aqua. No* 10.  
*S.* 3mal tägl. 1 Pulver.

## Rp. 283.

*Aqu. Menth. pip.*,  
*Aqu. Foenicul. aa* 75·0,  
*(Estr. lign. Campech. 1·0)*,  
*Morph. mur* 0·02,  
*Syr. Rhei* 20·0.  
*S.* 2stündl. 1 Esslöffel.

Wenn der Dickdarm vorzugweise ergriffen ist, adstringierende Klystiere, noch besser aber Hegar'sche Eingiessungen von adstringierenden und desinficirenden Lösungen: Alaun, Tannin in  $\frac{1}{2}$ —1%igen, Plumb. acetic in  $\frac{1}{2}$ %igen Lösungen.

**Typhlitis et Perityphlitis. Entzündung des Blinddarmes und seiner Umgebung** Nur im Beginn, wenn bedeutende Anhäufung von Fäcalmassen im Coecum besteht, leichte Abführmittel (Ricinus, Tamarinden) oder hohe Darmirrigation. Sowie Erscheinungen von peritonealer Reizung auftreten, absolute Ruhe, flüssige leichte Kost (Milch, Eier, Fleischbrühe), energische Kälteapplication in der Ileocecalgegend. Innerlich:

## Rp. 284.

*Opii pur.* 0·5,  
*Sacch. alb.* 8·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos aqua No.* 20.  
*S.* Stündlich 1 Pulver.



Rp. 285.

*Morphii muriat.* 0·1,

*Sacch. albi* 10·0.

*M. f. p. Div. in dos. aequ. No. 25*

*S. Stündlich 1 Pulver.*

Wenn die Schmerzen nachgelassen, Einpackungen mit verdünnter Burow'scher Lösung. Erst wenn die peritonealen Erscheinungen vollständig geschwunden sind und Stuhlverstopfung fortbesteht, ein Abführmittel, am besten in Form eines Klysma's. Bei zurückbleibenden Exsudatresten Gebrauch von Karlsbad und lauen Bädern, besonders Moorbädern (Franzensbad, Marienbad.)

**Obstipatio alvi. Stuhlverstopfung.** Bei temporärer Stuhlverstopfung in Fällen leichten Grades schon Regelung der Diät von Erfolg: Vermeidung von Hülsenfrüchten, schweren Mehlspeisen, grobem Brod, lertem Rothwein; Aussetzen etwa vorher gebrauchter stopfender Medicamente, namentlich des Opiums. Dagegen Einnahme von Compotes, Milch, Butter, Honig etc. Wird hiedurch nicht schon Stuhlabgang erzielt, Gebrauch eines Wasserklystieres. In neuerer Zeit mit sehr gutem Erfolg kleine Klystiere mit etwa 15 gr. Glycerin oder Glycerin-Suppositorien.

In hartnäckigen Fällen Klystiere mit Salzwasser. Ferner je nach dem Grade der Stuhlverstopfung 1 Weinglas bis 1 Wasserglas Osner, Saldschützer Bitterwasser oder Friedrichshaller Wasser. Am besten des Morgens auf nüchternem Magen, bei empfindlichen Individuen etwas gewärmt. 1 Esslöfel Marienbader, Karlsbader oder Kissinger Salz in  $\frac{1}{2}$  Glas kalten Wassers gelöst, hat gleichfalls Effekt. Ebenso ein Seidlitzpulver. Schwächere oder stärkere Abführmittel, innerlich oder per Klysma:

Rp. 286.

*Ol. Rvini* 50 0.

*S. 1-2 Esslöfel in Suppe oder schwarzem Kaffee oder mit etwas Cognac zu nehmen.*



Rp. 287.

*Capsul. gelatin. cum Ol.  
Ricin. 10 bis 30. No. 20.  
S. 5—10 Stück zu nehmen.*

Rp. 288.

*Pulv. rad. Rhei 600.  
S. Messerspitze zu  
nehmen.*

Rp. 289.

*Decoct. pulp. Tamarind,  
e 200 : 2000,  
Cremor. Tartari 200.  
S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Angenehmer zu nehmen ist:

Rp. 290.

*Decoct. pulp. Tamarind.  
e 200 : 2000,  
Magnes. citric.,  
Syr. mannat. aa 200.  
S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Rp. 291.

*Electuar. lenitiv. 500.  
S. Auf 2mal zu nehmen.*

Rp. 292.

*Hydrom. infant. 500.  
S. Wie das Vorige.*

Rp. 293.

*Hydrom. infant.,  
Tinct. Rhei aqu.  
aa 300.  
S. Auf einmal zu nehmen.*

Rp. 294

*Aqu. laxativ. Vienn. 500.  
S. Auf einmal zu neh-  
men.*

Rp. 295.

*Aqu. laxativ. Vienn. 500.  
Aqu. Laurac. 50,  
Syr. rub. Idaei 150  
S. Lauacarm zu nehmen.*

Rp. 296.

*Sal. amar. 300.  
S. Die Hälfte oder das  
Ganze in Wasser auf-  
gelöst zu nehmen.*

In hochgradigen Fällen:

Rp. 297.

*Inf. folior. Sennae  
e 150 : 2000,  
Syr. rub. Idaei 200.  
S. Die Hälfte auf ein-  
mal, dann alle 2 Stun-  
den 1 Esslöffel.*

Ebenso Klystiere von:

Rp. 288.

*Inf. folior. Sennae  
e 150—300 : 2000,  
Ol. Ricini 200.  
S. Auf 2 Klystiere.*

Rp. 299.

*Inf. fol. Sennae e 200 :  
2000.*

*Natrii sulfur. 200.*

*S. Klystier.*

Rp. 300.

*Pulv. rad. Jalap 0·6—0·8,  
Sacch. alb. 15.*

*M. f. pulv. Id. in dos.  
aequ. No. 3.*

*S. 2—3 Pulver in  
3stündigen Pausen.*

Wenn alle Mittel versagen:

Rp. 301

*Ol Ricini* 15·0,  
*Ol. Croton. gtts.* 2.  
*S.* 1—2 Kaffeelöffel.

Bei habitueller Stuhlverstopfung Abführmittel so lange als möglich zu meiden.

Entsprechende diätetische Massnahmen, reichlicher Genuss von rohem und gekochtem Obst, Obst-Curen, Traubencuren, regelmässige fleissige Bewegung. Heilgymnastische Proceuren sind oft von ausserordentlich gütlichem Einfluss, ebenso Reiten, Schwimmen etc. Sich einstellender Stuhl drang darf nie unterdrückt werden, der Patient soll selbst danach trachten, täglich zur bestimmten Zeit Stuhl zu haben. In manchen Fällen Trinken von kaltem Wasser auf nüchternem Magen, Rauchen einer Cigarre nach dem Frühstück oder Aehnliches von guter Wirkung.

Ueber Nacht Priessnitz'sche Umschläge auf den Unterleib, Kaltwassercuren. In hartnäckigen Fällen Faradisation des Darms, die Elektroden entweder am Bauch und Rücken, oder eine auf die Haut des Abdomens aufzusetzen, die andere in den Mastdarm einzuführen. Auch methodische Massage des Unterleibs oft von Nutzen. Sommercuren in Marienbad, Kissingen etc. Regelmässiger Gebrauch des Klysompomps oder hochgehender Darm-Irrigationen. Wenn methodischer Gebrauch von Abführmitteln sich als nothwendig erweist.

Rp. 302.

*Natr. sulfuric.* 100·0,  
*Natr. bicarbonic.* 10·0,  
*Natr. chlorat* 5·0.  
*S.* Kunstl. Carlsbader Salz,  
 1 Esslöffel in  $\frac{1}{10}$  Liter  
 Wassers aufgelöst, am  
 Morgen zu trinken.

Rp. 303.

*Cremor. Tartari* 20·0,  
*Magnes. carbon* 2·0,  
*Elaeos Foeniculi* 30·0  
*M. f. pulv. Da ad scut.*  
*S.* Früh u. Abends 1 Ess-  
 löffel in Wasser.

Rp. 304

*Natr. bicarbon.,*  
*Pulv. rad. Rhei,*  
*Elaeos. fruct. Aurant.*  
aa 10·0.  
S. Früh und Abends  
1 Kaffeelöffel.

Rp. 305.

*Pulv. rad. Rhei* 5·0,  
*Extr. Gentian.* q. s. ut  
f. pil. No. 25.  
*Conspurge pulv. Cinna-*  
*moni.*  
S. 2mal täglich je 5  
Pillen.

Rp. 306.

*Extr. Aloës* 1·0,  
*Pulv. rad. Rhei* 2·5,  
*Sapon. medicinal* qu. s.  
ut f. pil. No. 10.  
*Consp. pulv. rad. Rhei.*  
S. 1—1 Pillen des Abends  
zu nehmen.

Rp. 310.

*Extr. Aloës* 3·0,  
*Podophyllini* 0·2,  
*Extr. Turaxaci,*  
*Pulv. rad. Rhei* aa 2·0.  
*M. f. massa pil. e qua form. pil.* No. 10.  
*Consp. Elaeosacch. Anis.*  
S. Abends 1—3 Pillen.

Rp. 307.

*Pulv. rad. Rhei* 3·0,  
*Extr. Aloës* 1·0,  
*Extr. Colocynthid.* 0·3,  
*Extr. Rhei* q. s. ut f.  
pil. No. 30.  
*Consp. Lycopod.*  
S. Früh und Abends je  
2 Pillen.

Rp. 308.

*Spec. lax. St. Germ.* 30·0.  
S. Thee, 1 Kaffeelöffel  
bis 1 Esslöffel über  
Nacht mit  $\frac{1}{4}$  Liter  
Wasser anzusetzen, Früh  
aufzukochen und warm  
trinken zu lassen.

Rp. 309.

*Podophyllin.* 0·2,  
*Sacch. alb.* 3·0  
*M. f. pulv. Dic. in dos*  
*aequ.* No. 10.  
S. 3mal tagl. 1 Pulver.

**Ulcera intestini tuberculosa** Tuberculöse Darm-  
geschwüre. Entsprechende Behandlung der gleichzeitig  
vorhandenen Lungentuberculose. Sorge für Hebung

des Ernährungszustandes, dabei jedoch darmreizende Mittel, wie Leberthran, Molken, eisenhaltige Mineralwässer zu meiden. Die Nahrung hauptsächlich aus Milch, Eiern, leichtem Fleisch, Suppe, eventuell Fleisch-Solution zu bestehen. Das Abdomen warm zu halten, bei Schmerzen Kataplasmen. Gegen die Diarrhöe und Koliken vor allem Opium (s. „Cat. intestin. chron.“, S. 55 f). Von sehr guter Wirkung ist oft:

Rp. 311.

*Bismuth. subnitric. 5 0,*  
*Opii pur. 0·2,*  
*Sacch. alb. 4 0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3—5mal tägl. 1 Pulv.*

Rp. 312.

*Bismuth. salicylic. 5·0,*  
*Extr. Opii aquos. 0 1.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 2—3 stündlich 1 Pul-*  
*ver.*

Ferner Colombowurzeldecoct mit Opium (s. Rp. 279).

Bei Localisation im Dickdarm Klystiere von Salep, Amylum, Reisabkochungen etc. mit Zusatz von Opium oder Klystiere mit astringirenden Mitteln:

Rp. 313.

*Argent. nitric. 0·5,*  
*Aqu. dest. 200·0.*  
*S. Zu 2 Klystieren.*

**Noduli haemorrhoidales. Goldene Ader, Hämorrhoiden.** Diät aus leicht verdaulichen Speisen bestehend, nicht zu viel Fleisch, sondern mehr grüne Gemüse, Vermeidung von Alcoholicis, Kaffee, Thee, sowie von Gewürzen. Mässigkeit in sexueller Beziehung. Fleissige, aber nicht forcirte Bewegung im Freien. Sorge für tägliche Leibesöffnung, zu diesem Behufe Klystiere, Trinkenren in Karlsbad, Marienbad, Kissingen, Homburg etc.; von Abführmitteln am besten die salinischen. Vorgefallene Knoten in Knieellenbogenlage des Pat. zu repouiren. Bei Entzündung des Knotens Umschläge mit kaltem Wasser, Bleiwasser, essigsaurer Thonerde. Bei starken

Blutungen Ruhe, Klystiere mit Eiswasser oder Astringentien, eventuell eine Ergotin-Injection oder chirurgische Behandlung. Bei Entzündung der Hamorrhoidalknoten und Schmerzen local Umschläge mit Aqu. Plumbi oder Application von Kälte; ferner:

Rp. 314.

*Jodoform.* 2·0,  
*Extr. Opii aquos.* 0·5,  
*Ungu. emoll.* 30·0.  
*S.* Die Knoten damit mehrmals im Tag zu bestreich.

Rp. 315.

*Extr. Belladonn.* 0·5,  
*Ungu. Altheae* 30·0.  
*S.* Wie das Vorige.

Rp. 316.

*Plumbi acetici* 0·25,  
*Extr. Opii uquosi* 0·05,  
*Butyri Cacao* 2·0.  
*M. f. suppositorium.* *Dent.*  
*talía* No. 10.

*S.* Einigemale des Tags  
ein Stuhlzäpfchen zu appliciren.

### Occlusio intestini acuta Acuter Darmverschluss.

Wenn möglich, causale Behandlung; in manchen Fällen einfach Entfernung eingedickter Fäcalmassen oder fremder Körper nöthig. Nur in diesem Falle ist Verwendung von starken Abführmitteln erlaubt

Rp. 317.

*Olei Ricini* 60·0.  
*S.* Auf einmal zu nehmen (in schwarzem Kaffee.)

Rp. 318.

*Extract. Aloes* 1·0,  
*Resin. Jalapae* 2·0,  
*Succh. alb* 3·0  
*M. f. pulv. Dir. in dos aequ.* No. 10.  
*S.* 3mal tägl. 1 Pulver.

Rp. 319.

*Infus. folior. Sennae* e 10·0 ad 150·0,  
*Magnesia sulfur.*  
*Syr. rub. Idaei* aa 15·0.  
*S.* Stündlich 2 Löffel bis zur Wirkung.

Rp. 320.

*Ol. Crotonis gtts. 3,*  
*Mucil. gumm. Arab. 20·0,*  
*Aqu. font. 40·0,*  
*Syr. rub. Idaei 15·0.*

*S. 2stündlich 1 Esslöffel, bis starke Wirkung erfolgt.*

In allen übrigen Fällen (Volvulus, Achsendrehung, Intussusception, innere Incarceration, Compression etc) vor Allem Ruhestellung des Darms durch Opium oder Morphinum.

Rp. 321.

*Extr. Opii aquos 0·3,*  
*Sacch. alb. 4·0,*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aqu. No. 15.*  
*S. Stündlich 1 Pulver.*

Rp. 322.

*Morphii mur. 0·1,*  
*Sacch. albi 5·0.*  
*M. f. p. Div. in dos. aequ.*  
*No. 15.*  
*S. Stündlich 1 Pulver.*

Ebenso eine oder mehrere subcutane Morphininjectionen, besonders wenn häufiges Erbrechen besteht. Hegar'sche Irrigationen. Eingiessungen von 1—3 Liter Wasser mittelst Irrigators, der Patient dabei einfach in Seitenlage oder Rückenlage mit erhöhtem Steiss. Statt des Wassers auch Lösungen von:

Rp. 323.

*Natr. chlorat.*  
*120 0 200·0.*  
*S. In 2 Liter Wasser zu*  
*lösen zur Eingiessung.*

Rp. 324.

*Magnes. sulfur. 150 0,*  
*Aqu. dest 500 0.*  
*S. Zusatz zu 2 Litern*  
*Wasser zur Eingiessung.*

Einblasungen von Luft in den Mastdarm mit Hilfe eines Gummiballons, Klysmen mit einem Syphon sind anwendbare, jedoch mit Vorsicht zu behandelnde Methoden.

Bei Eintreten von Ileus in jedem Falle ein Versuch mit Ausspülung des Magens angezeigt. Eventuell einmal im Laufe des ersten Tages der Erkrankung zu wiederholen. Ausserdem wiederholte warme Bäder. Wenn am zweiten Tage der Behandlung kein Luftabgang per



anum oder kein Stuhl erfolgt, wenn rapidus Wachsen des Meteorismus sich einstellt, auf jeden Fall Laparotomie angezeigt. Nicht warten, bis Collapserscheinungen oder peritonitische Symptome sich einstellen. Bei starker Spannung des Abdomens multiple Punctionen der geblähten Schlingen mit der Pravaz'schen Nadel oder vorläufige Anlegung eines Anus praeternaturalis.

**Stenosis intestini. Darmstenose.** Sorge für wenig kothbildende Nahrung vgl. frühere Abschnitte, spec.: chron. Darmkatarrh. Zeitweilig Anwendung von leichten Abführmitteln, am besten von Ol. Ricini, oder Rheumpräparaten. Bei stärkeren Kolikschmerzen und Steigerung der Stenosesymptome:

Rp. 325.

*Extract. Belladonnae* 0.2,  
*Opii puri* 0.3,  
*Sacchar. alb.* 6.0.  
*M. f. p. Div. in dos. aequ.*  
*No. 15.*  
*S. 5–6 Pulver im Tag.*

Rp. 326.

*Extract. Belladonn.* 0.5,  
*Extract. Gent.* 2.0,  
*Pulv. rad. Rhei* 3.0  
*M. f. pil. No. 50.*  
*S. 2–4 Pillen des Tages.*

Wenn möglich, operative Behandlung.

**Taenia. Bandwurm.** Eingreifende Bandwurmeuren nur bei sonst gesunden Individuen vorzunehmen; bei anderweitig Kranken, schwächlichen oder abgemagerten Leuten höchstens Abführmittel oder ein Bandwurmmittel in geringerer Dosis. Während der Menstruation, Schwangerschaft oder Lactation keine Bandwurmeur. Am Abend vor der Bandwurmeur soll der Pat. nach 5 Uhr nichts mehr zu sich nehmen, als etwas Suppe. Am Abend eine halbe oder eine ganze Flasche Bitterwasser oder ein anderes Abführmittel zu reichen, damit einige Stühle erzielt werden. Am nächsten Morgen nüchtern oder nach Einnahme einer Tasse Thee oder Kaffee das Bandwurmmittel.



Rp. 327.

*Extract. filicis Mar. aether 1·0.*

*Dentur tales doses in caps. gelatin. No. 10*

*S. Im Laufe einer halben Stunde zu schlucken.*

1 2 Stunden später, wenn kein Stuhl erfolgt, ein Abführmittel, jedoch kein Ricinusöl. Letzteres in Rücksicht auf mehrfache, nach Verabreichung selbst kleiner Dosen von Filixextract erfolgte tödtliche Vergiftungen. (Das giftige Princip, die amorphe Filixsäure, wird bei Gegenwart von Öl rasch resorbirt, was für die beabsichtigte Wirkung sowohl abträglich, als für den Patienten gefährlich werden kann) Am besten wird Aqua laxativa viennensis oder ein Sennainfus gereicht.

Ebenso wie das vorige Mittel wird auch angewendet:

Rp. 328.

*Cort. rad. Punic. Granat.*

150·0,

*Aqu. font 100·0,*

*Mucra per horas 24*

*Dein coque ad col. 200·0,*

*Adde: Syrup. Zingiberis*  
20·0.

*S. Im Laufe einer halben Stunde auszutrinken, oder mit d. Schlundsonde zu appliciren.*

Wenn die Taenia nicht abgeht, nach 1½ Stunde 1—2 Löffel Ricinusöl. Bei Brechreiz: Rotulae Menthae pip und Beissen in eine Citrone.

Rp. 329.

*Flor. Koussou 30·0,*

*Mel. despum. q. s ut f. mellago.*

*S. Auf dreimal in 1-stündigen Intervallen zu nehmen.*

Rp. 330. *Pule Kamalae 15·0.*

*Div. in dos. aequ. No. 3.*

*D. S. Jede halbe Stunde 1 Pulver*

### **Ascaris lumbricoides. Spulwurm.**

Rp 331. *Santonin. pur 0·3 0·8,*

*Sacch. lact. 2·0.*

*M. f. pule Div. in dos. aequ. No. 10.*

*S. 3—4 Pulver im Tag.*

Rp. 332. *Santonin. pur. 0·5.*

*Sacch. alb. 5 0.*

*Pulv. Tragacanth. q. s. ut f. trachise. No. 20.*

*S. Früh und Abends je 1—2 Stück.*

Zweckmässig wird das Santonin gleich mit einem Abführmittel verbunden.

Rp. 233.

*Santonin. pur. 0·5.*

*Pulv. rad. Rhei chin.*

*Sacch. alb. aa 5 0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*S. 3mal täglich 1 Pulver.*

**Oxyuris vermicularis. Madenwurm.** Klystiere mit kaltem Wasser, denen man Oelklystiere folgen lassen kann. Klystiere mit Sapo medicinalis 6 gm. auf einen Liter Wasser, mit dem Irrigateur zu appliciren. Früh und Abend zu wiederholen. Combiniren mit einer Santoninbehandlung.

**Peritonitis diffusa acuta. Acute Bauchfellentzündung.** In heftigen Fällen energische Kälteapplication auf das Abdomen, Leiter'scher Kühlapparat. Anfangs absolute Entziehung der Nahrung, bis auf etwas Milch, Schleimsuppen, Gefrorenes, Thee. Innerlich behufs Ruhestellung des Darms:

Rp. 334.

*Morphin. mur. 0·1,*

*Sacchar. alb. 6 0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 15.*

*S. Stündl. 1 Pulver.*

! Rp. 335.

*Opü pur. 0·3,*

*Sacch. alb. 6·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 15.*

*S. Stündl. 1 Pulver.*

Gegen Erbrechen Eispillen, Sodawasser und

Rp. 336

*Agt. Laurocer. 20·0,*

*Morph. mur. 0·1.*

*S. Stündl. 10 Tropfen*

Gegen Singultus dieselben Mittel, ferner Hautreize im Epigastrium; wenn dies Alles nicht wirkt, subcutane Morphin-Injection. Bei hochgradigem Meteorismus nebst Kalteapplication, Aufträufeln von Aether auf den Unterleib: multiple Punctionen geblähter Darmschlingen, Einführung eines langen Drainrohres in den Mastdarm. Bei Collaps Wein, Champagner, Aether-Injection. Operative Behandlung selbst bei anscheinend verzweifelten Fällen von perforativer Peritonitis nicht selten erfolgreich.

**Peritonitis tuberculosa. Chron. Tuberculose des Bauchfells.** Einreibungen mit Kaliseife und mit Jodoformsalbe.

Rp. 337.

*Jodoformii 50,*

*Vasolini 1000.*

*F. unguentum.*

*S. Früh u. Abend nussgross einzureiben in d. Abdomen, darüber Billroth-Battist und eine Gazebinde.*

Bei Fällen mit stärkerem Ascites frühzeitige Punction, eventuell Schnittoperation mit völliger Entleerung der angesammelten Flüssigkeit. Anwendung von Diureticis gibt wenig Aussicht auf Erfolg.

**Icterus catarrhalis Katarrhalische Gelbsucht.** Behandlung des zu Grunde liegenden Magen- und Darmkatarrhs. In intensiven Fällen Bettruhe, strenge Diät (Suppe, Schleime), bei längerer Dauer leichte Fleischspeisen, Kohlehydrate, Eier, gekochtes Obst, strenge Vermeidung aller Fette. Gebrauch eines Alkali, wie Karlsbader Salz, Bülmer und Giesshübler-Wasser, oder:

Rp. 338.

*Natr. bicarbon 50,*

*Aqu. font. 1500,*

*Succ. Citri,*

*Syr. simpl. aut 200.*

*S. 2stündlich 1 Esslöffel*

Die Stuhlverstopfung anfangs nur durch Klystiere zu beheben; später, wenn die Erscheinungen des Magenkatarrhs zurückgegangen, *Tinctura Rhei aquosa*, *Aqu. laxativa*, *Rheum*; bei längerer Dauer Gebrauch von Mineralwassercuren, namentlich Karlsbad, Marienbad. Bei sehr hartnäckigem Icterus:

Rp. 339.

*Natr. salicylic.*,

*Natr. sulfuric.*,

*Natrii bicarbon. aa 15.*

*M. f. p. dent tales doses No. 10.*

*S. 1—2 Pulver täglich in Wasser gelöst zu nehmen.*

Systematischer Gebrauch von lauen Bädern und von Priessnitz-Einpackungen des Abdomens. Sehr empfehlenswerth sind hohe Darmirrigationen, 1—2 Liter kühlen Wassers (20° R.). Gegen das Hautjucken Abreibungen mit Citronensaft, Betupfen mit 2°iger Carbollosung oder mit 5°iger alcoholischer Menthol solution. Ferner Waschen mit:

Rp. 340.

*Emulsion. amygdalinae 300.0,*

*Aqu. Amygd. amarar. 100.0,*

*S. Mit einem kl. Schwämmchen aufzutragen.*

Rp. 341.

*Amygdalini 1.0,*

*Emuls. amygdal. 200.0.*

*S. Wie das Vorige.*

**Cholelithiasis. Gallensteinbildung.** a) Während der Anfälle: vollständige Ruhe, warme Tücher oder warme Umschläge auf das Abdomen; protrahirte warme Bäder oft sehr günstig wirkend. Schmerzstillende Einreibungen (Chloroformöl Umschläge). Bei heftigen Schmerzanfällen subcutan:

Rp. 342 *Morph. mur 0.1 0.2,*

*Aqu. dest 100.*

*S. 1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

Rp. 343.

*Morph. mur.* 0·1,  
*Aqu. Laurocerasi* 10·0.  
*S. 3mal im Tage* 10—15  
*Tropfen.*

Rp. 344.

*Extract. Belladonn.* 0·25,  
*Aqu. Lauroceras.* 10·0.  
*S. 20 Tropfen.*

Rp. 345.

*Morph. mur.* 0·4,  
*Adipis suilli* 4·0,  
*Cerae alb.* 1·5,  
*Olei cacao* 6·0.  
*F. Suppositoria No. 10.*  
*S. 1—2 Zäpfchen täglich.*

Bei Kühle der Extremitäten und kaltem Schweiss die Extremitäten in warme Tücher zu hüllen, etwas Glühwein, eventuell :

Rp. 346.

*Aether. sulf.* 2·0,  
*Aqu. dest.* 100·0,  
*Syr. cort. Aurant.* 20·0.  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Wenn der Kranke nicht schlucken kann, Kampher-

klystier oder Aether-Kampher-Injection.

Rp. 347.

*Camphor. trit.* 0·5,  
*Mucil. gumm. Arab.* 20·0,  
*Aqu. dest.* 100·0.  
*S. Zum Klystier.*

b) Behandlung ausserhalb der Anfälle: Reichliche körperliche Bewegung, Spazierengehen, Bergsteigen, Reiten, gymnastische Uebungen. Diät leicht verdaulich, Gemüse, Obst; Uebermaass von Fleischnahrung zu meiden, Sorge für regelmässigen Stuhl. Zu vermeiden sehr kaltes Getränk, Eis. Gebrauch von Alkalien, namentlich in Form einer Trinkcur mit den Wässern von Karlsbad, Marienbad, Kissingen, Vichy.

Rp. 348. *Natrii salicyl.,*

*Natrii bicarbon.*

*Natrii sulfurici aa* 1·0.

*F. p. Dentur tales doses No. 20.*

*S. 2—3mal täglich ein Pulver in Wasser gelöst.*

Ferner täglich eine hohe Darmirrigation mit 1 - 2 Liter lauen Wassers (28° R.) und Zusatz von 2 Esslöffeln Natrium bicarbon.

Das alte Durand'sche Mittel ist:

Rp. 349.

*Aether. sulf.* 200,

*Ol. Terebinth.* 50.

*S. Mehrmals täglich 15 - 30 Tropfen.*

Oder:

Rp. 350.

*Aether. sulfuric. gtts.* 6,

*Ol. Terebinthin. gtts.* 4,

*Erhibe in capsul. gelatinos.*

*Dent. tal. dos. No. 30.*

*S. Täglich 5 Stück zu nehmen.*

Endlich ist an die sehr ermunternden Erfolge der chirurgischen Behandlung des Gallensteineidens zu erinnern.

### **Cirrhosis hepatis. Laennec'sche Cirrhose der Leber.**

Im Beginn kann man der Causal-Indication noch manchmal Genüge leisten durch Entziehung des Alkohols. Im Uebrigen im Beginn des Leidens namentlich Karlsbader oder Marienbader Cur. Gebrauch von leichten Abführmitteln, wie Karlsbader Salz zu empfehlen. Durch Monate fortgesetzte Milchdiät. Zweckmässig in Verbindung mit einer leichten Jodtherapie.

Rp. 351.

*Natri jodat* 0.3

*D. tales dos. No. 10 ad chart. cer.*

*S. 3 Pulver des Tages, jedes in Milch zu nehmen.*

Bei entwickeltem Ascites gelingt es nicht selten durch eine Calomelbehandlung Beseitigung desselben und zwar für längere Zeit zu erzielen. Häufig sind zweckmässig kleinere Dosen von Calomel (4 Dosen von 0.1 g pro die), um die erwünschte Wirkung auf die Diuresis



zu erzielen. Andere Diuretica haben in der Regel keinen Erfolg. Wenn der Ascites nicht schwindet, Paracentesis abdom., und zwar jedesmal zu wiederholen, bevor die Spannung des Abdomens eine zu grosse wird.

Die hypertrophische Cirrhose gibt keine andere specielle Indication. Die syphilitische Hepatitis erfordert energische antiluetische Behandlung.

**Nephritis acuta. Morbus Brightii acutus. Acute Nierenentzündung.** Unter allen Verhältnissen dauernder Aufenthalt im Bette bis zum Verschwinden der Symptome oder zum Uebergang in eine chron. Form. Reine Milchdiät. Wenn nöthig, etwas Schleimsuppe und Bouillon. Erst im Stadium der Rückbildung leichte gemischte Kost gestattet. Alcoholica, Gewürze verboten. Im Beginn der Erkrankung bei hochgradiger Verminderung der Diurese: warme Bäder (30° R.) mit folgenden Einhüllungen in Kotzen behufs Einleitung stärkerer Diaphores. Bei bestehender Herzschwäche, kleinem frequenten Pulse an Stelle des Bades Einpackung in mit heissem Wasser getränkte ausgewundene Leinen. Bei kräftiger Herzaction Pilocarpinjection (0.01 bis 0.02 Pilocorpin. mur. subcutan) gestattet; doch die früher genannten Verfahren vorzuziehen. Als Getränk am zweckmässigsten Milch zur Hälfte mit Giesshübler oder Bilinear Wasser zu reichen, eventuell die Wasser allein. Ausserdem Limonade, Lindenbluthentheee u. dgl. Bei sehr verminderter Urinsecretion und Bestehen eines frequenten kleinen Pulses:

**Rp. 352.**

*Infus. folior. Digital. e 0.5 ad 150.0,*

*Liquor Kali acetici 10.0,*

*Syr. rub. Idaei 15.0.*

*§ 2stündlich 1 Esslöffel*

Beim Auftreten acuter urämischer Symptome, besonders beim Ausbrechen eklamptischer Anfälle ist folgendes Verfahren indicirt: Zur Beseitigung der



Convulsionen subcutane Morphininjection, Chloroforminjection (sehr zweckmässiges Verfahren), Chloralkysmen (2—4 gm), innerlich:

Rp. 353.

*Chloralhydrat.* 2 0,

*Morph. mur.* 0 02,

*Aq. dest.* 70 0,

*Syr. cort. Aurant.* 10 0.

*S. Auf einmal.*

Weiters zur Behebung des urämischen Zustandes energische Fortsetzung der schon früher begonnenen Diaphorese, wiederholte Pilocarpininjection bes. bei kräftigem, etwas verlangsamtem Pulse), ferner kräftig wirkende Abführmittel, innerlich oder als Klysma.

Bei vollständig entwickeltem urämischem Koma laues Bad mit kalten Uebergiessungen, bei weiterer Steigerung der Symptome und Abnehmen der Herzkraft Injectionen von *Oleum camphoratum*. Wenn Oedeme, Hydropsien der serösen Höhlen, Glottis-, Lungenödem auftreten, vgl. die betreffenden speciellen Abschnitte und das Capitel über chron. Morb. Brightii. Nach Schwinden der acuten Symptome und zurückbleibender Albuminurie Vorsicht der Lebensweise und Diät. Wenn möglich Aufenthalt unter günstigen klimatischen Verhältnissen, eventuell Eisen. Reichlicher Milchgenuss, keine Alcoholica.

### **Nephritis chronica praecipue parenchymatosa.**

**Chronischer, vorwiegend parenchymatöser Morb. Brightii.**

Regulirung der Lebensweise und Diät. Am besten zeitweilig dauernder Aufenthalt im Bett. Reichliche Milchkost, daneben jedoch eine dem Individuum angepasste gemischte Nahrung. Der Zustand des Verdauungsapparates wird in dem einzelnen Falle massgebend sein für die Einrichtung der Diät. Bei bestehendem Hydrops fortlaufender Gebrauch von heissen Bädern (40° C, 20—30 Min. Dauer). Nach dem Bad wird der Kranke in Kotzen gehüllt, trinkt in der Verpackung einige Tassen warmen

Lindenblüthenthees und verbleibt so 2 - 3 Stunden. Nabezu ebenso wirksam ist die Verwendung des Schwitzkastens, in dem der Patient 5—10 Minuten bleibt, um dann nachzuschwitzen. Ferner noch folgendes diaphoretisches Verfahren: Der Kranke liegt im Bett, die warmen Kotzen, mit denen er zugedeckt ist, sind über Holzreifen gelegt. In dem so entstehenden Hohlraum, in welchem der Kranke bis zum Kopfe sich befindet, brennt eine in einem entsprechenden Gefäss gesicherte Spirituslampe. Alle diese energischen Procedures Anfangs mit Vorsicht und mit relativ geringer Dauer vorzunehmen; wenn dieselben nicht vertragen werden oder aus äusseren Gründen nicht durchzuführen sind, auch Priessnitz'sche Einpackungen, wobei der ganze Körper von den Schultern an in ein in heisses Wasser getauchtes, gut ausgedrücktes Linnen und darüber in mehrere Decken eingehüllt wird; der Kranke verbleibt in der Einpackung 2 - 3 Stunden. Die Diaphorese kann, wenn diese Methoden fehlschlagen, auch erzeugt werden durch *Pilocarpin*:

Rp. 354.

*Inf. fol. Jaborandi*

*c 50. 1500,*

*Syr. acetos Citri 30 0.*

*S. Binnen 1 Stunde zu nehmen.*

Besser, weil den Magen nicht afficirend, ist:

Rp. 355.

*Pilocarpin. mur. 0.2,*

*Aqu. dest. 1000.*

*S.  $\frac{1}{3}$  1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

Der Kranke erhält den Auftrag, den bei reichlicher Salivation fliessenden Speichel nicht zu schlucken — dadurch kann Erbrechen vermieden werden.

Bei allen diaphoretischen Procedures Achtung auf Collaps!

Um die *Diuresis* anzuregen, reichliches Wassertrinken, oder Gebrauch von Mineralwässern, die viel Chloralkalien enthalten, wie Bilm, Giesshübl, Rohitsch, Vichy etc. Bei sehr chronisch verlaufenden Fällen mit hartnäckigem *Hydrops Diuretica*, namentlich kohlensaure und essigsaure Alkalien:

Rp. 356.

*Lith. carbonic. 1·0,*

*Sacch. alb. 2·0.*

*M. f. pulv. Dir. in dos*  
*aegu. No. 6.*

*S. 2stündlich 1 Pulver.*

Ferner vegetabilische  
(resp. animalische) Diuretica:

Rp. 357.

*Rad. Ononid.,*

*Rad. Petroselin.*

*Rad. Levistic.,*

*Bacc. Juniper. aa 30·0*

*S. Thee; Fröh u. Abends*

*1 Esslöffel auf 2 Tassen.*

Dazu kann man noch  
gehen:

Rp. 358

*Liqu. Kal. acetic. 50·0*

*S. 1 Kaffeelöffel auf*  
*1 Tasse des obigen*  
*Thees.*

Rp. 359

*Blatt. orient. 2·0,*

*Elaeos. Foeniculi 3·0.*

*M. f. pulv. Dir. in dos.*  
*aegu. No. 12.*

*S. 3stündlich 2 Pulver.*

Bei drohender Urämie kalte Umschläge auf den Kopf, reichliche Zufuhr von Getränken, namentlich von Brausemischungen, Säuren; Ableitung auf den Darm durch ein kräftiges Abführmittel (Aqu. laxativ., Fol. Sennae, Pulv. Jalapae).

Bei Auftreten von Erbrechen: Eispillen, Aqu. Laurocer. mit Morphinum.

Bei Asthma uraemicum: Chloralhydrat, Natr. bromat.

Bei urämischer Dyspepsie: absolute Milchdiät, Milch verdünnt durch Gleichenberger, Eisner, Bilmer Wasser, Versuch mit Molkeneur, Kefir; Gebrauch leichter Abführmittel, wie Tinctura Rhei aquosa.

Bei sich einstellender Schwäche des Herzmuskels mit Stauungen, Hydrops etc. Behandlung wie bei Vitium cordis im Stadium der Compensationsstörung. (s. S. 32 f.)

**Ren granulatus Genuine Schrumpfniere.** Von Anfang an Regelung der Lebensweise wie bei Vitium cordis. Vor Allem Vermeidung von reichlichen Mahlzeiten, reichlichem Alkoholenuss, Aufregungen (wegen Gefahr von

Hirnhämorrhagie). Am besten vorwiegende Milchdiät. Häufige laue Bäder, im Sommer Gleichenberg etc., im Winter Aufenthalt im Süden (bes. an Seeküsten). Bei urämischem Kopfschmerz Behandlung wie bei Anfällen von Hemicranie (s. S. 88).

Rp. 360.

*Coff. natrobenz. 1·5,*

*Phenacetini 2·5,*

*Sacch. lactis 1·0.*

*M. f. p. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*S. 3 Pulver täglich.*

Bei drohenden urämischen Anfällen und während derselben, siehe Neph. ac. und Neph. chron.

Bei eingetretener Schwäche des Herzmuskels Behandlung wie bei Vitium cordis im Stadium der Compensationsstörung. (S. 32 f).

**Degeneratio amyloidea renum. Amyloiddegeneration der Nieren.** Wenn möglich, Beseitigung des zu Grunde liegenden Leidens (Eiterung, Syphilis, Malaria). Innerlich Jodeisensyrup:

Rp. 361.

*Ferr. jodati sacch.,*

*Sacch. albi. aa 3·0.*

*M. f. p. Div. in doses aequ. No. 10.*

*S. 3 Pulver täglich.*

Rp. 362.

*Natrii jodati 0·3—0·5.*

*Dent. tal. doses No. 10 ad chartam ceratam.*

*S. 2—3mal täglich 1 Pulver in Milch.*

Gebrauch von Jodbädern, Hall in Oberösterreich, Lipik, Kreuznach etc.

**Pyelitis chronica. Chronische Nierenbeckenentzündung.** Bei saurem Harn Gebrauch von alkalischen Säuerlingen (Preblau, Giesshübel, Bilin, Fachingen) oder alkalisch-muriatischer Säuerlinge (Gleichenberg, Ems,

Lubatschowitz, Salzbrunn), endlich alkalisch-salinischer Mineralquellen (Marienbad, Karlsbad, Rohitsch). Ferner reichlicher Genuss von Milch, eventuell Molke.

Rp. 363.

*Acidi benzoici 1·0,*  
*Sacchar. lact. 3·0.*  
*M. f. pulv. Dic. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3–4 Pulver im Tag.*

Rp. 364.

*Natri salicyl. 3·0,*  
*Aq. dest. 150·0,*  
*Syrup. capill. Ven. 12·0,*  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Bei gleichzeitiger chron. Cystitis:

Rp. 365.

*Arbutini 3·0–4·0,*  
*Aq. destill. 150·0,*  
*Syrupi simpl. 10·0.*  
*S. 2stündl. 1 Esslöffel. (Sehr theuer!)*

Bei alkalischer Harnbeschaffenheit, sehr reichlichem citrigen Sediment Vermeidung alkalischer Mineralwasser. Hingegen Benzoesäure, Salicylsäure. Behandlung des etwa gleichzeitig vorhandenen Blasenleidens mit Ausspülungen etc.

**Nephrolithiasis. Nierensteine.** Während des Kolik-  
anfalles reichliches Trinken von Wasser und alkalischen  
Mineralwässern; energische Bewegung und zwar activer  
sowohl als passiver Art. Prolongirte laue Bäder, Morphinum  
innerlich, als Stuhlzäpfchen und subcutan. Nachher Regelung  
der Diät, Vermeidung von Wein, besonders weissem Wein,  
Vermeidung reichlicher Fleischnahrung, hingegen Obst,  
Gemüse empfehlenswerth, süsse Speisen zu verbieten.  
Leichtes Bier gestattet. Alkalische Sauerlinge, speciell  
Biliner, Fachinger, Preblauer reichlich zu geniessen.  
Triinkeuren in Karlsbad, Vichy, Marienbad. Besonders  
empfehlenswerth die Lithionbehandlung, sei es mit Hilfe  
lithionhaltiger Mineralwasser, wie Assmannshäuser Lithion-  
quelle (auf 24 Grad erwärmt 1–2 Flaschen täglich), Sal-  
vatorquelle, Salzbrunn, oder medicamentos:

Rp. 366.

*Lithii carbon.* 1·2,  
*Natri bicarb.* 0·3,  
*Aq. dest.* 400·0.  
*S. Innerhalb 2 Tagen zu*  
*verbrauchen.*

Rp. 367.

*Lithii carbon.* 0·1,  
*Natri bicarb.* 0·3.  
*F. p. Dentur tales doses*  
*No. 20.*  
*S. 5—6 Pulver im Tage.*

Ausserdem:

Rp. 368.

*Piperazini* 1·0,  
*Aq. destill.* 100·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*S. Früh, Mittag, Abend je 1 Drittel.*

**Meningitis cerebrospinalis.** Neben strengster Ruhe in gleichmässig temperirtem und zweckmässig etwas verdunkeltem Zimmer Kälte-Application auf den Kopf, Eiskappe oder Leiter'scher Kühlapparat. Nahrung rein flüssig. Eventuell locale Blutentziehung durch einige am Proc. mastoideus anzusetzende Blutegel.

Einreibung des rasirten Kopfes mit grauer Salbe oder mit:

Rp. 369.

*Jodoformii* 5·0,  
*Vasellini* 100·0.  
*M. f. unguentum.*  
*S. Salbe, 2mal täglich*  
*einreiben.*

Ableitung auf den  
Darm durch:

Rp. 370.

*Calomelan.* 0·5,  
*Pulv. rad. Jalap.,*  
*Sacch. alb. aa* 1·5.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 5.*  
*D. S. 3stündlich 1 Pulver.*

Rp. 371.

*Aqu. laxativ. Vienn.* 60·0,  
*Aqu. Cerasor. nigror.,*  
*Syr. rub. Idaei aa* 15·0.  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Rq. 372.

*Inf. fol. Sennae*  
*e* 15·0 *ad* 200·0,  
*Natrii sulfurici* 15·0.  
*S. Klysma.*

Bei starken Kopfschmerzen, wenn dieselben durch Kälte und Blutentziehung nicht genügend gemildert werden:



Rp. 373.

*Antipyrini* 1·0.

*Dent. tal. doses No. 4*

*S. 1 -2 Pulver im Laufe eines Tages.*

Rp. 374.

*Phenacetini* 0·5.

*Dent. tal. doses No. 10.*

*S. 4 Pulver innerhalb 8 - 12 Stunden zu nehmen.*

Rp. 375.

*Morph. mur. tr1,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv Div. in dos. aequ. No. 10.*

*S. 3mal tägl. 1 Pulver.*

Besser noch subcutane Morphininjection 0·005 bis 0·01.

Bei sehr grosser Unruhe: Chloral Klysmen (2 - 3 gm.), oder:

Rp. 376.

*Chloral. hydrat. 4 0,*

*Aqu. font.,*

*Syr. cort. Aur. aa 30 0.*

*S. 2stündl. 1 Kaffelöffel.*

Rp. 377.

*Kal. bromat. 5·0,*

*Aqu. dest. 150·0,*

*Syr. rub. Idaei 20·0.*

*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Bei Eintreten des Lähmungsstadiums der Krankheit, starkem Sopor: kalte Be-

giessungen, Senfteig auf Brust und Unterleib, reizende Klystiere (Essig) oder Klystier von:

Rp. 378.

*Camphor. ras. 1·0,*

*Subst. c. mucilag. gumm. Arab. 20·0*

*Add: ad*

*Inf. rad. Valerian.*

*e 10 0 : 200·0*

*S. Zu 2 Klystieren.*

Oder Aether-Kampher-Injection, Inject. von Ol. camphoratum.

Bei langsamer Rückbildung der Lähmungserscheinungen Gebrauch von Jod-

Rp. 379.

*Kal. (od. Natr.) iodat 1·0 - 2·0,*

*Aqu. dest. 80 0,*

*Syr. rub. Idaei 20·0.*

*S. Tagsüber zu verbrauchen.*

Gebrauch von Roborantien:

Rp. 380.

*Extr. Chinae frig. par. 2·0,*

*Aqu. destill. 100·0,*

*Syr. cort. Aur. 15·0.*

*S. 3mal tägl. 2 Esslöffel*

Rp. 381.

*Tinet. Ferri acetic. aeth 15·0*

*S. 2mal tägl. 6 Tropfen.*



Wenn die Krankheit günstig verläuft, vor Allem Sorge für genügende Ernährung, welche häufig in Folge anhaltenden Erbrechens oder bestehender Schlingstörungen grosse Schwierigkeiten bereitet und eventuell selbst die Verwendung der Schlundsonde oder die Anwendung von Nähr-Klysmen erforderlich macht. In den Endstadien warme Bäder, Soolbäder. Etwa zurückbleibende Lähmungen mit Massage, Gymnastik, Elektrizität zu behandeln.

**Haemorrhagia cerebri. Gehirnblutung.** Bei vollentwickeltem apoplektischem Insult, stark geröthetem Gesicht, bedeutender Pulsverlangsamung und stertoröser Respiration ausgiebiger Aderlass, sonst intensive Kälteapplication auf den Kopf (Eisblase, Kühlapparat), bei kleinem Puls und blassem Gesicht Excitantia (Senfteig auf die Brust, kalte Begiessungen, Aether-Kampher-Injection), Tieflagerung des Kopfes, in allen Fällen Ableitung auf den Darm:

Rp. 382.

*Inf. rad. Rhei*  
*e 15·0 : 150·0,*  
*Ol. Ricini 30·0.*  
*S. Auf 2 Klystiere.*

Rp. 383.

*Inf. fol. Sennae*  
*e 20·0 : 200·0,*  
*Magnesiae sulfur. 20·0.*  
*S. Klystier.*

Bei fehlendem oder nur wenig entwickeltem apopl. Insult: absolute Ruhe, Fernhalten aller intensiveren Sinneseindrücke, Evacuation des Verdauungstractes:

Rp. 384.

*Aqu. laxativ. Viennens. 60·0,*  
*Mixtur. oleos. 30·0,*  
*Natr. sulfuric. 10·0,*  
*Syr. rub. Idaeii 20·0.*  
*S. In 2 Port. zu nehmen.*

Weiterhin strenge Ruhe, flüssige Nahrung. Nach etwa 2 Monaten gegen die zurückbleibenden Lähmungen Massage und Faradisation der gelähmten Extremitäten, spiri-

möse Einreibungen mit Franzbranntwein, Kölnisch-Wasser oder mit

Rp. 385.

*Spir. saponati 1℥0.*

*Spir. Sinapis 1℥0.*

*D. S. Einreibung.*

Gebrauch indifferenter Thermen, wie Teplitz, Gastein, mit niedrigen Badetemperaturen (26—27° R., Wildbad, Ragaz, Johannisbad, Römerbad. Auch milde Kaltwassercuren sind empfehlenswerth. Zur Verhütung weiterer Anfälle: Sorge für regelmässige Stuhlentleerung; Alcoholica zu verbieten, Vermeidung von Excessen in Venere, von Aufenthalt in heissen Localen etc. Endlich bei hartnäckigen Fällen Versuch mit Jodbehandlung gestattet.

Rp. 386.

*Kali jodati 10—20.*

*Aquae destill. 100 0.*

*Syr. simpl. 10 0.*

*S. 2stündlich 1 Esslöffel*

**Emollitio cerebri ex embolia sive thrombosi arteriarum cerebri.** Gehirnerweichung durch Embolie oder Thrombose Wenn die Diagnose feststeht, sofortige Anwendung eines excitirenden Verfahrens. Wein, Kaffee, Tieflagerung des Kopfes. Valerianainfus, Strophantustinctur.

Behandlung der rückbleibenden Lähmungen, wie bei Haemorrh. cerebri.

**Tumor cerebri. Gehirntumor.** In allen Fällen Versuch mit Jodbehandlung, wobei mitunter überraschender Erfolg.

Rp. 387.

*Natrii jodati 10—50,*

*Aqu. destill. 150 0.*

*S. In 24 Stunden zu verbrauchen.*

Bei Bestehen von Rindenepilepsie oder epileptischen Anfällen:

Rp. 388.

*Natrii jodati* 1·0 5·0,  
*Natrii bromati* 2·0—4·0,  
*Aqu. destill.* 150·0.  
*S. In 24 Stunden zu ver-*  
*brauchen.*

Bei sehr heftigem Kopfschmerz:

Rp. 389.

*Phenacetini* 1·0.  
*Dent. tal. doses No 10.*  
*S. 2—4 Pulv. des Tages.*

Oder subcutane Morphininjection 0·01—0·02, und intensive Kälteapplication auf den Kopf.

Bei plötzlicher Zunahme des intracraniellen Druckes mit Sopor, Sistiren der Respiration, Verlangsamung und Arrhythmie des Pulses Quincke's Lumbalpunktion des Durasackes und Entleerung von Cerebrospinalflüssigkeit auf diesem Wege.

**Syphilis cerebri. Gehirnsyphilis.** Unter allen Umständen energische Inunctionscur mit 4 gm. Unguent. cinereum p. dosi. Dann grosse Dosen von Jodsalzen. Kalium oder Natrium jodatum 2—6 gm. p. die, selbstverständlich mit Berücksichtigung des sich gelegentlich einstellenden Jodismus.

Strenge Regelung der Lebensweise, speciell strenge Vermeidung jedes Alcoholübergenusses.

Badeur in Hall (Ober-Oesterreich), Lipik (Slavonien) Kreuznach etc. Ferner Nacheur in Schwefelthermen (Baden bei Wien, Aachen etc.)

**Malum Pottii. Compressionserkrankung des Rückenmarkes bei tuberculöser Wirbelcaries.** Lagerung im Gypsbett nach Lorenz, keine Extension. Bei Halswirbelcaries Gypscravatte. Es ist Alles daran zu setzen, einen Decubitus, und bei bestehender Blasenlahmung Infection des Blaseninhaltes zu vermeiden.

Zur Verhütung des Decubitus häufige Waschungen mit verdünntem Essig, mit Franzbranntwein. Etwa sich zeigende Excoriationen sofort mit Salicylpflaster zu decken;

sobald sich Hautnekrose entwickelt, Einstreuen mit Jodoform. Zur Beförderung der Abstossung der Schorfe Umschläge mit Liquor Burowi. Bei sehr weitgreifender Zerstörung und Gangraenescenz Gypstheer. Nach Abstossung der Schorfe zur Beförderung der Granulation Lapissalbe. Zur Verhütung der Blaseninfection wenn möglich Entleerung der Blase durch Expression. Bei nothwendigem Catheterismus häufiger Wechsel des elastischen Catheters, vor und nach dem Gebrauche Durchspülung mit 5<sup>o</sup>-iger Carbollosung. Verwendung von Carbolöl, Verhütung von Luftzutritt in die Blase.

Trotz aller Vorsicht findet namentlich bei Bestehen von Incontinentia urinae schliesslich doch Blaseninfection mit Entwicklung von alkalischer Harnsäure und katarrhalischer Cystitis statt. Dann innerlich:

Rp. 390.

*Acid. salicylici* 0·5.  
*Dent. tal. dos. No. 15.*  
*S. 4 — 5 Pulver des Tages.*

Rp. 391.

*Acidi benzoici* 1·0,  
*Sacch. lactis* 4·0,  
*M. f. p. Dir. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 4 — 5 Pulver des*  
*Tages.*

Rp. 392.

*Natrii salicylici* 4·0,  
*Aqu. destill.* 150·0,  
*Syr. rub. Idaei* 12·0.  
*S. 2stündl. 1 Esslöffel.*  
Ausspülungen der Blase  
mit.

Rp. 393.

*Acidi borici* 50·0,  
*Aqu. destill.* 1000·0.  
*S. Gewärmt zur Blasen-*  
*ausspülung.*

Behufs Hebung der Ernährung innerlicher Gebrauch von Leberthran, dann:

Rp. 394.

*Acidi arsenicosi* 0·1 (*decigr. unum*),  
*Pulv. et extr. Liq. qu. s. n. f. massa pil. e qua*  
*form. pil. No. 100.*  
*Consp. pulv. Cinamom.*

*S. Von 1 — 5 Pillen täglich, jeden 4. Tag um*  
*1 Pille steigend, nach Verbrauch von 100 Pillen in*  
*gleicher Weise mit der Dosis abwärts.*

Rp. 395.

*Ferri jodati sacchar. 2·0,*

*Sacch. lactic. 3·0.*

*M. f. p. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*Dent. ad chartam ceratam.*

*S. 3 Pulver täglich.*

Wenn Rückbildung der Lähmungen eintritt, worauf selbst nach jahrelangem Bestehen noch zu hoffen, und während des Anhaltens derselben spirituose Einreibungen; — Massage und Faradisation der Muskeln erst bei weiter vorgeschrittener Besserung, da spastische Lähmungszustände diese Verfahren contraindiciren.

Häuslicher Gebrauch von Soolbädern (25—26° R.), Badereisen nur mit Vorsicht.

### **Myelitis acuta. Acute Rückenmarksentzündung.**

Locale Kälteapplication, Chapman'scher Schlauch, locale Einreibung von graner Salbe. Vor Allem Achtung auf die Blasenfunction und Blasenbehandlung, ebenso auf den drohenden Decubitus. Unter allen Verhältnissen, wo Verdacht auf Lues besteht, Versuch mit Jodbehandlung (auch mercurieller Einreibungscur) zu machen.

Rp. 396.

*Natr. jodati 5·0,*

*Aqu. destill. 150·0,*

*Syrupi cort. Aurant. 12·0.*

*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

In dem folgenden chronischen Stadium der Krankheit zur Beförderung der Rückbildung restirender Lähmungen Jodbäder (Hall, Kreuznach), Soolbäder mit nicht hohen Badetemperaturen, milde Kaltwassercuren.

### **Poliomyelitis anterior acuta infantum. Spinale**

**Kinderlähmung.** Im acuten Stadium bei bedrohlichen cephalischen Symptomen kaltes Bad mit lauen Uebergiessungen, innerlich:

Rp. 397. *Calomelanos laevigati* 0·2,  
*Sacchar. albi* 4·0.  
*M. f. p. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*S. 3—4 Pulver in 24 Stunden.*

Ferner Priessnitzeinwicklungen des Rumpfes. Einreibung grauer Salbe in den Rücken. Behufs günstiger Beeinflussung der resultirenden atrophischen Lähmungen und zum Zwecke der Verhinderung des Zurückbleibens der Skelettentwicklung elektrische Behandlung (labile Galvanisation der gelähmten Muskeln und insoweit die faradische Erregbarkeit der Muskeln erhalten geblieben ist, Behandlung mit dem Inductionsstrom.) Später Massage, Gymnastik, vor Allem aber Anwendung zweckmässiger Prothesen und Stützapparate, welche eine willkürliche Bewegung der gelähmten Extremitätentheile ermöglichen.

Ausserdem roborirendes Verfahren, Akratothermen (Gastein, Teplitz etc.), Soolbäder (Ischl, Gmunden, Aussee), laue Seebäder (Abbazia), Thermalsoolen (Nauheim etc.), Kiefernadelbäder. Innerlich.

Rp. 398. *Ferri iodati sacch.* 5·0,  
*Aqu. destill.* 100·0,  
*Syrupi simpl.* 20·0.  
*S. 2—3 Kaffeeöffel des Tages.*

**Myelitis chronica. Spastische Spinalparalyse.** Regelung der Lebensweise, Vermeidung von Excessen jeder Art, Sorge für genügende Stuhlentleerung, Berücksichtigung der Blasenfunction, Kaltwasserbehandlung, Gebrauch von Soolbädern (25° R.), Thermalsoolbädern, Galvanisation stabil an der Wirbelsäule an Stelle der erkrankten Rückenmarksegmente. Innerlich:

Rp. 399.  
*Arg. nitric. cryst.* 0·5,  
*Pulv. et extr. Liqu. qu. s. u. f. massa pil. e qua form. pil. No. 100.*  
*Consp. pulv. Cinnamom.*  
*S. Von 2 Pillen p. die bis 8 p. die, bis zum Gesamtverbrauche von 1·5 gm. Nitr. arg.*



**Sclerosis cerebrospinalis multiplex. Disseminirte Hirn- und Rückenmarks-Sclerose.** Wegen der den initialen Stadien dieser Erkrankungsform eigenthümlichen spontanen Rückbildung selbst sehr ausgesprochener Krankheitssymptome (Lähmungen, Sehstörungen etc.) oft scheinbare Heilerfolge. Behandlung wie bei der chronischen Myelitis, welche übrigens in der Uebersahl der Fälle einer spinalen Localisation der multiplen Sclerose gleichzustellen ist.

Wenn Nitr. arg. (s. Rp. 399) bereits versucht worden ist, ein weiterer Versuch mit Kalium hyperosmicum, doch mit sehr wenig Aussicht auf Erfolg, gestattet.

Rp. 400.

*Acidi hyperosmici* 0.1,  
*Bol. alb. qu. s. u. f. pil.*  
No. 100.

*Obduc. argento fol.*  
S. 1—4 Pillen des Tages  
durch 6 8 Wochen.

Rp. 401.

*Kali hyperosmici* 0.1,  
*Argillae qu. s. u. f. pil.*  
No. 100.

*Obduc. auro foliat.*  
S. 1—4 Pillen des Tages  
durch 6 8 Wochen.

**Atrophia muscularis progressiva (spinalis, myopathica). Progressive Muskelatrophie.** Energische und fortgesetzte Muskelgalvanisation oder Faradisation. Massage. Bäder in Wildbädern wie Gastein, Schlangenbad, Johannisbad, Römerbad, Baden-Baden, Ragaz, Bormio.

**Tabes dorsualis.** Auch wenn unzweifelhaft Syphilis vorgegangen, was in der großen Uebersahl der Fälle zutrifft, keine antisyphilitische Behandlung, weil nutzlos. Jodbehandlung bringt eher Schaden als Nutzen.

Im initialen Stadium häufig scheinbare Heilerfolge durch spontanes Schwinden von Krankheitssymptomen. Soolbäder (24–26° R.) in Gmunden, Ischl, Aussee etc. Thermalsoolbäder und kohlensäurehaltige Bäder in Nauheim, Kissingen, Wiesbaden. Laue Seebäder. Bei anä-



mischen, stark herabgekommenen Individuen Bäder in Königswart, Franzensbad etc. Gebrauch der eigentlichen Thermen nicht zu empfehlen. Kaltwassercuren haben häufig keinen wohlthuenden Einfluss. Fortgesetzter häuslicher Gebrauch von 24° R. Bädern (mit Zusatz von 1 $\frac{1}{2}$ —2 Kilo Steinsalz) öfter von gutem Einfluss.

Allgemeine Hautfaradisation — 3mal der Woche eine 25 Minuten dauernde Sitzung. Innerlich Silbernitrat.

Rp. 402.

*Argenti nitrici* 1·0,

*Argillae* 10·0,

*R. c. aqu. d. qu. s. pil. No. 100*

*Consp. pulv. Cinnamomi Cass.*

*S. 1 Pille täglich durch 8 Tage, dann 2 Pillen tägl. durch 8 Tage, dann fortgesetzt 3 Pillen.*

Nach einigen Monaten Pause kann dieselbe Behandlung wiederholt werden.

Bei hochgradiger Ataxie ist durch entsprechende Stützapparate (Mieder) grössere Sicherheit im Gehen zu erzielen. Gegen die lancinirenden Schmerzen innerlich:

Rp. 403.

*Antipyrini* 1·0.

*Dent. tales doses ad capsul. amyl. No. 5.*

*S. 1—2 Pulver.*

oder:

Rp. 404.

*Antipyrini,*

*Aqu. destill. aa 5·0.*

*S. Eine Pravaz'sche Spritze subcutan an Stelle des heftigsten Schmerzes.*

Ferner:

Rp. 405.

*Chloroformii,*

*Ol. Olivarum aa 25 0.*

*M. f. linimentum.*

*S. Zu Einreibungen.*

Rp. 406.

*Veratrini* 0·5,

*Vaslini* 25·0,

*M. f. unguent.*

*S. Einreibung.*

Rp. 407.

*Veratrini* 0·5,  
*Chloroformii* 10·0,  
*Alcohol.* 50·0.  
*S. Einreibung.*

Wenn diese Mittel versagen, Morphininjection. Letztere das einzig auf Erfolg Aussicht gebende Mittel bei gastrischen Krisen. Nebenbei Chloroform innerlich, 5 Tropfen mit Eispillen alle 10 Minuten zu nehmen.

Bei Bestehen von Blasen- oder Mastdarmneuralgien Stuhlzäpfchen:

Rp. 408.

*Morph. muriat.* 0·02,  
*Butyri Cacao* 2·0.  
*M. f. suppositorium.*  
*Dent. talia* No. 10.  
*S. 1—2 Stuhlzäpfchen.*

**Neuritis multiplex. Multiple Neuritis.** In frischen Fällen während des raschen Vorschreitens der Erscheinungen:

Rp. 409.

*Natrii salicylici* 5·0,  
*Aqu. destill.* 150·0,  
*Syrupi rubi Idaei* 12·0.  
*S. 2stündlich 1 Ess-*  
*löffel.*

Bei sehr raschem Vorschreiten:

Rp. 410.

*Extr. Secal. cornuti* 2·0,  
*Aqu. destill.* 150·0,  
*Syr. Cinnamomi* 20·0.  
*S. 3stündlich 1 Essl.*

Sonst absolute Ruhe, Sorge für ausreichende Entleerung des Stuhles. Bei beginnender Rückbildung der Lähmungen Faradisation und Galvanisation der Musculatur, Massage, noch später Gebrauch von Thermen und Soolbädern.

**Hemicrania. Migraine.** Vermeidung der Schädlichkeiten, die erfahrungsgemäss bei dem betreffenden Patienten den Anfall hervorrufen, namentlich Vermeidung von Auf-

regung und geistiger Ueberanstrengung, Aufenthalt in heissen Localen etc. Bei Anämischen Eisenpräparate, bei nervösen Personen Bromsalze, Kaltwassercuren, Sommeraufenthalt im Gebirge oder an der See. Kraftige Kost, aber Vermeidung von schwer verdaulichen Speisen, Sorge für täglichen Stuhlgang.

Gegen die einzelnen Anfälle Fernhaltung aller Reize, horizontale Lagerung des Kranken. Je nach der individuellen Disposition wirken kalte oder warme Umschläge, in anderen Fällen Compression der Schädelweichtheile durch feste Umwicklung mit einem Tuch. Bei manchen Personen Trinken von schwarzem Kaffee oder Schlucken von Eisstückchen wirksam. Einreibung mit Chloroform oder Aether; auch die sogenannten Migraine-Stifte wirksam, oder statt deren:

Rp. 411.

*Menthol.* 10,  
*Spir. vin. Gallie* 50·0.  
*D. S.* Zum Einreiben.

Innerlich:

Rp. 412.

*Chinin. sulfuric.* 30,  
*Sacch. alb.* 6·0.  
*M f. pulc. Div. in dos.*  
*aequ. No. 6.*  
*S. Im Beginn des An-*  
*falls 1—2 Pulver.*

Rp. 413.

*Natr salicylic.* 2·5.  
*Div. in dos. aequ. No. 5.*  
*S. Im Anfall 2—3 Pulc.*

Ebenso: Rp. 417. *Phenacetin.* 2·5.

*Div. in dos. aequ. No. 5.*  
*S. Wie das Vorige.*

Rp. 414.

*Coffein. natriosalicyl.*  
*Sacch alb. aa* 2·5,  
*M f. pulc. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. Wie das Vorige*

Rp. 415.

*Pastue Guarana,*  
*Sacch alb. aa* 2·0  
*M. f. pulc. Div. in dos*  
*aequ. No. 5.*  
*S 2 Pulver im Anfall.*

Viel wirksamer als die vorstehenden Mittel:

Rp. 416.

*Antipyrin.* 5·0.  
*Div. in dos. aequ. No. 5.*  
*S. 1—2 Pulver im Be-*  
*ginn des Anfalls.*

Wenn das Gesicht blass, der Puls klein, ist ein Versuch mit Inhalation von Amylnitrit (Amylaether nitrosus), 2 Tropfen in den Bernatzik'schen Glasröhrchen, zu machen. Erfolg sehr unsicher.

Zu fortgesetztem Gebrauch eignen sich:

Rp. 418.

*Solut. arsen. Fowleri* 5 0,  
*Tinct. Ferr. pomat.* 10 0  
S. Früh und Abends  
6 - 12 Tropfen.

Besser:

Rp. 420.

*Acidi arsenicosi* 0·05,  
*Pulv. et extr. Liquir. qu. s. ut f. pil. No. 100.*  
*Consp. pulv. Cinnamom. Cassiae.*  
S. 1—5 Pillen des Tages.

Rp. 419.

*Natri bromat.* 2·0 4 0,  
*Aqu. destill.* 100·0.  
S. Früh, Mittag, Abend  
je  $\frac{1}{2}$  nach der Mahlzeit  
zu nehmen

**Neuralgia trigemini. Tic douloureux. Nervöser Gesichtsschmerz.** Berücksichtigung der Ursache: Ausschneidung schmerzhafter Narben, Entfernung cariöser Zähne, Behandlung einer etwa vorhandenen Nasen- oder Genital Affection Beseitigung bestehender Obstipation durch Gebrauch von Marienbad, Kissingen, häuslichen Gebrauch von Bitterwässern, Unterleibsmassage, Priessnitz-einwicklung des Unterleibs, tägliche Darmirrigation. Bei Anämischen Eisen, bei typisch wiederkehrenden Anfällen Chinin, bei begründetem Verdacht auf Syphilis eine entsprechende Cur, bei Blei-Intoxication Jodkali. Elektrizität oft von sehr gutem Erfolg: schwache, langsam durch Einschleichen zu verstärkende galvanische Ströme, (1·5 — 2·5 M.-Amp.), Kathode auf den Nacken, Anode auf die wichtigsten Schmerzpunkte. Sitzung von 3—4 Minuten (Ausschleichen des Stroms). Erfolge mitunter auffallend, doch immer sehr unsicher. Nicht zu versäumen ist ferner der Besuch von Wild-

bädern, wie Gastein, Bormio etc. Auch ein Versuch mit Kaltwassercur angezeigt.

Energische Arsenbehandlung hat manchmal guten Erfolg: Acid. arsenic. 0·001, alle 4 Tage um 1 Mgm. steigen bis 0·01 pro die, dann durch 3 Wochen diese Dosis fortsetzen, endlich langsam absteigende Tagesdosen bis 0·001.

Empfehlenswerth ist eine Combination dieser Arsenbehandlung mit systematischer Anwendung subcutaner Morphininjectionen. (2—4mal des Tages 0·01—0·02 Morph. muriat.). Innerlich ferner:

Rp. 421  
*Chinin sulfuric.* 2·5,  
*Succh. alb.* 5·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aegu. No. 5.*  
*S. Vor dem Anfall*  
*1—2 Pulver.*

Bei acuter, durch Erkältung entstandener Neuralgie Diaphoresis.

Oder:

Rp. 422.  
*Natr. salicylic.* 5·0,  
*Aqu. dest.* 150·0,  
*Syr. rub. Idae* 30·0.  
*S. Stündl. 1 Esslöffel.*

In manchen Fällen, namentlich bei Syphilis und Blei-Intoxication:

Rp. 423.  
*Kal. iodat.* 20·0.  
*Div. in dos. aegu. No. 20.*  
*S. Früh und Abends 1 Pulv. in Zuckerwasser.*

Wenn diese Mittel die Neuralgie nicht zu beseitigen vermögen, Neurectomie, doch auch hier die Erfolge zumeist nur vorübergehende.

**Neuralgia intercostalis.** Wenn möglich, causale Behandlung. Gegen die Anfälle selbst fliegende Vesicatore, schmerzstillende Einreibungen, Morphin-Injectionen. Elektricität entweder in Form galvanischer Ströme (Kathode auf die Wirbelsäule, Anode auf einen Schmerzpunkt) oder in Form des faradischen Pinsels. Erfolge sehr unsicher. Badecur wie bei Neuralgia trigemini (s. oben).

Rp. 424.

*Empl. Canth. perpet.* 20·0.  
S. Auf Leinwand ge-  
strichen aufzulegen u.  
mit Heftpflaster nieder-  
zudrücken; jeden Tag  
an einer anderen Stelle  
zu appliciren.

Rp. 425.

*Chloroform.* 20·0.  
*Ol. Hyoscyam. coct.* 10·0.  
S. Einreibung.

Sonst Antipyrin, Phenacetin, Arsen, Morphuinjection  
wie bei Trigemiusneuralgie. Ausserdem häufig von  
gutem Erfolge:

Rp. 429.

*Antipyrin.,*  
*Aqu. dist. ferrid. aa* 5·0  
S. 1—2 Pravaz'sche Spritzen an den Sitz des  
Schmerzes subcutan zu injiciren.

**Mastodynie. Brustdrüsenschmerz.** Behandlung be-  
stehender Anämie, Hysterie und Neurasthenie. Die  
Brust warm zu halten, mittelst Bandagen hinaufzubinden.  
Auflegen narkotischer Mittel. Vor ohne Noth ange-  
wendeten subcutanen Morphin-Injectionen sei wegen der  
Gefahr des Morphinismus gewarnt.

Rp. 431

*Extr. Belladonn.,*  
*Empl. saponat. aa* 5·0.  
*M. f. empl.*  
S. Jeden Abend frisch  
aufzulegen.

Rp. 426.

*Veratrin.* 0·2,  
*Ungu. emoll.* 10·0  
D. S. Salbe.

Rp. 427.

*Extr. Opii aquos.* 2·0,  
*Spir. aromat.* 100·0.  
S. Einzureiben.

Rp. 428.

*Aether. sulfur.* 10·0  
S. Auf Baumwolle ge-  
träufelt einzureiben.

Rp. 432.

*Tinct. Belladonn.* 5·0,  
*Aqu. Lammor.* 15·0.  
S. Früh und Abends ein-  
zupinseln



**Ischias. Hüftweh.** Berücksichtigung eines etwaigen Grundleidens, namentlich Sorge für regelmässigen Stuhl, Behandlung eines etwa vorhandenen parametritischen Exsudats. Bei rheumatisch entstandener Ischias Schwitzbäder, Natr. salicylic. Im Uebrigen gegen die Schmerzanfälle narkotische Einreibungen, Massage, Elektrizität: starke galvanische Ströme, die Elektroden in Form breiter Platten (Anode auf das Kreuzbein, Kathode auf den Nerven aufgesetzt oder entlang des Oberschenkels hinabstreichend, oder Faradisation mit starken Strömen (Pinselung); kräftige Hautreize, selbst Ferr. candens. Weiterhin Gebrauch von Soolbädern (Ischl, Gmunden, Aussee), von Schwefelbädern (Baden bei Wien, Pystian, Trenesin-Teplitz), oder von indifferenten Thermen (Gastein, Tephtz, Wildbad, Wiesbaden).

Rp. 432.

*Extr. Opii aquos. 2·0,*  
*Ungu. emoll. 10·0.*  
*S. Salbe.*

Rp. 433

*Veratrin.*  
*Morph. mur. aa 0·1,*  
*Vaselin. 10·0.*  
*S. Salbe.*

Rp. 434

*Bals. Opodeldoc 3tr0,*  
*Tinct. Opii crocat. 3·0.*  
*S. Früh und Abends ein-*  
*zureiben.*

Bei sehr starken Schmerzen auch Morphin-Injectionen.

Als Hautreiz verwendet man Emplastr. Cantharidum oder als milderer Mittel:

Rp. 437. *Empl. Euphorbii 20·0.*

*S. Auf Leinwand aufgestrichen aufzulegen und mit Heftpflaster zu befestigen.*

Auch bei Ischias wirkt oft überraschend günstig Antipyrin, Phenacetin etc.

Rp. 435.

*Antipyrini,*  
*Aqu. destill. aa 5·0.*  
*D S 1 - 2 Pravaz'sche*  
*Spritzen am Oberschen-*  
*kel zu injiciren.*

In manchen Fällen auch nützlich:

Rp. 436.

*Kal. iodat. 5·0,*  
*Aqu. font. 180·0,*  
*Syr. rub. Idaci 20·0.*  
*S. Früh und Abends*  
*1 Esslöffel.*

**Singultus. Schluchzen** Behandlung ursächlicher Hysterie oder Anämie, Magen- oder Darm-Affectionen. Schlucken von Eispillen, Aufträufeln von Aether auf die Zwerchfellgegend, kalte oder warme Umschläge, Sinapismen in die Magengegend, Compression der Zwerchfellgegend mit den aufgelegten Händen, Galvanisation oder Faradisation des Nervus phrenicus, faradische Pinselung der Zwerchfellgegend.

Rp. 438

*Bismuth subnitric.* 2·0,  
*Morphii mur.* 0·05—0·1,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv.* Div in dos.  
*aqu. No. 10.*  
*D S.* 2stündlich 1 Pulv.

Rp. 439.

*Chloroform* 2·0,  
*Mucilag. gumm. Arab.,*  
*Syr. Ribium* aa 25 0,  
*Aqu. dest.* 150 0.  
*S.* 2stündlich 1 Esslöffel

Rp. 440.

*Chloral. hydrat.* 3 0,  
*Mucilag. gumm. Arab.*  
*Syr. rub. Idari* aa 15·0,  
*Aqu. dest.* 60 0.  
*S.* Die Hälfte auf einmal; wenn nöthig, das Uebrige  
kaffeeleffelweise in 2stündigen Pausen.

**Paralysis nervi facialis. Lähmung des Gesichtsnerven.** Wo es möglich, causale Behandlung, Beseitigung von den Nerven comprimirenden Abscessen oder Geschwülsten; gegen Syphilis Quecksilber oder Jod; bei frisch entstandener „rheumatischer“ Lähmung diaphoretische Behandlung Weiterhin Elektrizität. Bei erhaltener faradischer Erregbarkeit der gelähmten Muskeln oder bei beginnender Rückkehr derselben Faradisation der einzelnen Gesichtsmuskeln, zweimal täglich; bei fehlender farad. Erregb. der gel. Muskeln labile Galvanis. derselben, ferner Galvanisation des Facialis selbst mittelst schwacher Ströme, die Anode auf den Warzenfortsatz der kranken, die Kathode auf den der gesunden Seite. Bei veralteten Fällen, die der Elektrizität nicht weichen, zu versuchen:

Rp. 441.

*Strychnin. nitric.* 0·05,

*Aqu. dest.* 10·0.

S. Täglich  $\frac{1}{2}$  1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.

**Chorea St. Viti. Veitstanz.** Beseitigung etwa vorhandener Koprostase, Helminthen, Genital-Affectionen Fernhaltung aller körperlichen und geistigen Anstrengung und Aufregung, Sorge für regelmässigen Stuhl, leichte Kost. Milde Kaltwasserbehandlung (am besten Abreibungen mit Wasser von 18—20° R.) Wenn ein Schmerzpunkt an der Wirbelsäule nachzuweisen ist (point apophysaire, gew. an dem zweiten Halswirbeldornfortsatz), dann Versuch mit galvan. Behandlung: Anode (Ein- und Ausschleichen, 1·5—2 M. Amp.) über dem Dornfortsatz, Kathode am Sternum.

Bei rheumatischer Chorea Salicylbehandlung, ferner:

Rp. 442.

*Natr. bromat.* 10·0,

*Aqu. dest.* 150·0,

*Syr. rub. Idae* 30·0.

S. 3stündl. 1 Esslöffel

Rp. 443.

*Acid. arsenicosi* 0·05,

*Rad. Liquirit. pulv.* 4·0.

*Mellis qu. s. u. f. pil.*

No. 100.

*Consp. Sacch. lactis*

D. S. 1—4 Pillen des

Tages durch 3—4 Woch.

Rp. 444.

*Sol. arsen. Fowleri* 5·0,

*Tinct. Absynth. comp* 15·0.

S. 3mal täglich nach

dem Essen 5 Tropfen,

allmählig steigend bis

zu 30 Tropfen im Tag.

Bei gleichzeitiger Anämie Gebrauch der Wasser von Roncegno, Levico oder Guberquelle (2 Kaffeelöffel täglich, dann steigend bis auf 2 Esslöffel); oder:

Rp. 445.

*Ferr. oxydat dialys.* 5·0,

*Sol. arsen Fowleri* 1·0—3·0,

*Aqu. dest.* 150·0,

*Aqu. Menth pip.*,

*Syr. Cinnamom aa* 15·0.

S. 3mal täglich 1 Esslöffel.

## Rp. 446.

*Ferr. arsenicos. cum*  
*Ammon. citric. 0·2,*  
*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aegu. No. 10.*

*D. S. 2—3 Pulver tägl.*

In sehr schweren  
 Fällen zur Erzeugung des  
 Schlafes Morphininjectionen  
 und:

## Rp. 447.

*Chloral. hydrat. 10·0,*  
*Aqu. dest. 100 0,*  
*Syr. cort. Aurant. 40·0.*  
*S. Stündlich 1 Esslöffel,*  
*bis Beruhigung ein-*  
*tritt.*

Endlich Chloroform Inha-  
 lationen bis zur beginnenden  
 Narkose.

**Morbus sacer. Epilepsia Fallsucht.** In causaler  
 Beziehung Behandlung von vorhandener Syphilis, Be-  
 schränkung von Alkohol Missbrauch, Excision von Narben,  
 Beseitigung vorhandener Helminthen, Vermeidung kör-  
 perlicher und geistiger Aufregung, leichte Diät, Sorge für  
 täglichen Stuhlgang, strenge Vermeidung von starkem  
 Kaffee, Thee, sowie von sexuellen Excessen. Im Anfall  
 selbst zweckmässige Lagerung des Kranken, Schutz des-  
 selben vor Verletzungen, Entfernung beengender Kleider.  
 In medicamentöser Beziehung: Bromsalzbehandlung  
 in systematischer, durch Jahre fortgesetzter Weise und  
 zwar: Vor Allem genaue Registrirung der einzelnen An-  
 fälle vor Beginn der Behandlung und während derselben.  
 Das aus Bromkalium, Bromnatrium und Brom-  
 ammonium bestehende Bromsalzgemisch wird in stei-  
 gender Dosis bis zum Verschwinden der Anfälle gegeben  
 und zwar bei Individuen über 16 Jahren durch 14 Tage:

## Rp 448.

*Kal. brom.*

*Natr. brom. aü 1·5,*

*Ammon. bromat. 0·7.*

*M. f. p. Dent tal. dos. No 14 ad chartam ceratam.*

*S. Täglich 1 Pulver in beiläufig 150 gm. Wasser*  
*zu lösen und von dieser Lösung Früh, Mittag*  
*Abend je  $\frac{1}{3}$  unmittelbar nach der Mahlzeit am*  
*besten mit etwas Sodawasser zu nehmen.*

Durch weitere 14 Tage:  
Rp. 449.

*Kal. bromat.*  
*Natr. bromat. aa 2·0,*  
*Ammon. bromat. 1·0.*  
*S. Wie das Vorige.*

Endlich:

Rp. 451.

*Kal. bromat.*  
*Natr. bromat. aa 3·0,*  
*Ammon. bromat. 1·5.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

Ferner durch 14 Tage:  
Rp. 450.

*Kal. bromat.*  
*Natr. bromat. aa 2·5,*  
*Ammon. bromat. 1·2.*  
*S. Wie Rp 448.*

Diese Tagesdosis wird durch längere Zeit fortgebraucht. Bleiben die Anfälle aus, so kehrt man nach Ablauf von 4-6 Wochen zu der nächst geringeren Tagesdosis zurück und lässt diese fortgebrauchen. Wenn nach längerer Zeit (einige Monate) auch da keine Anfälle sich einstellen, kann die Tagesdosis noch weiter ermässigt werden. Häufig geschieht es, dass frühzeitig sich einstellende Erscheinungen von Bromismus (abgesehen von Akne, auf die nicht allzuviel Gewicht zu legen ist, taumelnder Gang, Vergesslichkeit, Schlafsucht, Appetitverlust, Diarrhoe, Abmagerung, schwere Hautulcerationen) zu einer Durchführung der Behandlung mit kleineren Tagesdosen, die dann aber auch zumeist minder guten Erfolg haben, Veranlassung geben. Reichliches Trinken von Wasser, noch besser Giesshübler, oder namentlich Milch erscheint während der Brombehandlung zweckmässig. Muss dieselbe wegen heftiger Bromismussymptome völlig ausgesetzt werden, dann in der Zwischenzeit Borax zu empfehlen:

Rp. 452.

*Natrii boracici 1 - 4·0,*  
*Syrupi cort. Aurant. 30·0,*  
*Aqu. destill. 100·0.*  
*S. Früh und Abend je die Hälfte zu nehmen*



Rp. 453. *Natrii boracici* 20.

*Dent. tales doses No. 10.*

*S. 2–3 Pulver des Tages in  $\frac{1}{4}$  Glas Sodawasser gelöst zu nehmen.*

In den Sommermonaten werden zweckmässiger Weise leichte Kaltwassercuren verordnet.

**Neurasthenia. Nervenschwäche, Nervosität.** Streng individualisirende diätetische und psychische auf Steigerung des Selbstvertragens hinzielende Behandlung. Roborirendes Verfahren. Kaltwassercuren, eventuell Ostseebäder, Verweilen in gutgelegenen Nervenheilstätten, Hochgebirgsaufenthalt.

Symptomatische medicamentöse Behandlung — doch möglichst wenig Medicamente!

**Hysteria. Hysterie.** Eine Darstellung der Behandlung dieser polymorphen Krankheit kann hier nur ganz im Allgemeinen gegeben werden. Vermeidung aller Aufregungen, längerer Aufenthalt in Nervenheilstätten oder bei Kindern in geeigneten Erziehungsanstalten, in jedem Falle Trennung des Kranken von seiner bisherigen Umgebung. Allgemeine Massage und allgemeine Faradisation. Reichliche Bewegung im Freien; passende Beschäftigung, Vermeiden aufregender Lectüre. Das Wesentliche ist eine dem Individuum angepasste psychische Behandlung, zu deren Durchführung es allerdings der Anwendung verschiedener Heilverfahren und selbst Medicamente bedarf.

Als Beispiel liefür:

Rp. 454.

*Rad. Valerian.* 20·0,

*Flor. Aurant.,*

*Herb. Meliss. aa* 10·0.

*S. Thee; Früh u. Abends*

*1 Kinderlöffel auf*

*1 Tasse.*

Rp. 455.

*Aqu. Lauroceras.* 10 0,

*Tinct. Nuc. vom.* 1·0,

*Tinct. Castorei* 2 0.

*S. 3mal täglich 5–10*

*Tropfen.*



Rp. 456.

*Tinct. Valer. aether. 10·0,*  
*Tinct. Castorei 2·0,*  
*S. 3mal tägl. 10 Tropfen.*

Rp. 457.

*Kal. bromat. 10·0.*  
*Div in dos aequ. No. 10.*  
*S. 2—4mal tägl. 1 Pulver*  
*in Wasser.*

Bei nervösen Schmerzen und Aufregungen auch Antipyrin oder Phenacetin. Morphinum innerlich oder subcutan. Morphininjectionen nur im äussersten Nothfall gestattet, ebenso Chloral und andere Hypnotica.

**Agrypnia. Nervöse Schlaflosigkeit.** Vor Allem Ortswechsel. Im Winter Meran, Riviera etc., im Sommer ruhiger Hochgebirgsaufenthalt — Bad Fusch, Brenner, Madonna di Campiglio, Obladis etc.

Regelung der Lebensweise und Beschäftigung genügt mitunter allein, den Schlaf herbeizuführen. Vermeidung von geistiger Arbeit und Erregung am Abend, von späten Abendmahlzeiten. Ferner laue prolongirte Bäder vor dem Schlafengehen. Mitunter wirkt etwas schweres Bier als vortreffliches Hypnoticum. Von wirksamen Medicamenten ist wegen der Gewöhnung und der schädlichen Folgen mit Vorsicht und Sparsamkeit Gebrauch zu machen, Morphin und Opiate sind möglichst zu vermeiden:

Rp. 458.

*Chloral. hydr. 1·0 3·0,*  
*Aqu. destill. 70·0,*  
*Syr. cort. Aur. 20·0*  
*S. Abend zu nehmen,*  
*Wasser nachtrinken*  
*lassen.*

Sehr zweckmässig ist Chloral in Limousin'schen Capseln à  $\frac{1}{2}$  gm. zu verschreiben. 2—4 Capseln des Abends zu nehmen.

Rp. 459.

*Chloral hydr. 1·0—3·0,*  
*Morphii muriat 0·02,*  
*Aqu. destill. 70·0,*  
*Syr. cort. Aur. 20·0.*  
*S. Wie das Vorige.*

Rp. 460.

*Paraldehyd 4·0—6·0,*  
*Tinct. cort. Cinnamom.*  
*6·0—10·0.*  
*S. Am Abend zu nehmen*

Rp. 461.

*Natrii bromati* 2·0 — 4·0

*S. Abend in Sodawasser gelöst zu nehmen.*

Rp. 462.

*Sulfonal* 1·0 — 2·0.

*S. Abend 1 Stunde vor dem Schlafengehen zu nehmen; eine Tasse heissen Kamillenthee's oder 1 Glas heisser Limonade nachtrinken lassen.*

Rp. 463.

*Chloralamid*, 3 0,

*Acidi muriat. dil. gtts* 5,

*Aqu. dest.* 60·0,

*Syr. rub. Idaei* 10·0.

*S. Auf einmal zu nehmen.*

Chloral und Chloralamid sind zweckmässig auch als Klysma zu appliciren

Wegen der leicht und plötzlich eintretenden Vergiftungserscheinungen vorsichtige Steigerung der Dosis des Hyoscins zu empfehlen.

Bei innerlicher Anwendung:

Rp. 467.

*Hyoscini hydrojodici* 0·01,

*Pulc. et extr. Liquir. qu. s. u. f. pil* No. 50

*Consp. pulc Cinnamom. Cassiae.*

*S. 2 — 4 Pillen des Tages.*

Rp. 464.

*Amylen. hydrat.* 7·0,

*Aquae dest.* 60 0,

*Syr. simpl* 10·0.

*S. Die Hälfte zu nehmen.*

Rp 465.

*Amylen. hydrat.* 5·0,

*Aqu. dest.* 50 0,

*Mucilag. Gummi Arab*  
20·0.

*S. Klysma.*

Endlich zu versuchen und in manchen Fällen, namentl. bei Psychosen, sehr wirksam:

Rp 466.

*Hyoscini hydrojodici* 0·01,

*Aqu destill.* 10·0.

*S.  $\frac{1}{15}$  —  $\frac{1}{12}$  Pravaz'sche Spritze subcutan zu injiciren*

**Paralysis agitans Parkinson'sche Krankheit. Schüttellähmung.** Mitunter hat der Gebrauch der Wildbäder (Gastein, Johannisbad, Bormio etc.) beruhigenden Einfluss auf einzelne der quälenden Krankheitssymptome. Wegen Schlaflosigkeit werden subcutane Morphininjec-

tionen und von Allem Chloral innerlich und per Klysma nothwendig. Lane Bäder, Soolbäder, Kiefernadelbäder sind zu versuchen. Sonst innerlich:

Rp. 468

*Acidi arsenicosi 0·1,*

*Mass. pil. qu. s. f. pil. No. 100.*

*Consp. pulv. Cinnamom.*

*S. 1–10 Pillen, langsam ansteigende und ebenso abnehmende Tagesdosis.*

Ferner vorsichtige Hyoscinbehandlung (vide „Agrypnia“ S. 99) zu versuchen — doch sind die Erfolge sehr wenig befriedigende

**Tetanus. Wundstarrkrampf.** Vor allem gründliche Reinigung und Desinfection, eventuell Excision der Wunde oder Entfernung des verwundeten Theiles.

Möglichste Anregung aller Ausscheidungen, der Diurese und Diaphorese

Warme Bäder mit folgenden Einpackungen und Trinken einiger Tassen heissen Lindenblüthenthees, ein diuretisch wirkender Thee und sonst reichliches Getränk, Milch etc. ferner innerlich:

Rp. 469.

*Diuretini 5 0,*

*Aqu. destill. 150 0,*

*Syr. simpl. 10·0.*

*S. 2ständl. 1 Esslöffel.*

Ferner subcutane Morphininjection 0·01–0·02, einmal des Tages Innerlich Chloral 2–4 gm. und mehr pro die, Chloral-Klysmen, endlich Chloral subcutan:

Rp. 470.

*Chloral. hydrat.,*

*Aqu. destill. aa 10·0.*

*S. 1–2 Pravaz'sche Spritzen subcutan.*

Die Injectionen sind schmerzhaft und müssen mit allen antiseptischen Cautelen gemacht werden

Wichtig ist die Sorge für genügende Ernährung, die bei bestehendem Trismus mit flüssigen Nahrungsmitteln durchgeführt werden muss.

**Tetanie.** Bei frischen Fällen ist die Anwendung eines leichten diaphoretischen Verfahrens mitunter von Erfolg. Sonst *Natr. bromat.* 3—5 *gm.* pro die.

Bei sehr schmerzhaften Krämpfen, ausgebreiteter Localisation derselben: subcutane Morphininjection, Chloral.

**Rheumatismus articulorum acutus. Acuter Gelenkrheumatismus.** Bettruhe und Ruhigstellung der erkrankten Gelenke durch Einpackung mit essigsaurer Thonerde und „blaue“ (gestärkte) Organtinbinden. Darüber Application von Eisbeutel oder Kühlapparaten.

Innerlich,

Rp. 471.

*Acidi salicylici* 0·5.

*Dent. tales dos. No. 30 ad caps. amyl.*

*S. 2stündlich 1 Pulver.*

Die Behandlung wird derart durchgeführt, dass in den ersten 24 oder 48 Stunden bis zum wesentlichen Nachlass der Schmerzen zweistündlich, bei sehr schweren Fällen und kräftigen Individuen auch stündlich 1 Pulver gereicht wird. Die Darreichung der Pulver ist auch während der Nacht fortzusetzen! Mit dem Eintreten der Wirkung wird die Dosis sofort vermindert, jedoch die Salicyltherapie auch nach völligem Schwinden der Gelenkaffection noch einige Tage fortgesetzt.

Rp. 472.

*Natrii salicylici* 0·5

*Dent. tales dos. No. 30*

*ad caps. amyl.*

*S. 2stündlich 1 Pulver.*

Rp. 473.

*Natrii salicylici* 5 0,

*Aqu. destill.* 150 0,

*Syr. rubi Idæi* 12 0.

*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Rp. 171.

*Saloli 0.5.*

*Dent. talis doses No. 20 ad caps unyl.*

*S. 6 8 Pulver des Tages.*

Bei sehr heftigen Schmerzen oder bei Versagen der Salicylwirkung Antipyrin 1 gm. 2mal des Tages.

Bei Hyperpyrexie kalte Bäder und Uebergiessungen, energische Anwendung von Excitantien.

Bei durch Herzcomplication (Pericarditis, Endocarditis) bedingter Steigerung der Pulsfrequenz:

Rp. 475.

*Inf. fol. Dig purp. c 0.5 : 150.0,*

*Syr. rub. Idaei 20.0.*

*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Wenn nach Aufhören des Fiebers noch Schwellung und Schmerzhaftigkeit in einem Gelenk zurückbleibt, Fortsetzung der Einpackungen mit essigsaurer Thonerde. Gebrauch von Bädern (25 – 26° R.) — Später Soolbäder.

Zur Beseitigung der Krankheitsreste vor Allem Kaltwassercuren und Massage zweckmässig, daneben roborirende Behandlung.

Bei Neigung zu Recidiven klimatische Curen. Vorsicht in der Bekleidung (Wolle), tägliche Abreibungen mit Wasser von 18° R., im Sommer Gebrauch von kühlen Akratothermen — wie Johannisbad, Ragatz, Wildbad etc.

**Rheumatismus articul. chron. Chronischer Gelenk-rheumatismus.** Versuch mit Salicyltherapie zeitweilig zu machen und zu wiederholen, dabei ist mitunter doch einiger Effect zu erzielen. Im Allgemeinen roborirende Behandlung, China und Eisenpräparate. Bei heftigen Schmerzen Antipyrin und Phenacetin. Bei frischen articulare oder periarticularen Schwellungen: Einpackungen mit essigsaurer Thonerde. Wenn der Process zum Stillstande gekommen, Badecuren in Franzensbad (Moorbader), Ge-

brauch von Soolbädern (26<sup>n</sup> R.) in Gmunden, Ischl, Aussee, Badecuren mit indifferenten Thermen (Teplitz etc.), Gebrauch von Schwefelbädern (Baden bei Wien, Pystian, Mehadia, Aix les bains etc.), endlich bei in Rückbildung begriffenen Fällen Kaltwassercuren und Massage.

Bei Stellung der Indication ist streng zu individualisiren, energische Badecuren und Massagecuren sind bei floridem Process zu vermeiden. Auf Wohnungsverhältnisse, feuchte Gegend etc. ist Bedacht zu nehmen.

Innerlich:

Rp. 476.

*Natrii jodat.* 3·0,  
*Aqu. destill.* 150·0.  
*S.* 2mal täglich 1—2  
Esslöffel

Rp. 477.

*Ferri jodati sacchar.*,  
*Sacch. lactis aa* 2·0.  
*M. f. l. a. pil.* No. 50.  
*Consp. pulv. Cinnamom.*  
*S.* 2mal tägl. 3—5 Pillen.

Aeusserlich zur Einreibung an dem erkrankten Gelenke:

Rp. 478.

*Jodoform.* 3·0,  
*Extr. Opii aquos.* 2·0,  
*Ungu. simpl.* 30·0,  
*Ol. Bergamott. gtts.* 5.  
*M. f. unguentum.*  
*S.* Salbe.

Rp. 480.

*Veratrini* 0·25,  
*Natrii jodati* 1·5,  
*Vaselini* 20·0.  
*M. f. unguent.*  
*D. S.* Salbe.

Rp. 479.

*Aconitin.* 0·6,  
*Ungu. emoll.* 25·0.  
*S.* Salbe.

Rp. 481.

*Spir. camphorat.* 30·0,  
*Ol. Sinapis gtts.* 2.  
*S.* Täglich 2mal einzureiben.

## Rheumatismus musculorum. Muskelrheumatismus.

In frischen Fällen Diaphorese, Massage. Oft auch energische Muskel-Faradisatio von guter Wirkung. Einreibung schmerzstillender Mittel: Subcutane Injection von Antipyrin. Innerlich Antipyrin, Phenacetin etc.

Rp. 482. *Chloroform.*,

*Ol. Olivar. aa* 10·0,  
*Tinct. Opii simpl.* 5·0.  
*S.* Einzureiben.



Rp. 483

*Extr. Hyoscyam. 1·0,**Ungu. emoll. 20·0.**S. Salbe.*

Rp. 484.

*Veratrini 0·2,**Vaselini 25·0.**M. f. unguent.**S. Salbe*

**Typhus abdominalis. Unterleibstyphus.** Der Kranke in fleissig zu lüftendem Zimmer bei einer Temperatur von 14–15° R. Das Bettuch darf keine Falten bilden, die Bedeckung des Kranken muss leicht sein, die Bett- und Leibwäsche häufig gewechselt werden. Fleissiger Lagewechsel des Kranken. Consequente, ausreichende Reinigung der Mundhöhle. Diät von Anfang an nahrhaft, allerdings bis zu vorgeschrittener Reconvalescenz nur flüssig: Milch, Eier, Suppe, Wein, am besten leichter Weisswein, Champagner mit Wasser verdünnt, Weinsuppe, alles stets nur in kleinen Quantitäten, aber sehr oft zu reichen. Zum Getränk Brunnenwasser, bei starkem Durst eine organische Säure, Limonade, Orangeade.

Rp. 475.

*Acidi tartarici 5·0,**Aqu. destill. 25·0,**Syr. Ribium 50·0,**S. Getränk.*

Die Körpertemperatur wird alle 2 Stunden in der Achselhöhle gemessen und verzeichnet.

Leichte Fälle erfordern ausserdem keine Behandlung, mittelschwere Fälle jedoch mit Temperaturerhebungen bis gegen 40° C. ohne stärkere nervöse Symptome werden in folgender Weise behandelt: So oft die Temperatur 39° C. in der Achselhöhle überschreitet, erhält der Kranke eine Dosis von Antifebrin (0·1–0·2).

Rp. 486.

*Antifebrini 1·0–2·0,**Sacch. albi 1·5.**M. f. p. Div. in dos. aequ. No. 10.**S. Nach ärztlicher Anweisung zu nehmen.*

Unter keinen Umständen wird die Zahl von 4 solchen Einzeldosen in 24 Stunden überschritten.

Ausserdem zu Zeiten der stärkeren Temperaturerhöhung häufige (alle 5—10 Minuten wiederholte) Einpackungen in mit Wasser von  $12-14^{\circ}$  R. getränkte und ausgewundene Leintücher. Diese Einpackungen sind 10—12mal zu wiederholen, dann durch 1—2 Stunden Ruhe. An Stelle dieses Verfahrens in leichteren Fällen Waschungen mit verdünntem Essig.

Schwere Fälle mit hohen Temperatursteigerungen und stark entwickelten nervösen Symptomen erfordern eine dem Krankheitsfalle und dem Individuum entsprechend abgestufte Badbehandlung Als Schema folgendes: So oft die Temperatur in der Achselhöhle  $39.5$  erreicht, wird der Kranke in ein Bad von  $25^{\circ}$  R. gesetzt und dieses dann rasch durch Zugiessen von kaltem Wasser auf  $20-18^{\circ}$  R. abgekühlt. Kopf, Rücken und Brust des Kranken werden mit kaltem Wasser übergossen. Dauer des Bades 10 Minuten. Nachher wird der Kranke energisch frottirt, warm zugedeckt, Wärmflaschen an die Füsse.

Vor dem Bade, eventuell auch nach demselben erhält er ein Glas Wein.

Ausserdem erhält der Kranke 2—3 Dosen 0.1 0.2 Antifebrin in 24 Stunden, wodurch dem Kranken neben subjectiver Erleichterung der Fieberbeschwerden auch längeres Ausruhen von den Bädern gewährt wird.

Bei Krankheitsfällen mit niederen Fiebertemperaturen, aber sehr starken nervösen Symptomen ohne Rücksicht auf die Temperatur Bäder von  $26^{\circ}$  R. und kalte Uebergiessungen im Bade einigemal des Tages.

Wenn Kühle der Extremitäten, Cyanose sich einstellt, energische Frottirungen, Einhüllen in heisse Tücher, Glühwein, Excitantien innerlich und subcutan.

Bei schweren Fällen als ein die ganze Zeit des Verlaufes hindurch zu reichendes Mittel.

## Rp. 487.

*Vini Xerensis* (oder *Cognac*.) 50 0,  
*Aqu. (fl. Nuphar)* 100 0,  
*Syrupi simpl.* 20 0,  
*Vitell. avor. duor.*  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Im amphibolen Stadium, bei Bestehen starker Tages-  
 schwankungen der Temperatur, und wenn das Fieber sich  
 über die vierte Woche hinaus fortsetzt:

## Rp. 488

*Chinini muriat.* 2 0,  
*Aquae destill.* 150 0,  
*Acidi muriat. qu. s. ad sol.*  
*S. 2 - 3mal täglich 2 Ess-*  
*löffel.*

## Rp. 489.

*Chinini muriat.* 2 0 3 0,  
*Acidi mur. qu. s. ad sol.*  
*in Aqu. destill.* 200 0,  
*Mucil. gummi. Arab* 30 0.  
*S. Auf 2 - 3 Klysmen.*

Bei profusen Diar-  
 rhöen:

## Rp. 490.

*Mixtur gummos* 150 0,  
*Extr. Opii aquos.* 0 2,  
*Syr. Diacodii* 20 0.  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

## Rp. 491.

*Pulv. Dover.* 0 6,  
*Sacch. alb.* 1 0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aegu. No. 6.*  
*S. 2stündlich 1 Pulver.*

## Rp. 492.

*Chinini tannici* 2 0,  
*Opii pur.* 0 4,  
*Sacch. alb.* 1 5.  
*M. f. p. Div. in dos. aegu.*  
*No. 10.*  
*S 2 3 Pulver tägl.*

Stuhlverstopfung  
 durch Klystiere oder Calo-  
 mel 0 2, 2 - 3mal des Tages  
 gegeben, zu bekämpfen. Bei  
 Meteorismus kalte Um-  
 schläge auf den Bauch, Ein-  
 führung eines Mastdarm-  
 rohrs. Bei Darmblutun-  
 gen energ. Kälteapplicat.  
 auf das Abdomen; Klystiere  
 mit eiskaltem Wasser, Eis-  
 pillen, Gefrorenes.

## Rp. 493.

*Alumin crud.* 2 0,  
*Opii pur* 0 3,  
*Sacch. alb.* 3 0.  
*M. f. pulv. Div in dos.*  
*aegu. No. 10.*  
*S. 3stündl. 1 Pulver.*

Rp. 494.

*Plumb. acetic.,*  
*Opii pur. aa 0·3,*  
*Sacch. alb. 3·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3stündl. 1 Pulver.*

Ferner auch:

Rp. 495.

*Ergotin. dialysati 2·0,*  
*Aqu. font. 150·0.*  
*Syr. rub. Idaei 30·0.*  
*S. Stündlich bis 2stünd-*  
*lich 1 Esslöffel.*

Oder Ergotin-Injectionen (Rp. 96, 257).

Bei Bronchitis häufiger Lagewechsel, um Hypostasen zu verhüten; Expectorantia (s. Bronch. acuta S. 7). Auf regelmässige Blasen-Entleerung zu achten, bei Eintritt von Lähmung des Detrusor vesicae regelmässig zu katheterisiren. Bei den ersten Anzeichen von Herzschwäche und davon abhängigem Collaps fleissiges Reichen von schwerem Wein, Champagner, heissem Rothwein mit Tinct. Cinnamomi, 20 Tropfen in ein Weinglas, kräftiger Fleischbrühe, schwarzem Kaffee, Thee mit Rum, Cognac etc.

Rp. 496.

*Aqu. Melissae 150·0,*  
*Liqu. Ammon. anisat. 3·0,*  
*Syr. capillor. Vener. 15·0.*  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Rp. 497.

*Inf. rad. Valerianae e 10·0:150·0,*  
*(Liqu. Ammon. anis. 3·0),*  
*Syr. cort. Aurant. 20·0.*  
*S. 2 stündlich 1 Esslöffel.*

Bei schon eingetretenem Collaps neben reichlicher Einnahme der oben erwähnten excitirenden Getränke:

Rp. 498.

*Camphor. ras. 1·0,*  
*Mucil. gumm. Arab. 20·0,*  
*Aqu. font. 200·0.*  
*S. Zu 2 Klystieren.*

Rp. 499.

*Aether sulfuric* 10·0,*Camphor. ras.* 1·0.

S. 1 — 2 Pravaz'sche Spritzen zu injiciren.

Rp. 500.

*Ol. camphorati* 30·0.

S. 1 — 2 Pravaz'sche Spritzen.

**Dysenteria. Ruhr.** Prophylaxis zur Zeit des Herrschens einer Epidemie geboten. Vorsichtige Diät, Vermeiden von zu reichlichem Obstgenusse und überhaupt von abführenden Speisen, Verhütung von Erkältungen. Vorsicht in der Benützung infectirter Aborte. Bei ausgebrochener Krankheit der Patient womöglich zu isoliren, die Gefässe, in denen seine Stühle aufgefangen werden, zu desinficiren, ebenso die Abtritte. Bettruhe auch in leichten Fällen. warme (trockene oder feuchte) Umschläge auf das Abdomen. Diät nur in warmen Flüssigkeiten bestehend, Schleimsuppen, Reisabkochungen, warmer Milch, warmem Rothwein, Thee mit Rum etc. Der Mund fleissig mit kaltem Wasser auszuspülen. Häufige laue Bäder. Behandlung jedenfalls mit der Darreichung eines Abführmittels zu beginnen.

Rp. 501.

*Ol. Ricini* 80·0.

S. 2 Esslöffel zu reichen, eventuell zu wiederholen.

Rp. 502.

*Calomelanos* 0·2,*Sacch. albi* 1·5.

Dent. tales doses Nr. 2.

S. Im Laufe von 2 Stunden zu nehmen.

Das Abführmittel ist, wenn nicht rasche Besserung eintritt, am 3. Tage der Behandlung zu wiederholen.

Im Übrigen innerlich:

Rp. 503.

*Inf. rad. Ipecac.*

e 0·3:150·0,

*Tinct. Opii simpl.* gtts. 20,*Syr. Diacodii* 20·0.

S. 2stündl. 1 Esslöffel.

Rp. 504.

*Pulv. rad. Ipecac.* 0·5,*Extr. Opii aquos.* 0·2,*Sacch. alb.* 3·0.

M. 1 pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.

S. 2stündl. 1 Pulver.

In manchen Fällen von entschiedenem Nutzen:

Rp. 505.

*Calomelan. lacr.*,  
*Opü pur. aa* 0·3,  
*Sacch alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*S. 3—4 Pulver täglich.*

Rp. 506.

*Bismuthi subnitrici* 25,  
*Opü puri* 0·4,  
*Sacch albi* 1·5.  
*M. f. p. Div. in dos aequ. No. 10.*  
*S. 2—3 Pulver des Tages.*

Rp. 507

*Natrii salicylici* 2·0—3·0,  
*Aqu. destill.* 150·0,  
*Syr. Diacodii* 20·0.  
*S. 2stündl. 1 Esslöffel.*

Vor Salolmedication ist zu warnen, weil die Resorption der Phenolcomponenten im Darne sehr rasch stattfinden und damit Carbolvergiftung eintreten kann.

Sehr zweckmässig auch Klystiere, die jedoch vorsichtig und mit möglichster Schonung der oft entzündeten oder excoriirten Afterschleimhaut zu appliciren sind. Im Beginn einhüllende Klystiere mit Amylum, Salep etc. mit Zusatz von Opium, später wenn die Schleimhaut blennorrhöisch, die Stühle eitrig sind, astringirende Injectionen, eventuell auch mit Zusatz von Opium:

Rp. 508.

*Argent. nitr.* 0·3,  
*Aqu. dest.* 150·0,  
*Extr Opü aquos.* 0·2.  
*S. Zu 2 Klystieren.*

Rp. 509.

*Chinini muriat.* 1·0,  
*Aqu. destill.* 200·0,  
*Mucil. gumm. Arab.* 30·0.  
*S. Klysma, 1—2mal des Tages.*

Bei Verwendung von Carbolsäure, Salicylsäure zu Klysmen Vorsicht geboten, weil bei der durch das Vor-



handensein dysenterischer Substanzverluste der Schleimhaut des Darmes gegebenen raschen Resorption leicht Vergiftungserscheinungen auftreten

Bei starkem Tenesmus warme Umschläge auf die Aftergegend, Sitzen über einem Gefäss mit dampfendem Wasser, ferner:

Rp. 510.

*Opii pur.* 0·2,  
*Acid. tannic.* 1·0,  
*But. Cacao q. s. ut f.*  
*suppos. No. 10*  
*S. Früh und Abends*  
*1 Stück zu gebrauchen.*

Rp. 511.

*Extr. Belladonn.* 0·1,  
*Morph. mur.* 0·05,  
*But. Cacao q. s. ut f.*  
*suppos. No. 5.*  
*S. Wie das Vorige.*

Bei Darmblutungen Eisumschläge auf den Unterleib, Klystiere mit eiskaltem Wasser oder mit Essigwasser. Bei Collaps Excitantia.

**Cholera nostras. Brechdurchfall.** Sofort ein heisses prolongirtes Bad. Innerlich in Eis gekühlter Champagner, Cognac mit in Eis gekühltem Sodawasser, Eispillen, Subcutane Injection von Oleum camphoratum. Energisches Frottiren der Extremitäten und des Rumpfes, Einpacken in heisse Tücher. Bei sehr schmerzhaften Wadenkrämpfen Morphinum subcutan. In den schwersten Fällen mit dem Bilde der Cholera asiatica subcutane Infusion von auf 36° C erwärmter physiol. Kochsalzlösung (Natrii chlorati 7 10, Aq. dest. sterilisatæ 1000). Am besten für diese Infusionen eignet sich die Bauchhaut oder der Oberschenkel. Das entstehende subcutane Oedem lässt sich durch Massage rasch vertheilen. Ferner Klysmen mit  $\frac{1}{3}$  %iger Tanninlösung, 1—2 Liter mit dem Irrigateur. Sobald das Brechen aufhört, reichliches Getränk, später, bei Fortdauer der Diarrhœe, Opiumpräparate wie bei Dysenterie.

**Erysipelas. Rothlauf.** Innerlich neben kräftiger, aber flüssiger Nahrung und reichlich gereichtem Wein.

Rp. 512.

*Chinini muriat.* 1·0,  
*Aqu. destill.* 70·0,  
*Acid. mur. qu. s. ad sol.*  
*S. Auf 2mal zu nehmen.*

Die erkrankten Hautstellen und deren nächste Umgebung sind einzureiben und dick zu bestreichen mit

Rp. 513.

*Ichthyoli (Ammonii sulfoichthyolici),*  
*Vasellini ad* 50·0.  
*M. f. unguentum.*  
*S. Salbe.*

Darüber einfach trockene Verbandwatte zu legen.

Bei sehr starker Infiltration, Neigung zu Blasenbildung und Abscessen sind Einpackungen mit verdünnter Burow'scher Lösung vorzuziehen.

**Febris intermittens. Wechselfieber.** Prophylaktische Verhaltensmassregeln bei Aufenthalt in Malaria-Gegenden. Stets bei geschlossenen Fenstern schlafen in einer hochgelegenen, von den Sümpfen möglichst entfernten Gegend; nach Sonnenuntergang gewisse Orte meiden, ebenso das Baden in den Flüssen und Seen der Gegend. Im Fieberanfall selbst, wenn derselbe sehr heftig, Frottiren mit warmen Tüchern, eventuell 1–2 Tassen Thee trinken lassen; ein heisses Bad; bei starkem Erbrechen einige Tropfen Opium-Tinctur. Im darauffolgenden Hitze-Stadium kalte Getränke, kalte Umschläge auf den Kopf. In der Apyrexie:

Rp. 514.

*Chinin. muriat.* 1·0 1·5.  
*Div. in dos. aequ. No. 3.*  
*S. 3 Stunden vor dem Anfall das erste Pulver, die beiden anderen nach je 1 Stunde Pause.*

**Rp. 515.**

*Chinin. muriat* 1·0,  
*Extr. Taraxaci* q. s. ut f.  
*pill. No. 5.*  
*S.* 3 Stunden vor dem  
 Anfall die erste Pille,  
 dann jede  $\frac{1}{2}$  Stunde  
 1 Stück.

**Rp. 516.**

*Chin. bisulf.* 1·5,  
*Aqu. dest.,*  
*Syr. rub. Idaei*  $\overline{\text{aa}}$  25·0.  
*S.* 3 Stunden vor dem  
 Anfall in 2—3 Por-  
 tionen zu nehmen.

An den anfallsfreien Tagen kann man ge-  
 brauchen lassen:

**Rp. 517.**

*Cort. Chin. fusc.* 20·0,  
*Coque cum vin. Gallico ad col.* 200·0,  
*Syr. Cinnamom.* 25·0.  
*S.* 2stündlich 1 Esslöffel.

Bei andauernder Malaria-Kachexie, sowie bei  
 typischen Neuralgien Arsenikpillen (Rp. 468) oder:

**Rp. 518.**

*Sol. arsenic. Fowler.* 5·0,  
*Tinct. Chin. comp.* 15·0.  
*S.* Früh und Abends  
 5 Tropfen, allmählich zu  
 steigen auf 20 Tropfen  
*pro dosi.*

**Rp. 519.**

*Sol. arsenic. Fowler.* 5·0,  
*Aqu. dest.* 20·0.  
*S.* Von 5—30 Tropfen *p*  
*dosi* zu steigen.

**Rp. 520.**

*Extr. Chinae frig. par.* 2·0,  
*Aqu. Naph.* 100·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*S.* 2—3mal täglich 2 Esslöffel.

**Rp. 521.**

*Chinini muriat.* 1·2,  
*Ferri lactici* 1·0,  
*Elaeosacch. Calami* 3·0.  
*M. f. p. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S.* 2—3 Pulver täglich.

Zur Beseitigung der nach lang dauernden, namentlich tropischen Malariaerkrankungen zurückgebliebenen Milz- und Lebertumoren sehr zweckmässig Curgebrauch in Karlsbad mit Nacheur in Franzensbad.

**Influenza. Grippe.** Bei Krankheitsfällen, wo bloss stärkere continuirliche remittirende oder selbst intermittirende Fiebererscheinungen bestehen, bei intactem Circulations- und Respirationsapparat:

Rp. 522.

*Phenacetini* 0·5.  
*D. tales dos. No. 10.*  
*S. 4 Pulver täglich.*

Rp. 523.

*Chinini mur.* 1·0,  
*Aqu. dest.* 70 0,  
*Acid. mur. dil. q. s. ad*  
*solut.*  
*S. Auf zweimal zu nehmen.*

Rp. 524.

*Natrii salicyl.* 3·0 4·0,  
*Aqu. destill.* 150·0.,  
*Syr. rubi Idaei* 10·0  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Rp. 525.

*Salipyrini* 0·5.  
*D. tales dos. ad caps.*  
*amylac. No. 10.*  
*S. 2—3 Pulver täglich.*

Oder:

Rp. 526.

*Salipyrini* 6·0,  
*Glycerini* 14·0,  
*Syr. rub. Id.* 30·0,  
*Aqu. dest.* 40·0.  
*M. S. Von dieser Schüttel-*  
*mixtur 1—2 Esslöffel*  
*täglich*

Bei Bronchitis, Pneumonie, Darmaffection etc. vide die betreffenden Abschnitte. Von Anfang an Sorge für die Ernährung, Darreichung von Wein.

**Chlorosis. Bleichsucht.** Streng geregelte Lebensweise, thunlichste Vermeidung von Gemüthsaffecten. Kräftige, aber gemischte Kost. Alcoholica, wenn sie nicht Herzklopfen verursachen, in mässigen Mengen zu gestatten. Reichlicher Milchgenuss zu empfehlen; doch wird derselbe von den Patientinnen meist abgelehnt. Sehr wichtig Sorge für regelmässigen Stuhl. Aufenthalt auf dem Lande, jedoch ohne Ueberanstrengung bei Spa-

ziergängen. Aufenthalt im Hochgebirg sehr nützlich. Ueberhaupt eine möglichst weitgehende Aenderung der klimatischen Verhältnisse von Vortheil. Vor Allem Eisenquellen und Bäder: Franzensbad, Königswart, Pyrawarth, Cudowa, Schläes, Driburg, Elster, Schwalbach, Pymont, Reinerz, Spaa etc.: sehr empfehlenswerth ist ein längerer Aufenthalt und Curgebrauch in Levico oder St. Moritz. Bei sehr darniederliegender Verdauung und völligem Appetitmangel häuslicher Gebrauch von Egerer Salzquelle. Daneben ein bis zwei Kaffeelöffel Franzensbader oder Marienbader Quellsalz bei Neigung zu Stypsis. Ferner Levico, Roncegno, Srebrenica (Eisenarsenwasser) zu 1—3 Esslöffel des Tages nach den Mahlzeiten. Medicamentöser Eisengebrauch.

Rp. 527.

*Ferri lact.* 0·8,  
*Elucosacchari Calami,*  
*Sacchar. lact. aa* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 2 Pulver täglich*  
*(nach den Mahlzeiten)*

Rp. 528.

*Ferri sulfur.,*  
*Natrii bicarbon.,*  
*Extr. Gentianae aa* 4·0  
*M. f. pilulae No. 60*  
*Consp. pulv. Cinnam.*  
*S. 3mal tägl. (nach den*  
*Mahlz.) je 3—4 Pill.*

Rp. 529.

*Ferr. carbon. sacch.* 1·2,  
*Pulv. rad. Rhei* 0·6,  
*Elucos. Cinnamom.* 1·0  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 12.*  
*S. 3mal tägl. 1 Pulver.*

Rp. 530.

*Ferr. pyrophosphoric. c.*  
*Ammon. citric.* 1·0,  
*Sacch. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3mal tägl. 1 Pulver.*

Rp. 531.

*Ferri et Natr. pyrophos-*  
*phoric.*  
*Natrii bicarb.*  
*Sacchar. lact. aa* 1·5.  
*F. pulv. Div. in doses*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3 Pulver täglich*

Rp. 532.

*Ferr. Hydrogen. reduct.*  
*1·0,*  
*Elucosacch. Calam.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 3mal tägl. 1 Pulver*



Rp. 533.

*Tinct. Ferr. pomat.*,  
*Tinct. Chin. comp. aü 15·0.*  
*S. 3mal täglich 10 15*  
*Tropfen.*

Bei gleichzeitiger Dys-  
pepsie:

Rp. 534.

*Tinct. Nuc. vom. 10·0.*  
*Tinct. Chin. comp. 20·0.*  
*S. 2mal tägl. 10 Tropfen*

Ausserdem vergl. nervöse Dyspepsie (S. 51 f.).

**Anaemia gravis. (Essentielle progressive Anaemie und schwere secundäre Anaemien)** Wenn möglich, causale Behandlung (Ankylostomiasis, Bothriocephalus latens, Blutungen). Eisenbehandlung bleibt in der Regel ohne Erfolg. Hingegen empfehlenswerth:

Rp. 535. *Acidi arsenicosi 0·1,*

*Pulv. et extr. Liqu.*

*q. s. ut fiant pilulae No. 100 (centum).*

*S. Von 1 zu 10 Pillen langsam an- und*  
*ebenso absteigen.*

Ausserdem entsprechende kräftige Ernährung. Gebrauch von Eisenbädern (Levico, Franzensbad, Königswarth.)

**Leukaemie.** Vor Allem intensive Arsenbehandlung. Bei entsprechendem Zustand des Verdauungsapparates neben kräftiger Ernährung Eisentherapie. Im Sommer Aufenthalt im Hochgebirge, Gebrauch von Eisenbädern und Trinkeuren in Levico, St. Moritz, Franzensbad, Königswarth. Eventuell Versuch mit Sauerstoff-Inhalationen, 60—80 Liter pro die einzuathmen. (Erfolg negativ.)

Rp. 536.

*Chinin. mur. 1·5,*  
*Ferr. carbon. sacch. 1·0,*  
*Elacosacch. Aurant. 2·0.*  
*M f pulv Div in dos.*  
*aegu. No. 10.*  
*S 3 Pulver täglich.*

Rp. 537.

*Olei Eucalypti guttas 100,*  
*Piperini,*  
*Cer. alb. aü 4·0,*  
*Pulv. rad. Altheae 8·0.*  
*F. pil. No. 100 (centum).*  
*Consp. p Lycop*  
*S. Tägl. 3mal 3—5 Stück.*



**Pseudoleukaemie. Hodgkin'sche Krankheit.** Dieselbe Behandlung wie bei Leukaemie. Ausserdem Injectionen von Solutio arsenicalis Fowleri 1—3 Tropfen in die einzelnen geschwollenen Drüsen.

**Scorbutus. Scorbut.** Sorge für gute Wohnräume, die fleissig zu lüften sind, sowie für ausgiebige gemischte Nahrung, namentlich gutes Fleisch, frische Gemüße, Wein, Bier. Waschungen des Körpers mit Essig, kühle Bäder. Gegen die Blutungen äusserlich und innerlich Styptica:

Rp. 538.

*Ergotin. pur. 2·0,*  
*Aqu. dest. 150·0,*  
*Aqu. Lauroc. 5·0,*  
*Syr. Moror. 20·0.*  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Subcutane Injectionen nicht zu empfehlen.

Gegen die Lockerung des Zahnfleisches Ausspülungen mit einer Lösung von Kali chloric. (2·0 : 150·0) oder von Alaun oder Tannin (2%ig). Pinseln des Zahnfleisches mit:

Rp. 539.

*Tinct. Ratanhiae,*  
*Tinct. Gallar. aa 15·0.*  
*S. Zum Pinseln.*

Ferner innerlich:

Rp. 540.

*Elixir. acid. Halleri gtt. 12,*  
*Aqu. destill. 150·0,*  
*Syr. Ribium 12·0.*  
*S. 2stündlich 2 Esslöffel.*

Rp. 541.

*Acid. mur. dilut 1·5,*  
*Aqu. dest. 150·0,*  
*Syr. simpl. 15·0.*  
*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Rp. 542.

*Decoct. cort. Chin. e 10·0 ad 200·0,*  
*Acid. mur. gtts. 15.*

*Syr. cort. Aurant. 20·0.*

*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Rp. 543.

*Tinct. nervino-tonic. Bestuscheffii 20·0.*

*S. 2mal täglich 10 Tropfen.*

Geschwüre mit Lapis zu ätzen. (S. auch „Gingivitis“  
S. 40 f.)

Ähnliche Therapie auch bei *Purpura haemorrhagica* etc. Empfehlenswerth:

Rp. 544.

*Extr. Secal cornut. 1·0,*

*Ferri lact. 0·8,*

*Flaeosacchar. Cinnamom. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in doses aequ. No. 10.*

*S. 3—4 Pulver täglich.*

**Diabetes mellitus. Zuckerharnruhr.** Vermeidung aller Kohlenhydrate, daher die Kost vorwiegend aus Fleisch (auch Fische) bestehend, daneben Eier, Butter, Käse, Salat, saure Gurken, Spargel, Pilze; statt des gewöhnlichen Brodes Kleien- oder Mandelbrod. Als Getränk Wasser, Sodawasser oder besser ein alkalischer Sauerling, ungezuckerter Kaffee oder Thee, leichter, nicht süßer Wein; kein Bier; Milch nur in geringer Menge. Reichlicher Fettgehalt der Speisen gut. Für eine sehr reichliche Abwechslung der genossenen Speisen ist Sorge zu tragen. Bei Individuen, welche ungezuckerte Speisen und Getränke absolut verweigern, aber nur dann als Ersatz des Zuckers Saccharin zu empfehlen. Wenn unter dem Einflusse einer solchen strengen antidiabetischen Diät der Harn zuckerfrei geworden ist, mache man den Versuch mit Darreichung kleiner Mengen von Kohlenhydraten (Semmel und Bier), um die individuelle Toleranz zu be-

stommen. Diese letztere gibt dann die Richtschnur für die weitere Dia. Von gutem Erfolg langdauernde und oft zu wiederholende Curen in Karlsbad; oder auch in Kissingen, Vichy, Ems. Bei sehr heruntergekommenen Kranken auch eisenhaltige Mineralquellen. Auch der Gebrauch von warmen Bädern zu Hause oder der Bäder von Teplitz, Gastein etc. oft von gutem Erfolg. Muskelarbeit, Bewegung im Freien sehr angezeigt. Bei schweren Fällen von Diabetes (zumeist jugendliche Individuen betreffend), ist eine ausschliessliche Ernährung mit Fleisch wegen der dadurch zu steigenden Säurevergiftung nicht angezeigt. Hingegen, sobald Eisenchloridreaction im Harn sich zeigt, Darreichung von grossen Mengen alkalischer Salze (Natr. bicarbon 30—50 gm. pro die) angezeigt. Zur Verminderung der Zuckermengen und namentlich des quälenden Durstes temporärer Gebrauch von Opium.

Rp 545.

*Opii pur. 0.3,*  
*Natr. bicarbon. 3.0*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aegu. No. 10.*  
*S. 3—4mal tägl. 1 Pulv.*

Rp 546.

*Codein. 0.3,*  
*Sacch. alb. 3.0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aegu. No. 10*  
*S. 3—4 Pulver täglich.*

Rp 547.

*Natrii salicyl.*  
*Natrii bromati,*  
*Natrii bicarbon aa 1.5.*  
*F. p. Div. in dos aeq. No. 3*  
*S. Alle 3 Pulver im Laufe eines Tages in Wasser*  
*gelöst.*

Beim Eintreten der ersten Anzeichen eines Coma diabeticorum Zufuhr von möglichst viel Alkalien per os, per Klysma oder als intravenöse Injection (Natrium carb. 3 auf 1000, sterilisirt.) Die Erfolge sind allerdings bisher wenig ermunternde.

**Arthritis urica s. vera. Gicht.** Regelung der Diät und zwar nicht allein in Rücksicht einer Beschränkung des Fleischgenusses, sondern einer Verminderung der zugeführten Nährsubstanzen überhaupt. Abschaffung einer früher gewohnten Ueberernährung. Vermeidung schwerer alcoholischer Getränke, besonders weissen Weines. Leichtes Bier in mässiger Menge gestattet. Viel Bewegung in freier Luft. Heilgymnastik. Gebrauch von Alkalien, alkalisch salinischen Wässern, vgl. „Nierensteine“ (S. 76 f). Karlsbader Cur, womöglich zweimal im Jahre durchzuführen.

Während des Anfalles: Einpackungen der schmerzenden Theile mit essigsaurer Thonerde, darüber ein Eisbeutel. Innerlich Versuch mit Natrium salicylicum 0·5 einigemal des Tages, mit Antipyrin und Phenacetin. Ferner mit:

Rp. 548.

*Tinct. Colchici 15·0,*

*Tinct. Op. croc. 2·0.*

*S. 4mal täglich 15—20 Tropfen.*

Rp. 549.

*Colchicini 0·02,*

*Solv. in aq. destill.*

*q. s., ut fiat cum pulv. rad. Altaeae 4·0 et  
Sacchar. alb. 1·0 mass. pilul. e qua form.  
pil. No. 40.*

*Consp. elaeosacchar. Anisi.*

*S. 2—5 Pillen im Tage.*

---



Aus

**Hofrath Prof. Dr. Hermann Nothnagel's**  
**Klinik und Ambulatorium für innere Krankheiten.**

---

**Analeptica. Excitantia. Belebende, erregende Mittel.** Wein, insbesondere die schweren Weine (Tokayer, Sherry, Portwein), ferner Cognac, Thee mit Rum, schwarzer Kaffee. Die rascheste, erregende Wirkung hat Champagner. Kalte Abreibungen, kalte Begießungen im warmen Bade, Sinapismen oder Senfbäder. Ein gutes Excitans ist der Kampher:

Rp. 550.

*Champhor. ras. 1·0,*

*Ol. Olivar. 9·0.*

*S. 1—2 Pravaz'sche*

*Spritzen zu injiciren.*

Bei Ohnmachten  
Aether od. Ammoniak od. Spirit. aether. nitros. riechen zu lassen.

Bei Collaps in Folge  
raschen Blutverlustes (z. B.

Haematemesis) Infusion  
einer Kochsalzlösung in eine  
Vene eines Armes. Man be-  
nützt folgende, entsprechend  
erwärmte Mischung:

Rp. 551.

*Natr. chlorat. 4·0,*

*Natr. bicarbon. 0·5,*

*Aqu. dest. 500·0.*

*S. Zur Infusion.*

Diese Infusion kann auch subcutan gegeben werden an allen jenen Stellen, wo lockeres, subcutanes Zellgewebe (z. B. Brust) ist. Zu einer subcutanen Injection sind circa 100 ccm der früher angegebenen Mischung zu verwenden.

**Anodyna. Schmerzstillende Mittel.** a) Oertlich wirkend: Bei Schmerzen in Folge acuter Entzündung Kälte in Form von Eisblasen, Chapman'schem



Schlauch, Leiter'schem Kühlapparat; Blutentziehung durch Blutegel oder blutige Schröpfköpfe, bei anämischen oder sonst schwachen Personen trockene Schröpfköpfe. Bei Schmerzen in späteren Stadien der Entzündung (z. B. seröser Häute) Canthariden Pflaster oft sehr gut wirksam. Bei Kolikschmerzen (Enteralgia, Cholelithiasis, Nephrolithiasis) Kataplasmen, warme Bäder, Aufträufeln von Aether. Letzteres auch, ebenso wie Einreibung mit Menthol oder Kälte-Application überhaupt, oft bei Cephalaea sehr schmerzstillend. Bei rheumatischen und neuralgischen Schmerzen lindernde Einreibungen, z. B.:

Rp. 552.

*Chloroform.,*  
*Ol. Olivar. aa q s.*  
*S. Einreibung.*

Rp. 553.

*Spir. aromatic.,*  
*Spir. saponat. aa q s.*  
*D. S. Einreibung.*

Oder Hauteize, wie:

Rp 554.

*Spir camphorat. 500,*  
*Ol. Sinapis aether. 10*  
*S. Zum Einreiben.*

Dauerndere Wirkung erzielt man durch Application von Blasenpflastern, entweder in Form des Empl. Cantharid. ordinar., das auf Leinwand aufgestrichen an einer schmerzhaften Stelle applicirt, dort mit Tüchern oder Heftpflaster befestigt und entweder bis zur Röthung (2—4 Stunden) oder bis zur Blasenbildung (9—10 Stunden) liegen gelassen wird; oder man verschreibt, was namentlich bei frischen, durch Erkältung entstandenen Neuralgien oft von sehr gutem Erfolg, fliegende Vesicantien:

Rp. 555.

*Empl. Cantharid. perpet. q. s.*  
*D. S. Damit bestrichene Leinwandstücke jeden*  
*Tag an einer anderen schmerzhaften Stelle zu*  
*appliciren.*

Bei schmerzhaftem Tenesmus neben feuchter Wärme Suppositorien mit narkotischen Substanzen:

Rp. 556.

*Extr. Opii aquos. 0·1,*  
*(Extr. Belladonn. 0·1),*  
*But. Cacao q. s. ut f.*  
*suppos. No. 5.*  
*D. S. Täglich 1—2 Stück*  
*zu gebrauchen.*

Rp. 557.

*Cocain. mur. 0·15—0·25,*  
*But. Cacao q. s. ut f.*  
*suppos. No. 5.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

b) Allgemein wirkend: Morphin, innerlich oder in subcutanen Injectionen:

Rp. 558.

*Morph. mur. 0·07—0·3,*  
*Aqu. dest. 10·0.*  
*S. 1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

(Bei chronischen Leiden möglichst spät und mit den kleinsten Dosen zu beginnen.)

Bei neuralgischen Schmerzen überhaupt wirkt manchmal gut die faradische Pinselung, so auch bei Ischias, Migraine etc. Ferner oft sehr wirksam Antipyrin:

Rp. 559.

*Antipyrin. 10·0.*  
*Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S. 2—4 Pulver täglich (oder bei Schmerz-*  
*anfällen 1—2 Pulver im Beginn des Anfalls.)*

In entsprechenden Fällen auch subcutan:

Rp. 560.

*Antipyrin.,*  
*Aqu. fervid. āā 5·0.*  
*D. S. 1 Pravaz'sche Spritze voll an einer*  
*schmerzhaften Stelle zu injiciren.*

Manchmal wirkt besser als Antipyrin:

Rp. 561.

*Antifebrin. 1·5.*  
*Div. in dos. aequ. No. 5.*  
*D. S. 2—3 Pulver täglich.*

Öfters wirkt auch prompt:

Rp. 562.

*Phenacetin* 4 0,

*Div. in dos. aequ* No. 6.

*D. S.* 2 -3 Pulver täglich.

**Antacida. Säuretilgende Mittel.** Bei saurem Aufstossen, Pyrosis:

Rp. 563.

*Natr. bicarb.* 2 0—5 0,

*Elacosacch Cinnam* 5 0,

*M. f. pulv. Div. in dos aequ.* No. 10.

*D. S.* 3mal tägl. 1 Pulver nach der Mahlzeit.

Beim sogen Status gastricus wirkt oft besser eine Combination mit Rhoon.

Rp. 564

*Natr. bicarbon.,*

*Pulv. rad. Rhei.*  $\overline{aa}$  1 5,

*Sacch. alb.* 3 0

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ.* No. 10.

*D. S.* Wie das Vorige

Besteht vermehrte Salzsaureabsonderung (Gastroxynsis), so lässt man den Kranken während des Tags oft Getränk, besonders sehr stark verdünnten, russischen Thee (circa  $\frac{1}{2}$ —1 Liter täglich) trinken. Wenn zugleich Neigung zu Verstopfung besteht:

Rp. 565.

*Maquis. ust. (od. carbon.)* 5 0—10 0,

*Aqu. font* 150 0,

*Syr cort. Aurant.* 20 0.

*D. S.* 2stündlich 1 Esslöffel der gut umgeschüttelten Mixtur.

**Anthelmintica. Wurmtödtende Mittel.** Vor Anwendung des eigentlichen Wurmmittels ist es zu zweckmässig, den Patienten einen halben Tag fasten und am Abend

Kochsalz, am besten in Form eines stark gesalzenen Härings nehmen zu lassen. Gegen *Taenia* wirken:

Rp. 566.

*Decoct. cort. Pun. Granat.*  
*e 30·0—50·0:200·0,*  
*Syr. Zingiber. 30·0.*  
*D. S. In 2 Port. innerhalb*  
*1 Stunde zu nehmen.*

Rp. 567.

*Extr. Filic. mar. aether.*  
*recenter parat. 6·0.*  
*Div. in dos. aeq. No. 6.*  
*Da in capsul. gelatin.*  
*D. S.  $\frac{1}{4}$ -stündlich eine*  
*Dose.*

Rp. 568.

*Kamal. 10·0—15·0,*  
*Pulv. Tamarind. q. s.*  
*ut f. electuar.*  
*D. S. Auf 2 Portionen*  
*innerhalb  $\frac{1}{2}$ —1 St.*  
*zu nehmen.*

Besser vertragen wird:

Rp. 571.

*Santonin. pur. 0·2,*  
*Ol. Ricin. 20·0,*  
*Ol. Cin. aether. gtts. 4,*  
*Sacch. alb. q. s. ut f. pasta moll.*  
*D. S. In 2 Tagen zu verbrauchen.*

Rp. 569.

*Flor. Kousso 15·0—20·0,*  
*Inf. c. Aqu. ferv. 300·0.*  
*Adde Succ. Citr. rec. 3·0.*  
*D. S. Auf 2 Portionen*  
*innerhalb 1 Stunde*  
*wohlumgeschüttelt zu*  
*nehmen.*

(Alle Bandwurmmittel auf nüchternem Magen zu nehmen, einige Stunden nach der Einnahme ein leichtes Abführmittel) Bei Brechreiz Eispillen.

Gegen *Ascaris lumbricoides*:

Rp. 570.

*Santonin. pur. 0·06—0·3,*  
*Ol. Cin. aether. gtts 3—4,*  
*Ol. Ricini (od. Amygdal.*  
*dulc.) 30·0.*  
*S. Kaffeelöffelweise in*  
*2 Tagen zu verbrauchen.*

**Antidypsica. Durstwidrige Mittel.** Bei Diabetes mellitus wird als durstverminderndes Mittel vielfach gegeben:

**Rp. 572.**

*Opü pur. 0·3,  
Natr. bicarbon. 3·0.  
M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.  
D. S. 2—3mal täglich 1 Pulver.*

Oder in Verbindung mit  
Belladonna:

Ebens, bei Diabetes  
insipidus. Versuchsweise  
auch:

**Rp. 573.**

*Extr. Opü aquos,  
Extr. Belladonn. m̄i 0·1,  
Sacch. alb. 3·0.  
M. f. pulv. Div. in dos.  
aequ. No. 10.  
D. S. Wie das Vorige.*

**Rp. 574.**

*Codein. 0·1,  
Sacch. alb. 3·0.  
M. f. pulv. Div. in dos.  
aequ. No. 10.  
D. S. 2—3mal tägl. 1 Pulv*

**Antidyspnoëtica. Athemnoth vermindernde Mittel.**

Behandlung der ursächlichen Krankheit. Bei anfallsweise auftretender Dyspnoë, insbesondere beim Asthma bronchiale:

**Rp. 575.**

*Pyridin. gttss. 5—20,  
Aqu. dest. 40·0.  
S. Zur Inhalation.*

Bei demselben Leiden auch:

**Rp. 576.**

*Natr. iodat. 2·0,  
Aqu. dest. 80·0,  
Syr. cort. Aurant. 20·0  
D. S. Tagsüber zu verbrauchen.*

Bei Asthma in Folge von Herzfehler, Stenocardie, Uraemie etc. oft ein an der vorderen Thoraxfläche applicirter Sinapismus von gutem Erfolg. Bei stenocardischen Anfällen oft sehr gut die Anwendung von Nitroglycerin (vide „Cardiaca“ S. 134 ff.).

**Antiemetica. Erbrechen oder Brechreiz vermindernde Mittel.** Eispillen, in Eis gekühltes Sodawasser; bei durch Einnahme von Brechmitteln entstandener Hyperemesis oder beim Erbrechen im Alkohol rausch schwarzer Kaffee. In vielen Fällen Application eines Sinapismus oder Cantharidenpflasters im Epigastrium von Erfolg. Gegen Erbrechen in Folge schwerer Magenaffectionen, sowie gegen „sympathisches“, bei Erkrankungen entfernter Organe erfolgendes Erbrechen etc. Morphin.

Rp. 577.

*Morph. muriat. 0·1,*

*Aqu. dest. 10 0.*

*S. 10 Tropfen auf einmal, eventuell mehrmals im Tag zu wiederholen.*

Gegen uraemisches Erbrechen:

Rp. 578.

*Menthol 0·1,*

*Spirit. rm. concentrat. 100·0.*

*D. S. 4—5mal täglich einen Kinderlöffel voll in einem Glase Wasser zu nehmen.*

Bei Hyperemesis gravidarum oder bei „sympathisch-nervösem“ Erbrechen gelegentlich von Erfolg:

Rp. 579.

*Tinct. iodin. 0·5,*

*Aqu. dest. 150·0.*

*S. 2ständl. 1 Esslöffel.*

Gegen den bei Lungen- oder Kehlkopftubercu-

lose öfters auftretenden, heftigen Brechreiz:

Rp. 580.

*Kal. bromat. 10 0—20·0,*

*Aqu. dest. 20·0.*

*S. Zum Bepinseln der Rachenschleimhaut.*

**Antiepileptica. Epilepsie heilende oder lindernde Mittel.** Wo es möglich, causale Behandlung: Excision von reizenden Narben, Hebung der Constitution etc. Kaltwasserkuren, wobei jedoch Douchen auf Kopf und Rücken zu untersagen sind.



**Rp. 581.**

*Natr. bromat 10 0 50 0*

*Dic. in dos aequ. No. 10*

*Da in chart. cerat.*

*S. 2 3mal täglich 1 Pulver in Wasser aufgelöst zu nehmen.*

(Man beginnt mit den kleineren Dosen, 2 3 Gr. pro die, und steigt allmählich [nach jedem neuerlichen Anfalle um 1 Gr. pro die] bis auf 10 Gr. pro die.)

Wenn die durch Monate fortgesetzte Behandlung mit Bromnatrium keinen Effect erzielt, so ist eines der folgenden Mittel zu versuchen:

**Rp. 582**

*Atropin. sulfuric. 0·01,*

*Aqu. dest 10·0.*

*S. Tägl.  $\frac{1}{2}$ —1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren*

**Rp. 583.**

*Zinc. oxydat. 0·3—1·0,*

*Extr. Belladonn. 0·1,*

*Pul. rad Valerian.,*

*Sach alb aa 5 0*

*M. f. pulv Dic. in dos aequ. No 10*

*D. S. 3mal täglich 1 Pulver.*

**Rp 584.**

*Inf. rad. Artemis. e 15·0:150·0,*

*Syr. rub. Idaei 20·0.*

*D. S 2stündlich 1 Esslöffel.*

**Antihidrotica. Schweissbeschränkende Mittel.**

Gegen die Nachtschweisse der Phthisiker abendliche Abwaschungen mit verdünntem Essig oder mit Wasser, dem etwas Citronensaft zugesetzt ist, oder mit Franzbranntwein; Trinken von Milch mit Cognac. Von Medicamenten:

**Rp. 585.**

*Atropin sulfuric. 0·01,*

*Pulv. et extr. Liquir. q. s. ut f. pill. No. 20.*

*D. S. Am Abend 1—2 Pillen*

Rp. 586.

Agaricin. 0·03,  
 Sacch. alb. 3·0.  
 M. f. pulv. Div. in dos.  
 aequ. No. 10.  
 D. S. Abds. 1 2 Pulv.

Rp. 587.

Acid. camphorici 5·0.  
 Div. in dos. aequ. No.  
 10.  
 D. S. Abends 1—2 Pul-  
 ver.

Manchmal hilft das von Neusser empfohlene Natrium telluric. (in Dosen von 0·2—0·3 pro die). Doch riechen die Kranken nachher noch Tage lang nach Knoblauch.

**Antipyretica. Fiebermittel.** Antipyretische Behandlung, namentlich die durch Medicamente, im Allgemeinen nur bei sehr hohem oder sehr lange andauerndem Fieber angezeigt. Die Temperaturherabsetzung wird bewirkt: a) durch Wärmeentziehung mittelst Wassers: Bei Kindern Einwicklung in nasse Leintücher, bei Erwachsenen Bäder von 16—18° R., wenn die Kranken sehr schwach sind, Bäder von 22—26° R., die man durch Zuschütten von kaltem Wasser allmählich abkühlen kann. Bei Typhus abdominalis gewöhnlich täglich ein etwa  $\frac{1}{4}$  stündiges Bad von 22° R. mit kalten Uebergießungen im Nacken. Der Kranke im Bade zu frottiren. Um dem Collaps vorzubeugen, vor dem Bade Wein zu geben, ebenso in demselben; nach dem Bade, wenn der Puls schwach wird, ebenfalls Wein, schwarzer Kaffee, Cognac u. s. w. Wo die Bäder wegen äusserer Verhältnisse nicht durchführbar, kalte Einwicklungen und Waschungen. In manchen Fällen warme Bäder von 25—26° R. wirksamer als kalte, namentlich in der dritten und vierten Woche des Abdominaltyphus neben Chinin angezeigt.

b) Antipyrese durch Medicamente: Das häufigst gebrauchte Antipyreticum ist Chinin. Man gibt, z. B. bei Typhus abdominalis, wenn, wie gewöhnlich, die stärkste Remission am Morgen eintritt:

Rp. 588.

*Chinin. sulfuric. (od. mariat.),**Sacch. alb. aa 1·5.**M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 3**D. S. Abends um 7 od 8 Uhr 1—2—3 Pulver in  $\frac{1}{4}$ stündl. Pausen.*

Wenn flüssige Medicamente vom Kranken leichter genommen werden:

Rp. 589.

*Chin. bisulfur. 1·0—2·0,**Aqu. dest. 60·0,**Syr. rub. Idaeii 30·0.**D. S. In  $\frac{1}{2}$ —1 Stunde zu verbrauchen.*

Gewöhnlich gibt man zwei Abende hinter einander Chinin und setzt am dritten Abend aus.

Bei Pneumonia crouposa, wenn die Temperatur am vierten oder fünften Tage 40° übersteigt, ebenfalls grosse Dosen Chinin, 1·5—2·0 Gr., in manchen Fällen selbst 3—4 Gr. Aehnliche Verfahren bei anderen fieberhaften Erkrankungen

Ein anderes Antipyreticum ist Natrium salicylic.:

Rp. 590.

*Natr. salicylic. 3·0—5·0,**Aqu. dest. 150·0,**Succ. Liquir. 30·0.**S. Innerhalb  $\frac{1}{2}$  Stunde zu nehmen.*

In den letzten Jahren sind mehrere neue Substanzen dargestellt worden, die alle die Fiebertemperatur in den meisten Fällen rasch und sicher herabsetzen. Hieher gehören namentlich die folgenden:

Rp. 591.

*Antipyrin 3·0,**Div. in dos. aequ. No. 5.**D. S. 2—3 Pulver in einstündigen Pausen.*

- Rp. 592. *Antifebrin.* 0·5—1·0,  
*Sacch. alb.* 20.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 5.*  
*D. S. 1—2 Pulver*

Ferner das zuerst von v. Jacksch angewendete  
 Thallin:

- Rp. 593. *Thallin, sulfuric.* 1·0 1·25,  
*Sacch. alb.* 20.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 5.*  
*D. S. 1—2 Pulver.*

Dasselbe jedoch wegen der Collapsgefahr jetzt weniger  
 verwendet.

### **Antirheumatica. Rheumatismus heilende Mittel.**

Gegen die Polyarthrititis rheumatica acuta ist  
 die Salicylsäure von geradezu spezifischer Wirkung.

- Rp. 594.  
*Natr. salicyl.* 10·0.  
*Div. in dos. aequ. No. 20.*  
*D. S. Stündl. 1 Pulver*  
*in Oblaten.*

Nach dem Zurückgehen  
 der Schmerzen und Schwel-  
 lung noch durch etwa acht  
 Tage:

- Rp. 595.  
*Natr. salicylic.* 3·0,  
*Aqu. dest.* 150 0,  
*Syr. rub. Idaei* 20 0.  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Wenn das salicylsaure  
 Natron nicht vertragen wird  
 oder, was in ganz seltenen

Fällen vorkommt, nicht wirkt  
 zu versuchen:

- Rp. 596.  
*Natr. benzoic.* 20·0,  
*Sacch. alb.* 10 0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 30.*  
*D. S. Stündl. 1 Pulver.*

In neuerer Zeit mit sehr  
 gutem Erfolg nach der Em-  
 pfehlung von Sahli:

- Rp. 597.  
*Salol.,*  
*Sacch. alb. aa* 10·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 20.*  
*D. S. Stündl. 1 Pulver*

Statt *Natr. salicyl.* wird auch Antipyrin mit gutem  
 Erfolge gegeben

Rp. 598.

*Antipyrini 6·0.*

*Div. in dos. aequ. No 12.*

*D. S. 2stündl. 1 Pulver.*

Eventuell können auch locale Dampfbäder an dem erkrankten Gelenke mit dem Gartner'schen Apparate angewendet werden.

Bei chronischem Gelenkrheumatismus die obigen Mittel zu versuchen, aber viel weniger wirksam. Warme Bäder oder Gebrauch von indifferenten Thermen, Schwefelbäder, Soolbädern etc. Innerlich noch zu versuchen Arsen oder:

Rp. 599.

*Natr iodat. 10—4·0,*

*Aqu. font. 150 0,*

*Syr. Moror. 20·0*

*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Ferner Localbehandlung mit Kälte, Massage, Faradisation des Gelenks, Bepinselung der Haut mit Jodtinctur, schmerzlindernde Einreibungen (s. Rp. 552—554); hie und da auch wirksam:

Rp. 600.

*Ichthyol.,*

*Vaselin aa 20·0.*

*S. Einreibung; darüber Watta-Verband.*

Auch bei acutem Gelenkrheumatismus anzuwenden.

### **Antiseptica. Desinficientia. Fäulnisswidrige Mittel.**

Bei putriden Processen im Respirationsapparat (Bronchitis putrida, Bronchiektasie, Gangraena pulmonum) neben entsprechender sonstiger Behandlung (namentlich bei Lungenbrand reichliche Zufuhr von Alkohol) Desodorisation der Sputa durch Inhalation von:

Rp. 601.

*Ol. Terebinthin. 0·5—2·0,*  
*Aqu. dest. 100·0.*

*S. Mittels Inhalations-*  
*apparates mehrmals täg-*  
*lich zu inhaliren.*

Ebenso auch:

Rp. 602.

*Aqu. Picis 5·0—50·0,*  
*Aqu. dest. 100·0.*

*S. Zur Inhalation.*

Ferner:

Rp. 603.

*Acid. carbolic. 0·5—1·0,*  
*Aqu. dest. 100·0,*

*(Aqu. Menth. pip. 20·0).*

*S. Zur Inhalation.*

Ferner bei diesen Pro-  
cessen innerlich:

Rp. 604.

*Myrtol. 0·15.*

*Da in capsul. gelatinos.*

*Dent. tal. dos. No. 20.*

*D. S. Täglich 3 Pillen.*

Bei Dilatatio ven-  
triculi gegen die abnormen  
Gährungsvorgänge und die  
Anhäufung von Zersetzungs-  
producten im Magen Aus-  
spülung desselben mit anti-  
septischen Flüssigkeiten:

Rp. 605.

*Kal. hypermanganic.*

*2·5—5·0,*

*Aqu. dest. 1000·0.*

*S. Mit der erwärmten*  
*Flüssigkeit der Magen*  
*jeden Abend auszuspülen.*

Oder:

Rp 606.

*Acid. thymic. 0·5—1·0,*

*Aqu. dest. 1000·0.*

*S. Wie das Vorige.*

Ebenso auch  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  ige  
Lösungen von Carbolsäure.

Unter den Antiseptics ist wohl auch das Creosot in  
seiner in letzter Zeit eingeführten Anwendung bei be-  
ginnender Tuberculosis pulmonum zu erwähnen. Man gibt:

Rp. 607.

*Creosot. 1·0,*

*Sacch. lact. 5·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 20.*

*Da in capsulis.*

*S. 3 Kapseln täglich.*



Oder: Rp. 608.

*Creosoti* 0·1,

*Ol. jecor. Asell.* 0·2.

*Da in capsul. gelatinos.*

*Dent. tal. capsul. No. 50.*

*D. S. 5 Kapseln täglich (nach dem Essen zu nehmen).*

*Allmählich auf 10 Kapseln zu steigen*

Wenn das Mittel den Appetit herabsetzt, ist es auszusetzen.

**Antitypica.** Gegen durch Malaria-Intoxication bedingte, typische Fieberanfälle, sowie gegen typische Neuralgien, Congestionen etc. (Intermittens larvata):

Rp. 609.

*Chinin. sulfuric. (oder  
muriat)* 2·0,

*Sacch. alb.* 3·0.

*M. f. pulv. Div. in dos.  
aequ. No. 4.*

*D. S. 12—6 Stunden  
vor dem Anfall 1—2  
Pulver.*

(Bei sehr schweren Fieberanfällen grössere Dosen, bis zu 5 Gr. im Tag)

Nach Aufhören der Anfälle noch durch einige Tage:

Rp. 610.

*Chinin. mur.* 1·5,

*Sacch. alb.* 3·0.

*M. f. pulv. Div. in dos.  
aequ. No. 5.*

*D. S. Tdgl. 1—2 Pulver.*

Bei Ortsveränderung hören die Fieberanfälle öfters von selbst auf.

Wenn Chinin allein ausgebrochen wird, oder bei sehr schwerer Erkrankung:

Rp. 611.

*Chinin. mur.* 2·0,

*Opil. pur.* 0·2,

*Sacch. alb.* 3·0

*M. f. pul. Div. in dos.  
aequ. No. 4.*

*D. S. 12—6 Stunden vor  
dem Anfall 1 Pulver.*

Wenn Chinin in frischen Fällen nicht wirkt, oder bei inveterirten Wechselfiebern:

Rp. 612.

*Sol. arsenic. Fowleri* 5·0,  
*Aqu. dest.* 10·0.

*S. 2—3mal täglich nach  
dem Essen 5 Tropfen,  
allmählich bis auf's Dop-  
pelte zu steigen.*

**Astringentia. Zusammenziehende Mittel.** Bei Angina catarrhalis mässigen Grades neben Application von Kälte meist von guter Wirkung:

Rp. 613.

*Aqu. Calc.* 50·0,  
*Aqu. font.* 150·0.  
*S. Gurgelwasser.*

Bei subacuter und chronischer Pharyngitis auch:

Rp. 614.

*Alum. crud.* 5·0,  
*Aqu. dest. (od. Inf. fol. Salviae)* 200·0,  
*Tinct. Myrrh.* 2·0.  
*S. Gurgelwasser.*

Bei ganz frischer Pharyngitis oder Angina Touchiren mit Lapisstift öfter von abortiver Wirkung; statt des Stiftes auch concentrirte Lösungen, wie:

Rp. 615.

*Argent. nitric.* 0·5—2·0,  
*Aqu. dest.* 10·0.  
*S. Zum Bepinseln.*

Bei Stomatitis Ausspülung des Mundes mit:

Rp. 616.

*Tinct. Ratanh.,*  
*Tinct. Gallar. aa* 15·0.  
*D. S.* 5—10 Tropfen in ein Weinglas voll  
*Wasser zum Mundausspülen.*

(Ueber astringirende Inhalationen bei Bronchoblenorrhoe s. „Expectorantia“.)

**Cardiaca. Herzstärkende Mittel.** Bei Zeichen von Herzmuskel-Insufficienz in Folge von Cor adiposum, Vitium cordis etc., ferner bei acuter Pericarditis:

Rp. 617.

*Inf. fol. Digitalis purp.* 0·2—0·5—1·0: 180·0,  
*Syr. rub. Idaei* 20·0.  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Oder: Rp. 618.

*Pulv. fol. Digit. purp.* 0·3—0·5,  
(*Chin. mur.* 0·3),  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S. 3stündl. 1 Pulver.*

Die Digitalis stets nur durch einige — bis höchstens acht — Tage fortzugeben; wenn längerer Gebrauch des Mittels nothwendig, immer nach einigen Tagen eine mehrtägige Pause. Sowie die günstige Wirkung deutlich hervorgetreten, oder wenn der Puls verlangsamt oder arhythmisch geworden, das Mittel auszusetzen.

Bei Vitium cordis wird gewöhnlich die Digitalis in der Weise verwendet, dass man am ersten Tag 0·2 pr. die gibt, dann um 0·1 jeden Tag steigt bis 0·5, darauf wieder absinkt und ganz aussetzt.

Statt Digitalis, wenn dieselbe nicht mehr vertragen wird, aber noch ein Herztonicum nothwendig ist, am besten:

Rp. 619.

*Tinct. Strophant.* 15·0.  
*S. 3mal täglich 10—20 Tropfen.*

Ein anderes Ersatzmittel der Digitalis ist:

Rp. 620.

*Pulv. herb. Adon. vern.* 2·0,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S. 2stündl. 1 Pulver.*

Oefters auch als wirksam befunden:

Rp. 621

*Sparteïn. sulfuric.* 0·01,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S. 1—4 Pulv. im Tag.*

Bei allgemeinem Hydrops in Folge von Herzkrankheiten auch:

Rp. 622.

*Coffein natrosalicyl. (od. citric.)* 1·0—2·0,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S. 4—5 Pulver tägl.*

Vorzüglich wirkt bei allgemeinem Hydrops oft Diuretin (Knoll).

Rp. 623.

*Diuretini* 5·0,

*Aqu. destill.*,

*Aqu. Menth. pip. aa* 100·0

*D. S.* Im Laufe eines Tages zu verbrauchen.

Versagen sämtliche Herzmittel und sind die Oedeme sehr bedeutend, so sind an beiden Beinen tiefe Incisionen mit nachfolgendem, antiseptischem (Holzwolle-Jodoform) Verband indicirt.

Bei Angina pectoris, sowie bei pseudo-stenokardischen Anfällen in Folge von Vitium cordis oder Endarteriitis chronica:

Rp. 624.

*Nitroglycerin* 0·01,

*Pulv. et extr. Liquir. q. s. ut f. pill. No. 20.*

*D. S.* Tägl. 1 Pille, dann allmählich zu steigen bis auf 3—5 Pillen.

In derselben Weise zu verwenden die in der Wiener Hof-Apotheke erhältlichen Nitroglycerin-Tabletten. Ferner.

Rp. 625.

*Natr. nitros.* 0·5,

*Sacch. alb.* 3·0.

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*Da in nebul.*

*S.* Täglich 1—2 Pulver.

**Cathartica. Abführmittel.** Wenn es sich nur darum handelt, durch einen oder mehrere Tage ausgiebige Stuhlentleerungen zu erzielen, also bei temporärer Stuhlverstopfung, ferner behufs Ableitung bei Urämie, bei Congestionszuständen oder Entzündungen anderer Organe etc., je nach Bedürfniss leichtere oder stärkere Abführmittel, wie:

Rp. 626.

*Ol. Ricin. 30·0.**S. 1/2 - 2 Esslöffel in Suppe oder Kaffee zu nehmen.*

Rp. 627.

*Extr. Cascar. Sagrad. fluid.,**Syr. cort. Aurant. aa 25·0.**S. Am Morgen 1 - 2 Kaffeelöffel.*

Rp. 628.

*Calomelan. 1·0,**Sacch. alb. 2·0.**M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 5.**D. S. 2stündl. 1 Pulver bis zu ausgiebig. Wirkung.*

(Wenn Calomel nicht wirkt, muss bald ein anderes Abführmittel nachgegeben werden, um das längere Verweilen des Calomels im Darm und dadurch leicht entstehende Sublimatvergiftung zu verhindern.)

Rp. 629.

*Calomelan. laev.,**Pulv. rad. Jalap. aa 0·6,**Sacch. alb. 2·0.**M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 3.**D. S. 2 - 3 Pulver in 2stündigen Pausen.*

NB. Darf, ebenso wie die folgenden Mittel, bei entzündeter Darmschleimhaut nicht gegeben werden.)

Milde Abführmittel, die z. B. bei acut fieberhaften Krankheiten verwendet werden können, sind auch die Mittelsalze, *Natr. sulfuric.*, *Magnes. sulfuric.*, oder die dieselben enthaltenden Mineralwässer, wie die glauber-salzhaltigen Marienbader Brunnen oder die Bitterwässer von Ofen, Pullna, Saldschütz, Friedrichshall.

Von kräftigerer Wirkung sind:

Rp. 630.

*Inf. folior. Sennae e 5·0 - 15·0 : 150·0,**Syr. mannat. 20·0.**D. S. Die Hälfte auf einmal, eventuell nach einer Stunde den Rest.*

Ferner Klystiere mit eiskaltem Wasser. Bei Ileus, wenn diese Klystiere nicht nützen, hohe Eingiessungen mit Wasser, mit eiskaltem Syphon, Klystiere mit 8- bis 10% iger Kochsalzlösung.

Bei sehr hochgradiger Stuhlverstopfung durch angehäufte Kothmassen, bei mechanischer Darmstenose als energischst wirkendes Mittel:

Rp. 631.

*Ol. Croton. gtt. 1,*

*Ol. Ricin. 30·0.*

*S. Der 4. Theil bis zur ganzen Dosis in Kaffee oder Suppe zu nehmen.*

Bei habitueller Obstipation neben entsprechender Diät fleissige Bewegung, Zimmergymnastik, Massage des Unterleibes, Faradisation der Bauchmuskeln durch starke Ströme; Gebrauch von salinischen Abführmitteln, am besten in Form der Mineralwässer von Marienbad, Karlsbad, Tarasp; bei blassen Individuen mit schlaffer Musculatur besser Franzensbad oder Elster.

Bei *Ulcus ventriculi* zur Anregung der Peristaltik behufs Entfernung des sauren Speisebreies aus dem Magen Gebrauch des künstlichen Karlsbader Salzes:

Rp. 632.

*Sal. Carolinens. factit.*  
*100·0.*

*(i. e. Natr. sulfuric. 44·0,*

*Kal. sulfuric. 2·0,*

*Natr. chlorat. 14·0,*

*Natr. bicarb. 36·0).*

*D. S. 1—2 Theelöffel*

*auf  $\frac{1}{3}$  Liter warmen*

*Wassers am Morgen*

*zu nehmen.*

Bei chronischer Obstipation auch manche pflanzliche Abführmittel gebraucht, z. B. als mildwirkendes Purgans das *Pulvis Liquiritiae compositus* der deutschen Pharmacopöe:

Rp. 633.

*Fol. Senn,*

*Rad. Liquirit. aa 10·0,*

*Fruct. Foenic.,*

*Sulf. depurat. aa 5·0,*

*Sacch. alb. 30·0.*

*D. S. Am Morgen 1 Kaffee-  
löffel.*

Stärker wirkt:

Rp. 634.

*Extr. Aloës,*

*Extr. Rhei,*

*Pulv. rad. Rhei aa 2·0,*

*Extr. Colocynth. 0·3.*

*M. f. pill. No. 60.*

*D. S. Jeden Abend 3—4  
Stück.*



Ro. 635.

*Extr. Aloës. 1·5.*

*Podophyllin.,*

*Extr. Belladonn. aa 0·5.*

*Extr. Taraxac. q. s. ut*

*f. pill. No. 30.*

*D. S. Tägl. 1—2 Pillen.*

Zu versuchen wäre bei  
Atonie der Darmmuskulatur:  
Rp. 636.

*Extr. Fab. Calabar. 0·05,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos.*

*aequ. No. 10.*

*D. S. 1—2 Pulv. im Tag.*

**Diaphoretica. Schweisstreibende Mittel.** Zur Erzielung von Diaphorese bei leichten, acuten Erkältungskrankheiten Trinken von heissem Lindenblüthen- oder Hollunder-Thee, wobei jedoch nur das heisse Wasser die vermehrte Schweisssecretion hervorruft.

Behufs energischer diaphoretischer Wirkung bei acuter Nephritis mit stark verminderter Harnsecretion, bei chronischer parenchymatöser Nephritis mit starkem Hydrops warme Bäder (34° und darüber, deren Temperatur noch durch Hinzugießen von warmem Wasser allmählich gesteigert werden kann; nach dem Bad Einhüllung in warme Decken. Statt der Bäder auch Einwicklung in Leintücher, die in warmes Wasser getaucht worden, und darüber mehrere Decken. Wenn Bäder nicht anwendbar, Pilocarpin, dasselbe jedoch bei Herzschwäche oder drohendem Lungenödem contraindicirt.

Rp. 637.

*Pilocarp. mur. 0·1—0·2,*

*Aqu. dest. 10·0,*

*S. 1. Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

Eventuell könnten auch locale Dampfbäder mit dem Gartner'schen Apparate zur Anwendung gelangen.

**Diuretica. Harntreibende Mittel.** Bei Hydrops in Folge von Herzkrankheiten oder von Emphysema pulmonum; bei acuter Nephritis, wenn die Entzündungserscheinungen geschwunden und die Urinmenge spärlich ist,

bei chronischer Nephritis, wenn Erscheinungen chronischer Urämie auftreten etc., anzuwenden.

Rp. 638.

*Inf. rad. Onon. spinos. e 10·0:200·0,*  
*Liqu. Kal. acetic.,*  
*Oxymell. Scill. āā 15·0.*  
*S. 3stündlich 1 Esslöffel.*

Durch Erhöhung des arteriellen Blutdrucks wirkt auch *Digitalis* diuretisch, ist also bei Hydrops in Folge von Herzschwäche (*Vitium cordis*, *Emphysema pulmonum* etc.) zu gebrauchen.

Rp. 639.

*Inf. fol. Dig. purp. e 0·5—1·0 : 200·0,*  
*Kal. nitric. 3·0,*  
*Syr. rub. Idaei 20·0.*  
*D. S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

(Ueber Anwendungsweise der *Digitalis* s. „*Cardiaca*“ S. 135.)

In ähnlicher Weise wirkt auch *Coffein*.

Rp. 640.

*Coffein. natrosalicylic. 2·0,*  
*Sacch. alb. 3·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 3stündl. 1 Pulver.*

In neuerer Zeit wird bei Herzkrankheiten und bei *Ascites* in Folge von Leberkrankheiten wieder *Calomel*

mit gutem Erfolg gegen den Hydrops gegeben:

Rp. 641.

*Calomelan. 2·0,*  
*Sacch. alb. 3·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10*  
*D. S. Durch 2—3 Tage*  
*je 3—4 Pulver, eventuell*  
*nach einer Pause von*  
*einigen Tagen ein zwei-*  
*ter Cyclus.*

Wenn starke Diarrhöe eintritt, etwas *Opium*.

Ueber die Anwendung von Diuretin und Incisionen vide „*Cardiaca*“ S. 136).

**Emetica. Brechmittel.** Eines der beliebtesten Brechmittel ist:

Rp. 642.

*Pulv. rad. Iperac* 3·0,

*Tartar. emetic.* 0·15.

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 3.*

*D. S. 1 Pulver, event.*  
*nach  $\frac{1}{4}$  Stunde ein*  
*zweites.*

Zweckmässiger ist in den meisten Fällen:

Rp. 643.

*Apomorphin. mur.* 0·1,

*Aqu. dest.* 10·0.

*D. S.  $\frac{1}{4}$  1 Pravaz'sche*  
*Spritze zu injiciren.*

Bei Vergiftungen mit Narcoticis oder mit Phosphor auch.

Rp. 644.

*Capr. sulfuric.* 0·8,

*Aqu. dest.* 40·0,

*Syr. rub. Idaei* 10·0.

*S. Die Hälfte auf einmal: wenn nöthig, nach*  
 *$\frac{1}{4}$  Stunde den Rest.*

**Expectorantia. Hustenmittel.** Zur Milderung des Hustenreizes:

Rp. 645.

*Morph. mur.* 0·05,

*Sacch. alb.* 3·0.

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*

*D. S. 3 Amal tägl. 1 Pulv.*  
*Oder:*

Bei chronischen Affectionen, namentlich bei Tuberculosis pulmonum mit dem Morphin abwechselnd zu gebrauchen:

Rp. 647.

*Extr. Belladonn.* 0·1,

*Sacch. alb.* 3·0.

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*

*D. S. 3mal tägl. 1 Pulver.*

Rp. 646.

*Morph. mur* 0·02,

*Aqu. dest.* 180·0,

*Syr. capill. Veneris* 20·0.

*D. S. 2stündl. 1 Esslöffel.*

Oder: Rp. 648. *Codein.* 0·2,

*Sacch. alb.* 5·0

*Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 3 Amal täglich 1 Pulver.*

Zur Verflüssigung des Secrets: Bei chronischen Katarrhen Gebrauch von alkalischen oder alkalisch-muriatischen Mineralquellen (Vichy, Salzbrunn, Giesshübl, Bilin, Ems, Selters, Gleichenberg.)

Bei chronischen Katarrhen und beginnender Phthise auch Kochsalzwasser (Kissingen, Homburg, Soden, Wiesbaden). Inhalation von Natr. chlorat. oder Ammon. chlorat. in  $\frac{1}{2}$ —1%igen Lösungen. Bei acutem, fieberhaftem Bronchialkatarrh, wenn nur spärliches zähes Secret besteht, kann man eventuell anwenden:

Rp. 649.

*Tartar. stibiat. 0·1,*  
*Aqu. dest. 150·0,*  
*Syr. rub. Idaei 20·0.*  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Bei einfachem fieberlosem Katarrh oder wenn die Fiebererscheinungen bereits geschwunden, ebenso bei Pneumonie im Stadium der Lösung, wenn die Expectoration erschwert ist:

Rp. 650.

*Ammon. mur. 5·0—10·0,*  
*Aqu. dest. 150·0,*  
*Succ. Liquir. 30·0.*  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Oder:

Rp. 651.

*Ammon. mur.,*  
*Elaeos. Foenic. āā 5·0.*  
*M. f. pulv. Div. in doses*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 3stündl. 1 Pulver.*

Zur Beschränkung der Secretion bei Bronchoblennorrhoe etc.:

Rp. 652.

*Alum. crud. 0·2—1·0,*  
*Aqu. dest. 100·0.*  
*S. Zur Inhalation.*

Weniger wirksam, aber auch den Magen weniger angreifend ist:

Rp. 653.

*Acid. tannic. 1·0—2·0,*  
*Aqu. dest. 100·0.*  
*S. Zur Inhalation.*

Auch Creosot, intern gegeben, von Erfolg. (vide Rp. 607 f.)

Weiterhin Einathmung desodorisirender Mittel (s. „Antiseptica“).

Zur Erleichterung der Expectoration, wenn nur spärliches Secret vorhanden:

Rp. 654. die Expectoration durch Kräftemangel erschwert ist:

*Inf. rad. Ipecac.*  
*e 0·5 : 150·0,*

*Syr. cort. Aurant. 20·0.*

*S. 2stündl. 1 Esslöffel.*

Oder:

Rp. 655.

*Apomorphin. mur. 0·05,*

*Acid. mur. dil. gtts. 5,*

*Aqu. destillat. 200·0*

*D. S. 2stündl. 1 Esslöffel.*

(Ein Zusatz von Syrup |  
zersetzt das Apomorphin.)

Wenn die Bronchien mit  
Secret überfüllt sind, aber |

Bei drohendem Lungenödem:

Rp. 658

*Acid. benzoic. 2·0,*

*Camphor. trit. 0·3 - 0·5,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 2stündlich 1 Pulver.*

Bei im Verlauf einer Pneumonie, einer chronischen Nephritis etc. sich entwickelndem Lungenödem neben Gebrauch von Excitantien (Champagner, schwarzer Kaffee mit Cognac, Kampher-Injection) Applicationen eines grossen, über die ganze vordere Brustfläche sich ausbreitenden Vesicans oder Sinapismus, sowie innerlich:

Rp. 659.

*Plumb. acetic. 0·5,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 4 - 5 Pulver in  $\frac{1}{4}$  -  $\frac{1}{2}$ stündigen Zwischen-  
räumen.*

Rp. 656.

*Decoct. rad. Polygal.*

*Seneg. e 10·0 : 180·0,*

*Liqu. Ammonii anisat.*

*1·0 4·0,*

*Syr. cort. Aurant. 20·0.*

*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Rp. 657.

*Acid. benzoic. 2·0,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos.*

*aequ. No. 10.*

*D. S. 2stündl. 1 Pulver.*

**Hypnotica. Schlafmachende Mittel.** Das am meisten verwendete Hypnoticum ist Chloral

Rp. 660.

*Chloral hydrat.* 0·5 — 3·0,  
*Mucilag. Salep.* 50·0,  
*Syr. rub. Idaei* 20·0.  
*D. S.* An 1 — 2 Abenden  
zu verbrauchen.

Oder:

Rp. 661.

*Chloral, hydrat.* 2·0 — 5·0,  
*Aqu. font.* 200·0.  
*S. Klysma.*

Von gutem Erfolg  
öfters das von v. Jacksch  
zuerst verwendete Urethan.

Neuere Hypnotica sind ferner:

Rp. 664.

*Amylenhydrat.* 2·0 — 3·0,  
*Vin. malacens.* 30·0.

*S.* Die Hälfte; wenn diese nicht wirkt, die ganze  
Portion.

Besser ist Sulfonal, das nach dem Chloralhydrat wohl  
das wirksamste Hypnoticum bildet:

Rp. 665. *Sulfonal* 10·0.

*Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S.* 1—2 Pulver am Abend.

Dasselbe ist in heisser Milch oder Suppe gelöst zu  
nehmen. Vor anhaltendem Gebrauch ist zu warnen.

(Morphin ist zwar ein vorzügliches Hypnoticum,  
eignet sich aber zum fortgesetzten Gebrauch nicht wegen  
der Gefahr des chronischen Morphinismus und wird mehr  
in solchen Fällen gegeben, wo der Schlaf durch die  
Schmerzen, welche die Grundkrankheit verursacht, ge-  
stört ist.)

Rp. 662.

*Urethan.* 2·5 — 5·0,  
*Sacch. alb.* 5·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*

*D. P.* 2—3 Pulver im  
Laufe des Abends zu  
nehmen

Weniger zuverlässig ist:

Rp. 663

*Paraldehyd.* 2·0 — 4·0,  
*Aqu. dest.* 50·0,  
*Syr. cort. Aurant.* 20·0.  
*S.* Die Hälfte oder die  
ganze Dosis am Abend  
zu geben



**Neurotica. Nervenmittel.** Zur Herabsetzung der Erregbarkeit bei verschiedenen nervösen Zuständen eignet sich:

Rp. 666.

*Natr. bromat* 5·0,  
*Aqu. dest* 100·0.  
*Syr. cor<sup>d</sup> Aurant.* 20·0  
*S. 3* 6 Esslöffel täglich

Oder auch:

Rp. 667.

*Natr. bromat* 10·0,  
*Extr. Cannab. Indic.* 4r1  
*M. j. pulv. Div. in dos aequ.* No. 10.  
*D. S.* 3mal tägl. 1 Pulver in Wasser.

Oft ist die Behandlung mit lauwarmen Bädern (26° und allmähliches Absinken der Temperatur oder Abreibungen von gutem Erfolge begleitet. In anderen Fällen (bei Delirium tremens, Psychosen) Chloralhydrat, Morphin. Bei Chorea leistet neben leichter hydriatischer Behandlung und Galvanisation des Gehirns und Halsmarks mit schwachen Strömen meist gute Dienste:

Rp. 668.

*Sol. arsenic. Fowleri* 5·0,  
*Aqu. dest.* 15·0.

*S.* Bei Kindern mit 4, bei Erwachsenen mit 6 Tropfen 3mal täglich nach der Mahlzeit zu beginnen, nach je 5 Tagen um 1 Tropfen pr. dos. zu steigen bis zu 12 Tropfen, dann wieder abzufallen.

Ebenso auch:

anderen Nervenleiden nach Eulenburg

Rp. 669.

*Acid. arsen.* 0·001-0·005,  
*Aqu. font.* 120·0,  
*Syr. Moror.* 20·0,  
*S. 2* 10 Esslöff. im Tag.

Gegen den Tremor bei multipler inselförmiger Sclerose, Paralysis agitans und

Rp. 670.

*Sol. arsen. Fowler.* 2·0,  
*Aqu. dest.* 10·0.  
*S.* Täglich 1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren, allmählich bis auf 2 Spritzen zu steigen.

Gegen den Tremor bei Paralysis agitans ist Hyosein in Gaben von 0.00005 anzuwenden (nicht dauernd, da Angewöhnung eintritt); 0.0001 rufen schon manchmal Intoxicationserscheinungen hervor.

Bei Tabes dorsalis kann man neben entsprechenden diätetischen Maassnahmen (nur mässige Bewegung, Zurückhaltung in sexueller Beziehung) sowie neben fortgesetzter hydriatischer Behandlung (Halbbäder, Abreibungen mit in Wasser von 18–20° R. getauchten Tüchern) und Elektrizität (Galvanisation des Rückenmarks mit schwachen, absteigenden Strömen durch 2–5 Minuten, zum Schluss einige Stromwendungen, Faradisation der Extremitäten) zeitweilig durch einige Wochen gebrauchen lassen:

Rp. 671.

*Argent. nitr. 0.2,*  
*Argill. q. s. ut f. pill. No. 20.*  
*D. S. Täglich 2 Pillen*

Bei manchen Neuralgien, namentlich bei Ischias, öfters von Nutzen:

Rp. 672.

*Ol. Terebinth. rectific. 5 0,*  
*Pulv. et extr. Acori aa q. s. ut f. pill. Nr. 50.*  
*D. S. Früh und Abends je 5 Pillen*

Bei nervösen Anfällen, wenn das Gesicht dabei blass ist, namentlich bei gewissen Formen der Migraine (Hemicrania sympathico-tonica) und bei Angina pectoris vasomotoria:

Rp. 673.

*Amylaether. nitros. 10.0.*  
*S. 1–3 Tropf. auf ein Tuch gegossen einzuathmen.*

Bei Hysterie und Neurastenie das wichtigste Moment die psychische Behandlung; daneben Hydrotherapie (Halbbäder von 22–26° R. mit Uebergiessungen von 18–22° R., Abreibungen, Einpackungen etc.), ferner viel verwendet die allgemeine Faradisation

nach Beard und Rockwell, die Füße in einem Fussbad, in welchem die eine Elektrode liegt, während mit der andern die Extremitäten, sowie namentlich die als schmerzhaft bezeichneten Stellen faradisirt werden, besonders wirksam dabei Application des faradischen Pinsels, sowie allgemeine Massage etc.

Mitunter ist eine Mastkur nach Weir-Mitchell von gutem Erfolge begleitet. Dieselbe besteht darin, dass man bei absoluter geistiger Ruhe und bei Ausschluss fast aller activen körperlichen Bewegung die Nahrungsaufnahme enorm steigert, während hierbei die Assimilation der zugeführten Speisen von Seite des Verdauungstractes und die weitere Ausnützung der assimilirten Stoffe zum Aufbau und zur Kräftigung der verschiedenen Gewebe durch ausgiebige Massage und Faradisation der Körpermusculatur unterstützt und ermöglicht werden soll. Die Entfernung des Patienten aus seiner gewohnten Umgebung und Ueberführung in eine ihm fremde Wohnung ist für das Gelingen der Cur fast unumgänglich nothwendig.

Bei Kranken, welche in ihrer Ernährung sehr herabgekommen sind und gewohnt waren, nur minimale Mengen von Nahrung zu sich zu nehmen, ist es am besten, im Beginne der Cur eine ausschliessliche Milchdiät zu verordnen. Man lässt anfangs alle 2—3 Stunden 90—120 cm<sup>3</sup> Milch verabreichen und steigert die Dosis successive derart, dass nach 3—4 Tagen innerhalb 24 Stunden  $1\frac{1}{2}$ —2—3 Liter genossen werden. Es soll darauf geachtet werden, dass die Kranken anfangs die Milch nur schluckweise zu sich nehmen, so dass zum Trinken eines  $\frac{1}{2}$  Liters  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  Stunde Zeit zur Verwendung kommt. Nachdem die Verdauungsorgane durch diese mehrtägige Milchdiät vorbereitet sind, lässt man auch andere Speisen verabreichen und geht zur Steigerung der Nahrungszufuhr über, welche am 15. Tage bereits eine exorbitante Höhe erreichen kann.

Am 3. oder 5. Curtage beginnt man zugleich mit der Massage (steigend bis zu 2 Mal täglich durch  $1\frac{1}{2}$

Stunden geübt), welche alle Weichtheile der Extremitäten, des Rückgrates, der Brust und des Bauches umfassen und die Muskelarbeit ersetzen soll.

Mitunter tritt während dieser Mastdiät besonders anfangs Erbrechen ein und die Kranken weigern sich, die verordneten Mahlzeiten zu sich zu nehmen. So lange die Zunge feucht bleibt, keine dauernde Uebelkeit besteht, so lange die Magengegend nicht besonders empfindlich auf Druck ist und überhaupt keine ausgesprochenen Zeichen eines intensiven Magenkatarrhs vorhanden sind, ist die gesteigerte Nahrungszufuhr fortzusetzen. Nur wenn sich die Zeichen eines heftigen Magen-Darmkatarrhs einstellen, ist für einige Tage die Zufuhr aller Speisen mit Ausnahme der Milch zu sistiren. Unter dem Einfluss der Milch gehen die Verdauungsstörungen innerhalb einiger Tage vorüber.

Um die Details und den Gang der Mastcur besser ersichtlich zu machen, diene folgender von Burkart veröffentlichter Speisezettel einer Patientin, bei welcher es wegen des guten Zustandes der Verdauungsorgane nicht nöthig war, eine vorbereitende Milchdiät zu verordnen:

Am 18. Februar, dem Tage des Curbeginnes, bot der Speisezettel folgendes:

7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Morg: <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Liter Milch (30–45 Minuten Zeit bis zum vollständigen Verbrauch dieser Portion  
10 Uhr Morg. <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Liter Milch; 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Mittags 1 Suppe mit Ei, 50 gr gebratenes Fleisch, Kartoffelpurée; 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Nm. <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Liter Milch; 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Nm <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Liter Milch;  
8 Uhr Abends <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Liter Milch, 50 gr kaltes Fleisch, Weissbrot, Butter.

Am 19. Februar: Derselbe Speisezettel nur um 5 Zwieback mehr.

Am 22. Februar: Beginn der Massage und mit derselben eine besondere Steigerung der Nahrungszufuhr:

7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Morg <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Liter Milch und 2 Zwieback;  
8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Morg. Kaffee mit Sahne, Weissbrot, Butter;

10 Uhr Vorm.  $\frac{1}{2}$  Liter Milch, 2 Zwieback; 12 Uhr Mittags  $\frac{1}{2}$  Liter Milch: 1 Uhr Nachm. Suppe mit Ei, 100 gr Fleisch, Kartoffelbrei, 75 gr Pflaumencompott: 3  $\frac{1}{2}$  Uhr Nachm.  $\frac{1}{2}$  Liter Milch: 5  $\frac{1}{2}$  Uhr Nachm.  $\frac{1}{5}$  Liter Milch, 2 Zwieback: 8 Uhr Abends  $\frac{1}{2}$  Liter Milch, 60 gr Fleisch, Weissbrot, Butter: 9  $\frac{1}{2}$  Uhr Abends  $\frac{1}{3}$  Liter Milch, 2 Zwieback.

Am 24. Februar: Als Zulage um 8  $\frac{1}{2}$  Uhr Morg. 80 gr Fleisch.

Am 25. Februar: Abgesehen von der übrigen Diätverordnung werden zu Mittag um 1 Uhr im Ganzen 150 gr Fleisch und 125 gr Pflaumencompott verabreicht.

Am 26. Februar erhielt Patientin Mittags 1 Uhr 200 gr Fleisch und Abends 8 Uhr 80 gr Fleisch.

Am 29. Februar lautete der Speisezettel der verzehrten Nahrungsmittel wie folgt:

7  $\frac{1}{2}$  Uhr Morg.  $\frac{1}{2}$  Liter Milch, 2 Zwieback; 8  $\frac{1}{2}$  Uhr Morg. Kaffee mit Sahne, 80 gr Fleisch, Weissbrot, Butter, geröstete Kartoffel: 10 Uhr  $\frac{1}{4}$  Liter Milch, 3 Zwieback; 12 Uhr Mittag  $\frac{1}{2}$  Liter Milch; 1 Uhr Nachm. Suppe mit Ei, 200 gr Fleisch, Kartoffel, Gemüse, 125 gr Pflaumencompott, süsse Mehlspeise; 3  $\frac{1}{2}$  Uhr Nachm.  $\frac{1}{2}$  Liter Milch, 5  $\frac{1}{2}$  Uhr Nachm.  $\frac{1}{3}$  Liter Milch; 8  $\frac{1}{2}$  Uhr Abends 80 gr Fleisch und  $\frac{1}{3}$  Liter Milch: 9  $\frac{1}{2}$  Uhr Abends  $\frac{1}{3}$  Liter Milch, 2 Zwieback. Dieser Diätzettel blieb bis zum 31. März in Kraft.

Während dieser Zeit, also innerhalb 43 Tagen, hatte die Krauke 13 kg an Gewicht zugenommen.

Bei Spinal-Irritation neben entsprechendem diätetischem Regime Eisbeutel oder Chapman'scher Schlauch durch mehrere Stunden des Tages am Rücken zu tragen, ferner eventuell Brom, Sulfoal, Antipyrin et.

**Obstruentia. Stopfmittel.** Das beste Stopfmittel ist Opium, namentlich bei einfachem acutem Darmkatarth anzuwenden (wenn derselbe nicht durch noch im Darmcanal befindliche, schädliche Ingesta unterhalten wird,

in welchem Falle für rasche Entfernung derselben Sorge zu tragen ist). Man gibt als Stopfmittel beim acuten Darmkatarrh am besten:

Rp. 674.

*Tinct. Opii simpl. 5·0.*

*S. 5—10 Tropfen auf Zucker; eventuell nach 6—8 Stunden die Dosis zu wiederholen.*

Oder auch Klystiere mit Stärkemehl-Aufkochung.

Opium wirkt aber auch sehr gut bei mehr chronisch verlaufenden Durchfällen, beim chronischen Darmkatarrh, bei Darm-Ulcerationen verschiedener Art (bei tuberculösen Geschwüren jedoch erst in vorgeschrittenen Stadien der Phthise zu geben), bei der Dysenterie etc. Man verordnet es da meist in Verbindung mit anderen unterstützenden Mitteln, z. B.:

Rp. 675.

*Pulv. Doveri 1·0,*

*Sacch. alb. 2·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. Je nach Umständen 3—6 Pulv. im Tag.*

Rp. 676.

*Opii pur. 0·1—0·2,*

*Alum. crud.*

*Pulv. gummos. āā 2·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 3mal tägl. 1 Pulver.*

Bei Dysenterie auch Opium-Klystiere:

Rp. 677.

*Extr. Opii aquos. 0·2,*

*Mucilag. Salep.,*

*Aqu. dest. āā 100·0.*

*S. Zu 2 Klystieren.*

Bei Diarrhöen im Verlauf acuter Infectiouskrankheiten zweckmässig ein aromatisches Vehikel:



Rp. 678.

*Inf. herb. Meliss. 6 Itro: 20000,**Tinct. Opii simpl. gttss. 5—25.**S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Bei Darm-Ulcerationen, namentlich bei katarrhischen, folliculären, sowie bei dysenterischen neben entsprechender Diät Schleimsuppe, Tapiocca, Arrowroot, Bouillon mit etwas Eisweiss oder Eigelb, Cacao, Chocolate, Leube-Rosenthal'sche Fleischsolution, Pepton, Burgunder Wein und Gebrauch warmer Bäder, sowie über die Nacht um den Leib zu tragender warmer Ueberschläge, intern.

Rp. 679.

*Bismuth. subnitric. 100.**Dir. in dos. aequ. No. 10.**D. S. Jede 2. Stunde ein Pulver.*

Bei starken Durchfällen damit abwechselnd:

Rp. 680.

*Bismuth subnitric. 100,**Extr. Opii aquos. 01.**M. f. pulv. Dir. in dos. aequ. No. 10.**D. S. Jede 2. Stunde 1 Pulver.*

Bei verschiedenen Arten von Diarrhöe, namentlich bei veraltetem chronischem Darmkatarrh, kann man nach Empfehlung Rossbach's anwenden:

Rp. 681.

*Naphthalin. 50.**Dir. in dos. aequ. No. 10**Da in capsul. amylic**S. 3 - 10 Kapseln im Tag.*

**Refrigerantia. Kühlende Mittel.** Bei Fieber als durstlöschendes und kühlendes Getränk Sodawasser, Limonade oder:

Rp. 682.

*Succ. Citr.* 30·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*S.* Zum Getränk.

Ebenso:

Rp 683

*Acid. phosphoric.* 5·0,  
*Syr. simpl.* 50·0.  
*S.* Zusatz zum Getränk.

**Resorbentia. Resorptionsbefördernde Mittel.** Um die Aufsaugung von Exsudaten, z. B. nach Pericarditis oder Peritonitis zu befördern, Hautreize, z. B.:

Rp. 684.

*Tinct. iodin.*,  
*Tinct. Gallar.* aa 25·0.  
*S.* Die Haut über den erkrankten Theilen damit einzupinseln.

Ebenso:

Rp 685.

*Sapon. cicid.* 50·0,  
*Ol. Lavandul.* 1·0.  
*S.* Tägl. 1-2mal mandel- bis walnussgr Stücke einzureiben.

Bei Pericarditis auch Auflegen von Emplastr. Cantharidum. Nach Peritonitis Umschläge mit warmem Salzwasser (vorher immer die Haut mit Vaseline einzureiben) oder einer erwärmten Borsäure Lösung; ferner Gebrauch von Soolbädern oder von indifferenten prothierten lauen Bädern. Bei pleuritischen Exsudaten wirkt oft *Natr. salicyl.* gut.:

Rp. 686.

*Natr. salicyl* 10·0  
*Dir.* in dos aeq. No. 20.  
*D. S.* Stündl. ein Pulver.

**Roborantia. Tonica. Kräftigende Mittel.** Bei verschiedenen anämischen Zuständen, nach acuten Krankheiten, nach erschöpfenden chronischen Diarrhöen etc., nach starken Blutverlusten (wenn dieselben nicht durch sogenannte active Blutungen hervorgerufen wurden), insbesondere aber bei Chlorose neben kräftiger Nahrung, Landaufenthalt, fleissiger Bewegung im Freien, Gebrauch

von Eisen durch längere Zeit fortzusetzen, man beginnt mit den am leichtesten verdaulichen Präparaten:

Rp. 687.

*Tinct. Ferr. pomat.*,  
*Tinct. Absynth. aa* 20·0.  
*D. S.* 3mal täglich 20  
 Tropfen nach d. Mahl-  
 zeit.

Rp. 688.

*Ferr. lactic.* 1·0,  
*Pulv. et extr. Liquir. aa*  
*q. s. ut f. pill. No. 50.*  
*D. S.* 3mal tägl. je 5 Pül-  
 len nach der Mahlzeit.

Rp. 689.

*Ferr. carbon. saccharat.* 1·0,  
*Elaeosacch. Calam.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S.* 3mal täglich 1 Pulver.

Rp. 690.

*Tinct. Ferr. albuminat* 100·0.  
*D. S.* 2mal täglich 1 Kaffeelöffel nach der  
 Mahlzeit.

Eisenwässer werden gewöhnlich gut vertragen, man verordnet die Wässer von Schwalbach, Spaa, Szliács in Ungarn, Srebrenica in Bosnien (Guberquelle); im Beginn der Eisenbehandlung besser kohlensäurehaltige Wässer, wie Pyrmont, Driburg, Cudowa. Eventuell auch Seebäder.

Bei gleichzeitiger Stuhlverstopfung Franzensbad, Marienbad, Elster, Tarasp; oder wenn man Eisen in medicamentöser Form gibt, dasselbe zweckmässig mit Rheum zu verbinden, z. B.:

Rp. 691.

*Ferr. Hydrog. reduct.* 1·0,  
*Extr. Rhei aquos.* 3·0,  
*Pulv. rad. Rhei q. s. ut*  
*f. pill. No. 50.*  
*D. S.* 3mal. tägl. je 5 Pill.

Bei Malaria-Kachexie  
 zweckmässig Eisen m. Chinin:

Rp. 692.

*Ferr. carb. sacchar.* 1·0,  
*Chinin. muriat.* 2·0,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S.* 3mal tägl. 1 Pul-  
 ver nach der Mahlzeit.

Zu den Tonicis kann man auch den Phosphor rechnen, insoferne derselbe bei Osteomalacie und Rachitis das Festwerden der Knochen entschieden zu befördern scheint. Man kann bei Erwachsenen geben:

Rp. 693.

*Phosphor. 0·02,*  
*Mucil. gumm. Arab.,*  
*Pulv. Tragacanth. āā q. s. ut f. pill. No. 20.*  
*D. S. Tägl. 1—2 Pillen.*

**Stomachica. Verdauungsbefördernde Mittel.** Bei dyspeptischen Zuständen, namentlich von anämischen Individuen oder von fiebernden Kranken, sowie in späteren Stadien des chronischen Magenkatarrhs:

Rp. 694.

*Acid. mur. dil. pur. 20·0.*  
*D. S. Vor der Mahl-*  
*zeit 5 Tropfen in einem*  
*Weinglas voll Wasser*  
*zu nehmen.*

Damit kann man verbinden:

Rp. 695.

*Vin. Pepsin. 50·0.*  
*S. Nach der Mahlzeit*  
*1 Kaffeelöffel.*

Bei atonischer Verdauungsschwäche, gegen die Appetitlosigkeit von Chlorotischen oder Potatoren (nicht aber bei einem organischen Magenleiden) reine oder aromatische Bittermittel, am besten in Form von Tincturen, da der Alkohol selbst die Verdauung anregt. Sehr beliebt ist:

Rp. 696.

*Tinct. Rhei vinos. (Darell.),*  
*Tinct. aromatic. āā 25·0.*  
*D. S. 3mal täglich 1 Theelöffel*  
*1/2 Stunde vor der Mahlzeit.*

Ein sehr gutes Stomachicum, selbst gegen die das Carcinoma ventriculi begleitenden dyspeptischen Erscheinungen oft wirksam, ist Cortex Condurango.

Rp. 697.

*Cort. Condurang. 15 0,*  
*Aqu. dest. 300 0.*  
*Macera per horas 12,*  
*Dem coque ad col. 150 0.*  
*Adde Syr. Cinnam. 20 0*  
*S. 2—3mal täglich 1 Esslöffel.*

Oder noch besser:

Rp. 698.

*Vin Condurang. 200 0.*  
*S. Täglich 2—3 Esslöffel.*

Oder:

Rp. 699.

*Vini Condurango 20 0,*  
*Tinct. Rhei vin Darchi 80 0*  
*D. S. 2—3mal tägl. 1 Essl.*

**Styptica. Blutstillende Mittel.** Bei Haemoptoe absolute Ruhe im Bett bei einer Zimmertemperatur von 14—15° R.; der Kranke darf nur kalte Flüssigkeiten genießen, am besten nur eiskalte Milch; jede Aufregung und Anstrengung, selbst vieles Sprechen zu vermeiden. Ein Eisbeutel auf die Herzgegend. Verschlucken eines Essloffels voll Kochsalz manchmal von coupirender Wirkung. Im Uebrigen von Medicamenten am besten.

Rp. 700.

*Plumb. acet. 0 5,*  
*Morph. mur. 0 05,*  
*Sacch. alb. 3 0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S. 2stündl., bei profusen Blutungen*  
*selbst stündlich 1 Pulver.*

Eventuell subcutane Ergotin-Injectionen:

Rp. 701.

*Ergotin. pur. 5 0,*  
*Aqu. dest. 15 0,*  
*Acid. carbolic. 0 1,*  
*Morph. mur. 0 2.*  
*S.  $\frac{1}{2}$  - 1 Pravaz'sche Spritze voll zu injicir,*  
*eventuell nach einer Stunde eine 2. Dosis*

Oder: Rp. 702.

*Morph. mur.* 0·2,  
*Atropini sulf.* 0·01,  
*Aqu. dest.* 10·0.

*D. S. Injection. Zu Händen des Arztes.*

$\frac{1}{2}$ —1 *Pravaz'sche Spritze voll.*

Aehnlich ist das Verfahren bei anderen Blutungen aus inneren Organen, z. B. bei *H a e m a t e m e s i s*; der Kranke soll da in den ersten 24 Stunden gar nichts geniessen, am zweiten und dritten Tage nur abgekochte, eiskalte Milch, esslöffelweise, dann noch durch 8—10 Tage nur flüssige Nahrung. So lange die Blutung andauert, Schlucken von Eispillen, ein Eisbeutel auf den Magen; von Medicamenten nur Morphinum (innerlich) oder Opium von Nutzen. Bei allen innerlichen Blutungen mitunter das Abbinden der Extremitäten von glänzendem Erfolge: Man umschnürt die Oberarme und Oberschenkel in der Weise, dass die Venen an den peripher gelegenen Theilen strotzend gefüllt sind, aber der Arterienpuls in den peripheren Theilen noch deutlich zu fühlen ist. Die Binden können  $\frac{1}{2}$  bis mehrere Stunden liegen bleiben, müssen aber dann sehr vorsichtig und allmählich gelöst werden, sonst recidivirt die Blutung.

Wenn Collaps eingetreten, Excitantia, Einwicklung der Extremitäten mit einer Flanellbinde oder Esmarch'schen Binde, eventuell eine Kochsalz-Infusion (s. S. 120).

---





Therapie der Nasen- und Hals-Krankheiten  
an  
Professor Dr. Leopold von Schrötter's  
Klinik und Ambulatorium.

**Rhinitis, Coryza. Nasenkatarrh. Schnupfen.** In acuten Fällen genügt entsprechendes diätetisches Verhalten.

Bei Rhinitis chronica Ermittlung der Ursache. Ist dieselbe in Verbiegungen des Septums und dadurch bewirkter Stauung des Secrets in einem Nasenloch gegeben, Erweiterung des verengten Nasengangs durch Laminaria-Stifte; Zerstörung der prominirenden Parteeen mit Galvanocauter. Genaues Nachsuchen nach einem etwa vorhandenen nekrotischen Knochen und Entfernung desselben. Bei einfachem chronischen Nasenkatarrh:

Rp. 703.

*Mercur. sublim. corrosiv. 0.015,*

*Aqu. font. 120.0,*

*Tinct. Opii crocat.,*

*Aqu. Lauroceras. āā gtts 6.*

*S. Mehrere Male des Tags aufzuschnupfen, dabei der Kopf nach verschiedenen Seiten zu neigen.*

Ausspritzen der Nase mittelst einer Hartgummi-spritze, an deren Ansatz ein kleines Drainagerohr steckt, das in den unteren Nasengang eingeführt wird, worauf der Patient das entsprechende Nasenloch von Aussen comprimirt, den Mund öffnet und den Kopf etwas senkt, um so die Flüssigkeit durch den Nasenrachenraum herausfliessen zu lassen. Als Ausspritzungs-Flüssigkeiten

verwendet man  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$  ige Lösungen von Natr. chlorat. oder Natr. bicarbonic.

In subacuten Fällen, wenn es noch nicht zu Hypertrophie der Schleimhaut gekommen, Ausspritzung mit Astringentien (Alaun, Tannin), oder besser Bougies nasales.

Rp. 704.

*Acid. tannic. 0.06—0.12,*  
*Gelatin. q. s. ut f. bacill.*  
*nasal. No. 6.*

*S. Allabendlich in beide Nasenlocher oder (wenn dies nicht vertragen wird) nur in eines ein Stück einzuführen.*

(Den Bougies ist etwas Watte nachzuschieben, um

das Ausfliessen der schmelzenden Gelatine zu verhindern.) In ebensolcher Weise verwendet man:

Rp. 705.

*Cupr. sulfuric. 0.1—0.2,*  
*Gelatin q. s. ut f. bacill.*  
*nasal. No 10.*

*S. Nasenbougies.*

Bei hypertrophischer Rhinitis Zerstörung der verdickten Schleimhautpartieen, am besten durch Galvano-kanstik, eventuell auch durch Chromsäure oder Lapis in Substanz. In neuerer Zeit wurde in diesen Fällen öfters versucht:

Rp. 706.

*Acid. lactic,*  
*Aqu. dest. aa 30.0.*  
*S. Aeusserlich.*

(Die Application der Milchsäure geschieht mittelst Pinsels oder durch Einführung von in Milchsäure getränkten Watta-Tampons. Man steigt von den 50percentigen Lösungen allmähig zu stärkeren Concentrationen bis zur reinen Milchsäure auf.) Bei empfindlichen Individuen vor Anwendung der Milchsäure:

Rp. 707.

*Cocain. muriat. 0.5,*  
*Aqu. dest. 10.0.*

*S. Zur Bepinselung der Nasenschleimhaut.*

Bei *Rhinitis sicca* mit Borkenbildung Bepinselung der Nasenrachenhöhle mit Jodglycerin.

Rp. 708.

*Jod. pur. 0·2,*  
*Kal. iodat. 0·3,*  
*Glycerin. 30·0.*  
*S. Zum Bepinseln.*

In neuerer Zeit statt des Jodglycerins auch:

Rp. 709.

*Alumin. aceto-tartaric. 1·0,*  
*Aqu. dest. 10·0.*  
*S. 1—2mal tägl. einzupinseln (vorher*  
*immer die Nasenhöhle mit Salzwasser*  
*auszuspritzen.)*

**Ozaena. Stinknase.** Bei Syphilis und Scrophulose Allgemeinbehandlung neben der localen. Bei Caries entsprechendes chirurgisches Verfahren. Das Wichtigste ist die Desodorisation des Secretes durch fleissiges Ausspritzen der Nase:

Rp. 710.

*Kal. hypermanganic. 5·0,*  
*Aqu. dest. 100·0.*  
*S. Zu  $\frac{1}{2}$  Liter warmen Wassers 1 Kaffeelöffel*  
*zuzusetzen und damit die Nase auszuspritzen.*

Ebenso :

Rp. 711.

*Acid. carbolic. 1·0—2·0,*  
*Glycerin. 5·0,*  
*Aqu. font. 200·0.*  
*S. Zum Ausspritzen der*  
*Nase.*

Zu demselben Zweck auch:

Rp. 712.

*Jodoform. pulv. 0·06,*  
*Gelatin. q. s. ut f. bacill.*  
*nasal. No. 6.*  
*D. S. In ein od. beide Na-*  
*senlöcher einzuführen.*

Bei Syphilis und Scrophulose Bepinseln der Nasenschleimhaut mit:

Rp. 713.

*Kal. iodat.* 0·5,*Jod. pur.* 0·3,*Glycerin.* 50·0.*S. Zur Einpinselung.*

Auch Ausspritzung mit:

Rp. 714.

*Jod. pur.* 0·2,*Kal. iodat.* 1·0,*Glycerin.* 10·0,*Aqu. font.* 200·0.*S. Ausspritzung.*

**Angina catarrhalis. Pharyngitis acuta. Acuter Rachenkatarrh.** Dunstumschläge um den Hals, Eispillen, Gebrauch von schleimigen Gurgelwässern, wie:

Rp. 715.

*Decoct. folior Malv.**e* 20 0 : 200·0,*Tinct. Opii simpl.* 1·0.*S. Gurgelwasser, erwärmt zu gebrauchen.*

Ebenso:

Rp. 716.

*Decoct. Althaeae* 200·0,*Tinct. Opii simpl. gtts.* 15,*Syr. Diacodii* 20 0.*S. Wie das Vorige.*

Im Allgemeinen bei Rachenaffectioren:

Rp. 717.

*Kal. hypermangan. cryst.* 0·03,*Aqu. destillat.* 300 0.*S. Gurgelwasser.*

**Angina phlegmonosa. Angina tonsillaris. Eitrige Mandelentzündung.** Kalte Umschläge, Eispillen, Gurgeln mit hypermangansaurem Kali. Bei starken Schlingbeschwerden oder heftigen Schmerzen:

Rp. 718.

*Cocain. mur.* 1·0,*Aqu. dest.* 10·0.*S. Zum Bepinseln der Rachenschleimhaut.*

Lindernd und in manchen

Fällen geradezu abortiv wirkt

Scarification der entzündeten

Theile mit (bis gegen die Spitze gedecktem) Messer.

(Gebotenen Falls Eröffnung des Tonsillarabscesses. Bei häufiger Wiederkehr der Affectioren Entfernung der Tonsillen durch Tonsillotomie, nur wenn dieselben gerade nicht entzündet sind, auszuführen.)

## Pharyngitis chronica. Chronischer Rachenkatarrh.

Starkes Rauchen, namentlich von Cigarretten, rauchige und staubige Locale, schwere Alcoholica und stark gewürzte Speisen zu meiden.

Rp. 719.

*Acid. tannic.* 2·0,  
*Aqu. font.* 200·0,  
*Spir. Frument.*,  
*Syr. Diacod.*  $\overline{aa}$  10·0.  
*S. Gurgelwasser.*

Ebenso:

Rp. 720.

*Alum. crud.* 3·0,  
*Aqu. font.* 200·0,  
*Syr. Moror.* 20·0.  
*S. Gurgelwasser.*

Rp. 721.

*Spir. vin. Gallic.*,  
*Aqu. font.*  $\overline{aa}$  100·0.  
*S. Gurgelwasser.*

Rp. 722.

*Alum. crud.* (oder *Acid.*  
*tann.*) 5·0,  
*Aqu. font.* 200·0,  
*Syr. Diacodii*,  
*Spir. Frument.*  $\overline{aa}$  10·0,  
*Tinct. Opii simpl.* 3·0.  
*S. Gurgelwasser.*

In hartnäckigen und namentlich in auf constitutioneller Grundlage beruhenden Fällen:

Rp. 723.

*Argent. nitric.* 2·0—24·0,  
*Aqu. dest.* 100·0.  
*S. Zum Bepinseln.*

Bei Pharyngitis granulosa Aetzungen mit Lapis oder Chromsäure in Substanz oder Galvonakaustik. In neuerer Zeit auch concentrirte Milchsäure versucht.

**Angina crouposa et diphtheritica. Croup und Diphtheritis des Rachens.** Entsprechende Allgemeinbehandlung. Antipyrese. Kälte, Eispillen, Gurgeln mit Kal. hypermanganic.

Rp. 724.

*Aqu. Calcis*,  
*Aqu. dest.*  $\overline{aa}$  500·0.  
*S. Mittelst Siegle'schen Inhalations-Apparates fortwährend in der Nähe des Kranken zu zerstäuben.*



Rp. 725.

*Chloral. Hydrat. 5·0.*

*Glycerin. 2·0.*

*S. 4—5mal täglich mittelst Charpiepinsels*

*an. 200000000000.*

Versuchsweise wohl auch Pinselungen mit Milchsäure.

**Syphilis pharyngis. Rachensyphilis.** Bei syphilitischen Plaques, dem papulösen Syphilid, wenn die Affection frisch ist, Bepinselung mit Jod-Tinctur, ältere Plaques mit Lapis zu verschärfen.

Gegen *Ulcera syphilitica* des Pharynx: Bepinselung mit Jod-Tinctur oder der Lugol'schen Lösung:

Rp. 726.

*Jod. pur. 1·0.*

*Kal. iodat. 2·0.*

*Glycerin. (ad. Aqu. dest.) 30·0.*

*S. Einzupinseln.*

**Laryngitis acuta. Acuter Kehlkopfkatarrh.** Einathmung von Wasserdämpfen oder:

Rp. 727.

*Inf. flor. Sambuci e 10·0:200·0,*

*Aqu. Laurocer. 2·0*

*S. Erwärmt einzuathmen.*

Diese Einathmungen finden aus einem einfachen Wassergefäß statt, indem dieses und der Kopf des Patienten zusammen mit einem Tuch bedeckt werden.

Bei starkem Hustenreiz:

Rp. 728.

*Morph. muriat. 0·05,*

*Natr. bicarbonic. 4·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*S. 3 Pulver täglich.*

Bei gleichzeitiger Neigung zu Stuhlverstopfung:

Rp. 729.

*Morph. muriat. 0·05,*

*Extr. Aloës aquos. 0·3,*

*Sacch. alb. 4·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 12.*

*S. 2—4mal tägl. 1 Pulver.*

**Laryngitis chronica.** Entsprechende diätetische Vorschriften, namentlich Verbot des Rauchens. Die Localtherapie mit Inhalationen zu beginnen, während der Dauer der Inhalationskur häufige laryngoskopische Untersuchung, um die Patienten an diese zu gewöhnen und dadurch auch für eventuelle energischere Localbehandlung geeigneter zu machen. Zur Inhalation wird am häufigsten verwendet, namentlich auch bei Complication mit Tracheal- und Bronchialkatarrh:

Rp. 730.

*Ol. Juniper.,*

*Ol. Terebinth. rectific. āā 15 0.*

*S. Zur Einathmung.*

(In ein Gefäss mit siedendem Wasser werden Morgens und Abends Anfangs 3 Tropfen, jeden 2. Tag um einen bis zwei Tropfen mehr, bis zu 30 Tropfen hineingegossen und die Dämpfe dieser Mischung direct aus dem Gefäss bei darüber gehaltenem Kopf eingeathmet.)

In anderen Fällen:

Rp. 731.

*Alum. crud. 1·0—2·0,*

*Aqu. destillat. 100·0.*

*S. Zur Inhalation.*

Rp. 732.

*Acid. tannic. 0·5—1·0,*

*Spir. vin. Gallic. 5·0,*

*Aqu. dest. 50·0.*

*S. Zur Inhalation.*

Diese 2 letzteren Inhalationen werden mittelst des Schrötter'schen Zerstäubungsapparates 2—4mal täglich ausgeführt. Bei häufigem Hustenreiz setzt man der Inhalationsflüssigkeit vor jedesmaligem Gebrauch 10—20 Tropfen Opiumtinctur zu.

Wenn die Inhalationen nicht in kurzer Zeit zum Ziele führen, Einblasungen mittelst Insufflationsrohres auszuführen.

Rp. 733.

*Alum. crud. pulveris.,*

*Pulv. gummos. āā 10 0.*

*S. Zur Einblasung.*

Oder:

Rp. 734.

*Alum. crud. pulv* (oder  
*Acid. tannic.*),  
*Sacch. alb. aa* 5·0,  
*Morph. mur.* 0·5  
*S. Zum Einblasen*

Wenn die Einblasungen  
nicht genügenden Erfolg  
haben, Bepinselungen mit:

Rp. 735.

*Argent. nitric* 1·0—12·0,  
*Aqu. dest.* 50·0.  
*M. Da in vitro nigro.*  
*S. Zum Bepinseln.*

Die stärkeren Lösungen verwendet man bei starker Verdickung der Stimmbänder. Wenn nach den Einpinselungen Glottiskrampf auftritt, lässt man tiefe Inspirationen machen oder einen Schluck kalten Wassers trinken.

**Oedema glottidis. Glottisödem.** Eispillen, kalte Umschläge um den Hals oder Einreibung des Halses mit Jodglycerin (s. Rp. 726), die eingeriebenen Stellen mit Guttaperchapapier zu bedecken. Eventuell ein Brechmittel. Scarification der den Kehlkopfengang verlegenden Wülste.

**Laryngitis crouposa et diphtheritica. Häutige und brandige Bräune.** Anwendung von Kälte innerlich und in Form von Umschlägen, Gurgeln mit hypermangansaurem Kali. Einathmung von Wasserdämpfen oder:

Rp. 736.

*Kal. hypermangan.* 0·2,  
*Aqu. dest.* 100·0.

*S. Stündlich mittelst Schrötter'schen Zerstäubungsapparates zu inhaliren.*

Ebenso Einathmungen von Aqua Calcis oder von:

Rp. 737.

*Acid. carbolic.* 0·5,  
*Aqu. dest.* 100·0.  
*S. Zur Inhalation.*

Im weiteren Verlauf bei starker Dyspnoë und noch kräftigem Puls eventuell ein Brechmittel, am besten Injection von 1 Centigramm Apomorphin. Bei sehr hohem Fieber Chinin. Antipyrin. Bei Collaps Excitantia. Bei drohender Erstickungsgefahr Tracheotomie.

**Perichondritis laryngea.** Im Beginne antiphlogistisches Verfahren; Einreibung von Jodglycerin am Halse, Verschlucken von Eistückchen, Inhalation von (mittels des Schrötter'schen Apparates) zerstaubten warmen Flüssigkeiten (Wasser mit etwas Opiumtinctur, Lösungen von Kal. hypermanganic, Carbonsäure etc.). Bei Perichondritis syphilitica geringeren Grades Bepinselung des Kehlkopfinnernen mit Jodglycerin (Rp. 708). Bei Oedem der Weichtheile um den Aditus laryngis Scarification derselben. Bei acuter Steigerung der Erscheinungen von Larynx Stenose rechtzeitig, vor dem Eintreten der Kohlensäure-Ueberladung, Tracheotomie, danach weiter locale Behandlung. Wenn die Entzündungserscheinungen abgelaufen sind und eine narbige Larynx-Stenose zurückbleibt, mechanische Dilatation derselben mittelst der von Prof. v. Schrötter angegebenen Hartgummi-Bougies oder Zinnbolzen mit dreieckigem Querschnitt.

**Tuberculosis laryngis. Kehlkopfschwindsucht.** a) Bei der infiltrirten Form gegen die Anschwellungen Einpinselung von Milchsäure. Man beginnt mit:

Rp. 738.

*Acid. lactic. 5·0,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*S. Zum Bepinseln.*

Allmählich steigt man mit der Concentration bis zur reinen Milchsäure. Die Einpinselungen werden gewöhnlich täglich, wenn ein Schorf sich entwickelt, aber erst bei beginnender Abstossung desselben wiederholt. Bei Perichondritis tuberculosa, wenn äusserlich Schwel-

lung des Schildknorpels nachweisbar ist, Einreibungen mit Jodglycerin. Bei Bildung von Abscessen baldige Eröffnung derselben. (S. ferner unter „Perichondritis“ S. 167). Wenn hochgradige Schlingbeschwerden bestehen:

R. 739.

*Morph. muriat.* 0 5,

*Sacch. alb.* 5·0.

*S. Mittelst Insufflationsrohrs einzublasen.*

In neuerer Zeit statt dessen besser:

Rp. 740

*Cocain. muriat.* 1·0,

*Aqu. dest.* 8·0,

*Spir. vin. rectificat.* 2 0.

*S. Einzupinseln.*

b) Bei der ulcerösen Form ebenfalls in erster Linie directe Behandlung der Geschwüre durch Bepinselung mit Milchsäure, wobei mit 25%iger Lösung zu beginnen. Die ersten Einpinselungen sehr vorsichtig auszuführen. Bei empfindlichen Individuen vorher cocainisiren.

Bei ausgedehnten Ulcerationen and grosser Schwäche des Patienten (Complication mit vorgeschrittener Lungen- oder Darmtuberculose), wo die Milchsäurebehandlung eventuell gefährliche Reaction hervorrufen könnte, Gebrauch von Jodoform; 1—2mal täglich Einblasung von reinem Jodoform oder von:

Rp. 741.

*Jodoform.*,

*Amyl. pur aa* 10 0.

*S. Einzublasen.*

Oder Bepinselung mit:

Rp. 742.

*Jodoform.* 4·0,

*Aether. sulfuric.* 20·0.

*S. 2mal tägl einzupinseln.*

Auch:

Rp. 743. *Menthol.* 5·0,

*Ol. Olivar.* 25·0.

*S. Einige Tropfen mittelst Kehlkopfspritze zu injiciren.*

In neuerer Zeit werden Pinselungen mit Resorcin mit anscheinend gutem Erfolge versucht:

Rp. 744. *Resorcini,*  
*Aqu. dest. āā 30·0.*  
*D. S. Zum Pinseln.*

Bei grosser Schmerzhaftigkeit der Geschwüre und bei Schlingbeschwerden:

Rp. 745.  
*Morph. muriat. 1·0,*  
*Jodoform.,*  
*Amyl. āā 5·0.*  
*S. Zum Einblasen.*

Bei hochgradigen Schlingbeschwerden Einpinselung mit 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>iger Cocainlösung.

Bei starker Schwellung Inhalationen mit:

Rp. 746.  
*Natr. boracic. 1·0,*  
*Aqu. font. 150·0,*  
*Aqu. Lauroceras. 5·0.*  
*S. Täglich mehrmals mittelst Schrötter'schen Zer-*  
*stäubungs-Apparates zu inhaliren.*

Nach Bedarf der Inhalationsflüssigkeit vor dem Gebrauch 10—20 Tropfen Opium-Tinctur zuzusetzen.

**Syphilis laryngis. Kehlkopfsyphilis.** Einreibungscur oder Jod:

Rp. 747.  
*Kal. iodat. 5·0,*  
*Pulv. et extr. Liquir. āā q. s.*  
*ut f. pill. No. 30.*  
*S. 2mal täglich je 3 Pil-*  
*len.*

Oder:  
Rp. 748.  
*Natr. iodat. 20·0.*  
*Div. in dos. aequ. No. 20.*  
*D. S. Täglich 2—3 Pulver*  
*in Wasser.*

In schweren Fällen auch Combination von Mercur-Einreibungen und innerlichem Gebrauch von Jodsalzen. Local Einpinselung der Haut des Halses mit Jodtinctur oder mit:

Rp. 749.

*Kal. iodat. 2·0,  
Jod. pur. 0·2,  
Glycerin. 20·0.  
S. Einzupinseln.*

Eventuell auch Bepinselung der Kehlkopfschleimhaut mit Jodglycerin. Bei Ulcerationen Aetzung der Geschwüre mit *Argentum nitricum* in starker Lösung oder selbst in Substanz (mittelst Aetzmittelträgers).

**Paresis musculorum laryngis. Lähmung von Kehlkopfmuskeln.** Behandlung der ursächlichen Erkrankung (Katarrh, Syphilis, Hysterie etc.). Die durch Katarrh entstandenen Lähmungen einzelner Muskeln schwinden oft durch die blosse Behandlung des ersteren. Im Uebrigen *Faradisatio*n, entweder die Elektroden zu beiden Seiten des Kehlkopfs zu appliciren, oder *endolaryngeale Faradisatio*n (eine Elektrode aussen am Kehlkopf, die andere im *Sinus pyriformis* aufzusetzen).

**Corpora aliena in larynge. Fremdkörper im Kehlkopf.** Extraction mittelst Kehlkopfpincette oder Kehlkopfszange. Zur Erleichterung des Verfahrens, wenn nöthig, Anästhesirung der Pharynx- und Larynxschleimhaut durch Einpinselungen mit 10<sup>0</sup>iger Cocainlösung.

Ist der Fremdkörper auf laryngoskopischem Wege nicht zu entfernen, *Laryngotomie*

**Tracheitis. Luftröhrenkatarrh.** Bei acutem Katarrh Inhalationen von:

Rp. 750.

*Spir. vin. rectificat. 100·0,  
Aqu. Laurocerasi 0·5.  
S. Ein halber Kaffeelöffel in einen Topf  
siedenden Wassers, zur Inhalation.*



Bei starkem Hustenreiz Einathmung von:

Rp. 751.

*Tinct. Opii simpl. 5·0,*

*Aqu. Laurocer. 60·0.*

*S. 1 Kaffeelöffel in das nicht ganz mit Wasser gefüllte Inhalationsglas, zur Inhalation.*

In neuerer Zeit:

Rp. 752.

*Cocain muriat. 0·5—1·0,*

*Aqu. destillat. 50·0.*

*S. Mittelst Zerstäubungsapparates zu inhaliren.*

Bei chronischem Katarrh Einathmung von Ol. Terebinth. oder von stark verdünntem Alkohol.

---



Aus  
**weil. Hofrath Prof. Dr. Theodor Meynert's**  
**Klinik für Psychiatrie.**

**A. Ueber die Ausstellung von Parere's behufs  
Aufnahme auf die psychiatrische Klinik.**

Wenn die Ueberbringung eines Geisteskranken auf die psychiatrische Klinik angezeigt erscheint, so ist demselben ein Parere mitzugeben, durch welches der pathologische Geisteszustand des Patienten, sowie die Nothwendigkeit, den Kranken der Pflege und Ueberwachung der Klinik zu übergeben, dargethan wird. Dieses Parere ist von einem Polizeibezirksarzt des Bezirkes auszustellen, in welchem der Patient wohnt, oder in welchem er wegen störender oder gemeingefährlicher Handlungen polizeilich angehalten wurde; in dringenden Fällen kann auch der den Patienten behandelnde Arzt das Parere abfassen, das aber dann vom Polizeiarzt vidirt werden soll. Das Parere muss nicht etwa die Diagnose der Geisteskrankheit enthalten, an welcher der Patient leidet, noch weniger soll es nur aus dieser Diagnose bestehen oder gar aus einer ganz laienhaften Benennung der Krankheit, wie z. B. „Pat. N. N. leidet an religiösem Wahnsinn“ oder „... leidet an Liebeswahn“ etc.; vielmehr soll dasselbe eine kurze Schilderung der Handlungen oder Aeusserungen des Patienten liefern, vermöge welcher derselbe geisteskrank erscheint, sowie darlegen, wodurch die Uebergabe des Patienten an die psychiatrische Klinik nothwendig geworden. In letzterer Beziehung kommt



für die Untersuchung und oft auch für therapeutische Maassnahmen, sowie andererseits auch für die Beurtheilung, ob ein Kranker wieder der häuslichen Pflege übergeben werden kann, geliefert wird. Punkt Nr. 5 ist insoferne wichtig, als die Kranken, sobald ihre Zuständigkeit nachgewiesen ist, in die betr. Landes-Irrenanstalt transportirt werden, wesshalb auch, wenn möglich, dem Parere der Heimatschein des Patienten beigelegt werden soll.

## B. Therapie von Geisteskrankheiten.

### **Melancholie, Kleinheitswahn, Selbstanklagewahn.**

Leichte Fälle können unter guten Verhältnissen in häuslicher Behandlung bleiben. Die Indicationen für Abgabe in eine Anstalt sind: Selbstmordversuch, Nahrungsverweigerung, Armuth. Kraftige Ernährung durch proteinreiche, aber reizlose Kost. Bei Nahrungsverweigerung zunächst die Speisen weiter dem Kranken hin zustellen, der sie oft, wenn er sich unbemerkt glaubt, doch zu sich nimmt; wenn dies nicht der Fall, flüssige Nahrung durch eine Schnabeltasse einzugiessen; wenn dies nicht zum Ziele führt und die Nahrungsverweigerung mehrere Tage anhält, künstliche Fütterung mittelst Magenschlauches, welcher durch die Nase eingeführt wird und an dessen oberem Ende ein Trichter sich befindet, um die Nahrung mit eventuell beigegebenen Medicamenten bequem eingiessen zu können. Die Fütterung 1—2mal täglich vorzunehmen; die Nährflüssigkeit warm und gut durchgeseiht, am besten Milch mit Eidottern (1—2 Liter Milch und 12 Eidotter pro die), mit einer entsprechenden Menge Kochsalz, eventuell auch Wein.

Wenn die Einführung des Schlauches durch Zurückwürfen desselben in die Mundhöhle unmöglich ist: Chloralkysma. (2 bis 4 Gr. Chloralhydrat auf ein Klysma). Unter der Einwirkung des Chlorals nehmen dann die Patienten mitunter Nahrung spontan. Auch leichte Chloroformnarcose ermöglicht die Einführung des Magen-

schlauches. Bei der künstlichen Fütterung ist die Möglichkeit des Eindringens des Magenschlauches in den Kehlkopf oder unter Umständen des Eindringens von Speisetheilen durch die Eustachische Trompete in das Mittelohr im Auge zu behalten. In den meisten Fällen Bettruhe angezeigt.

Roborirende Medicamente, Chinin, Eisen, Arsen:

Rp. 753.

*Ferr. oxydat. dialysat.* 10·0,  
*Chinin sulfuric.* 5·0,  
(*Extr. Aloës* 1·0),  
*Pulv. et extr. Liquirit* q. s. ut f. pil. Nr. 100.  
*D. S.* 3mal täglich je 4 Pillen.

Rp. 754.

*Ferr. sulfuric.*,  
*Kali. carbonic* aa 15·0,  
*Gumm. Tragacanth.* q. s. ut f. pil. Nr. 96.  
*D. S.* 3mal täglich 2–3 Pillen.

Rp. 755.

*Ferr. carbonic*,  
*Natr. bicarbonic.*,  
*Pulv. rad. Rhei.* aa 5·0,  
*Sacch. alb.* 10·0.  
*M. f. pulv. Da ad scat.*  
*D. S.* 3mal täglich 1 Messerspitze voll.

Rp. 756.

*Ferr. oxydat. dialysat.* 5·0,  
*Aquae font.* 150·0,  
*Aquae Cinnamom.* 50·0.  
*S.* Tagsüber zu verbrauchen.

Ferner die Solut. Pearsonii:

Rp. 757.

*Natr. arsenicos.* 0·05,  
*Aquae destill.* 100·00.  
*S.* 3mal des Tages 1 Kaffeelöffel nach den Mahlzeiten.

Oder Aqua Roncegno oder Aqua Levico dreimal ein Esslöffel voll nach den Mahlzeiten.

Gegen Obstipation besser Drastica: Rheum, Aloë, Podophyllin als die in grösseren Mengen einzuführenden Mineralwässer.

Bei menstrualen Blutverlusten zunächst Bromnatrium, dann:

Rp. 758.

*Ergotini dialysati* 2·0,  
*Glycerini* 8·0.  
*D. S.* 2mal des Tages  
10—20 Tropfen wäh-  
rend der Menses.

Rp. 759.

*Ergotin. bis depur.* 6·0,  
*Gumm Tragacanth. q. s*  
*ut fiant pil. Nr. 60.*  
*D. S.* 3—6 Pillen tägl.

Rp. 760.

*Ergotin. bis depur.* 2·0,  
*Glycerini,*  
*Aquae destill. aa* 4·0.  
*S. Tägl.*  $\frac{1}{2}$ —1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.

Oder man injicirt Ergotin de Bombellon, täglich  $\frac{1}{2}$  Pravaz'sche Spritze.

Mildere Formen von Melancholie können in Kurorten mit Eisenwässern und mässig auflösenden Wässern (z. B. Marienbader Ferdinandsbrunnen) behandelt werden.

Bei Lymphdrüsenerkrankung:

Rp. 761. *Natr. iodati* 6·0,

*Aqu. destill.* 180·0.

*D. S.* Vormittags ein Esslöffel voll.

Oder Trinkkur in Luhatschowitz, Hall.

Herabsetzung des erhöhten arteriellen Druckes anzustreben durch prolongirte laue Bäder von 27—28° R., Inhalation von Amylnitrit, innerlichen Gebrauch von Chinin, *Natr. salicylicum*, Antipyrin, Antifebrin, Phenacetin, Salol.

Als Reizmittel wirken: Regen-Douche auf den Kopf, Alcoholica, Spiritus vini Gallicus, Cognac theelöffelweise mehrmals im Tage; kleine Dosen Morphin zu 0·01.



Als Sedativum, in der höheren Dosis als Schlafmittel  
Bromnatrium:

Rp. 762.

*Natr. bromat 6·0.*

*Div. in dos acqu. Nr 3*

*D. S. 1—2 Pulver in 1 Glas Wasser aufgelöst.*

Bei Schlaflosigkeit:

Rp. 763.

*Sulfonol. 10·0.*

*Div. in dos acqu. No. 10.*

*D. S. Abend 1—2 Pulver in heisser Suppe oder Milch.*

Der anhaltende Gebrauch des Sulfonal bedenklich.  
Ein neueres gutes Schlafmittel ist Somnal.

Rp. 764.

*Somnal. 10·0,*

*Aquae destill 45·0,*

*Sol. succi Liquiritae oder Syr. rub. Idaei 20·0.*

*D. S. Ein Esslöffel voll mit Milch oder Himbeersaft.*

**Manie, Tollheit.** Behandlung selten ausserhalb einer Anstalt möglich.

Kraftige, reizlose Ernährung, roborirende Mittel: Eisen und Arsen wie bei Melancholie. Protrahirte laue Bäder. Zu meiden Kopf-Douchen und Alcoholica.

Gegen den erniedrigten Gefässdruck nicht nur beim weiblichen Geschlechte *Secale cornutum*.

Rp. 765.

*Ergotin. bis depur. 0·3,*

*Aqu. font. 180·0,*

*Syr. rub. Idaei 20·0*

*D. S. In einem Tag zu verbrauchen.*

Als Sedativa Opiate und *Natr. bromatum*. Gegen Schlaflosigkeit dieselben Mittel wie bei Melancholie.

**Circuläre Geistesstörung.** Mehrjährige, fortlaufende Behandlung nothwendig; sie ist im melancholischen und im manischen Stadium wie bei der einfachen Melancholie und Manie, die lichten Zwischenstadien nach der Manie sind wie latente Melancholie, die nach der Melancholie wie latente Manie zu behandeln. Es ist daher nach einigen Wochen expectativen Verhaltens der drohenden Melancholie durch laue Bäder, Chinin, der Wiederkehr der Manie durch kühle Behandlung, Anwendung von *Secale cornutum* entgegen zu wirken.

Rp. 766.

*Pulv. Secal. cornut. 5·0*

*Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. Täglich 2—3 Pulver in Wasser zu nehmen.*

Roborirende, möglichst nahrhafte Diät in keinem Stadium ausser Acht zu lassen.

**Amentia, Verwirrtheit.** („Acuter Wahnsinn, allgemeiner Wahnsinn, Manie, Tobsucht, Melancholie mit Aufregung, Melancholie mit Stumpfsinn“ der Autoren.) Meist Behandlung in einer Anstalt nothwendig, da in einer solchen Selbstmord und Gewaltthat am wahrscheinlichsten vermieden, die Ernährung energisch durchgeführt werden kann. Doch ist der Aufenthalt daselbst möglichst zu kürzen, da verstandige häusliche Pflege in gewohnter, unveränderter Umgebung das Wiederklarwerden begünstigt.

Möglichste Hebung des Ernährungszustandes. Protrahirte laue Bäder von 27—28° R. Bei Reizzuständen möglichst anhaltende Bettruhe, Eisumschläge oder Eiskappe auf den Kopf. Bei Congestionen:

Rp. 767. *Pulv. Sec. corn. rec 4·0,*

*Pulv. fol. Digit. 1·0,*

*Extract. Liquiritiae q. s.*

*ut fiant pil. No. 50.*

*S. 2mal täglich 3 Pillen.*

Rp. 768.

*Ergotin. lis depur. 2·0,*

*Glycerini 10·0,*

*Aqu. destill. 20·0.*

*S. Eine Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

Bei andauernder hochgradiger Erregung: Isolirzelle, Morphinjection 0·03—0·05! auf einmal oder 0·02 mehrmals im Tage. Bei kräftigem und regelmässigem Puls Bromnatrium bis 15·00! pro die in dünner Lösung oder in Suppe. Oder man gibt Chloralhydrat:

Rp. 769.

*Chloral hydrat 6·0,*

*Div in dos. aqu. No. 3.*

*D. S. Chloralhydrat.*

Man gibt Abends 1 Pulver in einem Glas Wasser aufgelöst; bei Wirkungslosigkeit dessersten nach 2 Stunden die beiden anderen auf einmal. Ist das Medicament intern dem tobenden Kranken nicht beizubringen, so gibt man 2—3 Pulver in einem Klysma.

Nach erreichter Schlafwirkung kann man die Betäubung fortsetzen durch Weiterreichen von:

Rp 770.

*Chloral. hydrat. 10·0,*

*Aqu. destill. 150·0,*

*Syrup. rub. Idaei 50·0.*

*D. S. Stündlich ein Esslöffel voll*

Bei gestörtem Schlaf: Sulfonal oder Somnal. Rp 763, 764). Bei Angstzuständen auch Chloral mit Brom combinirt oder Opium in grossen Dosen:

Rp. 771.

*Chloral. hydrat. 3·0,*

*Natr. bromat. 5·0,*

*Aquae font 120·0,*

*Syr. simpl. 50·0.*

*S. Den dritten Theil auf einmal; wenn dies nicht wirkt, nach 1—2 Stunden den Rest.*

Rp. 772.

*Extr. Opii aquos. 0·5,*

*Sacch. alb. 5·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 3—6 Pulver täglich.*

Bei Congestionen ist häufig ein Senfteig in den Nacken ein gutes Schlafmittel. Bei längerer Anwendung ist mit den Schlafmitteln zu wechseln und man wird auch zu den minder sicher wirkenden, wie Paraldehyd und Amylenhydrat greifen:

Rp. 773.

*Paraldehyd. 3·0—5·0,*

*Syrup. cort. Aurant. 25·0.*

*S. Am Abend zu nehmen.*

Rp. 774.

*Amylen. hydrat. 2·0—4·0,*

*Succ. Liquirit. 10·0,*

*Aquae destill. 100·0.*

*S. Am Abend die Hälfte oder die ganze Portion zu nehmen.*

Bei Stupor Kopfdouche aus mässiger Höhe und mit nicht zu tiefer Temperatur, mit Vorsicht kann allgemeine Galvanisation, auch Faradisation angewendet werden; häufige Lageveränderung zur Vermeidung von Decubitus.

Bei tiefer Regungslosigkeit, bei anämischen und jüngeren Leuten Amylnitrit-Inhalation. Kampherwein (3—5 Löffel pro die), Pepsinwein, Cognac.

Rp. 775.

*Spir. vin. Gallic. 20·0.*

*S. 3stündlich ein Kaffeelöffel.*

Rp. 776.

*Camphor. monobromat. 1·0,*

*Sacch. alb. 2·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 3—4 Pu'ver täglich.*

Bei bullären Reizsymptomen (Hyperästhesie der Sinne, Neuralgien besonders des Quintus, Angst, Röthung des Gesichtes etc.) consequente Opiumbehandlung. Chinin, Natrium saheyl., Antifebrin, Phenacetin, Salol, Antipyrin sind zu versuchen. Bei Betheiligung der weiblichen Sexualorgane Secale und Bromnatrium.

Gegen die Recidiven von Puerperalpsychosen bei nachfolgenden Geburten empfiehlt sich, den Geburtsact in der Narcose und wo möglich beschleunigt zu vollziehen und schon vorher die Mutter mit dieser tröstlichen Aussicht zu beruhigen.

Bei Amentia in Folge Intoxication durch Blei od. Alkaloide symptomatische Behandlung und möglichst rasche Entfernung der toxischen Substanzen aus dem Körper. Bei im Verlaufe der chronischen Alkoholiintoxication auftretendem **Delirium tremens**, alkoholischer Verwirrtheit in der Anstalt expectatives Verhalten, meist Isolirung geboten, Alkohol wird vollständig entzogen, nur bei Collaps Wein, Cognac, starker Kaffee. Bei Herzschwäche auch Digitalis (mit Vorsicht) oder:

Rp. 777

*Coffein. natrobenzoic. 1·0,*

*Aquae font 150·0,*

*Syr. rub. Idae 25·0.*

*D. S. 3 mal täglich 1 Esslöffel.*

Schlaf ist nur bei häuslicher Behandlung zu erzwingen durch Chloralhydrat, Sulfonal, Somnal.

Gegen Angstzustände:

Rp. 778.

*Extr. Opii aquos. 0·5—1·0,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div in dos. aequ No. 10.*

*D. S. 3stündlich 1 Pulver.*

Oder:

Rp. 779.

*Tinct. Opii simpl. 10·0.*

*D. S. 10—20 Tropfen im Tag.*

Oder:

Rp. 780. *Extr. Opii aquos.* 0·5,

*Glycerin.*,

*Aqu. destill. āā* 5·0.

*D. S. Täglich 1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

Bei Lyssa Chloralhydrat bis 10·0 p. die als Klysma.

**Paranoia, Wahnsinn.** („Primäre Verrücktheit. Chronischer, partieller Wahnsinn. Verfolgungswahn und Grössenwahn“ der Autoren.) Je nach Beschaffenheit der Wahnideen Behandlung im Hause, Wechsel des Aufenthaltes oder Anstaltspflege, wo dem Kranken Gelegenheit zur Arbeit geboten ist. Die Angstgefühle durch allgemeines Regimen, welches Blutbildung und Kräftigung anstrebt, zu bekämpfen. Gebrauch von Eisen (Rp. 753—756) oder:

Rp. 781. *Sol. arsenic. Fowleri,*

*Aqu. destill. āā* 5·0.

*D. S. Täglich 3mal 5 Tropfen, allmählich steigend bis auf 50 Tropfen im Tag.*

Oder die Solutio Pearsonii (Rp. 757) oder Roncegnowasser. Gegen peinliche Unruhe, neuralgische Empfindungen, Schlaflosigkeit Bromnatrium, Sulfonal, Somnal, Natrium salicylicum, Chinin und die anderen den Gefäßdruck beeinflussenden Mittel.

Bei hypochondrischen Klagen über Beschwerden des Verdauungstractes: Salzsäure, Eccoprotica, Carminativa, hydrotherapeutische Reize.

Bei Reizzuständen im Gebiete der Beckenorgane Bromnatrium, Secale cornutum, bei chronischer Entkräftung durch Blutverluste:

Rp. 782.

*Extract. fluid. Gossyp. herbac.* 30·0.

*D. S. Täglich 2—3 Kaffeelöffel.*

Rp. 783.

*Extr. fluid. Hydrast. canad.* 30·0.

*D. S. 2—4mal täglich 20 Tropfen.*

Bei Klagen über Impotenz sowie bei reizbarer Schwäche grosse Dosen Chinin, Bromnatrium, Lupulin, Ergotin, auch Herabsetzung der Reflexerregbarkeit durch kühlende hydrotherapeutische Behandlung, Kühlsonde in der Harnröhre, spinal angewendete Elektrizität.

Bei Erkrankung des Gehörapparates Behandlung dieser Affection.

**Paralysis progressiva. Paralytische Geistesstörung.** Prophylaktisch, wenn, namentlich bei einem 35—50jährigen Mann, Symptome beobachtet werden, wie sie gewöhnlich die Prodromalerscheinungen der Paralyse darstellen (Gedächtnissabnahme, Zerstreutheit, Veränderung des Charakters, indem der früher arbeitsame, solide, verständige Mann nunmehr faul, nachlässig, verschwenderisch, trunk- und weiberstüchtig wird; dazu häufiger Kopfschmerz, Schwindel, Congestionen, Schlaflosigkeit, verschiedene Neuralgien, apoplektiforme Anfälle): vor Allem Aufgeben jeder anstrengenden Berufsarbeit, Vermeidung jeder körperlichen und geistigen Anstrengung; reichliche, aber reizlose Nahrung, Sorge für tägliche Stuhlentleerung, bei habitueller Stuhlverstopfung Marienbader Kreuz- oder Ferdinandsbrunnen, Massage etc.; Aufenthalt auf dem Lande empfehlenswerth, grössere Reisen jedoch, namentlich ohne entsprechende Begleitung, geradezu schädlich. Gebrauch von Eisen, Arsen; bei congestiven Zuständen Ergotin (s. Rp. 765, 766); bei gleichzeitigen Herzpalpitationen mit Digitalis zu combiniren, etwa:

Rp 784.

*Ergotin. bis depur. 6·0,*

*Pulv. fol. Digital. 1·2,*

*Pulv. et extr. Liquir. aa q. s. ut f. pill. No. 50.*

*S. 3mal täglich je 2—3 Pillen*

Bei Schlaflosigkeit Bromnatrium (4·0—6·0 Gramm,) Chloralhydrat, auch Combination beider (siehe Rp. 770), Sulfonal, Somnal (Rp. 763, 764).



Ist die Schlaflosigkeit durch neuralgische Beschwerden bedingt:

Rp. 785.

*Chloral. hydrat. 10·0,  
Morph. mur. 0·05,  
Aqu. dest. 100·0,  
Syr. cort. Aur. 20·0.  
S 3 Esslöffel bei Tag,  
bei Nacht ebensoviel  
oder etwas mehr.*

Beruhigend wirken auch oft warme Bäder, dagegen die energischen Prozeduren der üblichen Kaltwasserbehandlung schädlich.

Bei luetischer Grundlage der Krankheit Schmierkur oder sonstige energische

Mercurialbehandlung, danach noch Gebrauch von Jod:

Rp. 786.

*Kal. iodat. 10·0,  
Aqu. font. 100·0,  
Syr. cort. Aur. 20·0.  
S. 3mal täglich 1 Kaffeelöffel, allmählich steigend  
bis zu 3 Esslöffeln pro  
die.*

Wenn Jodismus eintritt, besser:

Rp. 787.

*Natr. iodat. 10·0,  
Natr. bromat. 20·0,  
Aqu. font. 300·0,  
Syr. cort. Aur. 30·0.  
S. 3mal tägl. 1 Esslöffel.*

Bei gleichzeitiger Anämie statt Jodkalium oder Jodnatrium:

Rp. 788.

*Ferr. iodat. sacch. 2·0,  
Aqu. font. 100·0,  
Aqu. Menth. pip. 20·0.  
S. Tagsüber zu verbrauchen.*

Auf der Höhe der Krankheit meist Unterbringung in einer Irrenanstalt, zeitweise selbst Isolirung nöthig. Im Uebrigen diätetische und medicamentöse Behandlung wie im Prodromalstadium. Bei vorübergehendem Kothschmierern sonst ruhiger Kranker hochgehende Klysmen. Achtung auf etwa sich entwickelnde Blasenparese und Cystitis und entsprechende Behandlung derselben.

Bei paralytischen Anfällen Kälte auf den Kopf, leichte Reizmittel (Riechmittel, Frottiren etc.), bei Ver-

stopfung Klysmen; wenn Zeichen von Herzschwäche eintreten Wein, Digitalis

In den nicht selten auftretenden, mehr oder weniger lange dauernden Pausen mit anscheinend fast völliger Wiederherstellung der Gesundheit: Entlassung aus der Anstalt, passende, ruhige, von allen Aufregungen und Anstrengungen freie Lebensweise unter häuslicher Pflege.

Im Stadium decrementi sorgfältige Ueberwachung, genaue Achtung auf Reinlichkeit; die Nahrung dem Patienten in nicht zu grossen Bissen darzureichen, oft auch künstliche Fütterung nöthig. Bekämpfung der Entwicklung von Decubitus und von Pneumonie.

**Secundäre Geistesstörung.** Die Ausgangszustände nicht geheilter Psychosen mit rudimentären Krankheitserscheinungen oder Verblödung ermöglichen in vielen Fällen den Aufenthalt zu Hause oder in Arbeitsecolouien der Irrenhäuser; oft erfordern die Nahrungsaufnahme und die übrigen körperlichen Functionen gewissenhafte Ueberwachung.

**Erworbener Blödsinn.** Sorge für Nahrungsaufnahme, Stuhl- und Harnentleerung, bei Schlaflosigkeit Schlafmittel. Bei senilem Blödsinn mit Atherose der Arterien speciell Regulirung der Herzthätigkeit, eventuell Gebrauch von Digitalis, Coffein etc., in anderen Fällen Anregung der Circulation durch Alcoholica. Bei Aufregungszuständen in Folge senilen Blödsinns auch Opium:

Rp. 789.

*Extr. Opii aquos. 0·3 - 0·5,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. acqu. No. 10.*

*D. S. 3 - 5 Pulver im Tag.*

## **Angeborener Blödsinn, Idiotismus, Imbecillität.**

Sorgfältige körperliche Pflege. Eine spezifische Pädagogik erzielt je nach dem Grade der Geistesschwäche günstige Erfolge (Biedermannsdorf bei Wien). Der endemische Idiotismus ist durch hygienische Massregeln zu bekämpfen (Anstalt in Hallstatt).

## **Geistesstörungen bei Epileptikern. Behandlung der Epilepsie durch Bromsalze:**

Rp. 790.

*Natr. bromat. 50·0.*

*Div. in dos. aequ. No. 50.*

*D. S. Zu Beginn täglich 3 Pulver in Wasser aufgelöst; nach jedem Anfall um 1 Pulver pro die zu steigen.*

Dabei blande Diät, namentlich Alcoholica zu meiden. Wenn Bromacne auftritt, das Brompräparat nicht aussetzen, sondern daneben Arsen gebrauchen zu lassen, Roncegno-Wasser oder:

Rp. 791.

*Sol. arsenic. Fowler. 5·0,*

*Aquae destill. 10·0.*

*S. Anfangs täglich 15 Tropfen, allmählich bis zu 30 Tropfen im Tag zu steigen.*

Ebenso auch:

Rp. 792.

*Acid. arsenicos. 0·3,*

*Kal. carbonic. 0·5,*

*Brom. pur. 0·4,*

*Aquae destill. 20·0.*

*S. 2—4 Tropfen im Tag.*

Ist man genöthigt, mit dem Bromnatrium bis auf 10 gr. pro die zu steigen, neben diesem noch zu geben:

Rp. 793.

*Extr. Belladonnae,*

*Zinc. oxydat. aa 1·0,*

*Pulv. et extr. Liquir. q. s. ut f. pil. No. 30.*

*D. S. 1—2 Pillen im Tag.*

Die Behandlung bis zum Auftreten leichter Intoxicationerscheinungen (weite Pupillen, Trockenheit und Kratzen im Halse) fortzusetzen. Bei gehäuften epileptischen Anfällen Chloralhydrat, am besten in Klysmen, 3—6 *gr.* pro dos.

Wenn vor dem Anfall, während der Aura, auffallende Blässe des Gesichts eintritt:

Rp. 794.

*Amylaether. nitros. 5·0.*

*S. 2—4 Tropfen, auf Baumwolle geträufelt,  
einathmen zu lassen.*

Während des Anfalls der Patient nach Möglichkeit vor Verletzungen zu schützen.

**Geistesstörungen durch Intoxicationen.** Wo möglich Entfernung der toxischen Substanzen aus dem Körper. Über Behandlung der *Amentia* auf Grundlage von Intoxicationen siehe S. 182. *Paranoia*, *Paralysis progressiva*, *Dementia* durch Alkohol, Blei etc. bedingt, werden nach den bei den einzelnen Psychosen angegebenen Regeln behandelt.

---

Aus

**Prof. Rich. Freih. v. Krafft-Ebing's**  
**Klinik für Psychiatrie.**

**1. Prophylaxis.**

Belastete Kinder sollen nicht künstlich aufgefüttert, nicht von der neuropathischen Mutter, sondern von gesunder Amme gestugt werden. Heisse Zimmer und zu warme Kleider zu meiden. Kühle Bäder von 26°, später 23° R.; Abhärtung durch kalte Waschungen. Kräftige, reizlose Kost, Vermeidung von Kaffee, Thee, Alkohol. Man suche Leidenschaftlichkeit und Empfindlichkeit hintanzuhalten, Beginn des Schulunterrichtes möglichst spät. Sind die Eltern verschoben, hypochondrisch, hysterisch, dann ist das Kind nicht im elterlichen Hause, sondern im Hause eines geeigneten Pädagogen zu erziehen. Die sexuelle Frühreife möglichst hintanzuhalten, zur Pubertätszeit auftretende Erkrankungen (Chlorose etc.) energisch zu behandeln. Das Lesen von Romanen, schwärmerische Religiosität ist gefährlich. Auch bei Erwachsenen die Lebensweise mässig, Missbrauch von Genussmitteln zu meiden. Wahl eines bürgerlichen oder technischen Berufes, welcher an die geistigen Leistungen weniger Anforderungen stellt und der nicht aufregenden Wechselfällen unterliegt. Verheirathung ist weiblichen Individuen erst nach erreichter körperlicher Reife zu gestatten. Das Stillen der Kinder, wenn überhaupt zulässig, höchstens drei Monate.

## 2. Behandlung im Beginne des Irreseins.

Der Beginn der Geisteskrankheiten, von Unerfahrenen als Verstimmung, Liebeskummer, Chlorose, Hysterie, Nervosität aufgefasst, gestattet in vielen Fällen erfolgreiche Behandlung. Aus widrigen Dienst- oder Familienverhältnissen, aus den Anstrengungen des Berufes bringe man den Kranken in einen freundlichen Landaufenthalt zu Bekannten, lasse ihn eventuell in Begleitung eine kleine Reise machen. Grössere Reisen, Besuch von grossen Städten und Kurorten zu meiden. Kaltwasseranstalten mit grösster Vorsicht zu benutzen. Die Kost sei kräftig, reizlos, Tabak und Alkohol möglichst wenig zu geniessen. Sorge für Schlaf durch laue Bäder, Friessnitz'sche Einpackungen, Durchleiten des galvanischen Stromes durch den Kopf, Sulfonal, Paraldehyd, Amylenhydrat.

Rp. 795.

*Sulfonal, 10·0—15·0.*

*Die in dos. aequ. No. 10.*

*S. Abends 1 Pulver in Suppe oder Milch.*

Rp. 796.

*Paraldehyd.*

*Cognac aa 5·0.*

*S. Abends in 1 Glase Zuckerw. zu nehmen.*

Rp. 797.

*Amylenhydrat. 4·0,*

*Succ. Liquir. 1·0,*

*Aqu. destill. 50·0.*

*S. Abends zu nehmen.*

Oder:

Rp. 798.

*Amylenhydrat. 4·0.*

*S. Abends in Bier zu nehmen.*

Opiate allein oder in Verbindung mit Chinin, Digitalis mit Aq. Amygdalarum, Bromkali. Bei gesunkenem Tonus der Gefässe des Gehirns: kalte Umschläge, Leiter's Kühlapparat, Senfteige im Nacken, Fussbäder. Sorge für Stuhlentleerung durch Aloë, Rheum, Podophyllin, salinische oder diätetische Mittel (Weintrauben, Molken etc.) Der Arzt soll das Vertrauen des Kranken zu gewinnen, ihn abzulenken und zu erheitern suchen, die Umgebung darf nicht moralisiren und kritisiren, durch logische Bekämpfung der Wahnideen erbittern und reizen, ebenso ist Eingehen auf dieselben zu meiden.

Bei melancholischen Zuständen, psychischer Hyperästhesie, Präcordialangst: Opium (s. R. 803, 804)

In allen Fällen zu meiden: Entziehungskuren mit blander Diät, Blutentziehungen, Purgantien, Derivantien, rücksichtslose Kaltwasserkuren, „Erschütterungskuren“ mit Tart. emeticus oder psychische Shoks.

### 3. Irrenanstalt.

Nothwendig ist Abgabe in eine Anstalt bei ungünstigen häuslichen Verhältnissen, ungeeigneter psychischer Behandlung zu Hause, Armuth, bei Gefährlichkeit des Kranken gegen sich und die Umgebung, bei Unfügsamkeit des Patienten gegen Pflege und ärztliche Behandlung, bei Nahrungsverweigerung. Häusliche Pflege unter sonst guten Verhältnissen ist vorzuziehen bei Hypochondrie, Hysterie, bei raisonnirendem Irresein, bei ruhigen secundären psychischen Schwächezuständen.

### 4. Behandlung der ausgebildeten Krankheit.

#### Blutzufuhr zum Gehirn behindernde Mittel.

Blutentziehungen als schwächende Eingriffe werden gemieden; nur im Anfange bei Delirium acutum, bei Suppressio mensium, bei gewissen klimakterischen Psychosen mögen Blutegel, am Processus mastoid. oder an der Nasenscheidewand angesetzt, oder Schrotköpfe im Nacken von Nutzen sein.

Die Herzthätigkeit wird herabgesetzt durch kalte Compressen auf die Herzgegend, kalte Leibbinden, kühle Halbbäder von 24 — 21 ° R., Digitalis (Vorsicht wegen cumulativ. Wirkung; contraindicirt bei acuten Magenaffectionen und sexuellen Erregungszuständen).

Rp. 799.

*Infus. fol. Digital. e 0.5 — 1.0 : 150.0 — 200.0*

*D. S. 2stündlich ein Esslöffel.*

Rp. 800.

*Tinct. Strophanti 20.0.*

*D. S. 10—15 Tropfen 3mal täglich.*



Natr. nitricum, Morphinum unterstützen die Wirkung.

Rp. 801.

*Natr. nitr. 10·0.*

*Div. in dos. aequ. No. 10.*

*S. Tägl. 1—2 Pulver in Wasser gelöst zu nehmen.*

Erweiterung der peripheren Gefässbahnen zu erzielen durch laue Vollbäder, Abreibungen mit feuchten Leintüchern, Einpackungen, Wadenbinden. Ableitung auf die Darmgefässe durch Mittelsalze, Glaubersalzhaltige Mineralwässer, Karlsbader Salz, Aloë, Rheum.

Verengerung der Gefässe des Gehirns erreichen wir durch kalte Compressen oder Eisbeutel auf den Kopf oder längs der Halsgefässe, durch den Leiter'schen Apparat, Sinapismen, Senffussbäder (250—500 gr. frisches Senfmehl auf ein Bad), grosse Hautflächen bedeckende Senfteige. Gefässverengend wirken auch Chinin, Coffein, Nicotin, Nux vomica, Belladonna, Opium und Morphinum in kleinen Dosen, Secale cornutum. Man gibt Extract. Secal. cornut. 0·3—1·0 gr. die; um raschere Wirkung zu erzielen: Ergotin Boujean  $\frac{1}{2}$ —1 Pravaz'sche Spritze.

### **Blutzufuhr zum Gehirne befördernde Mittel.**

Die Herzthätigkeit steigern die Analeptica, alter Wein, Bier, warme alkoholische Getränke (Grog, Punsch etc.) Bei schwacher Herzthätigkeit: Thee, Kaffee, Aether, Aethylalkohol, Tinct. Strophanti (Rp. 800).

Bei Collaps: subcutane Injection von Aether sulf., Kampher 0·1—0·2 innerlich oder um rasch zu wirken:

Rp. 802.

*Camphor. trit. 1·0,*

*Ol. Olivarum 10·0.*

*D. S. Eine Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

Warme Umschlage, mit warmem Wasser gefüllte Kappen auf den Kopf, kalte kurze Abreibungen, kühle Halbbäder mit kräftigen Übergiessungen.

Gefässerweiternd wirkt Aether, Chloroform, Opium und Morphinum in grossen Dosen, Amylnitrit 2—6 Tropfen auf Baumwolle in das Nasenloch. (Über 12 Tropfen pro die nicht zu gebrauchen.)

**Die gesteigerte Erregung und Erregbarkeit herabsetzende Mittel.** Opium und Morphinum wirken in kleinen Dosen gefässerverengend, in grossen gefässerweiternd. Opium wirkt ausserdem trophisch, daher anzuwenden bei Patienten mit gesunkener Ernährung, bei Melancholie mit psychischer Hyperästhesie mit oder ohne Angstzustände, bei weiblichen, anämischen Individuen mit Puerperalpsychosen, bei reizbarer Manie, bei acuten Alcoholpsychosen; Opium schadet bei Melancholia passiva und Melancholia cum stupore.

Morphium und Opium wird intern und subcutan gegeben:

Rp. 803. *Extr. Opii aquosi* 1·0,  
*Extr. Rhei* 2·0,  
*Extr. et pulv. Liq. q. s. ut f. pil. Nr. 50.*  
*D. S. Morgens und Abends 2 bis 10 Pillen*  
*steigend zu nehmen.*

Rp. 804. *Extr. Opii aquos.* 0·6,  
*Extr. Aloës* 0·4,  
*Vini Malacens* 120·0,  
*Tinct. Aurant. comp.,*  
*Syrup. Aurant. aa* 15·0.  
*3 Kaffeelöffel, n. Bericht zu nehmen*  
*3 Mittel langsam steigend etwa in fol-*  
*gender Weise:*  
*1. Kaffeel. Morgens, 3 Kaffeel. Abends.*

"	3 <sup>1</sup>	2	"	"
"	4		"	"
"	4 <sup>1</sup>	2	"	"
"	5		"	"
"	5		"	"

Die anfangs auftretende Constipation schwindet nach 8—10 Tagen, da sich der Darm an das Mittel gewöhnt.

Rp. 805.

*Morph. mur. 1·0,*

*Aqu. destill. 17·0,*

*Glycerin. 3·0.*

*D. S. 1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

Rp. 806.

*Extr. Opii aquos. 1·0,*

*Glycerin 2·0,*

*Aqu. destill. 18·0.*

*D. S. 2—4 Spritzen im Tage zu injiciren.*

Tritt nach der Injection Erbrechen ein: Ruhelage, schwarzer Kaffee, Zusatz von geringer Menge Atropin (0·25—0·5 Milligr. pro dosi) zur Injectionsflüssigkeit.

Tritt unmittelbar nach einer Morphinum-Injection Collaps ein: künstliche Athmung, Faradisation der Phrenici. Contraindicirt ist Morphinum bei Anämie, Abstinenz, Marasmus, Neigung zu Collaps, nicht compensirten Klappenfehlern, Fett-herz, auf der Höhe der Manie mit expansivem Charakter.

Bei fureibunden Zuständen werthvoll, aber bei Fett-herz, Arteriosclerose, Fieber, bei marastischen Personen zu meiden ist:

Rp. 807.

*Hyoscin. muratic. 0·01,*

*Aquae destill. 10·0.*

*D. S. 1—2 Pravaz'sche Spritzen zu injiciren.*

Intern kann es bis zur doppelten Höhe gegeben werden, vor anhaltendem Gebrauche ist zu warnen

Besser:

Rp. 808

*Duboisin. sulfur. 0·01,*

*Aqu. destill. 10·0.*

*M. D. S. 1 Pravaz'sche-Spritze.*

Intern bis zu 0·002 (auch als gutes Schlafmittel).

Zur Herabsetzung der Reflexerregbarkeit, z. B. bei hysterischen Krämpfen:

Rp. 809.

*Extr. Conii maculat. 3·0,*

*Extr. et. pulv. Liq. q. s. ut f. pill. Nr. 60.*

*D. S. Von 4 Pillen langsam auf 10 Pillen pro die zu steigen.*

Rp. 810.

*Camphor. monobrom.,*

*Extr. Valerian. aa 3·0.*

*M. f. pill. No. 30.*

*Obduc fol. argent*

*D. S. 3 mal täglich 1 Pille.*

Bei Reflexpsychosen, Psychosen mit Betheiligung der sexuellen Sphäre kommen die die Reflexcentra beruhigenden Bromsalze zur Anwendung, man gibt 6—10 -15 gr. pro die. Schlafmachende Wirkung ist bei Männern mit 6·0, bei Weibern mit 4·0 zu erzielen.

Die Wirkung der Bromsalze ist durch ihren Bromgehalt bedingt. Es enthält:

*Bromkali 62<sup>0</sup>/<sub>100</sub> Brom*

*„ natrium 67<sup>0</sup>/<sub>100</sub> Brom*

*„ ammonium 75<sup>0</sup>/<sub>100</sub> „*

*„ magnesium 83<sup>0</sup>/<sub>100</sub> „*

Bei Bromismus mit Mattigkeit, Gedächtnisschwäche, darniederliegender Herzthätigkeit ist Strychnin Antidot.

Rp. 811.

*Strychnin. nitr. 0·02,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*D. S.  $\frac{1}{2}$ —1 Spritze zu injiciren (1—2 mal täglich).*

Diätetische Beruhigungsmittel: Bettruhe, zeitweise Isolirung, Abhaltung greller Sinnesreize, laue Bäder von 25—27° R.  $\frac{1}{2}$  bis 1 Stunde, bei gleichzeitiger Fluxion kalte Compressen auf den Kopf; prolongirte Bäder von 28° R. durch 10—14 Stunden und Berieselung des

Kopfes mit Wasser von 15° R. Priessnitz'sche Einpackungen von ein- bis mehrstündiger Dauer. (Contraindicirt sind Bäder bei Anämien, Erschöpfungszuständen)

**Schlafmittel.** Betruhe, reichliche Abendmahlzeit mit Alcohol, kräftigem Bier, altem Wein, Glühwein, Weinpunsch. Bei Fluxionen zum Gehirn: laue Bäder, Senfbäder, Senffussbäder, Extr. Secal. cornut., Brompräparate. Bei Angst, Zwangsvorstellungen, Hallucinationen: Opium, Morphinum, Sulfonal, Paraldehyd, Amylenhydrat.

Bei hysterischer und neurasthenischer Schlaflosigkeit: Priessnitz'sche Einpackung, Priessnitzgürtel, Valeriana, Aqua Laurocerasi, Sulfonal, Monobromkampher (0.50 pro dosi) in Suppositorien, Brom, Piscidia.

Bei Anwendung narkotischer Mittel häufiger Wechsel nothig. Bei sexueller Reizung: Kühle Sitzbäder, Brompräparate, Monobromkampher.

Chloralhydrat 2.0—3.0 intern oder in Klysma; ist zu meiden bei alten Leuten, bei Fettherz, Arteriosclerose, Klappenfehlern.

Amylenhydrat (bei Anämie des Gehirns) nicht unter 3.0, nicht über 6.0 mit der doppelten Menge Cognac. Paraldehyd unter 4.0 keine Wirkung, bis 8.0 mit der doppelten Menge Tinct. fruct. Aurant. (der Geruch des Mittels sehr unangenehm) oder:

Rp. 812.

*Paraldehyd. 12.0,*

*Tinct. Aurant.,*

*Cognac. ad 10.0.*

*D. S. Die Hälfte Abends in Zuckerwasser zu nehmen.*

Durchleitung des galvanischen Stromes ( $\frac{1}{2}$ —1 Milliampère) in der Längsaxe des Kopfes durch 2—3 Minuten.

Rp. 813.

*Extr. fluid. Piscid. 100.0.*

*D. S. 2—3 Kaffeelöffel in Wasser mit Syrup. Menthae.*

Rp. 814.

*Hypnom (Acetophenon) 20·0.*

*D. S. 15—20 Tropfen mit Rum oder Syrup. cort  
Aurant.*

Besonders wirksam bei Alkoholikern:

Rp. 815.

*Methylal. 1·0,*

*Aquae destill. 9·0.*

*D. S. 1—3 Pravaz'sche Spritzen in 24 Stunden zu injic.*

**Antaphrodisiaca.** Geringen Wert haben Kampher, Belladonna. Lupulin mindestens 1·0 pro dosi zu versuchen. Brompräparate nicht unter 6·0. Antipyrin 2·0 zu versuchen, auch Natrium nitricum 3·0 pro die.

Behandlung etwaiger Ursachen als Oxyuris, Vaginitis, Leukorrhoe, Pruritus. Cocainbepinselung, Cocainsuppositorien, kalte Wäschungen, Sitzbäder, Ermüdung durch körperliche Arbeit, Vermeidung gewürzter Speisen, alkoholischer Getränke, Cauterisation der Clitoris; mit günstigem Erfolge wurde Clitoridectomie ausgeführt.

Bei häufigen Pollutionen:

Rp. 816.

*Extr. Secal. cornut. 5·0,*

*Camphor. monobrom. 2·0,*

*Lupulin. 3·0,*

*Pulv. et extr. Liq. q. s. ut f. pil. No. 50.*

*D. S. 3—4 Pillen täglich.*

Rp. 817.

*Camphor. monobrom. 0·7,*

*Extr. Opii aquos. 0·05,*

*Liquefactis leni calori adde*

*Butyri Cacao et Ol. Olivarum q. s. ut f.  
supposit.*

*Dent. tal. supposit. No. 6.*

*D. S. Abends 1 Stück einzuführen.*



**Tonica.** Nebst kräftiger Ernährung und guter Luft hydrotherapeutische Behandlung in Form von Regenbädern, kühlen Halbbädern von 24—20° R. mit kräftiger Uebergiessung und Frottirung, Abwaschungen mit Wasser von 20—12° R. und folgendem starken Frottiren, Abreibungen mit dem nassen Leintuch von 23—16° R. Allgemeine Faradisation oder elektrische Massage. Chinin- und Eisenpräparate, Ergotin, Nux vomica.

Rp. 818.

*Extr. Secal. corn.,*  
*Chinini ferro-citr. aa 5·0.*  
*F. pill. No. 50.*  
*D. S. Tägl. 3—5 Pillen.*

Rp 819.

*Chinini ferro-citr. 1·0,*  
*(Extr. Nuc vom. 0·20.)*  
*Extr. Liquir. qu. s.*  
*ut. f. pill. No. 20.*  
*S. 2mal täglich 1 Pille.*

**Somatische Diätetik.** Roborirende Diät, frische Luft, Reinlichkeit. Bettruhe wirkt beruhigend und ist indicirt bei darniederliegendem Ernährungszustande, Marasmus, bei Zeichen von Hirnanämie und Nahrungsverweigerung.

Die Reinlichkeit erfordert individuelle Behandlung: Auf der Höhe von Aufregungszuständen kann der Patient nur in einer eigenen Abtheilung mit guter Ventilation und Heizvorrichtung, cementirten Wänden, undurchlässigem Boden und passend construirten Betten gehalten werden; bei ruhigen unreinen Kranken ist für regelmäßige Darmentleerung durch Klysmen zu sorgen, bei ungenügendem Sphincterschluss mitunter Nux vomica von Nutzen, bei Hyperästhesie der Rectalschleimhaut Belladonna.

Rp. 820. *Extr. Nuc. vom. 0·20,*

*Extr. et pulv. Liquir. qu. s.*  
*ut f. pill. Nr. 20.*  
*D. S. 3mal täglich 1 Pille.*



Rp. 821.

*Extr. Belladonnae* 0·1 0·2,

(*Extr. Opii aqu* 0·1—0·2),

*Butyri Cacao qu. s. ut f. supposit. No. 10.*

*D. S. Stuhlzäpfchen.*

Kranken, welche sich der Kleider entledigen, dieselben zerreißen, gibt man solche in einem Stück aus schwer zerreißbarem Stoff mit für den Kranken unzugänglichem Verschluss, Lederhandschuhe mit Schlossschnallen, Schuhe mit Sperrvorrichtung. Reicht man damit nicht aus: warme Zelle mit Rosshaar oder Seegras.

Mechanische Beschränkung (Zwangs- oder Schutzjacke) nur bei chirurgischen Verletzungen, schweren Augenaffectionen, wenn die Kranken sonst den Verband zerreißen oder sonst sich beschädigen würden. Ueberwachung der Harn und Stuhlentleerung, einfache Klysmen, hohe Irrigation, Mineralwässer. Gentigen diese nicht. Senna, Rhenm, Rhamnus frangula, Ricinus; Calomel (0·5 pr. dosi) leicht in Milch beizubringen.

### Wichtige Einzelsymptome.

**Nahrungsverweigerung.** Pat. bleibe im Bette, Reinhaltung des Mundes durch Ausspritzungen mit Kali chloricum oder Kali hypermang. etc. Bei Bettruhe, gutem Ernährungszustande, wenn der Mund gut ausgespült wird und der Kranke wenigstens Wasser zu sich nimmt, kann die künstliche Fütterung bis zu 6—8 Tagen verschoben werden.

**Präcordialangst.** Ueberwachung wegen Möglichkeit eines Selbstmordversuches und Gefahr für die Umgebung. In leichten Fällen: laue Bäder, Sinapismen in die Magen-grube, Aq Amygd. amar., Extr. Belladonnae, Bettruhe. In schwereren Fällen: Opiate, bei schwachem Puls in Verbindung mit Aether aceticus, bei stürmischer Herz-action mit Digital. (10 Tropf. Tinct. Digital. 1—3mal tägl.)

Am wirksamsten Opium subcutan, bei Neuralgien mit Angstzuständen Injection am Orte des Schmerzes. Bei Präcordialangst der Neurastheniker, Onanisten auch Chlo-  
ralhydrat wirksam.

**Hallucinationen.** Bei Gehörshallucinationen mit sensorischer Hyperästhesie constanter Strom, eventuell Morphinum-behandlung. Auf ein Ohr oder Auge localisirte Hallucinationen erfordern Behandlung des betreffenden Organes.

---

Aus

**Hofrath Prof. Dr. Hermann Widerhofer's**  
**Klinik und Ambulatorium für Kinderkrankheiten.**

---

**A. Diätetik des gesunden Kindes.**

**Zimmer und Bett des Säuglings.**

Zimmertemperatur in den ersten 3—4 Tagen 17—18° R., dann 16° R.; das Zimmer zweimal täglich zu lüften, in den ersten 6 Tagen etwas zu verdunkeln. Das Bett feststehend, nicht Wiege oder Schaukelbettchen; Matratzen und Kopfpolster mit Seegras oder Rosshaar gefüllt, nicht mit Federn. Bedeckung nur in einer leichten Decke bestehend. Die Kinder sollen im Bettchen einschlafen, sind nicht auf dem Arm zu wiegen, jedoch einige Stunden im Tag herumzutragen.

**Die Ernährung im Säuglingsalter.**

**I. Die Ernährung durch die Brust.**

Jedenfalls die beste Art der Ernährung, besonders

**a) die durch die eigene Mutter.**

Wo es irgend angeht, soll die Mutter säugen. Contra indicationen dagegen: Puerperale Erkrankungen, vorgeschrittene Mastitis, acute (durch hochgradigen Blutverlust bei der Geburt entstandene) oder chronische Anämie, Anlage zur Lungenphthise oder bereits bestehende Tubercu-

lose, Prolapsus uteri, starker Fluor albus, Epilepsie, Hysterie. (Ueber Ernährung bei Syphilis der Mutter s. unter „Lues hereditaria“.) Das Säugen durch die Mutter ferner zu unterlassen bei sehr mangelhafter Milchsecretion (bei geringeren Graden von Milcharmuth ist natürliche und künstliche Ernährung zu combiniren), bei Hohlwarzen (dieselben sind schon während der Schwangerschaft täglich mit lauwarmem Wasser zu waschen und durch ein Saugglas hervorzuziehen), Excoriationen der Warzen, wenn sie bei Fortsetzung des Säugens nicht zur Heilung gebracht werden können.

Behandlung der **Excoriationes papillarum**. Prophylaktisch schon während der Schwangerschaft Einreibung der Warze mit Alcoholicis und gerbsäurehaltigen Mitteln, also etwa:

Rp. 822.

*Tinct. Gallar. 2·0,  
Spir. vin. Gallic. 20·0.  
S. Zur Einreibung.*

Bei bereits bestehenden Schründen täglich einmal unmittelbar nach dem Säugen Touchiren mit Lapis, danach sorgfältige Reinigung der Warze

Oder:

Rp. 823.

*Ol. cadin. 1·0,  
Ungu. emollient.,  
Glycerin pur. aa 10·0  
D. S. Früh und Abends einzupinseln, vor dem Säugen gründl. Reinigung.*

**Bei Galaktostase**, besonders wenn Schmerzhaftigkeit der Brustdrüse auftritt:

Rp. 824. *Extr. Belladonn. 0·2—0·4,*

*Ungu. emollient 20·0.*

*D. S. Früh und Abends einzureiben, aber nicht in der Nähe der Warze.*

NB. Bei Gebrauch dieser Salbe gründliche Reinigung der Mamma vor jedem Säugen.

**b) Ernährung durch eine Amme.**

Bei der Ammenwahl auf folgende Momente zu achten: Alter der Amme (20—30 Jahre), des Ammenkindes (6—8 Wochen), die Amme am besten zweitgebärend, am Körper der Amme Untersuchung der Haut (Syphilis, Scrophulose, Scabies), der Lymphdrüsen (Syphilis, Tuberculose), der Genitalien (Lues, Puerperalerkrankungen), der Analfalte, der Zähne (Caries), des Herzens, der Lunge, endlich Untersuchung der Mammæ. Dieselben seien mässig gross, fettarm, aber reich an Drüsenparenchym, die Haut von reichlichen Venennetzen durchzogen, die Warze lang, leicht fassbar; bei concentrischem Druck auf die Brust soll die Milch in 6—8 Bogen spritzen, nicht spontan träufeln. Das Kind der Amme stets auch zu untersuchen.

Die Ernährung der Amme möglichst gleich ihrer gewohnten Nahrung, nur eventuell reichlicher; starke Flüssigkeitsaufnahme angezeigt. Bier (am besten Pilsener Bier) in mässiger Menge, aber auch nur bei daran gewöhnten Personen nothwendig. Scharfgewürzte Speisen zu meiden.

Einmaliger Eintritt der Menstruation (wenn nicht schon vor dem vierten Monat erfolgend) nöthigt nicht zum Wechsel der Amme; nur wenn die durch die Menstruation der Amme hervorgerufenen dyspeptischen Erscheinungen beim Säugling noch nach dem Aufhören der Menses andauern oder diese sich wiederholen, ist eine andere Amme zu wählen, oder bei 6—7monatlichen Kindern die Ablactation vorzunehmen. Vorübergehende fieberhafte Erkrankung der Amme (meist acuter Magenkatarrh) erfordert zeitweiliges Absetzen des Kindes, nach Aufhören des Fiebers die erste Milch auszupumpen, dann erst nach einigen Stunden das Kind wieder anzulegen. Bei heftigen Gemüthsbewegungen der Amme das Säugen ebenfalls zu unterbrechen.

**c) Eintheilung der Mahlzeiten bei Brustkindern.**

In den ersten 12—16 Stunden kann das Kind ganz gut fasten, da die Mütter da gewöhnlich noch keine oder

wenig Milch haben. (Kamillenthee oder Zuckerwasser schadet nicht.) Vom zweiten Tag angefangen das Kind anzulegen, so oft es schreit, erfolglose Saugversuche dürfen nicht abschrecken, das Kind wieder anzulegen; saugt es in den ersten Tagen schlecht, so kann man etwas Biedert'sches Rahngemenge ohne Milchzusatz geben (s. „künstliche Ernährung“, S. 206). Vom vierzehnten Tage an Regelmässigkeit in der Zahl der Mahlzeiten durchzuführen, nie öfter trinken lassen, als alle zwei Stunden, und nie länger als eine halbe Stunde. Von der dritten bis sechsten Woche lasse man sechsmal bei Tag trinken und zweimal Nachts (gegen Mitternacht und gegen Morgen), von der sechsten Woche bis zum Alter von drei Monaten fünfmal am Tag, zweimal in der Nacht, dann bis zur Entwöhnung fünfmal bei Tag und einmal in der Nacht. Bei sehr schwächlichen Kindern, namentlich bei frühgeborenen, sind diese Zeiten nicht einzuhalten; hier oft Ernährung mit dem Löffel nothwendig.

#### d) Entwöhnung.

Zeit derselben am besten zwischen siebentem und zehntem Lebensmonat, d. h. wenn das Kind vier Zähne hat; womöglich nicht im März oder April, wo die Kuhmilch schlecht ist und nicht im Juli oder August, wo die Kinder am meisten zu Krankheiten der Verdauungsorgane disponiren. Rasche Entwöhnung nur bei heftigen, acut fieberhaften Erkrankungen der Mutter oder Amme nothwendig, wenn nicht gleich eine andere Amme zu haben ist, sonst allmälliche Entwöhnung: Vom fünften Monat an einmal im Tag statt der Brust Kuhmilch, mit dem dritten Theil Wasser verdünnt, zusammen  $\frac{1}{6}$  Liter, nach 14 Tagen zweimal, nach weiteren 14 Tagen dreimal im Tag Kuhmilch vorausgesetzt, dass das Kind dabei gedeiht). Um die Mittagszeit etwas gesalzene Rindssuppe, besonders bei Kindern, die Neigung zu Rachitis haben. Nach weiteren 6–8 Wochen vollständige Entwöhnung.



## II. Die künstliche Ernährung.

Gemischt künstliche Ernährung (bei ungenügender Milchsecretion der Mutter) oft sehr zu empfehlen, rein künstliche Ernährung stets schlechter, als die durch die Brust. Die gewöhnliche Nahrung ist a) **Kuhmilch** (Stutenmilch wäre wegen des geringeren Caseingehaltes besser). Die Kuhmilch soll von mehreren Kühen genommen werden, die mit trockenem Futter zu ernähren, nicht auf die Weide zu führen sind. Milch von Höhenkühen (Schweizer oder Mürzthalkühen) besser als von Niedrungskühen (der Holländer Race). Die Milch in sorgfältigst gereinigten Geschirren aufzufangen und abgekocht aufzubewahren, die für jede Mahlzeit entsprechende Menge zu erwärmen und mittelst Löffels oder Saugflasche zu geben. Am besten ist es, die Milch zu sterilisiren nach dem Verfahren von Soxhlet; dasselbe in Privathäusern am einfachsten in der Weise durchzuführen, dass man sich Flaschchen mit luftdicht schliessenden durchbohrten Kautschukstüpseln bereiten lässt, in die Oeffnung der letzteren passt wieder luftdicht ein Glasstüpsel. Die Milch, resp. entsprechende Mischung von Milch und Wasser (s. unten) wird nun in einem solchen Flaschchen, das mit dem Kautschukstüpsel verschlossen ist, durch etwa 20 Minuten im Wasserbade aufgekocht, dann der Kautschukpfropf noch durch den Glasstüpsel geschlossen und die Milch noch durch weitere 20 Minuten gekocht. Zum Gebrauch wird der Kautschukstüpsel durch ein reines Saughütchen ersetzt.

Im Säuglingsalter ist die Kuhmilch, ob sterilisirt oder nicht, stets verdünnt zu geben und zwar nach folgendem Schema: die ersten beiden Lebenswochen gibt man einen Theil Milch auf drei Theile Wasser, dann bis zur vierten Woche auf zwei Theile Wasser, hierauf bis zum Alter von drei Monaten die Milch mit der gleichen Menge Wasser, danach mit der Hälfte oder in späteren Monaten mit dem Drittel Wasser verdünnt. Die tägliche Menge der Milch bis zur sechsten Woche  $\frac{1}{2}$  Liter, dann bis zum



vierten Monat  $\frac{2}{3}$  Liter, weiterhin mindestens 1 Liter. Zahl der Mahlzeiten wie bei Ernährung durch die Brust, womöglich die Pause zwischen den einzelnen Mahlzeiten noch etwas grösser. Jedenfalls sehr genaue Einteilung. Vom dritten bis vierten Monat an einmal im Tag gut gesalzene Fleischbrühe ohne aromatische Kräuter; nach Durchbruch der vier ersten Schneidezähne halbbebratenes Rindfleisch, Saft von Beefsteak, gehacktes Fleisch. Wird die Kuhmilch nicht gut vertragen, so ist sie statt mit Wasser mit Kalbsbrühe zu verdünnen:  $\frac{1}{2}$  Kilogr. Kalbfleisch mit 1 Liter Wasser und bis auf einen halben Liter eingekocht.

In Städten, wo gute, unverfälschte Kuhmilch oft nicht zu beschaffen, verwendet man statt derselben Surrogate, am besten:

b) **Liebig'sche Suppe.** 20 Gr. gekeimte Malzgerste (in jedem Brauhaus oder in der Apotheke erhältlich, 40 Gr. Wasser, 16 Tropfen Liquor Kali carbonic. lässt man bei Zimmertemperatur  $\frac{1}{2}$  Stunde stehen und setzt dann die Mischung langsam zu einem aus 20 Gr. Weizenmehlmehl und 200 Gr. nicht abgerahmter Kuhmilch auf dem Herde bereiteten, aber nicht aufgekochten Brei unter beständigem Umrühren zu, lässt die Mischung  $\frac{1}{4}$  Stunde in einem Wasserbad von 90° R. stehen, dann einmal aufkochen, zuletzt wird das Ganze abgekühlt und durch ein Tuch gesiebt. In den ersten Monaten die Milch nicht rein, sondern mit der gleichen Menge Wasser verdünnt anzuwenden. Zu bequemerem Gebrauch besteht ein Präparat aus Hell's Fabrik, wovon zur Bereitung der Liebig'schen Suppe 1—2 Kaffeelöffel zu einem halben Liter Milch zugesetzt, die Mischung aufgekocht und dann nach dem Alter des Kindes, ebenso wie Milch, verdünnt wird.

c) **Biedert's Rahmgemenge** eignet sich als Surrogat der Muttermilch für die ersten Tage, wenn die Kinder noch nicht gut saugen können. Man gibt einen Löffel auf 13 Löffel Wasser erwärmt; später muss im entsprechenden Verhältniss Milch zugesetzt werden.

d) **Condensirte Milch, Schweizermilch**, eignet sich besonders zur Ernährung auf Reisen: man gibt sie mit der 16—20fachen Menge Wassers verdünnt. Die Dose soll nach dem erstmaligen Gebrauch offen bleiben.

Weitere Surrogate der Kuhmilch sind.

Löfflund's Malzextract (ein Kaffeelöffel auf einen halben Liter entsprechend verdünnter Milch), Nestle's Kindermehl (Geheimmittel, erst vom sechsten oder siebenten Monat an zu gebrauchen), Demme's Gemenge (namentlich bei Cholera infantum gerühmt, das Eiweiss von zwei Eiern in  $\frac{1}{2}$  Liter Wasser kalt verrührt, hierauf 2 Löffel Milchzucker und ein Löffel Cognac zugesetzt)

### Die normale Dentition.

Reihenfolge der Zähne nach der Zeit des Durchbruchs.	Zeit des Durchbruchs
1. und 2. unterer Schneidezahn	6. bis 9. Monat
1. und 2. oberer Schneidezahn 3. und 4. oberer Schneidezahn	8. bis 10. Monat
1. und 2. oberer Backenzahn 3. und 4. unterer Schneidezahn 1. und 2. unterer Backenzahn	12. bis 15. Monat
1. und 2. oberer Eckzahn 1. und 2. unterer Eckzahn	18. bis 24. Monat
3. und 4. oberer Backenzahn 3. und 4. unterer Backenzahn	30. bis 36. Monat

(Die Reihenfolge ist nicht immer genau, wie oben angegeben, indem manchmal die oberen, manchmal die unteren Zähne derselben Kategorie zuerst durchbrechen.)

Beginn der zweiten Dentition (Durchbruch des dritten Backenzahns) Ende des fünften oder Anfang des sechsten

Jahres, im siebenten Jahre Ausfallen der erstgebildeten und Entwicklung der bleibenden Schneidezähne.

### Pflege des Mundes bei gesunden Kindern

In den ersten sechs Wochen vor, und wenn das Kind beim Saugen nicht einschläft, auch nach jedem Trinken Reinigung des Mundes mit einem in Wasser getauchten reinen (nicht öfter als zweimal zu verwendenden), weichen Leinwandlappchen; bei Kindern von 3–4 Monaten nur Frñh und Abends diese Reinigung nothwendig. Während der Dentition häufiges Waschen des Mundes mit kaltem Wasser. So lange die Kinder nur Milch und Suppe bekommen, die Zähne nur mit einem Leinwandlappen und Wasser zu reinigen, später, bei consistenterer Nahrung, feine weiche Zahnbürstchen zu verwenden, als Zahnpulver fein vertheilte Lindenkohle oder:

Rp. 825.

*Pulv. ossis Sepiae,*  
*Magnes. carbonic, aa 10·0,*  
*Pulv. rad. Ireos florentin. 2·0,*  
*Ol. Menth. pip. gtts. 3.*  
*D S. Zahnpulver.*

Nach dem Zähneputzen durch reichliches Ausspülen die Reste des Zahnpulvers aus dem Munde zu entfernen

### B. Therapie der Krankheiten des Kindesalters.

**Lebensschwäche.** Das Kind in Watte einzuwickeln oder in einen mit warmem Sand gefüllten Korb zu legen. Noch besser die in neuerer Zeit aus Paris bezogenen Heisswasserwiegen. Das Kind oft von einer Seite auf die andere zu legen; zur Anregung der Respiration öfters leichter Druck auf den Thorax auszuüben und die Arme des Kindes zu heben. Bäder von 28–29° R. mit Kleienabkochung. Die Ernährung mittelst Löffels, wenn nöthig, durch die Nase. Bei vorhandenen Oedemen leichte Massage.

**Meningitis purulenta. Eitrige Gehirnhautentzündung.** Bei sehr kräftigen, über 10 Jahre alten Kindern 1–2 Blutegel hinter das Ohr. Im Beginne bei grösseren Kindern, wenn Verstopfung besteht:

Rp. 826.

*Magnes. citric. effervescent. anglic. 50 0.*

*S. 1 Kaffeelöffel in einem Glas Wasser aufgelöst, davon esslöffelweise.*

Oder:

Rp. 827.

*Natr. phosphoric. 5·0,*

*Aqu. destillat. 70 0,*

*Syr. rub. Idae 20·0.*

*S. In 2–3 Portionen zu verbrauchen.*

Wenn die Kinder Medicamente zu nehmen verweigern, erweichende Klystiere.

Als Antiphlogisticum viertelstündlich zu wechselnde Eisumschläge auf den Kopf oder Leiter'scher Kühlapparat. Absolute Ruhe in verfinstertem Zimmer Nahrung flüssig und abgekühlt; Suppe, Milch. Bei Erbrechen Eispillen, Fruchteis, in Eis gekühltes Sodawasser. Bei Fieber:

Rp. 828

*Chinin. sulfuric. 1 0–2·0,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequal. No. 10.*

*D. S. 2stündlich 1 Pulver.*

Bei kräftiger und regelmässiger, aber sehr frequenter Herzaction kann daneben gegeben werden:

Rp. 829.

*Inf. fol. Digital. purp. e 0·15 : 70·0,*

*Liqu. Kal. acetic. gtts. 10–30,*

*Syr. simpl. 10·0.*

*M. D. S. 2stündlich 1 Kinderlöffel.*

**Meningitis tuberculosa. Tuberculöse Gehirnhautentzündung.** a) Prophylaxis bei Kindern tuberculöser Eltern oder bei Geschwistern von an Meningitis

verstorbenen Kindern möglich: Ernährung durch eine gesunde Amme, dabei Behandlung der geringsten Verdauungsstörungen. Nach der Ablactation kräftige Nahrung, Fleisch, Milch, Fleischsuppe. Fleissiger Aufenthalt im Freien, bei grösseren Kindern mässige Bewegung, rationelle Abhärtung durch kalte Waschungen. Impfung vor dem 3. Lebensmonat vorzunehmen. Wenn die Kinder beginnen blass zu werden, strengste Regelung der Ernährung, wenn möglich, Luftveränderung, im Sommer Gebirgsgegend; im Winter ein südlicher Kurort (Meran, Arco, Nizza, Mentone). Während des Sommeraufenthalts Gebrauch von Pyrmonter oder Spaaer Wasser oder (auch während des Winters):

Rp. 830.

*Chinin. sulfuric* 0·3,  
*Ferr. carbon. sacchar.* 0·5,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 3mal tägl. 1 Pulv.*

Oder:

Rp. 831.

*Chinin. ferrocitric.* 1·0,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 3mal tägl. 1 Pulv.*

Bei Drüsenanschwellungen Einreibungen mit:

Rp. 832.

*Jod. pur.* 0·05,  
*Kal. iodat.* 0·5,  
*Ungu. emollient.* 30·0.  
*S. Salbe.*

b) Bei bereits ausgebrochener Erkrankung expectatives Verhalten. Ruhe, Aufenthalt in verfinstertem, aber öfters zu lüftendem Zimmer. Wenn Nahrung genommen wird, leicht verdauliche, flüssige Nahrungsmittel in geringen Quantitäten auf einmal, aber oft im Tag. Bei Stuhlverstopfung Klystier mit reinem Wasser oder mit einem Zusatz von:

**Rp. 833.**

*Ol. Ricini 20·0--30·0.*

*S. Zusatz zum Klystier.*

Bei Blasenlähmung öfteres Katheterisiren.

Im Uebrigen im Beginn am besten:

**Rp. 834.**

*Chinin. sulfur. 0·2—0·6,*

*Acid. sulfur. q. s. ad sol.,*

*Aqu. dest. 80·0,*

*Syr. cort. Aurant. 10·0.*

*M. D. S. 2stündlich*

*1 Kaffeelöffel.*

Daneben kalte Umschläge auf den Kopf. Ohne nach-

weisbaren Nutzen, aber gewöhnlich verwendet ist:

**Rp. 835.**

*Kal. iodat. 0·5—1·0,*

*Aqu. dest. 70·0,*

*Syr. simpl. 10·0.*

*M. D. S. 2stündlich*

*1 Kaffeelöffel.*

Ebenso:

**Rp. 836.**

*Liqu. Kal. acetic. gtts. 20,*

*Aqu. destillat. 70·0,*

*Syr. simpl. 10·0.*

*M. D. S. 2stündlich*

*1 Kaffeelöffel.*

**Meningitis cerebrospinalis epidemica. Epidemische Genickstarre.** Absolute Ruhe; im Beginn Eiskappe oder Leiter'scher Apparat auf den Kopf.

Salinische Abführmittel oder:

**Rp. 837.**

*Calomelan. 0·2—0·3,*

*Sacch. alb. 1·0.*

*M. f. pulv. Div in dos.*

*aequ. No. 10.*

*S. 2stündlich 1 Pulver,*

*bis ausgiebige Stühle*

*erfolgen.*

Einreibung des Kopfes und Nackens mit Unguent. ciner.

Ferner Jodkali in entsprechender Dosis.

**Rp. 838.**

*Kal. iodat. 0·5,*

*Aqu. font. 70·0,*

*Syr. cort. Aurant. 20·0.*

*S. 2stündlich 1 Kinderl.*

Bei Convulsionen:

**Rp. 839.**

*Chloral. hydrat. 0·5—1·5,*

*Decoct. Salep 100·0.*

*M. D. S. Die Hälfte da-*

*von zu einem Abends*

*zu gebenden Klystier.*



**Coryza. Schnupfen. Nasenkatarrh.** Bei Säuglingen eine ernste Erkrankung, weil durch dieselbe das Saugen behindert wird. Deshalb fleissiges Entfernen des vertrockneten Secrets durch Einspritzen von lauem Wasser mittelst kleiner Spritze in nicht zu starkem Strahl, oder durch gründliches Auswischen der Nasenlöcher mittelst eines feinen, in Wasser getauchten Malerpinsels. Ausserdem zweimal täglich Einspritzung einer leicht astringirenden Flüssigkeit wie:

Rp 840.

*Zinc. sulfuric. 0·2,*  
*Aqu. dest. 150·0.*  
*S. Einspritzung.*

Oder:

Rp 841.

*Alum. crud. 0·3,*  
*Aqu. destillat. 150 0.*  
*S. Aeusserlich.*

Rp. 842.

*Acid. tannic. 0·2,*  
*Aqu. dest. 200 0.*  
*S. Aeusserlich*

(Diese Einspritzungen  
sind stets vom Arzte selbst  
vorzunehmen.)

Das Kind stets nur nach gründlicher Reinigung der Nase an die Brust zu legen. Kann das Kind trotzdem nicht saugen, so ist die Milch mit dem Löffel einzuflossen.

**Ozaena scrophulosa. Scrophulöse Stinknase.** Behandlung der Scrophulose überhaupt. Fleissige Reinigung der Nase; Ausspritzung derselben mit Haller Jodwasser oder mit:

Rp. 843.

*Kal. iodat. 2·0,*  
*Aqu. font. 300·0.*  
*S. Zum Ausspritzen.*

Die Schleimhaut mehrmals täglich einzuschmieren mit:

Rp. 844.

*Merc. praec. rubr. 0·05,*  
*Ungu. emollient 10 0,*  
*(Ol. Rosar. gtts. 3).*  
*S. Nasensalbe.*



Ekzematöse Stellen an der äusseren Haut mit auf Leinwand aufgestrichener Salbe zu bedecken, wie:

Rp. 845.

*Ungu. Diachylon Hebra 20·0.*  
*S. Salbe.*

## Diphtheritis narium. Primärer Nasencroup, Nasendiphtheritis.

Mehrere Male im Tag Einspritzungen von Eiswasser oder von:

Rp. 846.

*Kal. chloric. 2·0,*  
*Aqu. dest. 150·0.*  
*S. Einspritzung.*

Rp. 847.

*Acid. carbolic. gtts. 6,*  
*Aqu. dest. 150·0.*  
*S. Einspritzung.*

Ferner auch:

Rp. 848.

*Liqu. Ferr. sesquichlorat.*  
*gtts. 8—10,*  
*Aqu. dest. 150·0.*  
*S. Aeusserlich.*

In neuerer Zeit auch Bepinselungen mit Milchsäure versucht.

Rp. 849.

*Acid. lactic. 5·0,*  
*Aqu. dest. 10·0.*  
*S. Zum Einpinseln.*

Gegen das Fieber Chinin, Antipyrin; Waschungen mit kaltem Wasser oder mit zur Hälfte mit Wasser verdünntem Essig. Um der Anämie vorzubeugen, vom Beginne an:

Rp. 850.

*Tinct. nervino-tonic.*  
*Bestuscheffii gtts. 10,*  
*Aqu. dest. 70·0,*  
*Syr. simpl. 10·0.*  
*M. D. S. 2stündlich*  
*1 Kaffeelöffel.*

Wenn Verfall der Kräfte eintritt, schwarzer Kaffee mit Rum, russischer Thee mit Rum, oder Cognac, oder:

Rp. 851.

*Aether. sulfur. gtts. 10,*  
*Mixtur. gummos. 70·0,*  
*Syr. simpl. 10·0.*  
*M. D. S. 1—3stündlich*  
*1 Kaffeelöffel.*

**Stomatitis catarrhalis. Katarrh der Mundschleimhaut.**

Fleissige Reinigung des Mundes mit kaltem Wasser oder mit: Bei Säuglingen statt dessen:

Rp. 852.	Rp. 853
<i>Kal. chloric. 0·5 - 1·0,</i>	<i>Borac. venet. 1·0,</i>
<i>Aqu. dest. 100·0.</i>	<i>Aqu. dest. 100·0.</i>
<i>S. Mundwasser</i>	<i>S. Zum Reinigen des Mundes.</i>

**Stomatitis aphthosa. Aphthen.** Kalte Getränke, Eiswasser, in Eis gekühltes Sodawasser, Eispillen, Fruchteis. Bei Fieber entsprechend eingeschränkte Diät. Die Nahrungsmittel gut flüssig und ausgekühlt.

Rp. 854.	Grossere Aphthen-Geschwüre mit Lapis zu touchiren.
<i>Kal. chloric. 1·0,</i>	
<i>Aqu. dest. 70·0,</i>	
<i>Syr. simpl. 10·0.</i>	
<i>D. S. 2stündl. 1 Kaffee.</i>	

Daneben als Mundwasser:	Bei Säuglingen:
Rp. 855.	Rp. 866.
<i>Kal. chloric. 2·0,</i>	<i>Borac. ven. 2·0,</i>
<i>Aqu. dest. 150·0.</i>	<i>Aqu. dest. 100·0.</i>
<i>S. Mundwasser.</i>	<i>S. Mundwasser.</i>

**Stomacace. Mundfäule.** Reinhalten des Mundes durch zweistündlich zu wiederholendes Ausspülen mit reinem, kaltem Brunnenwasser; einmal täglich die erkrankte Stelle vom Arzt selbst mit Salicyl-Watte abzuwischen. Ferner ein Mundwasser von *Kal. chloric.* (s. Rp. 855).

Bei stark gelockerter, nicht blutender Schleimhaut Touchirung mit 1 $\frac{1}{10}$ iger Lapislösung. Schiefstehende Zahnwurzeln zu entternen. Nach der Genesung noch sorgfältige Pflege und Reinigung des Mundes fortzusetzen.

**Soor. Mehlhund.** Energische, jedoch ohne Verletzung des Kindes vorzunehmende Reinigung des Mundes vor und nach jedem Saugen mit einem in ein geeignetes Mundwasser getauchten Leinwandfleck; man verwendet hierzu:

Rp. 857.

*Borac. venet.* 1·0,  
*Aqu. font.* 100·0.  
*D. S. Mundwasser.*

Oder:

Rp. 858.

*Natr. bicarbonic.* 0·5,  
*Aqu. dest.* 150·0.  
*S. Mundwasser.*

Jeder zuckerhaltige Zusatz zu diesen Mundwässern zu vermeiden.

Die Reinigung des Mundes noch lange nach der Genesung fleissig fortzusetzen.

**Noma. Wangenbrand.** Behufs der Prophylaxis bei allen schweren Infectiouskrankheiten tägliche Inspection und Reinigung des Mundes. Bei bereits ausgebrochener Erkrankung roborirende Allgemeinbehandlung; kräftige Fleischbrühe, Milch, Wein etc.

Rp. 859.

*Decoct. cort. Chin. reg.*  
*e* 1·0 : 100·0,  
*Syr. cort. Aurant.* 10·0.  
*M. D. S.* 2stündlich  
1 Kinderlöffel.

Oder:

Rp. 860.

*Tinct. Chin. compos.,*  
*Tinct. Rhei Dar. aā* 20 0.  
*D. S.* 2stündlich 10 15  
Tropfen auf Zucker.

Nach Bildung einer Demarcation Entfernung des gangränösen Stückes, Aetzung der Ränder mit rauchender Salpetersäure oder concentrirter Carbolsäure, ebenso beim ersten Auftreten der Krankheit energische Auskratzung mit dem scharfen Löffel und danach Aetzung mit rauchender Salpetersäure oder mit Ferrum candens.

**Anchyloglosson. Angeborene Verkürzung des Zungenbändchens. „Angewachsene Zunge.“** Operative Behandlung nur dann nothwendig, wenn die

Zungenspitze den Kiefferrand nicht erreichen kann, wird aber von den Eltern auch bei geringeren Graden gefordert. Bei der Operation das Kind, dessen Extremitäten gut in eine Decke eingewickelt, horizontal auf dem Arm zu halten; der Arzt schiebt das mit einem Einschnitt versehene Spatelende unter die Zunge, so dass das gespannte Zungenbändchen in den Einschnitt hineinreicht; dieses wird nun, soweit es weiss ist, mit einem Schlag der Hohlsechere durchtrennt. Blutstillung dadurch, dass man das Kind saugen lässt; dasselbe noch durch 1—2 Stunden in Beobachtung zu halten

**Angina. Halsentzündung. Amygdalitis. Angina tonsillaris. Mandelentzündung.** Prophylaktisch, d. h. zur Vermeidung von Recidiven zweckmässige Abhärtung durch Kälte. Bei Kindern unter 2 Jahren Bäder, Anfangs von 27° R., dann jeden Tag um einen Grad sinken bis auf 23—22° R. Bei über 2 Jahre alten Kindern kalte Waschungen, zuerst mit gestandenem Wasser von Zimmertemperatur, allmählich mit kälterem Wasser, bis zu frischem Brunnenwasser, diese Waschungen am besten Abends mit gut ausgedrücktem Schwamme vorzunehmen. Grössere Kinder sollen im Sommer kalt baden, schwimmen.

Bei bestehender Krankheit Vermeidung von Staub, Aufenthalt in gut gelüftetem Zimmer bei gleichmässiger Temperatur. Bei stärkerem Fieber Bettruhe, säuerliche Getränke, eventuell ein leichtes Laxans, wie:

Rp. 861.

*Tinct. Rhei aquos.* 5·0,  
*Aqu. destillat.* 70·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
S. 2stündlich 1 Kaffee-  
löffel.

Local kalte, fleissig zu wechselnde Umschläge um den Hals, Eispillen oder Fruchteis, Eiswasser zum Getränk. Bei Kindern, die

schon gurgeln können, ein leichtes Gurgelwasser, wie:

Rp. 862.

*Kal chloric.* 6·0,  
*Aqu. destillat* 300·0.  
D. S. Gurgelwasser.

Oder:

Rp. 863.

*Borac. venet.* 10·0,  
*Aqu. dest.* 300·0.  
D. S. Gurgelwasser.

Bei Entzündung der Mandeln Touchirung mit Lapis, namentlich an den grubigen Einziehungen und Geschwürchen; Tonsillarabscesse mittelst mit Heftpflaster bis zur Spitze gedeckten Spitzbistourris zu eröffnen. Nach Ablauf der acuten Entzündung bei zurückbleibender Hypertrophie der Mandeln Tonsillotomie.

**Diphtheritis faucium. Rachendiphtheritis, Rachenbräune.** a) Localbehandlung: Das Wichtigste ist Kälte: Umschläge mit vorher auf Eis gelegten Compressen, Tag und Nacht alle 5 Minuten zu wechseln, oder besser Eiscravatte, bei hochgradigen Collapserscheinungen auszusetzen. Innerlich Eispillen, gezuckert, oder Fruchteis, wenn sich die Kinder dagegen weigern, fleissiges Trinken kleiner Portionen Eiswasser. Grössere Kinder lässt man auch mit einem entsprechenden Mundwasser gurgeln. Man verwendet eine der folgenden Lösungen:

Rp. 864.

*Kal. chloric. 4·0,  
Aqu. dest. 300·0.  
D. S. Gurgelwasser.*

Oder:

Rp. 865.

*Alum. crud. 2·0,  
Aqu. dest. 300·0.  
D. S. Gurgelwasser.*

Rp. 866.

*Acid. carbolic. gtts. 20,  
Aqu. dest. 300·0.  
D. S. Gurgelwasser.*

Oder:

Rp. 867.

*Aqu. Calc.,  
Aqu. dest. aa 150·0.  
D. S. Gurgelwasser.*

Rp. 868.

*Acid. salicylic. 2·0,  
Spir. vin. q. s. ad sol.,  
Aqu. dest. 300·0.  
D. S. Gurgelwasser.*

Oder:

Rp. 869.

*Kal. hypermangan. 0·15,  
Aqu. dest. 300·0.  
D. S. Gurgelwasser.*

Bei localisirten, streng begrenzten diphtheritischen Geschwüren Aetzung mit:

Rp. 870.

*Acid. lact. conc. pur. 20·0.  
D. S. Täglich einmal  
mittelst Wattepinsels  
aufzutragen.*

Bei gangränösem Zerfall einmalige Bepinselung mit:

Rp. 871.

*Acid carbolic.* 2·0,  
*Spir. vin. rectificat.* 20 0.  
*D. S.* Zum Bepinseln.

b) Allgemeinbehandlung: Diät trotz des Fiebers möglichst nahrhaft, Bouillon mit Ei, kalte Milch, rohes gehacktes Fleisch etc. Gegen Stuhlverstopfung Klystiere.

(Gegen das Fieber:

Rp. 872.

*Chinin. sulfuric.* 1·0,  
*Sacch. alb.* 2·0  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 6.*  
*D. S.* 3stündl. 1 Pulver.

Oder:

Rp. 873.

*Antipyrin.* 2·5 - 5·0.  
*Div. in dos aequ. No 10.*  
*D. S.* Stündl. 1 Pulver  
bis zu starkem Temperaturabfall.

Rp. 874.

*Antifebrin.* 0·5 - 1·0,  
*Sacch. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 5.*  
*D. S.* 1 Pulver, eventuell  
nach 1 Stunde ein  
zweites.

Bei erschwertem Schlingen Chinin in Lösung, also:

Rp. 875.

*Chinin. sulfuric.* 0·5,  
*Acid sulfuric. dil. q. s.,*  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S.* Früh und Abends  
die Hälfte.

(Die stärkeren Fiebermittel, namentlich Antipyrin und Antifebrin, nur bei genauer Controle der Temperatur mittelst des Thermometers zu reichen, die Temperatur stündlich zu messen und bei starkem Abfall derselben das Antipyreticum auszusetzen.)

Ferner kann man innerlich Kal. chloric. geben, dasselbe jedoch bei Albuminurie contraindicirt. Man verschreibt für kleinere Kinder:

Rp. 876.

*Kal. chloric.* 0·5 - 0·8,  
*Aqu. dest.* 70·0,  
*Syr. rub. Idaei* 10·0.  
*M D. S.* Stündl. 1 Kaffeel.



Bei grösseren Kindern:  
Rp. 877.

*Kal. chloric.* 1·0—1·5,  
*Aqu. dest.* 70·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*M. D.S. Stündl.* 1 Kaffee-  
löffel.

Oder:  
Rp. 878.

*Liqu. ferr. sesquichlor.*  
*gtts.* 6,  
*Aqu. dest.* 70·0,  
*Syr. cort. Aurant.* 10·0.  
*D. S. 2stündl.* 1 Kaffee.

Bei Eintritt von Collaps heisser russischer Thee mit Rum, schwarzer Kaffee mit Cognac, erwärmter rother Wein. Die Extremitäten in warme Leintücher zu hüllen. Warme Essigwaschungen.

Rp. 879.

*Camphor ras.* 0·2—0·5,  
*Spir. vin q. s ad sol.*,  
*Mixtur. gummos.* 70·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S. 2—3stündlich* 1  
Kaffeelöffel.

Oder:  
Rp. 880.

*Mosch. oriental.* 0·3—0·5,  
*Sacch. alb.* 3·0  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aegu. Nr. 10.*  
*D. S. 2stündlich* 1 Pulv.

Zur Nachbehandlung kräftige Fleischnahrung, Eisen oder Gebrauch von eisenhaltigen Mineralwässern, wie Spaa, Pyrmont, Franzensbad.

c) Behandlung der diphtheritischen Lähmungen. Neben kräftiger Nahrung Gebrauch eines Eisenpräparates, wie:

Rp. 881.

*Ferr. carbonic. saccha-*  
*rat.* 1·0,  
*Chinin. sulfuric.* 0·5,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aegu. No. 10.*  
*D. S. 3mal tägl.* 1 Pulv.

Faradisirung der ge-  
lähmten Muskeln. In hart-

näckigen Fällen und insbe-  
sondere bei Lähmung der  
Respirationsmuskeln neuer-  
lich empfohlen:

Rp. 882.

*Strychnin. nitric.*  
*0·01—0·03,*  
*Aqu. dest.* 10·0.  
*S. Täglich* 1 Pravaz'sche  
Spritze zu injiciren.



**Laryngitis catarrhalis. Acuter Kehlkopfkatarrh.**

**Pseudocroup.** Prophylaktisch bei zu Katarrhen disponirten Kindern entsprechende Abhärtung durch Bäder und kalte Waschungen s. Angina S. 216. Im Sommer Aufenthalt in Gebirgsgegend mit Soolen Ischl. Reichenhall, Hallein, Aussee und Gebrauch von Kochsalzinhalationen daselbst.

Bei einem Anfall von Pseudocroup das Kind wach zu erhalten, demselben alle 2—3 Minuten löffelweise warme Flüssigkeit zu geben, wie warmes Zuckerwasser, warme Limonade, Eibischthee, Lindenblüthentheee. Fleissig zu wechselnde Umschläge um den Hals von warmem Wasser oder Oel, oder mit Haarlinsen oder Leinsamen. Die Luft des Zimmers durch auf dem Ofen oder über einer Spirituslampe verdampfendes Wasser feucht zu erhalten. Bei reichlichem Secret, starkem Rasseln und Pfeifen bei der Athmung ein Brechmittel zu geben: zunächst Anregung des Erbrechens durch reichliche Zufuhr warmen Getrankes und durch Kitzeln des Gaumens mit einer Feder. Wenn dies nicht wirkt:

Rp. 883.

*Tartar. emetic.* 0·05 – 0·1,

*Linct. gummos.* 50·0.

*D. S.* Alle 10 Minuten 1

Kaffeelöffel, im Ganzen  
2—3.

Rp. 884.

*Inf. rad. Ipecacuanh.*

*e* 10:70·0,

*Syr. simpl.* 10·0.

*D. S.* Alle 10 Minuten  
ein Esslöffel bis zur  
Wirkung.

Nach Aufhören des Anfalls Behandlung des eigentlichen Katarrhs. Aufenthalt in gleichmässig temperirter Zimmerluft (16° R.).

Innerlicher Gebrauch von:

Rp. 885.

*Inf. rad. Ipecacuanh. e* 0·1:70·0,

*Natr. bicarbonic.* 0·1,

*Syr. capillor. Vener.* 10·0.

*M. D. S.* 2stündl. 1 Kaffeelöffel.

**Rp. 886.**

*Sal. ammoniac dep.* 1·0,  
*Aqu. dest.* 70·0,  
*Syr. rub. Idaei* 20·0.  
*M. D. S.* 2stündl. 1 Kaffee-  
löffel.

Bei starkem Hustenreiz  
leichte Narcotica, wie:

**Rp. 888.**

*Inf. rad Ipec. e* 0·15 0·2 : 70·0,  
*Extr. Hyoscyami* 0·1,  
*Syr. rub. Idaei* 10·0.  
*D. S.* 2—3stündlich 1 Kaffeelöffel.

Für die nächste Nacht nach einem Anfall von Pseudo-  
croup die nöthigen Verhaltungsmaassregeln zu geben;  
fleissig warmes Getränk zu reichen; sowie sich bellender  
Husten einstellt, das Kind durch 1—2 Stunden wach  
zu erhalten.

**Laryngitis crouposa. Croup.** Das Krankenzimmer  
fleissig zu lüften, eventuell die Fenster offen zu lassen,  
und wenn schon Erstickungsanfälle auftreten, das Kind  
an das offene Fenster zu setzen. Die Luft des Zimmers  
durch Wasserdämpfe feucht zu erhalten. Leicht verdau-  
liche Nahrung: Milch, weiche Eier, geschabtes Fleisch,  
Thee mit Milch oder Rum, Chaudeau; bei Verfall der  
Kräfte starker schwarzer Kaffee mit Cognac, Weinsuppe,  
erwärmter Rothwein etc. Gegen das Fieber:

**Rp. 889.**

*Chin. sulfuric.* 0·5—1·0,  
*Sacch. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 5.*  
*D. S.* Abends 2—3 Pul-  
ver in 1stünd. Pausen:

**Rp. 887.**

*Sal. ammoniac. dep.* 0·5,  
*Extr. Cannab. Indic.*  
0·05 0·1,  
*Elaeosacch. Foenicul.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 6.*  
*D. S.* 2—3stündl. 1 Pulv.

Ebenso:

**Rp. 890.**

*Antipyrin.,*  
*Sacch. alb. aa* 1·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 4.*  
*D. S.* Abends 2 Pulver  
in 1stündiger Pause.

Oft nehmen die Kinder die Medicamente besser in Lösung:

Rp. 891.

*Chinin. sulfuric. 1·0,*  
*Acid. sulfuric. q. s. ad*  
*sol.,*  
*Mictur. gummos.,*  
*Syr. simpl. aa 30·0.*  
*D. S. Abends 1 2 Ess-*  
*löffel.*

Weigert sich das Kind, das Medicament zu nehmen, dasselbe in Klysmenform zu geben, nach vorausgegangenem Reinigungsklystier.

Rp. 892.

*Chinin. sulfuric. 1·0,*  
*Acid. sulfuric. q. s.,*  
*Aqu. font. 50·0.*  
*D. S. Auf 2 Klystiere.*

Local im Stadium der Exsudation Eis: alle 5 Minuten zu wechselnde Eisumschläge, innerlich Eispillen, Fruchteis. Daneben Inhalationen mittelst des Richardson'schen oder des Siegle'schen Inhalationsapparates. Zur Inhalation verwendet man Wasserdämpfe oder 1—2percentige Lösungen von Kali chloric., Natrium chloratum, Natrium bicarbonic., Ammon. chlorat., Alaun, ebenso auch Aqua Calcis zu gleichen Theilen mit Wasser oder:

Rp. 893.

*Acid. lactic. gtts. 25,*  
*Aqu. dest. 100·0*  
*S. Zur Inhalation.*

Wenn die Membranen beginnen sich zu lösen und zu lockern, Expectorantia in Verbindung mit stimulirenden Mitteln, wie:

Rp. 894

*Inf. rad. Polygal. Seneg.*  
*e 5·0—8·0 · 70·0,*  
*Liqu. Ammon. anisat.*  
*gtts. 20,*  
*Syr. simpl. 10·0.*  
*M. D. S. 1 -2stündlich*  
*1 Kaffeelöffel.*

Rp. 895.

*Inf. rad. Ipecacuanh.*  
*e 0·15:70 0,*  
*Aether. sulfuric.*  
*gtts. 10 - 20,*  
*Syr. capill. Veneris 20·0.*  
*M. D. S. 1—2stündlich*  
*1 Kaffeelöffel.*

Bei reichlichem Secret in den Luftwegen, wenn das Flottiren von Membranen zu hören ist, kann man bei muskelkräftigen Kindern einmal ein Emeticum geben. Man lässt das Kind reichlich warme Flüssigkeiten zu sich nehmen, hierauf reicht man:

Rp. 896.

*Tart. emetic.* 0·05 – 0·1,  
*Linct. gummos.* 30·0.

*D. S.* Die Hälfte auf einmal, dann alle 10 Minuten 1 Kaffeelöffel bis zur Wirkung.

Rp. 897.

*Pulv. rad. Ipecac.* 1·0,  
*Infunde cum Aqu. ferv.*  
*q. s. ad col.* 40·0,  
*Syr. Ipecacuanh.* 5·0.  
*M. D. S.* Wie das Vorige.

Rp. 898.

*Apomorphin. mur.* 0·02,  
*Aqu. dest.* 10·0.  
*M. D. S.*  $\frac{1}{2}$  – 1 Pravazsche Spritze zu injicir.

In neuerer Zeit wurden versucht und oft mit sehr gu-

tem Erfolge: Quecksilber-einreibungen als Abortivkur:

Rp. 899.

*Ungu. ciner.,*  
*Ungu. simpl. aa* 6·0.  
*M. f. ungu. Div. in dos.*  
*aequ. No. 6.*  
*D. S.* Stündlich 1 Dose einzureiben, je nach dem Alter des Kindes im Ganzen 3 – 6 Dosen.

Daneben:

Rp. 900.

*Merc. subl. corr.* 0·01,  
*Vitell. ori. unius,*  
*Aqu. dest.* 70·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*M. D. S.* 2stündl. 1 Kaffeelöffel

Oder:

Rp. 901.

*Calomelan. laevigat.* 0·6,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos aequal No. 10*  
*D. S.* Stündl. 1 Pulv., im Ganzen 3 – 6 Pulv.

Wenn das Stadium asphycticum begonnen, oder noch früher, wenn der letzte Erstickungsanfall so stark war, dass man fürchten muss, das Kind werde den folgenden nicht mehr überstehen, namentlich aber wenn bleibende

Cyanose eingetreten, unverzüglich Tracheotomie, oder Tubage nach Olwyer wenn der Croup localisirt, das Kind über 3 Jahre alt ist und keine Complication vorliegt).

Die Wunde nach der Tracheotomie mit passend zugeschnittener Jodoformgaze u. darüber Billroth-Battist zu verbinden. Der Verband täglich 1—2 mal zu wechseln, dabei die Wunde mit in 2 %ige Carbollösung getauchten Wattbänschchen zu reinigen. In der Trachea oder der Canüle sich ansammelndes Secret durch Einführen eines reinen Federhahnes herauszubefördern. Die innere Canüle oft herauszunehmen und zu reinigen. Behufs Verflüssigung und leichter Herausbeförderung des Schleimes die Luft durch Wasserdämpfe stets feucht zu erhalten, am besten mittelst Sprays oder Siegle'schen Apparates den Kranken ununterbrochen inhaliren zu lassen, indem man den Dampfstrahl auf die Canülenöffnung richtet. Man verwendet:

Rp. 902

*Aqu. Calc.*  
*Aqu. dest. aa 300.0.*  
*S. Inhalation.*

Oder:

Rp. 903.

*Natr. salicylic. 10.0,*  
*Aqu. dest. 500.0.*  
*S. Inhalation.*

Ferner innerlich Expectorantia (s. Rp. 894, 895), oder:  
Rp. 904. *Apomorphin mur. 0.01.*

*Liqu. Ammon. anisat. gttss. 20.*

*Aqu. dest. 500.0.*

*Syr. simpl. 200.0.*

*S. 2stündlich 1 Kaffeelöffel*

Im Uebrigen entsprechende Behandlung fortbestehenden Fiebers oder etwa eintretenden Collapses

Die äussere Canüle erst in 3—4 Tagen behufs Reinigung zu entfernen. Definitive Entfernung der Canüle nicht vor dem zehnten Tage, im Allgemeinen nicht, so lange sich noch Membranen im Kehlkopf abstossen, auch muss man immer vor der Entfernung der Canüle versuchen, ob das Kind bei mit dem Finger oder einem Stöpsel verschlossener Canüle genug Luft hat.



**Laryngospasmus. Stimmritzenkrampf.** Im Anfall ein nasses Handtuch auf die Brust zu legen, Wasser ins Gesicht zu spritzen. Ist der Arzt bei dem Anfall zugegen, so öffne er mit dem Finger den Mund des Kindes und ziehe die Zunge nach vorne. Nach dem Anfall Bromkali in gehäufte Dosis.

Rp. 905.

*Kal. bromat.* 3·0—6·0.  
*Div. in dos. aequ. No 6.*  
*D. S. Früh und Abends*  
*1 Pulver in Milch.*

Oder :

Rp. 906.

*Chloral. hydrat.* 0·1—0·5,  
*Aqu. font.,*  
*Syr. rub. Idaei*  $\bar{u}\bar{a}$  20·0.  
*M. D. S. 3—4mal täg-*  
*lich 1 Kaffeelöffel.*

Auch Chloroform intern:

Rp. 907.

*Chloroformi gtts.* 5—10,  
*Aqu. dest.* 25·0,  
*Glycerin.* 5·0.  
*M. D. S. 1 Kaffeelöffel halbstündlich; dann nach*  
*Beruhigung 1—2stündlich.*

Bei kleinen Kindern antirachitische Behandlung, Ammenmilch, Leberthran.

**Bronchitis. Lungenkatarrh.** In leichten, acuten Fällen, beim sogenannten Bronchokatarrh leichte Expectorantia, z. B. bei kleinen Kindern:

Rp. 908. *Mixtur. gummos.* 100·0,  
*Syr. Ipecac.* 10·0.  
*S. 2stündlich 1 Kaffeelöffel.*

Bei grösseren Kindern:

Rp. 909.

*Inf. rad. Ipecac.*  
*e* 0·15 : 70·0,  
*Natr. bicarbon.* 0·3,  
*Syr. capillor. Vener.* 10·0.  
*M. D. S. 2stündl. 1 Kaffeel.*

Rp. 910.

*Inf. rad. Ipecacuanh.*  
*e* 0·15 : 70·0,  
*Sal. ammon. dep.* 0·3—0·6,  
*Syr. Althaeae* 10·0  
*M. D. S. 2stündlich*  
*1 Kaffeelöffel.*

Mässiger Hustenreiz ist nicht zu bekämpfen, nur wenn derselbe sehr stark und quälend ist, gibt man leichte Narcotica; Opium und Morphin nur in schweren Fällen bei unertraglichem Hustenreiz, wenn die anderen, vorher zu versuchenden Mittel nicht wirken.

Rp. 911.

*Mixtur. oleos. 70 0,*  
*Aqu. Laurocer. gtts 10 20,*  
*Syr. simpl. 10 0.*  
*M. D. S. 2stündlich 1 Kaffeelöffel.*

Inhalationen von Wasserdämpfen oder von Terpentinöl bei grösseren Kindern angezeigt. Wenn der Katarrh droht chronisch zu werden, Regelung der Diät, leichte Eisenpräparate, Leberthran, Steinsalzbäder. Zur Verhütung von Recidiven Abhärtung gegen Witterungseinflüsse, im Sommer Aufenthalt in wasserreichen Gebirgsgegenden oder am Meere.

Bei der fieberhaften, heftigen Bronchitis Anfangs expectatives Verhalten, Milderung des Hustenreizes durch Rp. 911 oder:

Rp. 912.

*Extr. Hyoscyam. 0.02,*  
*Sacch. alb. 2.0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S. 2stündlich 1 Pulver.*

Bei hohem Fieber Chinin. Kleine Kinder fleissig herumzutragen, ihre Lage oft zu wechseln. Nach Auftreten von Rasselgeräuschen Priessnitz'sche Umschläge um den Thorax, sowie die oben genannten Expectorantia, eventuell bei sehr reichlicher Secretion und hochgradiger Dyspnoë eine Apomorphin-Injection, (Rp. 898) oder:

Rp. 913.

*Tart. emetic. 0.05,*  
*Linct. gummos. 30 0*  
*M. D. S. In 2 Portionen zu nehmen.*



In hochgradigen Fällen von Bronchitis, namentlich wenn die feinsten Bronchien mit ergriffen sind (Bronchitis capillaris) die Expectorantia mit excitirenden Mitteln zu verbinden.  
Rp. 914.

*Inf. rad. Ipecacuanh.*  
e 0 15 : 70 0,  
*Liqu. Ammon. anisat.*  
gtts. 20,  
*Syr. cort. Aurant.* 20 0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kaffee-  
löffel.

Rp. 915.

*Inf. rad. Polygal. Seneg.*  
e 2 0 — 5 0 : 70 0,  
*Liqu. Ammon. anisat.*  
gtts. 20,  
*Syr. Senegae* 20 0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kaffee-  
löffel.

Bei Bestand von Darm-  
affectionen Senega zu ver-  
meiden und nur die Am-  
monium-Präparate zu geben,  
also:

Rp. 916.

*Liqu. Ammon. anisat.*  
gtts. 15 — 20,  
*Aqu. Foenicul.,*  
*Aqu. dest. aa* 40 0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kaffee-  
löffel.

Rp. 917.

*Ammon. carbonic. sicc.*  
0 2,  
*Sacch. alb.* 2 0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*æqu. No. 6.*  
*D. S.* 2—3stündlich 1  
Pulver.

Sehr zweckmässig auch Inhalationen von Terpentinöl:  
Bei kleineren Kindern lässt man einfach einen Topf heissen  
Wassers mit 5—10 Tropfen Terpentin vor ihnen ver-  
dampfen, grössere Kinder sollen den Kopf über den Topf  
halten und über das Gefäss und den Kopf des Kindes  
ein Tuch gebreitet werden. Zur Nachbehandlung der  
Krankheit kräftige Fleischkost, Aufenthalt auf dem Lande,  
Eisen.

Bei der chronischen Bronchitis, bei der es meist  
auch zur Vergrösserung der Bronchialdrüsen  
kömmt, gute Nahrung, Leberthran, bei kleinen Kindern  
antirachitische Behandlung. Behufs Verminderung der  
Drüsenschwellung:

Rp. 918.

*Kal. iodat.* 0 2—0 3.

*Aqu. dest.* 70 0.

*Syr. cort. Aurant.* 10 0.

*M. D. S.* 2stündlich

1 Kaffeelöffel.

Rp. 919.

*Syr. Ferr. iod.* 2 0—4 0.

*Aqu. dest.*

*Syr. simpl.* aa 20 0.

*D. S.* 3mal tägl. 1 Kaffeelöffel.

Bei reichlichem Secret in den Bronchien entsprechende Expectorantia, eventuell in dringenden Fällen ein Emeticum.

**Pertussis. Tussis convulsiva. Keuchhusten.** Wenn möglich Vertauschung des städtischen Wohnortes mit Landaufenthalt. Bei gutem Wetter fleissiger Aufenthalt im Freien, bei schlechtem und im Winter verbleibe das Kind im gut gelüfteten Zimmer. Nahrung kräftig, besonders aus Fleisch, Milch und Suppe bestehend, oft zu geben, am besten immer gleich nach einem Anfall. In medicamentöser Beziehung Gebrauch von:

Rp. 920.

*Pulv. rad. Bellad.* 0 1,

*Natr. bicarbon.* 0 4,

*Sacch. alb.* 2 0

*M. f. pulv. Div. in dos.*

*aqu. No. 10.*

*D. S.* 3stündlich 1 Pulver.

Rp. 921

*Tinct. Belladonn.*

*qtts.* 2 10.

*Aqu. dest.* 70 0.

*Syr. rub. Idac.* 10 0.

*D. S.* 2stündl. 1 Kaffeelöffel.

In sehr schweren Fällen:

Rp. 922.

*Atrop. sulf.* 0 001—0 002,

*Aqu. dest.* 70 0.

*D. S.* 3—4mal tägl. 1—2

Tropfen auf Zucker

(Alle diese Recepte bei den ersten Zeichen von Atropin-Intoxication auszusetzen.)

Statt Belladonna auch andere Narcotica gebraucht Morphin jedoch zu vermeiden, am meisten Bromsalze:

Rp. 923

*Natr. bromat.* 1 0,

*Aqu. dest.* 70 0,

*Syr. rub. Idac.* 10 0,

*D. S.* 2stündl. 1 Kaffeel.

Rp. 924

*Ammon. brom.* 1 0—3 0,

*Sacch. alb.* 3 0.

*M. f. pulv. Div. in dos.*

*aqu. No. 10.*

*D. S.* 5mal tägl. 1 Pulver

in Wasser aufgelöst.

In neuerer Zeit mit gutem Erfolg gebraucht: Chinin, und zwar Bepinselungen des Kehlkopfs mit 1 percentigen Lösungen, sowie intern:

Rp. 925.

*Chinin. muriat.* 1·0,  
(*Extr. Belladonn.* 0·05),  
*Natr. bicarbon.*,  
*Sacch. alb. aa* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 4—5mal täglich*  
*1 Pulver.*

Ebenso hat sich sehr gut bewährt:

Rp. 926.

*Antipyrin.* 1·0—5·0,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*S. 2—3mal täglich*  
*1 Pulver.*

Rp. 927.

*Resorcini* 0·1—0·5,  
*Inf. Chamomill.* 70·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*M. D. S. 2stündlich*  
*1 Kaffeelöffel.*

Ferner auch:

Rp. 930.

*Resorcin. pur.* 0·3,  
*Aqu. dest.* 30·0.  
*D. S. Zum Bepinseln des Kehlkopfs.*

Im katarrhalischen Stadium Behandlung wie bei Bronchitis. Als Nachkur Aufenthalt in nicht zu rauher Gebirgsgegend, im Winter eventuell auch im Süden.

Oder:

Rp. 928.

*Bromoform.* 0·1—0·5,  
*Spir. vini rectific.* 4·0,  
*Aqu. dest.* 70·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*M. D. S. 2stündlich*  
*1 Kaffeelöffel.*

Von grossem Werth sind Inhalationen von Ol. Terebinthin. rectificat. oder Benzin (zweimal des Tags einige Tropfen auf ein Gefäss warmen Wassers), sowie von 1% iger Carbollösung oder von Naphtalin (2mal täglich 20 Gramm in einer Porzellanschale über einer Spiritusflamme verdampfen zu lassen.)

In neuerer Zeit auch als wirksam befunden Bepinselungen des Kehlkopfs mit 5% iger Cocainlösung, sowie Inhalation von:

Rp. 929.

*Cocain. muriatic.* 2·0,  
*Aqu. dest.* 100·0.  
*S. Inhalation.*

**Atelectasia pulmonum. Luftleere der Lungen.**

**Bronchitis suffocativa.** Ernährung durch die Brust; oder wenn das Kind schlecht saugt, die Milch abzumelken und mit dem Löffel, am besten durch die Nase, zu geben. Jede halbe bis ganze Stunde Nahrung zu reichen. Zur Anregung der Respiration am besten Faradisation mittelst schwacher Ströme, sobald die Athmung weniger tief wird, zu wiederholen; der eine Pol an den Proc. xiphoides, der andere an die Wirbelsäule anzusetzen. Dauer der Sitzung Anfangs einige Secunden, allmählich länger. Senfbäder: Eine Hand voll Senfmehl in ein Tuch gegeben, mit demselben in das Badewasser von 24–25° R. zu halten, bis zur Entwicklung eines stechenden Geruchs; das Kind im Bade zu lassen, bis die Haut lebhaft roth wird, etwa 2–3 Minuten. Innerlich Expectorantia und Excitantia.

Rp. 931. *Liqu. Ammon. anisat.* 1·0,

*Aqu. dest.* 40·0.

*D. S.* 2stündlich 1 Kaffeelöffel.

Daneben starker russischer Thee mit Cognac oder Rum.

**Pneumonia. Lungenentzündung.** Säuglinge fleissig

auf dem Arme zu tragen mit häufiger Veränderung der Lage; die Brust oder die künstliche Nahrung öfter zu reichen, als bei gesunden Kindern. Bei grösseren Kindern Bettruhe, aber häufiger Lagewechsel; Nahrung bis zum Abfall des Fiebers aus Milch und Suppe bestehend, gegen den Durst am besten frisches Wasser; bei beginnendem Collaps Wein, Thee mit Rum. Priessnitz'sche Einwicklungen des Thorax sehr wirksam. Gegen das Fieber Chinin, bei starker Pulsbeschleunigung auch:

Rp. 932.

*Inf. fol. Digital. purp.*  
*e* 0·1—0·2 : 70·0,

*Liqu. Kal. acetic. gtt.* 20,

*Syr. rub. Idari* 10·0.

*D. S.* 2stündl. 1 Kaffeelöffel.  
*bis Kinderlöffel.*

Gegen den Hustenreiz,  
bei Säuglingen:

Rp. 933.

*Mixtur. oleos.* 70·0,

*Aqu. Lauroc. gtt.* 10–15,

*Syr. Althaeae* 20·0.

*D. S.* 2stündl. 1 Kaffeel.

Bei grösseren Kindern:

Rp. 934.

*Mixtur. oleos.* 70·0,  
*Tinct. Opii simpl. gtts.* 4—5,  
*Syr. rub. Idaei* 10·0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kaffeelöffel.

Nach Eintritt der Lösung  
Expectorantia (s. Bronchitis  
S. 225 ff.):

Rp. 935.

*Inf. rad. Inpecacuanh.*  
*e* 0·15:70·0,  
*Tinct. Chin. simpl. gtts.* 15,  
*Syr. capillor. Vener.* 20·0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kaffeel.

Rp. 936.

*Inf. rad. Polygal. Seneg.*  
*e* 5·0:70·0,  
*Tinct. Ferr. pomat.*  
*gtts.* 15,  
*Syr. Althaeae* 20·0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kaffeelöffel.

Nach gänzlicher Ausheilung der Krankheit zur Vermeidung von Recidiven vorsichtige Abhärtung gegen Witterungseinflüsse. Schwimmunterricht. Gebirgsluft.

**Tuberculosis pulmonum. Lungenschwindsucht.** Im Winter Aufenthalt in Nizza, Cannes, Meran, Mentone etc., im Sommer in gesunder Gebirgsgegend. Im Sommer auch Gebrauch von Emser, Gleichenberger, Giesshübler Wasser angezeigt; Molken-, Kumys-, Kefir-Kuren. Im Winter Gebrauch von Leberthran, 2—4 Kaffeelöffel pro die. In neuerer Zeit bei beginnender Phthisis Gebrauch von Creosot:

Rp. 937.

*Creosot. gtts.* 3—5,  
*Spir. Aether. gtts.* 10,  
*Cognac.* 2·0—3·0,  
*Aqu. dest.* 100·0.  
*S.* 3—4mal täglich ein Kaffeelöffel vor den Mahlzeiten.

(Bei Appetitlosigkeit auszusetzen.)

Kräftige Nahrung, namentlich viel gebratenes Fleisch.  
Bei Fieber längerer Gebrauch von mässigen Dosen Chinin.

Rp. 938.

*Chinin. sulfuric. 1·0,*  
*Acid. sulfur. q. s. ad sol.,*  
*Aqu. font.,*  
*Syr. rub. Idaei aa 40·0.*  
*M. D. S. 3mal täglich 1 Kaffeelöffel.*

Nach Ablauf des Fiebers fortgesetzter Gebrauch von Eisen.

Rp. 939.

*Ferr. lactic. 0·5,*  
*Chinin. sulfuric. 0·3,*  
*Sacch. alb. 3·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S. 3mal tägl. 1 Pulver.*

Gegen den Katarrh Expectorantia, sowie Inhalationen von Terpentin (3—8 Tropfen auf einen Topf warmen Wassers) oder von Kochsalzlösung (1%).

**Pleuritis. Rippenfellentzündung.** In den ersten Wochen expectative Behandlung. Bettruhe bei gleichmässiger Zimmertemperatur, Fieberdiät, nicht allzu reichliches Trinken, zur Stillung des Durstgefühles der Mund öfters mit frischem Wasser auszuspülen. Gegen die Schmerzen leichte, nicht beengende Priessnitz'sche Einwicklung des Thorax. Bei hohem Fieber Chinin, bei starker Pulsbeschleunigung ohne sonstige Circulationsstörungen:

Rp. 940.

*Inf. fol. Digital. purp. e 0·2:70·0,*  
*Aqu. Laurocer. gtts. 10,*  
*Syr. rub. Idaei 10·0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kaffeelöffel.*

Wenn das Exsudat stationär bleibt, das Fieber nachgelassen, noch durch einige Zeit leicht verdauliche Nahrung; bei gesunder Niere leichte Diuretica.

Rp. 941.

*Decoct. Ononid. spinos.*  
*e 3·0:100·0,*

*Liqu. Kal. acetic.*  
*gtts. 10—15,*

*Roob. Juniperi 20 0.*

*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

Oder:

Rp. 942.

*Dec Equiset. e 2·0:100·0,*

*Oxymell. Scill. 10·0,*

*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

Rp. 943.

*Diuretin. 3·0.*

*Div. in dos. aequ. No. 6.*

*S. 3—4 Pulver täglich.*

Rp. 944.

*Natr. salicyl. 2·0,*

*Aqu. dest. 70·0,*

*Syr. simpl. 10·0.*

*M. D. S. 2stündl. 1 Kaffee-  
löffel.*

Wenn das Exsudat jedoch eitrig ist und unter andauerndem Fieber langsam zunimmt, roborirende Behandlung: Milchdiät, kräftige Fleischbrühe, gebratenes oder rohes, fein zertheiltes Fleisch Mässig kalte Abreibungen. Landaufenthalt, sobald das Kind transportabel ist; später Aufenthalt im Süden:

Rp. 945.

*Chinin. sulfuric. 0·2,*

*Ferr. carbon. sacch. 0·15,*

*Sacch. alb. 2 0.*

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 6.*

*D. S. 3mal tägl. 1 Pulver.*

Rp. 946.

*Chinin. sulfuric. 0·4,*

*Acid. sulf. dil. q. s. ad sol.,*

*Aqu. destill.,*

*Syr. cort. Aur. aa 40 0,*

*Tinct. nervino-tonic.*

*Bestuscheff. gtts. 10—20.*

*D. S. 3stündl. 1 Kaffee-*

(Bei Eintritt einer Darmaffection die Eisenpräparate auszusetzen.)

Bei rascher Zunahme des Exsudats, sowie bei eitrigem Exsudat überhaupt Thoracocentese.

## Endocarditis. Entzündung des Endocardiums.

**Vitium cordis. Herzfehler.** Prophylaktisch bei zu Rheumatismen geneigten Kindern vorsichtige Abhärtung, Kaltwasserkuren Bei acuter Endocarditis absolute Ruhe; kalte Umschläge oder Leiter'scher Kühlapparat in der



Herzgegend. Bei beschleunigtem oder arhythmischem Puls Digitalis.

Rp. 947.

*Inf. fol. Digital. purp.*  
*e 0.1—0.2:70.0,*  
*Liqu. Kal. acetic. gtts. 20,*  
*Syr. rub. Idaei 20.0.*  
*M. D. S. 2stündlich*  
*1 Kaffeelöffel.*

Rp. 948.

*Pulv. fol. Dig. purp. 0.3,*  
*Chinin. sulfuric. 0.8,*  
*Sacch. alb. 3.0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 3stündl. 1 Pulver.*

Sowie Verlangsamung der Herzcontractionen eintritt, die Digitalis auszusetzen und ein indifferentes Mittel zu geben, wie:

Rp. 949.

*Acid. tartaric. 0.5,*  
*Aqu. dest. 70.0,*  
*Syr. simpl. 10.0.*  
*D. S. 2stündlich 1 Kaffeelöffel.*

Kinder mit Herzfehlern sind vor jeder körperlichen Anstrengung (Schwimmen, Bergsteigen, Tanzen), sowie vor jeder geistigen Aufregung zu bewahren. Jedoch mässige Bewegung im Freien angezeigt. Diät leicht verdaulich, Fleisch, Milch, Eier; dagegen blähende Gemüse, schwere Mehlspeisen zu meiden, ebenso Kaffee und Thee. Leichte Alcoholica in geringen Quantitäten gestattet. Bei starker Anämie vorsichtiger Eisengebrauch, bei eintretenden Compensationsstörungen Ruhe, Digitalis, (Rp. 947) oder:

Rp. 950.

*Tinct. Strophant. hisp. 15.0.*  
*S. 2mal täglich 5—10 Tropfen.*

**Dyspepsie.** Ermittlung und Beseitigung der Ursachen: bei Brustkindern Ueberfütterung (sehr häufige Ursache), zu alte Amme oder sonst schlechte Ammenmilch; bei *künstlich* genährten Kindern schlechte Milch oder *unzweckmässige* Nahrung. Dementsprechend Regelung der

Diät, eventuell Wechsel der Amme, für künstlich genährte Kinder sterilisirte Kuhmilch oder Biedert'sches Rahmgemenge, Liebig'sche Suppe (siehe unter „künstliche Ernährung“, S. 206), womöglich Ammenbrust. Bei mangelhafter Secretion von Seite des Magens, namentlich bei frühgeborenen Kindern:

Rp. 951.

*Pepsin. Germanic. 0·5—1·0,*

*Sacch. lact. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 4mal täglich 1 Pulver vor dem Trinken.*

Sehr gut ist das Pepsin lactated, 2—3mal täglich 1 Messerspitze vor dem Trinken.

Damit verbunden:

Rp. 952.

*Acid. muriat. dil. gtts. 10,*

*Aqu. dest. 100·0,*

*Syr. simpl. 10·0.*

*S. Nach der Einnahme  
des obigen Medicam.  
1 Kaffeelöffel.*

Oder bei Diarrhöe und  
Kolik:

Rp. 953.

*Acid. muriat. dil. gtts. 6,*

*Tinct. Opii simpl. gtt. 1,*

*Aqu. dest. 70·0,*

*Syr. simpl. 10·0.*

*S. 3mal täglich 1 Kaffeelöffel nach dem Trinken.*

Rp. 956.

*Bismuth. subnitric. 0·5,*

*Sacch. lact. 1·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 3mal tägl. 1 Pulv.*

Bei übermässiger Säurebildung:

Rp. 954.

*Natr. bicarbonic. 0·3,*

*Aqu. dest. 70·0,*

*Sacch. lact. 10·0.*

*M. D. S. 2stündlich  
1 Kaffeelöffel vor dem Trinken.*

Oder:

Rp. 955.

*Aqu. Calc.,*

*Aqu. dest. aa 50·0.*

*D. S. Vor jedem Trinken  
1 Kaffeelöffel.*

Bei Dyspepsie ohne Erscheinungen von Seite des Darms auch von Wirkung Auswaschen des Magens mit  $\frac{1}{3}\%$ iger Lösung von Natr. bicarbon. oder benzoic.

Ferner:

Rp. 957.

*Argent. nitric.* 0·01—0·02,  
*Aqu. dest.* 100·0.

*Da in vitr. caerul.*

*S.* 2stündlich 1 Kaffee-  
löffel (mit Glaslöffel zu  
geben).

Wenn dyspeptische Diar-  
rhöen vorhanden sind:

Rp. 958.

*Tinct. Cascarill.,*

*Tinct. Ratanh. aa* gtts. 20,

*Elaeosacch. Foenicul.,*

*Pulv. lapid. Cancror.*

*aa* 5·0.

*Da ad scatul. S.* Vor  
jedem Trinken eine  
Messerspitze voll.

Rp. 962.

*Syr. mannat.* 30·0,

*Tinct. Rhei aquos.* 10·0.

*D. S.* 2stündl. 1 Kinderl.

Bei häufigem Auftreten  
von Koliken:

Rp. 959.

*Tinct. Rhei Darell.* 5·0,

*Tinct. Nuc. vom. gtts.* 5,

*Aqu. dest.* 70·0,

*Syr. simpl.* 10·0.

*D. S.* 4mal tägl. 1 Kaffeel.

Bei angehaltenem Stuhl  
leichte Abführmittel, wie:

Rp. 960.

*Mannit. crystall.* 5·0,

*Aqu. font.* 150·0.

*S.* Kaffeelöffelweise.

Rp. 961.

*Hydromell. infant.* 20·0.

*D. S.* 1—2 Kaffeelöffel.

**Catarrhus ventriculi. Magenkatarrh** (grösserer  
Kinder). In acuten Fällen restringirte Diät. Fleisch-  
brühe, russischer Thee mit Milch und etwas Rum. Bei  
Fieber Chinin in kleinen Dosen.

Rp. 963.

*Chinin. sulfuric.* 0·2—0·3,

*Acid. sulfuric. dil. gtts.* 3,

*Aqu. dest.,*

*Syr. cort. Aur. aa* 40·0.

*D. S.* 2stündlich 1 Kaffee-  
löffel.

Bei Stuhlverstopfung:

Rp. 964.

*Aqu. laxat. Vienn.* 50·0,

*Aqu. Cerasor. nigror.,*

*Syr. rub. Idaei aa* 15·0.

*D. S.* 2stündl. 1 Kinder-  
löffel, bis Stuhl erfolgt.

Nach Aufhören des Fiebers Fleischnahrung, am besten halbgebratenes Rindfleisch, Rothwein, Eisen und Chinin, bei Appetitmangel ein Amarum, z. B.:

Rp. 965.

*Tinct. Cascarill. gtts. 20,*  
*Tinct. nervino-tonic. Bestuscheffii gtts. 15,*  
*Aqu. dest. 70·0,*  
*Syr. rub. Idaei 15·0.*  
*M. D. S. 3stündlich 1 Kinderlöffel.*

Bei chronischem Magenkatarrh strenge Regelung der Diät. Vom Fett befreites und durchgeseiebtes rohes oder leicht abgebratenes Fleisch, Fleischbrühe, leichter russischer Thee mit Milch.

Rp. 966.

*Tinct. Rhei Darell. 25·0.*  
*S. 2mal täglich 1 Kaffeelöffel.*

Ferner Mineralwässer: Karlsbader Mühlbrunnen oder Schlossbrunnen (Morgens  $\frac{1}{2}$ —1 Bordeaux-Glas voll), Giesshübler, Rohitscher Wasser; bei starker Anämie Eisenwässer (Spaa, Franzensbad, Pyrawart), Anfangs 1—2 Esslöffel voll, allmählich mit der Dosis zu steigen.

**Enterocatarrhus. Katarrh des Dünndarms.** Vor Allem Berücksichtigung und Entfernung der Ursache. Für künstlich genährte Kinder eine Amme; wenn dies nicht möglich, strenge Regelung der Ernährung, Milch mit Kalbsbrühe oder sterilisirte Milch, Liebig'sche Suppe. Bei Brustkindern nur, wenn es dringend nöthig, Wechsel der Amme.

Gegen den Durst in Eis gekühltes Sodawasser, kaffeelöffelweise, und häufiges Auswaschen des Mundes. Bei grösseren Kindern die Nahrung zu restringiren; im Anfang oft nur Suppe oder Schleimsuppe, später rohes oder halbgebratenes Fleisch; kein Fett, keine Butter, kein Gemüse, als Getränk gutes Quellwasser; wo dies nicht zu haben, russischer Thee; daneben in chronischen Fällen

leichter Rothwein, in besonders schweren Fällen auch Portwein oder Malaga. Hauptmedicament Opium, aber bei kleinen Kindern mit grosser Vorsicht.

Rp. 967.

*Tinct. Cascarill.* (od. *Tinct. Ratanhiae*) *gtts.* 20,  
*Aqu. dest.* 70 0,  
*Tinct. Opii simpl.* *gtts.* 1-2,  
*Syr. simpl.* 10 0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kaffee.

Rp. 968.

*Pulv. Paullin. sorbil.* 1 0,  
*Pulv. Dover.* 0 1—0 2,  
*Sacch. alb.* 2 0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10*  
*D. S.* 2—3stündl. 1 Pulv.

Rp. 969.

*Tinct. Cascar.* (od. *Ratanh.*)  
*gtts.* 20,  
*Tinct. Opii spl.* *gtt.* 1,  
*Sacch. lact.* 10 0.  
*Stent usque ad perfect.*  
*evaporat spir. vin.*  
*D. S.* 2stündl. 1 Messer-  
spitze voll.

Rp. 970.

*Chinin. tannic.* 0 3,  
*Pulv. Dover.* 0 2,  
*Sacch. alb.* 2 0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S.* 2stündl. 1 Pulver.

Rp. 971

*Acid. tannic.* 0 3,  
*Sacch. alb.* 1 0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 6.*  
*D. S.* 3—4 Pulver tägl.

Rp. 972.

*Plumb. acet.* 0 3—0 5,  
*Elaeosacch. Foenic.* 1 5.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S.* 3 Pulver täglich.

Bei längerer Dauer des Katarrhs und dadurch entstandener Anämie:

Rp. 973.

*Pulv. Dover.* 0 1—0 2,  
*Ferr. carb. saccharat.* 0 2,  
*Elaeos. Foenicul.* 2 0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S.* 3stündl. 1 Pulver.

Bei grösseren Kindern kann man auch geben:

Rp. 974.

*Decoct. rad. Colombo*  
*e* 5 0: 80 0,  
*Tinct. Opii simpl.*  
*gtts.* 2—4,  
*Syr. cort. Aurant.* 10 0.  
*S.* 2stündlich 1 Kinder-  
löffel.

Rp. 975.

*Decoct. lign. Campechian.*  
*e 10·0: 100·0.*  
*Natr. salicylic. 1·0,*  
*Tinct. Opii simpl. gtts. 4—6,*  
*Syr. rub. Idaei 15·0.*  
*M. D. S. 2stündlich*  
*1 Kinderlöffel.*

Rp. 976.

*Bismuth. subnitric. 1·0,*  
*Pulv. Dover. 0·1—0·3,*  
*Sacch. alb. 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequal. No. 10.*  
*D. S. 3stündl. 1 Pulver.*

Bei Collaps russischen Thee mit Rum, Rothwein, Cognac etc.

Rp. 977.

*Aether. acetic.,*  
*Liqu. Ammon. anisat. āā 10·0.*  
*S.  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ stündlich 5 Tropfen in etwas Zucker-*  
*wasser.*

Bei Kolik siehe unter „Colica flatulenta.“

Bei sehr chronischem Verlauf des Dünndarmkatarrhs grösserer Kinder Karlsbader Mühlbrunn, 1—2 Weingläser am Morgen warm zu trinken.

**Enteralgia. Colica flatulenta. Windkolik.** Kommt man zu dem Anfall selbst, Einführung eines Klystierrohres per anum. Hierauf, nachdem Winde und Stuhl abgegangen, Frictionen des Bauches, dann neuerliche Einführungen des Klystierrohres. Zu den Frictionen kann man auch benützen:

Rp. 978.

*Ungu. aromatic. 50·0.*  
*S. Salbe.*

Recht gut wirken auch Bäder, denen man Kamillen zusetzen kann und in denen man das Kind abreibt. Danach noch warme Umschläge auf das Abdomen.

Innerlich:

Rp. 979.

*Ol. Chamomill. (od. Foeni-*  
*culi) gtts. 1—2,*  
*Tinct. Opii spl. gtt. 1,*  
*Sacch. lact. 10·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 2stündl. 1 Pulv.*



Die weitere Behandlung richtet sich nach dem Causalmoment: bei Coprostase Abführmittel, bei Ulcerationen Opiate, bei Würmern Anthelmintica. Bei hysterischer Kolik Excitantia oder:

Rp. 980

*Extr. Belladonn* 01.

*Aq. Cerasor. nigror* 50—100.

*D. S.* 1stündlich 10—20 Tropfen

**Cholera nostras. Cholera infantum. Brechdurchfall der Kinder.** Prophylaktische Maassnahmen: das Kind nicht im Hochsommer zu entwohnen, während der heissen Jahreszeit täglich 1—2 kühle Bäder oder Waschungen.

Bei bereits ausgebrochener Cholera bei Brustkindern regelmässige Fortsetzung der Ernährung, event. Ammenwechsel; bei eben in der Alactation befindlichen Kindern Rückkehr zur Ernährung durch die Brust. Künstlich genährte Kinder an die Brust zu bringen: wenn dies aus Aussenen Gründen nicht möglich, in den ersten 12 Stunden keine Nahrung, höchstens etwas excitirende Mittel, russischen Thee abgekühlt, oder Cognac mit Wasser. Cognac 50—100, 5000—10000 Wasser. Hierauf gibt man fettlose Rindsuppe, Biedert'sches Rahmgemenge, Liebig'sche Milch-Malzsuppe: Kuhmilch nur, wenn sehr gute zur Verfügung steht, wenn möglich sterilisirt; dieselbe mit der gleichen Menge Wassers zu verdünnen. Sehr gut auch Demme's Gemenge s. S. 207.

Im Uebrigen ist die Therapie *a)* antimykotisch, *b)* antidiarrhöisch, *c)* excitirend.

ad *a)* die Trousseau'sche Behandlung mit Calomel oft von guter Wirkung.

Rp. 981. *Calomelan. laevigat.* 01.

*Sach. alb.* 20.

*M. f. pulv. Div. in dos. aeqv. No. 10.*

*D. S.* 2—3stündlich 1 Pulver, bis (nach 1—2 Tagen) gelbe Entleerungen eintreten.

Oder man gibt:

Rp. 982.

*Natr. benzoic.* 3·0,  
*Aqu. font.* 70·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*S. 2stündlich 1 Kaffeelöffel.*

ad b) Opium nur bei sehr rasch hintereinander folgenden Stühlen, oder wenn nach der Calomelbehandlung noch Diarrhöe, einem Katarrh entsprechend, zurückbleibt. Also dem vorigen Recept (982) 1—2 Tropfen Tinct. Opii zuzusetzen oder eines der folgenden Adstringentia mit Opium zu verbinden. Das Opium auszusetzen, sobald das Kind schläfrig wird oder bei Eintritt von Collapserscheinungen. Im Uebrigen gegen die Diarrhöe Astringentia, hauptsächlich in der Reconvalescenz anzuwenden.

Rp. 983.

*Bismuth. subnitric.* 1·0,  
*(Opii pur.* 0·03),  
*Sacch. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 2stündl. 1 Pulver.*

Rp. 984.

*Chinin. tannic.* 0·3,  
*(Pulv. Dover.* 0·2—0·3),  
*Sacch. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 2stündl. 1 Pulver.*

ad c) Die Darreichung von Stimulantien oft das Wichtigste in der Behandlung der Cholera infantum. Russischer Thee, Cognac, schwere Weine löffelweise, in Eis gekühlter Champagner. Senfbäder, alle 2—4 Stunden, bis die Collapserscheinungen zurückgehen. (Ueber Senfbäder siehe unter „Atelectasia pulmonum“ S. 230.)

Innerlich als Medicament:

Rp. 985.

*Aether. sulf. gtts.* 6—10,  
*Mixtur. gummos.* 70·0,  
*Syr. rub. Idaei* 20·0.  
*M. D. S. 2stündlich 1 Kaffeelöffel.*

Rp. 986.

*Camphor. ras.* 0·05 0·1,  
*Solue c. paux. spir. vin.*  
*rect. ad:*  
*Mixtur gummos.* 70·0,  
*Syr. cort. Aurant.* 20·0  
*M. D. S.* 2stündlich  
 1 Kaffeelöffel.

Rp. 987.

*Liqu. Ammonii anisat.*  
 2·0,  
*Aqu. Cinnamom.,*  
*Aqu. dest. aa* 10·0.  
*M. D. S.* 2stündlich  
 20 Tropfen auf Zucker.

Rp. 988.

*Mosch. oriental* 0·1 — 0·3,  
*Sacch alb.* 2·0,  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S.* 2stündl. 1 Pulver.

**Enteritis follicularis Dickdarmkatarrh.** Behandlung  
 gewöhnlich wegen spärlicher, blutiger Stühle und starkem  
 Tenesmus mit Anregung der Peristaltik zu beginnen; zu  
 diesem Behufe hohe Irrigationen mit warmem Wasser oder:

Rp. 989.

*Acid. salicylic.* 12·0,  
*Natr. bicarbon.* 10·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 4.*  
*S.* 1 Pulver auf 1 Liter  
 warmen Wassers zu  
 einer Irrigation.

Weiter gegen den Te-  
 nesmus auch Klystiere von:  
 Rp. 990.

*Decoct Salep.* 150·0,  
*Tinct. Opii spl. gttss.* 5.  
*S. Zu 2 Klystieren.*

(Den Klystieren event.  
 auch Amylum zuzusetzen.)

Statt der Irrigationen, wo selbe nicht durchzuführen  
 Abführmittel:

Rp. 991.

*Pulv. rad. Rhei,*  
*Magnes. carbonic.,*  
*Sacch. alb. aa* 1·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 3.*  
*D. S.* 2stündl. 1 Pulv., bis  
 ausgiebige Stühle erfolg.

Bei grösseren Kindern:

Rp. 992.

*Pulv. rad. Rhei,*  
*Magnes. carbonic.,*  
*Sacch. alb. aa* 10·0.  
*M. f. pulv. Da ad scatul.*  
*S.* 2stündlich  $\frac{1}{2}$  Kaffee-  
 löffel.

Nach Eintreten der Abführwirkung Hauptsache Regelung der Ernährung: Bei 3—5 monatlichen Kindern gute Ammenmilch, daneben bei bisher künstlich genährten Kindern gut gesalzene Rindsuppe oder Kalbsbrühe. Bei Kindern über 8 Monate, die bisher künstlich genährt wurden, Liebig'sche Suppe, Löfflund'scher Malzextract, Cacao ( $\frac{1}{2}$  1 Kaffeelöffel vom Pulver der Bohne auf  $\frac{1}{2}$  Liter Milch), bei rachitischen Kindern eventuell auch Eichelkaffee. Wenn Milchpräparate nicht gut vertragen werden, Fleischpepton (ein bohnergrosses Stück auf eine Kaffeetasse voll Wasser) oder Beef-tea ( $\frac{1}{4}$  Kilo entfettetes Rindfleisch in kleine Stücke geschnitten auf eine Tasse Wasser mit etwas Salz in einer kleinen Flasche im Wasserbad einige Stunden gekocht). Zum Getränk, namentlich bei grösseren Kindern, auch Rothwein (Vöslauer, Ofener, Bordeaux) etwas erwärmt, oder Malaga bei Säuglingen 1—5—10 Tropfen pro die, bei grösseren Kindern 20 Tropfen bis  $\frac{1}{2}$  Kaffeelöffel.) Bei Ablactationsdiarrhöen die Kinder wieder an die Brust zu geben.

In medicamentöser Beziehung gegen die Diarrhöe Astringentia mit Opium (s. „Enterocatarrhus“ S. 237 f.).

Rp. 993.

*Chinin. tannic.* 0·3,  
*Extr. Opii aquos.* 0·03,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 2stündl. 1 Pulver.*

Rp. 994.

*Chinin. tannic.* 1·0—1·5,  
*Tinct. Opii spl. gtt.* 1—2,  
*Aqu. dest.,*  
*Syr. rub. Idaei aa* 40·0.  
*M. D. S. 2stündlich*  
*1 Kaffeelöffel gut um-*  
*geschüttelt.*

Rp. 995.

*Pulv. Paullin. sorbil.* 0·6,  
*Pulv. Dorer.* 0·06,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 6.*  
*D. S. 2stündl. 1 Pulver.*

Rp. 996.

*Decoct. rad. Colomb.*  
*e* 5·0—10·0 : 100·0,  
*Tinct. Opii simpl.*  
*gtts.* 1—4,  
*Syr. cort. Aurant.* 20·0.  
*M. D. S. 2stündlich*  
*1 Kaffee- bis Kinderl.*

Bei blutigen Stühlen:

Rp. 997.

*Liqu. Ferr. sesquichlorat* gtts. 10 -12,  
*Tinct. Opii simpl.* gtts. 1—4,  
*Aqu. Cinnamom.*,  
*Aqu. dest.* aa 40·0,  
*Syr. simpl.* 20·0.  
*M. D. S.* 2stündlich 1 Kaffeeleffel.

Bei starken Diarrhöen und besonders bei hochgradigem Tenesmus Klystiere von Eiswasser oder von:

Rp. 998.

*Decoct. Salep* 150·0,  
*Argent. nitric.* 0·06,  
(*Tinct. Opii simpl.* gtts. 6 -10).  
*M. D. S.* Zu 2 Klystieren.

Wenn nach Ablauf der Enteritis Obstipation fortbesteht:

Rp. 999.

*Tinct. Rhei Darell.* 20·0.  
*S. Früh u. Abds.* 1 Kaffeeleffel.

Ferner nach Ablauf der Krankheit Landaufenthalt, leichte Kaltwasserkur, Priessnitz'sche Einwickelungen.

**Taenia. Bandwurm.** Sehr zweckmässig ist folgendes Verfahren: Am Tage vor der Kur weniger Nahrung und meist salzige Speisen: Heringe, Schinken, Sardellenbutter. Abends ein stärkeres Abführmittel, z. B. *Aqu. laxat.*

Am anderen Morgen:

Rp. 1000.

*Extr. Filic. mar. aeth.*  
15·0.  
*S.* 1 -3 Kaffeeleffel in  
1stündigen Pausen.

Darnach Pfeffermünzzeltchen essen zu lassen.

Oder auch:

Rp. 1001.

*Kamala* 15·0,  
*Extr. Filic. mar. aeth.* 8·0.  
*Fiat cum syr. cort. Aurant. et pulv. gummos.*  
*l. a. electuarium.*

*D. S.* Nach Bericht.

Hievon die erste Hälfte sehr zeitig am Morgen, hierauf das Kind noch einige Stunden schlafen zu lassen, dann den Rest des Mittels in 1—2 Stunden. Eine Stunde nachher ein Abführmittel.

Ein anderes beliebtes Bandwurmmittel ist:

Rp. 1002.

*Cort. Punic. Granat. rec. 40·0,*  
*Macera cum Aqu. font. 400·0 per horas 24, dein*  
*coque ad rem. 200·0.*

*S. Am Morgen in 3 Portionen in ½ständigen Pausen*  
*zu nehmen.*

### **Oxyuris vermicularis. Madenwurm.**

Rp. 1003.

*Asae foetidae 10·0,*  
*Vitell. vi unius,*  
*Decoct. Salep 100·0.*  
*D. S. Für 2 Klysmen.*

### **Ascaris lumbricoides. Spulwurm.**

Rp. 1004.

*Santonin. 0·2,*  
*Ol. Ricin. 70·0.*  
*D. S. 2ständl. 1 Kaffeel. bis mehrere Stühle erfolgen.*

Oder:

Je ½ Kaffeelöffel voll verzuckerten Wurmsamens durch  
6 Tage, am 7. Tage ein Abführmittel.

**Peritonitis. Bauchfellentzündung.** Bei acuter Erkrankung (selten) feuchtwarme Umschläge oder Leiter'scher Kühlapparat auf das Abdomen. Innerlich:

Rp. 1005.

*Mixtur. gummos. 70·0,*  
*Tinct. Opii simpl. gtts. 1—5,*  
*Syr. simpl. 10·0.*  
*D. S. 2ständlich 1 Kaffeelöffel.*

Oder: Rp. 1006.

*Extr. Opii aquos.* 10.5—15.1,

*Sacch. alb.* 2.0

*M. f. pulv. Dic. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S.* 2—3mal tägl. 1 Pulv.

Gegen das Fieber massige Dosen Chinin. Bei Collaps  
Excitantia: Thee mit Rum; tropfenweise zu gebende starke  
Weine Portwein, Malaga; Liqu. Ammonii anisatus.

Bei chronischer, tuberculöser Peritonitis  
sorgfältige Ernährung, besonders mit rohem Fleisch,  
Milch, wenn Abführen besteht, zu vermeiden. Eisen,  
Chinin. Bei Stuhlverstopfung:

Rp. 1007.

*Pulv. rad. Rhei,*

*Magnes. ust.,*

*Sacch. lact. aa* 20.0.

*M. f. pulv. Da ad scatul.*

*S. Früh und Abends 1 Messerspitze voll in einem  
Glas Wasser zu nehmen.*

Bei Diarrhöe:

Rp. 1008

*Chinin. tannic.* 0.5—1.0,

*Pulv. Doveri* 0.3—0.5,

*Sacch. alb.* 3.0

*M. f. pulv. Dic. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S.* 3mal tägl. 1 Pulver.

**Icterus catarrhalis. Gelbsucht, Katarrh der Gallen-  
wege.** Strenge Regelung der Diät Nahrung hauptsäch-  
lich in Fleisch und Eiern bestehend (Milch zu vermeiden).  
Karlsbader Mühlbrunnen oder:

Rp. 1009

*Tinct. Rhei aquos.* 2.0,

*Aqu. dest.* 70.0,

*Syr. simpl.* 10.0.

*D. S.* 2stündl. 1 Kinderlöffel.



Oder: Rp. 1010.

*Pulv. rad. Rhei chin. 2·0,*  
*Magnes. carbon. 4·0,*  
*Sacch. alb. 8·0.*  
*M. f. pulv. Da ad scatul.*  
*S. 2stündl. 1 Messerspitze.*

Wenn der Icterus geringer wird, Gebrauch von Biliner, Giesshübler, Preblauer Wasser. Wenn Stuhlverstopfung weiter besteht, 1—2 Weingläser voll Bitterwasser.

**Blennorrhoea umbilici. Nabelfluss.** Fleissige Reinigung des Nabels vom Secret; Umschläge mit Aqu. Goulardi oder mit:

Rp. 1011.

*Zinc. sulfuric. 1·0,*  
*Aqu. font. 100·0.*  
*S. Aeusserlich.*

**Sarcomphalus. Nabelschwamm.** Leichte Lapis-touchirungen; bei grösseren Excrescenzen besser Abbindung des Stiels mit einem starken Seidenfaden.

**Omphalitis. Nabelentzündung. Gangraena umbilici. Nabelbrand.** Roborirende Behandlung. Ernährung durch eine Amme mit milchreicher Brust und langer, leicht fassbarer Warze. Der Nabel rein zu halten, die Krusten abzulösen, Auflegen von:

Rp. 1012.

*Acid. carbolic. 2·0,*  
*Ol. Lini 100·0.*  
*M. D. S. Aeusserlich.*

Oder von:

Rp. 1013.

*Alumin. crud. 2·0,*  
*Aqu. dest. 100·0.*  
*S. Zu Umschlägen.*

Innerlich:

Rp. 1014.

*Chin. sulfur. 0·1—0·15,*  
*Acid. sulfuric. q. s. ad*  
*solut.,*  
*Aqu. dest. 70·0,*  
*Syr. simpl. 10·0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kaffee-*  
*löffel.*

Bei Collaps tropfenweise schwarzer Kaffee oder Malaga-  
wein zu geben.

Wenn sich Gangrän entwickelt hat, Fortsetzung der  
bisherigen Therapie, bis sich die Gangrän begrenzt hat;  
hierauf Entfernung des Brandigen. Auf die rückbleibende  
Wunde Jodoformgaze oder:

Rp. 1015.

*Acid. carbolic. 3·0,*

*Ol. Lini 100·0.*

*D. S. Aeusserlich.*

Oder:

Rp. 1016.

*Camphor trit. 2·0,*

*Spir. vin. q. s. ad sol.,*

*Mucilag. gumm. Arabic. 150·0.*

*S. In diese Flüssigkeit getauchte Charpieballen  
2ständl. auf die Wunde geben.*

**Nephritis acuta. Acute Nierenentzündung.** Nahrung  
hauptsächlich aus Milch bestehend. Warme Bäder von  
28–29° R. durch 10 Minuten, hierauf Einwicklung in  
wollene Decken.

Innerlich:

Rp 1017. *Acid. tannic. 0·5,*

*Sacch. alb. 2·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 3mal täglich 1 Pulver.*

Bei blutigem Urin:

Oder:

Rp. 1018.

*Ergotin. Bombellon*

*gtts 10,*

*Aqu. font 80·0,*

*Syr. cort. Aur 15·0.*

*S. Stündlich 1 Kaffeelöffel.*

Rp 1019.

*Liqu. Ferr. sesquichlorat.*

*gtts. 5–10,*

*Aqu. Cinnamom 70·0,*

*Syr. rub. Idaci 20·0.*

*S. 2ständl. 1 Kaffeelöffel.*

Wenn die Krankheit chronisch zu werden droht, leichte Diuretica.

Rp. 1020.

*Liqu. Kal. acetic.*  
1·0—2 0,  
*Aqu. font.* 100·0,  
*Syr. rub. Idaei* 20·0.  
*M. D. S.* 2stündl. 1 Kin-  
derlöffel.

Rp. 1021.

*Decoct. Ononidis spinos.*  
(*Equiset.*) e 2·0 : 100·0,  
*Cremor. Tartari* 10·0,  
*Syr. Juniperi* 15·0.  
*M. D. S.* 2stündl. 1 Kin-  
derlöffel.

Bei urämischen An-  
fällen: So lange die Kinder

nicht schlucken können,  
Chloralhydrat in Klysmen:

Rp. 1022.

*Chloral. hydrat.* 1·0,  
*Mucil. gumm. Arab.* 20·0,  
*Aqu. dest.* 80·0.  
*S.* Zu 2 Klystieren.

Später, wenn das Kind  
schlucken kann, ein kräftiges  
Abführmittel:

Rp. 1023.

*Aqu. laxativ. Viennens.*  
50·0,  
*Aqu. Cerasor. nigror.,*  
*Syr. rub. Idaei aa* 30·0.  
*M. D. S.* Auf 2 Hälften  
zu nehmen.

Daneben Klystiere. Weiterhin expectatives Verfahren,  
sehr verdünnte Milch, Limonade, Selterswasser. Bei  
arythmischem Puls:

Rp. 1024.

*Inf. fol. Digital. e.* 0·15—0·2 : 100·0,  
*Syr. rub. Idaei* 20·0.  
*M. D. S.* 2stündl. 1 Kaffeelöffel.

Ferner weitere Anwendung der (S. 248) beschriebenen  
Bäder.

**Nephritis chronica. Morbus Brightii chronicus. Chro-  
nische Nierenentzündung. Bright'sche Nieren-  
krankheit.** Leicht verdauliche, reizlose Fleisch- und  
Milchkost. Vermeidung von Erkältungen. Gebrauch von  
Karlsbader Mühl- oder Schlossbrunn, 1—2 Esslöffel im  
Tage. Protrahirte laue Bäder (26° R.).

**Spasmus vesicae. Blasenkrampf.** Sorgfältige Reinhaltung der äusseren Genitalien. Feuchtwarme Umschläge auf die Blasengegend.

Rp. 1025.

*Tinct. Opii spl. gtts 1—4,*  
*Aqu. dest. 100 0,*  
*Syr. simpl. 10 0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kaffeelöffel.*

Oder:

Rp. 1026.

*Tinct. Opii spl. gtts. 1—2,*  
*Aqu. dest. 100·0.*  
*S. 3—4 Esslöffel auf ein Klysm.*

**Enuresis nocturna. Bettnässen.** Abends nicht zu spät Nahrungsaufnahme, nicht viel Wasser trinken. Die Kinder sollen nicht auf dem Rücken liegen; sind nach 2—3 Stunden Schlaf zur Harnentleerung aufzuwecken. Kalte Waschungen am ganzen Körper. Faradisation der Blase.

Rp. 1027.

*Extr. Bellad 0·05—0·1,*  
*Sacch. alb. 2·0.*  
*M f. pulv. Div. in dos. aequ. No 10.*  
*D. S. 3—4mal tägl. 1 Pulv.*

Oder:

Rp. 1028.

*Atropin. sulf. 0·01,*  
*Aqu. dest. 10·0.*  
*2 Mal tägl. doppelt so viel Tropfen als das Kind Jahre zählt.*

In manchen Fällen wirksam:

Rp. 1029.

*Ergotin. bis dep. 1·0,*  
*Aqu. dest. 70·0.*  
*Syr. rub. Idaci 20·0.*  
*S. 2stündl. 1 Kaffeelöffel.*

**Blenorrhoea vulvae. Weisses Fluss.** Behandlung etwaiger ursächlicher Erkrankungen (Eczema, Traumen), insbesondere Untersuchung auf Vorhandensein von Oxyu-

ris; Inquiriren auf Masturbation. Gegen ursächliche Anämie oder Scrophulose entsprechende Allgemeinbehandlung und zwar im ersteren Fall bei grösseren Kindern:

Rp. 1030.

*Ferr. sulf. cryst.,*

*Kal. carb. e Tart. aa 10·0,*

*Extr. Gent. qu s.*

*Forment. c. Balsam. de Tolu pill. No. 200.*

*S. 2—3 Pillen tägl.*

Kalte Waschungen. Sitzbäder in Abkochungen von Eichenrinde. Sorgfältige, fleissige Reinigung der Genitalien. Ausspritzungen mit leichten Astringentien und Einlegen von Watte-Tampons.

Rp. 1031.

*Alum. crud. 10·0,*

*Aqu. font. 300·0.*

*S. Zur Ausspritzung.*

Rp. 1032.

*Acid. thymic. 0·5,*

*Aqu. font. 500·0.*

*S. Zur Ausspritzung.*

Rp. 1033.

*Creolin. gtts. 10,*

*Aqu. font. 500·0.*

*S. Zur Ausspritzung.*

Oder 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>ige Lösungen von Zinc. sulfuric. oder sulfo-carbolic., Acid. carbolic. etc.

**Chorea minor. Veitstanz.** Behandlung der etwaigen Anämie durch kräftige Nahrung, Eisen und Chinin. Gegen die Krankheit selbst Injectionen von Solut. Fowleri in die vorher gereinigte und mit einer 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub>igen Thymol-Lösung desinficirte Haut.

Rp. 1034.

*Solut. arsenical. Fowleri,*

*Aqu. dest. aa 10·0.*

*S. Injection.*

Oder: Rp. 1035.

*Sol. arsenic. Fowleri* 10·0,  
*Glycerin.*,  
*Aqu. dest. an* 5·0,  
*S. Injection.*

(Von dieser stets vor dem Gebrauch 2-3mal zu filtrirenden Lösung am ersten Tage 1 Theilstrich einer Pravaz'schen Spritze zu injiciren, dann jeden Tag um einen Theilstrich steigend bis zu einer ganzen Spritze, dann wieder allmähliches Zurückgehen bis auf 2 Tropfen.)

Werden die Injectionen nicht vertragen, so empfiehlt sich innerliche Darreichung des erwähnten Medicamentes:

Rp. 1036

*Solut. arsenic. Fowleri*,  
*Tinct. Absynthii* (oder  
*amar.*) *aa* 10·0.

*D. S.* Von 5 Tropfen bis  
auf 15 Tropfen im Tag  
zu steigen, dann wieder  
zurückzugehen.

Bei Anämie besser:

Rp. 1037.

*Solut. arsenic. Fowleri*,  
*Tinct. Ferr. pomat.*,  
*Tinct. Abs. comp.* *aa* 10·0.  
*D. S.* Wie das Vorige

Manchmal von Wirkung:

Rp. 1040. *Kali iodat* 10—20,

*Aqu. dest.* 70·0,

*Syr. simpl.* 10·0.

*D. S.* 2 stundl. 1 Kaffeelöffel.

Auch Galvanisation des Sympathicus mit mässig starkem Strom öfters von Nutzen. In sehr schweren Fällen Chloralhydrat, je nach dem Alter, bis zum Eintritt von Schlaflosigkeit. Kühle Einpackungen.

In leichten Fällen auch:

Rp. 1038.

*Zinc. valerianic.* 0·2-0·5,  
*Sach. alb.* 3·0.

*M. f. pulv.* Div. in dos.  
*aequ.* No 10.

*D. S.* 2-3mal tägl. 1 Pulv.

Oder:

Rp. 1039.

*Kal. bromat.* 3·0,

*Aqu. dest.* 70·0,

*Syr. cort. Aurant.* 20·0.

*S.* 2stündl. 1 Kinderlöffel.

**Poliomyelitis anterior acuta. Spinale Kinderlähmung.** Im Beginn Application von Kälte, milde Abführmittel; weiterhin Galvanisation des Rückenmarks, später auch Faradisation der gelähmten Extremitäten. Daneben gute Ernährung, kalte Abreibungen.

**Tetanus (Trismus) neonatorum. Starrkrampf der Neugeborenen.** Kühle gleichmässige Zimmertemperatur. Nahrung in den Pausen zwischen den Anfällen (etwa alle 2 Stunden) mittelst Löffels durch die Nase einzuflössen, ebenso die Medicamente in Milch darzureichen.

Rp. 1041.

*Chloral. hydrat.* 0·25,  
*Sacch. alb.* 1·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 5.*  
*D. S. 2stündl. 1 Pulver*  
*in Milch, bis Schlaf*  
*eintritt.*  
Oder Rp. 1022.

In neuerer Zeit auch:

Rp. 1042.

*Extr. fab. Calabar.* 0·1,  
*Sacch. alb.* 1·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 5.*  
*D. S. 4stündl. 1 Pulver*  
*in Milch.*

**Convulsiones. Krämpfe, Fraisen.** Ermittlung und womöglich Beseitigung der Ursache. Bei der eigentlichen Eclampsia neonatorum Eis- oder Essigwasser-Umschläge auf den Kopf, alle 2—3 Minuten zu wechseln. Entfernung beengender Kleidungsstücke. Bei aufgetriebenem Bauch leichte Massage desselben. Vorsichtige, nur durch wenige Minuten andauernde Compression der Karotis. Fleissige Lüftung des Zimmers.

Bei Convulsionen im Beginne acuter Krankheiten ebenfalls Eisumschläge; eventuell kalte Begiessungen des Kopfes.

Rp. 1043.

*Chloral. hydrat.* 0·5—1·5,  
*Mucil. gumm. Arab.* 20·0,  
*Aqu. dest.* 80·0.  
*S. Zu 2 Klystieren.*



**Bei Stuhlverstopfung:**

Rp. 1044.

*Calomelan. laerigat.* 0·1,*Sacch alb.* 2·0.*M. f. pulv. Dir. in dos.*  
*aegu. No. 10.**D. S.* 3mal tägl. 1 Pulver.

In schweren Fällen selbst vorsichtige Einleitung von Chloroform - Inhalationen, (einige Tropfen Chlorof. auf ein Taschentuch gegossen).

Bei Rhachitis, Hydrocephalus. neben der antirhachitischen Behandlung:

Rp. 1045.

*Kal. bromat.* 3·0 – 5·0.*Dir. in dos aegu. No. 10.**D. S.* Früh und Abends  
1 Pulv in Zuckerwasser.

Dasselbe bei Epilepsie im Säuglingsalter. Bei grösseren Kindern entsprechend grossere Dosen von Bromsalzen.

**Chorea maior. Hysteria. Der grosse Veitstanz.**

Hauptsache psychische Behandlung. Zweckmässige Beschäftigung mit leichten Arbeiten. (Schulbesuch nicht angezeigt.) Massige Bewegung im Freien, Zimmergymnastik. Protrahierte laue Bäder 24–26° R., 1–2 Stunden Dauer mit nachfolgender mehrstündiger Ruhe. Dabei kräftige Ernährung; geistige Getränke gestattet. Bei anämischen Kindern zu versuchen:

Rp. 1046.

*Tinct. Ferr pomat* 2·0,*Solut. arsenic Fowleri*  
*gtts* 3–6,*Aqu Cinnamon.* 30·0.*D. S.* Früh und Abends  
1 Kaffelöfsl.

Um die Anfälle hinauszuschieben, manchmal nützlich:

Rp. 1047

*Chinin. sulfuric.* 2·0,*Sacch alb* 3·0.*M. f. pulv. Dir. in dos.*  
*aegu. No. 10.**D. S.* 2–3mal tägl. 1 Pulv.

Oder: Rp. 1048.

*Zinc. valerian.* 0·1 – 0·2,*Sacch alb.* 2·0,*M. f. pulv. Dir. in dos. aegu No* 10.  
*S.* 3 Pulver täglich.

Ebenso Bromkali oder Bromnatron in allmählich steigenden Dosen bis zu 1 Gr. pro die.

Bei starker Unruhe für grössere Kinder auch anwendbar :

Rp. 1049.

*Chloral. hydrat.* 2·0—3·0,  
*Morph. muriat.* 0·01,  
*Aqu. font.*,  
*Syr. rub. Idaei* āā 30·0.  
*M. D. S.* 2stündl. 1 Kaffeelöffel.

Während der Anfälle das Kind vor Verletzungen zu schützen und wenn die Bewegungen weniger heftig werden, in liegende Stellung zu bringen.

**Seborrhoea. Gneis.** Täglich der Kopf mit Olivenöl fest einzuölen, dann im Bad mit Seife abzuwaschen.

**Eczema. Nässende Flechte.** Bei acutem Ekzem mit heftigen Entzündungserscheinungen kalte Umschläge, später Amylum. Bei mehr chronisch verlaufendem Ekzem des Gesichts die Krusten mit Oel und lauem Wasser abzuwaschen, hierauf eine Salbe aufzulegen, bei mässigem Jucken einfach dick aufzuschmieren, wenn dasselbe stark, das Kind unruhig, Gesichtsmasken aus Leinwand darüber zu binden. Man verwendet als Salbe:

Rp. 1050.

*Zinc. oxydat.* 0·2,  
*Ungu. Ceruss.*,  
*Ungu. emollient.* āā 5·0.  
*D. S.* Salbe.

Bei stärkerem Jucken  
am besten:

Rp. 1051.

*Ungu. Diachylon*  
*alb.* 10·0.  
*S.* Salbe.

In neuerer Zeit ange-  
wendet und sehr zweck-  
mässig ist:

Rp. 1052.

*Zinc. oxydat.* 0·5,  
*Lanolin.* 20·0.  
*S.* Salbe.

Rp. 1053.

*Bismuth. subnitric.* 0·1,  
*Lanolin.* 20·0.  
S. Salbe.

Ebenso statt der Diachylon-Salbe in neuerer Zeit:

Rp. 1054.

*Empl. Plumb. simpl.* 10·0,  
*Ol. Olivar.*,  
*Lanolin aa* 5·0.  
S. Salbe.

Oder:

Rp. 1055.

*Acid. salicyl.* 1·0,  
*Empl. saponat.*,  
*Vaselin. aa* 50·0.  
D. S. Auf Leincand auf-  
zustreichen.

Rp. 1056

*Acid salicyl* 1·0,  
*Lanolin anhydr* 90·0,  
*Cetacci* 10·0.  
D. S. Salbe.

Bei Eczema inter-  
trigo am besten Auflegen  
von:

Rp. 1057.

*Aqu. Calc.*,  
*Ol. Olivar. aa* 50·0.  
S. Leinwandlappchen,  
damit getränkt, auf-  
zulegen.

In neuerer Zeit mit  
sehr gutem Erfolg Ichthyol:

Rp. 1058

*Ammon. sulfoichthyol.* 1·0,  
*Ungu simpl.* 100·0.  
S. Salbe. Dick einzu-  
schmieren, darüber  
*Poudre.*

Oder:

Rp. 1059.

*Ammon sulfoichthyol.* 1·0,  
*Zinci. oxydat.* 10·0,  
*Empl. Diachyl. comp.*,  
*Lanolin. puri aa* 50·0.  
D. S. Pflaster.

Wenn nur Röthung der  
Haut ohne Serum Absonde-  
rung besteht, Streupulver:

Rp. 1060.

*Zinc. oxydat* 2·0,  
*Pulv. semin. Lycop.* 20·0.  
S. Streupulver.

Rp. 1061.

*Acid salicylic.* 0·2,  
*Amyl. Oryz* 20·0.  
S. Streupulver.

Bei chronischen Ekzemen  
der Extremitäten mit Haut-  
verdickung Umschläge mit  
Liquor Burowi oder mit:

Rp. 1062.

*Plumb. acet.* 1·0,  
*Aqu. dest.* 100·0.  
S. Zu Überschlügen.

Ebenso Waschung mit  
einer Mischung von 1 Theil  
Alkohol auf 10 Theile Wasser.

Bei schuppenden Ekzemen grösserer Kinder  
Rp. 1063.

*Ol. cadin. 2·0,*  
*Sapon virid.,*  
*Ungu. emollient. āā 50·0.*  
*S. Salbe; mit Borsten-*  
*pinsel dünn einzureiben.*

### Scabies. Krätze.

Rp. 1064.

*Balsam. peruvian.,*  
*Ungu. emollient. āā 30·0.*  
*M. f. ungu.*  
*D. S. Salbe.*

(Nachdem die Haut mit Seife gut abgewaschen wurde,  
Abends einzureiben, am Morgen ein Bad. Dies durch  
3—4 Tage zu wiederholen.)

Ebenso auch:

Rp. 1065.

*Styrac. liquid. 20·0,*  
*Spir. vin. rectific. 10·0,*  
*Ungu. emollient. 50·0.*  
*D. S. Mehrere Tage hintereinander täglich eine*  
*Einreibung, nach der letzten ein Bad.*

In neuerer Zeit:

Rp. 1066.

β *Naphtol. 15·0,*  
*Sapon. virid. 50·0,*  
*Ungu. simpl. 100·0.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

**Morbilli. Masern.** Expectative Behandlung. Zimmer genü-  
gend zu lüften, wegen der Conjunctivitis etwas zu verdunkeln.  
Priessnitz'sche Umschläge um den Hals. Etwaige Com-  
plicationen entsprechend zu behandeln. Nach Verschwinden  
der katarrhalischen Erscheinungen lauwarme Bäder.

**Scarlatina. Scharlach.** So lange das Fieber andauert, nur wenig Nahrung, Rindsuppe, etwas Milch. Fleisch erst nach vollendeter Desquamation. Der Harn täglich auf Albumin zu untersuchen. Bei starkem Fieber Chinin oder Antipyrin. Eisumschläge auf den Kopf, kalte Waschungen. Bei Stuhlverstopfung Klystiere oder leichte Abführmittel, wie Aqu. laxativ. Viennens., oder:

Rp. 1067.

*Inf. rad Rhei*

*e 5·0:70·0,*

*Syr. mannat 30 0.*

*D. S. 2stündl. 1 Kinder-  
löffel, bis Stuhl erfolgt.*

Im Uebrigen:

Rp. 1068.

*Decoct. cort. Chin. reg.*

*e 5·0. 70·0,*

*Syr. simpl. 10·0.*

*S. 2stündlich 1 Kaffeel.*

Bei Convulsionen im Beginn der Erkrankung Eisumschläge auf den Kopf, Compression einer Karotis durch 2—3 Minuten.

Rp. 1069.

*Decoct. Salep 80·0,*

*Chloral. hydrat. 1·0.*

*S. Zu 2 Klysmen.*

Bei begleitender Angina mit stärkerem Belag der Tonsillen nach Heubner 2mal täglich Injection von je  $\frac{1}{2}$  Pravaz'schen Spritze einer 2—5%igen Carbollösung in jede Tonsille mittelst der von Traube angegebenen Canüle.

Nach Aufhören des Fiebers bei beginnender Abschuppung fleissiger Gebrauch lauwärmer Bäder.

Uefer Complicationen s. unter Angina diphtheritica, Nephritis acuta etc.

**Variola. Blattern. Varicella. Windpocken, Schafblattern.** Behandlung rein expectativ, gegen Fieber Chinin, bei Kräfteverfall Wein. Fleissige Reinigung des Mundes.

Gegen Variola das beste Prophylacticum:

**Vaccinatio. Schutzimpfung.** Am besten Impfung von Arm zu Arm. Eine 8 Tage alte Pustel des Stammimpflings mit der Impfnadel zu eröffnen (dabei darf kein Blut fliessen), wenn sich ein Tropfen klarer Lymphe angesammelt hat, die Spitze der Impfnadel einzutauchen und in eine emporgehobene Hautfalte am Arm des zu impfenden Kindes einzustechen, oder die Haut mit dem Impfschnäpper zu incidiren und über die Wunden nach Abwischen des Blutes der Impfstoff zu streichen. Die Instrumente natürlich stets vollkommen rein zu halten, nach jeder Impfung zu reinigen. Während der Entwicklung der Impfpusteln bis zur Eintrocknung derselben die Kinder nicht zu baden. Der Stammimpfung soll mindestens 3 Monate alt und vollkommen gesund sein, kein Zeichen von Laes, Rhachitis, Ekzemen, Scrophulose, Darmkatarrh darbieten. Die Impfung am besten im Alter von 6 Wochen vorzunehmen; bei Ekzem und Laes nicht impfen, ehe die Efflorescenzen geschwunden sind, ausser wenn das Kind direct der Blatterngefahr ausgesetzt ist, ebenso während einer acut fieberhaften Krankheit nicht impfen. Wenn die Mutter während der Entbindung an Variola leidet, Impfung des Kindes gleich nach der Geburt vorzunehmen. Geschwister von an Meningitis tuberculosa verstorbenen Kindern jedenfalls vor dem dritten Lebensmonat zu vacciniren.

**Erysipelas. Rothlauf.** Bei Säuglingen Ernährung durch Mutter oder Amme, die aber von der Ansteckungsgefahr in Kenntniss gesetzt werden muss. Daneben tropfenweise Rothwein, Malaga, russischer Thee mit Rum. Bei grösseren Kindern Ernährung entsprechend dem Fieber, fleissige Darreichung von Stimulantien. Während der Dauer der Krankheit nicht baden. Bei Säuglingen gegen das Fieber:

Rp. 1070. *Chinin. sulfuric.* 0·25,  
*Acid. sulfuric.* q. s. ad sol.,  
*Aqu. dest.*,  
*Syr. simpl.* aa 40·0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kaffeelöffel.

Bei grösseren Kindern entsprechend grössere Dosen von Chinin.

Local Umschläge von -

Rp. 1071. *Plub. acetic. liq. sol. gtt. 10,*

*Aqu. font. 2000.*

*S. Zu Umschlägen.*

Oder Umschläge von *Aqu. Calcis* mit *Ol. Lini* u. s., die Umschläge 2stündlich zu wechseln.

**Typhus abdominalis. Bauchtyphus.** Sorge für Erhaltung der Kräfte. Während des Fiebers nur flüssige Nahrung: Milch, leichter russischer Thee mit Milch, Schleimsuppen, gut gesalzene Rindsuppe. Zum Getränk frisches gutes Wasser: wo dies nicht zu beschaffen, in Eis gekühltes Sodawasser. Stündlich Reinigung des Mundes. Rechtzeitige Anwendung von Excitantien. Gegen das Fieber Kalte. Kalte Waschungen namentlich Abends, so oft die Haut heiss wird. Kalte Einpackungen: bei sehr hohem Fieber am besten Bäder von 22—24° R. durch 10—12 Minuten; zu wiederholen, sobald die Temperatur wieder auf 39.5—40° steigt. Bei Sopor oder Delirien Eisumschläge auf den Kopf, in schweren Fällen auch kalte Begiessungen des Kopfes (mit Wasser von 17—18° R.) Neben der Kaltwasserbehandlung auch Chinin zu geben.

Rp. 1072.

*Chinin sulfuric. 0.3 - 0.6,*

*Sach. alb. 10.*

*M. f. pulv. Div. in dos. acqu. No. 3.*

*D. S. Einige Stunden vor dem Ansteigen des Fiebers (also gewöhnlich etwa um 3 Uhr Nachm.)*

*2—3 Pulver in halbstündl. Pausen.*

Bei starker Diarrhoe statt dessen:

Rp. 1073

*Chinin. tannic. 0.6 - 1.2,*

*Aqu. dest.*

*Syr. rub. Idaci aa 300.*

*M. D. S. Am Nachmittag innerhalb 1 Stunde zu verbrauchen; vor dem Einnehmen gut umzuschütteln.*



Statt Chinin auch Antipyrin oder Antifebrin (s. Rp 873, 874).

Daneben gegen die Diarrhöe Magister. Bismuthi, Colombo, Cascarilla etc., aber kein Opium.

Bei Stuhlverstopfung Klystier mit Wasser, dem man eventuell 6—8 Gr. Ol. Ricini zusetzt.

In der Reconvalescentz vorsichtiger Uebergang zu fester Nahrung.

**Intermittens. Wechselfieber.** Drei Stunden vor dem Anfall Chinin in entsprechender Dosis, bei Säuglingen:

Rp. 1074.

*Chinin. sulfuric. 0·3,  
Acid. sulf. dil. q. s. ad sol.,  
Syr. simpl. 20·0.*

*S. In 1stündigen Intervallen auf 2 Portionen.*

Wenn die säugende Mutter ebenfalls an Intermittens erkrankt ist, das Kind

an eine gesunde Amme zu legen. Bei grösseren Kindern:

Rp. 1075.

*Chinin. sulfuric. 0·5—1·0,  
Sacch. alb. 1·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 3.*

*D. S. Jede Stunde 1 Pulv.*

Nach Aufhören der Krankheit Eisen, oder wenn Kachexie besteht, Arsen mit oder ohne Eisen.

Rp. 1076.

*Tinct. Fer. pomat.,  
Tinct. amar. āā 10·0,  
Sol. arsenic. Fowleri 5·0.*

*D. S. Früh und Abends nach dem Essen je 5 Tropfen, allmählich steigend bis zu 30 Tropfen im Tag.*

Womöglich Verlassen der Wechselfiebergegend.

**Lues hereditaria. Angeborene Syphilis.** Nur bei Ernährung durch die Brust Genesung zu erwarten. Wenn die Mutter (allem Anscheine nach) gesund, Ernährung durch die Mutter; wenn die Mutter ebenfalls Erscheinungen von Syphilis darbietet, Ernährung durch eine

Amme, die aber von der Gefahr, der sie sich aussetzt, in Kenntniss zu setzen ist. Dabei natürlich sorgfältige Beobachtung des Kindes, namentlich des Mundes; bei Rhagaden an den Mundwinkeln und bei Plaques muqueuses der Mundschleimhaut das Saugen auszusetzen. Neben der Brust bald entsprechend verdünnte Kuhmilch zu geben, vom fünften bis sechsten Monat an auch gut gesalzene Rindsuppe. Die Nase des Kindes vor dem Triuken stets mittelst feiner Wattetampons gut zu reinigen.

Medicamente bei kleinen Kindern am besten intern:

Rp. 1077.

*Calomelan lacrigat.* 0·05,  
*Ferr. carbon. saccharat.*  
0·1—0·2,

*Sacch. alb.* 2·0.

*M. f. pulc. Div. in dos*  
*aegu. No. 10.*

*D. S. 2mal tägl. 1 Pulver.*  
*nach 6 Tagen einige*  
*Tage pausiren.*

Bei verlässlichem Wartepersonal Sublimat-Bäder sehr zu empfehlen:

Rp. 1079. *Merc. sublim. corrosiv.* 0·5,

*Aqu. font.* 100·0,

*Sal. ammoniac. dep.* 1·0.

*S. Zusatz zu einem Bad.*

Gewöhnlich jeden zweiten Tag ein Bad. Dabei Acht zu geben, dass das Kind nichts vom Badwasser verschluckt.

Bei grösseren Kindern von über  $\frac{1}{2}$  Jahr auch Einreibungskur.

Rp. 1080.

*Ungu. ciner.* 0·5,

*Ungu. emollient.* 1·0.

*Dent. tal. doses No. 6.*

*Da in charta cerat.*

*S. Durch 6 Tage Einreibung an verschiedenen Stellen*  
*des Körpers, nach der sechsten Einreibung ein Bad.*

Bei Diarrhöe ist das Calomel auszusetzen.

In neuerer Zeit:

Rp. 1078.

*Hydrargyr. tannic. oxydu-*  
*lat.* 0·2,

*Sacch. alb.* 2·0.

*M. f. pulc. Div. in dos.*  
*aegu. No. 10.*

*D. S. 2mal tägl. 1 Pulc.*

Auch Injectionen des Bamberger'schen Quecksilber-Peptions oft gut.

Rp. 1081.

*Hydrargyr. peptonat. solut. 5·0,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*D. S. Tägl.  $\frac{1}{2}$  Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

Bei Rediciven, sowie bei Drüsen- und Knochen-syphilis Jod.

Rp. 1082.

*Syr. Ferr. iodat. gtts. 10,*

*Aqu. dest.,*

*Syr. simpl. aa 20·0.*

*S. Früh und Abends  
1 Kaffeelöffel.*

Zur localen Behandlung Sublimatbepinselungen:

Rp. 1083.

*Merc. bichlor. corros. 0·1,  
Glycerin. 50·0.*

*D. S. Zum Bepinseln (von Rhagaden oder Condylomen.)*

Bei Condylomen auch Betupfen mit Chlorina liquida und nachfolgendes Bestreuen mit Calomel (Labaraque).

Bei Ozaena syphilitica Salben, wie:

Rp. 1084.

*Mercur. praecip. rubr. 0·1,*

*Ungu. emollient. 20·0.*

*S. Salbe.*

Oder:

Rp. 1085.

*Hydrargyr. oxydat. flav. 0·2—0·3,*

*Ungu. emollient. 20·0.*

*S. Salbe.*

Diese Salben mittelst feinen Malerpinsels oder eines Wattetampons möglichst hoch hinauf in die Nase zu bringen.

Nach Schwinden der Syphilis-Erscheinungen noch lange Zeit sorgfältige Ernährung, Gebrauch von Leberthran, Eisen, Jod, Haller Jodwasser.

**Scorbutus. Scharbock.** Sorge für trockene Wohnung. Zur Nahrung Milch, bei grösseren Kindern Fleisch, Suppe, grüne Gemüse aller Art, Salat, Sauerkraut. Der Mund mehrere Male täglich mit Essigwasser auszuwaschen, das Zahnfleisch alle 2—3 Tage mit Lapis zu touchiren. Innerlich Chinin mit Eisen, in leichten Fällen auch nur eine Säure, wie:

Rp. 1086.

*Acid. tartaric. 0·5,*  
*Aqu. dest. 70·0,*  
*Syr. simpl. 20·0.*  
*S. 2stündlich 1 Kinder-*  
*löffel.*

Oder:

Rp. 1087.

*Succ Citr. rec. press. 20·0,*  
*Syr. simpl. 40·0.*  
*S. 2stündlich 1 Kinder-*  
*löffel.*

Viel gebräucht wird auch:

Rp. 1088.

*Decoct. Malt. cum turionibus Pini e 2·5 : 100·0,*  
*Syr. acetos. Citri 20·0.*  
*S. 2stündlich 1 Kinderlöffel.*

Bei Darmblutung Ruhe, leichte Diät:

Rp. 1089.

*Liqu. Ferr. sesquichlorat. gtts. 10—15,*  
*Tinct. Opii simpl. gtts. 1—5,*  
*Aqu. dest. 70·0,*  
*Syr. cort. Aurant. 20·0.*  
*D. S. 2stündlich ein Kaffeelöffel.*

Rp. 1090.

*Ergotin. de Bombellon gtts. 20,*  
*Aqu. dest. 70·0,*  
*(Tinct. Opii simpl. gtts. 1—3),*  
*Syr. simpl. 20·0.*  
*S. 2stündlich 1 Kaffeelöffel.*

Oder subcutane Injection von Ergotin de Bombellon  
 (½—1 Pravaz'sche Spritze).

Rp. 1091.

*Extr. Hydrast. canadens.,*  
*Vin. malacens. aa 10·0.*  
*S. 2mal täglich 10—12 Tropfen.*

**Melaena neonatorum** Das Kind warm einzuhüllen,  
 tropfenweise warmen Rothwein oder russischen Thee  
 mit Rum. Auf den Unterleib kalte Umschläge oder Eis-  
 beutel.



und in einem Tüllsäckchen durch etwa eine Minute in kochende Suppe getaucht, zur Verhütung von Erkrankung an *Taenia*. Zweimal wöchentl. laue (26° R.) Steinsalzbäder, 250—300 Gr. Steinsalz oder Halleiner Mutterlaugensalz auf ein Bad, bei starker Anämie statt dessen 1—3 Esslöffel Franzensbader Eisenmoorsalz oder 3—6 Stück Globuli martiales minores auf ein Bad. Die Bäder nicht des Abends zu geben.

Innerlich Gebrauch von Leberthran, bei Säuglingen Anfangs in einer Mixtur:

Rp. 1096.

*Ol. iccor. Aselli* 5·0—10·0,  
*Mucilag. gummi Arab.*,  
*Aqu. dest.* aa q. s. ut f. emulsio col. 50·0 100·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*S. Tagsüber die Flasche zu verbrauchen.*

(Die Leberthranmischung muss täglich frisch bereitet werden.)

Allmählich kann man zu reinem Leberthran übergehen, allenfalls m. Eisen vermischt, z. B.:

Rp. 1097.

*Ol. iccor. Asell.* 100·0,  
*Tinct. nerrino- tonic.* Bestuscheff. gtts. 20,  
*Syr. simpl.* 20·0.  
*S. Tagsüber zu verbrauchen.*

Wenn Leberthran nicht vertragen wird, bei Appetitlosigkeit oder Diarrhöe, sowie im Hochsommer statt dessen Eisenpräparate:

Rp. 1098.

*Ferr. carbon. sacch.* 0·5,  
*Sacch. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S. 3mal tägl. 1 Pulver.*

Eventuell auch:

Rp. 1099.

*Calc. phosphoric.*,  
*Ferr. carbonic. saccharat.* aa 3·0,  
*Sacch. lact.* 4·0.  
*S. 2mal täglich 1 Messerspitze voll.*

In neuerer Zeit wird nach Angabe von Kassowitz  
versucht:

Rp. 1100.

*Phosphori 0·01,*

*Ol. Amygdalar. dulc. 30·0,*

*Pulv. gumm. Arabic.,*

*Sacch. alb. āā 15·0,*

*Aqu. dest. 40·0.*

*D. S. 1—2 Kaffeelöffel im Tag.*

Bessere Wirkung hat wohl:

Rp. 1001.

*Phosphor. 0·01,*

*Ol. iecor. Asell. 100·G.*

*D. S. Täglich 1—2 Kaffeelöffel.*

---





Aus  
**Professor Dr. Alois Monti's**  
**Poliklinik für Kinderkrankheiten.**

(Revidirt von dem Assistenten Herrn Dr. J. Brunner.)

**A. Diätetisches.**

**Ernährung des Säuglings.** Wo es irgend durchführbar, ist das Kind durch die Brust von Mutter oder Amme zu ernähren.

**Die Diät der Stillenden** möglichst ähnlich der gewohnten Nahrung, nur reichlicher (im Minimum 5 Mahlzeiten täglich), sowie reichliches Getränk. Die Nahrung aus Milch, Fleisch, Gemüse, Mehlspeisen bestehend; Fleisch nicht öfter als zweimal im Tage. Saure oder zu fette Speisen, schwere Käsesorten, übermäßiger Genuss von Obst zu meiden. Bier nur bei daran gewohnten Personen, am besten Abzug- oder böhmisches Bier. An Wein gewohnten Frauen stark tanninhaltiger, aber nicht saurer Rothwein zu geben. Kohlensäure Wasser nicht angezeigt. Die Amme muss Bewegung machen, arbeiten, öfters baden.

**Eintheilung der Mahlzeiten:** Bei Neugeborenen alle  $1\frac{1}{2}$  Stunden, von der dritten Woche an alle 2 Stunden, von der fünften Woche an alle 3 Stunden zu säugen.

**Entwöhnung.** Vorzunehmen, wenn das Kind zwei untere und zwei obere Schneidezähne hat, also ungefähr im neunten Monat. Successive Entwöhnung, indem man erst einmal, dann allmählich öfter im Tag statt der Brust Kuhmilch gibt.

**Künstliche Ernährung im Säuglingsalter.**  
Die Milch für künstliche Ernährung: 1. Die Kuh

soll vor etwa 3 Monaten geworfen haben. 2. Sie soll nur mit trockenem Futter gefüttert werden. 3. Grösste Reinlichkeit beim Melken, die Gefässe, in welche die Milch kommt, sorgfältigst zu reinigen. Am besten die Milch zu sterilisiren mittelst des Apparates von Soxhlet. 4. Die Milch nur abgekocht zu nehmen und verdünnt, und zwar bei einem specifischen Gewicht der Milch von 1.030 — 1.036: bis zum Alter von 6 Wochen 2 Theile Wasser, 1 Theil Milch, von 6 Wochen bis zu 3 Monaten 1 Theil Wasser, 1 Theil Milch, „ 3 Monaten „ „ 7 „ „ 1 „ „ 2 Theile „ „ 7 „ „ „ 9 (12) „ „ 1 „ „ 3 „ „

Man gibt dann zu jeder Mahlzeit:

in der ersten Woche . . . . .	2—4	Esslöffel
„ „ zweiten „ . . . . .	3—4	„
„ „ dritten „ . . . . .	4—5	„
„ „ vierten „ . . . . .	5—6	„
im zweiten Monat . . . . .	7—9	„
„ dritten „ und den folgenden) 12	12	„

(Bei Dyspepsie nimmt man immer die niedrigere Zahl.)

Eine stärkere Verdünnung ist vorzunehmen, wenn der Stuhl schlechte Verdauung verräth. Die Milch erwärmt man, indem man die Saugflasche in warmes Wasser stellt, ihre Temperatur sei 26° C.

Um das Sauerwerden nichtsterilisirter Milch zu verhindern, kann derselben etwas Aqu. Calcis oder ein Esslöffel einer 1°<sub>0</sub>igen Lösung von Natr. bicarbon zugesetzt werden.

Statt der Kuhmilch gibt man auch sehr zweckmässig eine Rahmmischung in folgender Weise:  $\frac{1}{4}$  Liter Rahm,  $\frac{3}{8}$  Liter Wasser, 15 Gr. Milchezucker. Diese Mischung wird so lange gegeben, bis das Kind bei Gebrauch derselben nicht mehr an Gewicht zunimmt, dann gibt man die Mischung mit Zusatz von  $\frac{1}{16}$  Liter Kuhmilch, den man allmählich bis auf  $\frac{1}{4}$ — $\frac{7}{8}$  Liter steigern kann. Diese Rahmmischung nur bei sehr gutem Materiale anzuwenden.

Von gutem Erfolg ist auch Biederts künstliches Rahmgemenge. Man gibt 1 Esslöffel desselben auf 13 Esslöffel Wasser. Nimmt das Gewicht des Kindes dabei nicht

mehr zu, so setzt man dem Gemenge 1 Esslöffel Kuhmilch zu und steigt damit allmählich bis auf 13 Esslöffel.

Liebig'sche Suppe, nach Prof. Monti in folgender Weise zu bereiten:

Rp. 1102. *Kal. carbonic.* 2·0,  
*Aqu. font. dest.* 200·0.  
*D. S. Kalilösung, zur Bereitung der Liebig'schen Suppe.*

I. Der vierte Theil dieser Kalilösung mit einem Esslöffel voll Malzmehl vermischt durch eine Stunde stehen zu lassen.

II. Zehn Loth Milch mit einem Esslöffel voll Weizenmehl kalt gemischt und dann erwärmt. Hierauf werden I und II gemischt und unter Erwärmen umgerührt.

Diese Suppe verwendbar bei Säuglingen im Alter von 6 Monaten und darüber, ferner als diätetisches Mittel bei Darmerkrankungen für Kinder von 1—2 Jahren. Bei Neugeborenen muss die Suppe verdünnt werden, und zwar: bis zum zweiten Monat

2 Theile Wasser, 1 Theil Liebig'sche Suppe,  
vom zweiten bis vierten Monat

1 Theil Wasser, 1 Theil Liebig'sche Suppe,  
vom vierten bis fünften Monat

1 Theil Wasser, 2 Theile Liebig'sche Suppe,  
vom sechsten Monat an die Suppe unverdünnt.

Bei Dyspepsie und Enterokatarrh des Säuglingsalters kann auch entsprechend verdünnter Kefir (Nr. 1 und 2) verwendet werden.

Mit geradezu grossartigem Erfolge bei schweren Dyspepsien wurde Löflund's peptonisirte Milch angewendet. Man beginnt mit 1 Löffel auf 12 Löffel Wasser und steigt bis 1 Löffel auf 6 Löffel Wasser je nach dem Alter des Kindes.

Peptonisirte Milch kann man nach folgendem Recepte herstellen:

Rp. 1103. *Pancreatin.*,  
*Natr. bicarbonic.*  $\overline{aa}$  1·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ.* Nr. 10.  
*D. S. 1 Pulver als Zusatz zu jeder Milchportion.*

**Ernährung nach der Entwöhnung und bei älteren Säuglingen.** Nach der Entwöhnung soll das Kind durch 2 Monate noch hauptsächlich Kuhmilch bekommen. Weitere Nahrungsmittel sind: 1. Suppe; hauptsächlich bei anämischen Kindern mit Ekzemen oder mit Neigung zu Rhachitis, sowie bei fettleibigen Kindern. Die Suppe im Allgemeinen nie vor dem fünften Monat, bei gesunden Kindern erst im neunten Monat zu geben. Man gibt zunächst Kalbsbrühe, später pure Rindsuppe, der man vom neunten oder zehnten Monat an etwas Tapioca oder Maizena (s. unten) zusetzen kann. Nach der Entwöhnung zweimal täglich Suppe.

2. Amylacea, vor der Entwöhnung nicht angezeigt, nur bei abgemagerten Kindern vom vierten Monat anfangen einmal täglich in flüssiger Form. Nach der Entwöhnung 1–3mal täglich Amylacea als Zusatz zur Milch oder Suppe. Am zweckmässigsten Kindermehle, die jedoch nie als ausschliessliche Nahrung zu geben sind. Arrowroot kann vom neunten Monat bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr als Zusatz zur Milch gegeben werden. Ebenso die Proteinnährstoffe von Klencke. Maizena, 1 Kaffeelöffel auf  $\frac{1}{8}$ – $\frac{1}{4}$  Liter Milch, wird auch von Säuglingen sehr gut vertragen. Oppels Kinderzwieback, 1–2mal täglich der Milch zuzusetzen, so dass ein flüssiger Brei entsteht. Tapioca besonders als Zusatz zur Suppe u. s. w.

3. Fleisch, nicht vor dem achten oder neunten Monate zu geben, bei gesunden Kindern erst im zwölften Monat notwendig. Man gibt es roh oder gebraten in Purée-Form; rohes Fleisch wird besser vertragen, mit etwas Kochsalz in Form eines Breies in lauer Suppe zu nehmen; Anfangs 1 Kinderlöffel, und wenn dies vertragen wird, allmählich steigend bis zu 2 Esslöffeln. Auch rohes Fleisch mit Chocolate zweckmässig. Nach vollendetem erstem Lebensjahr im Minimum 1–2mal täglich Fleisch, und zwar schon abgebraten oder gedunstet, auf jede Mahlzeit 1–2 Esslöffel.

4. Eier werden von Säuglingen nicht vertragen, im zweiten Lebensjahr ein Eidotter als Zusatz zur Suppe ganz zweckmässig.

5. Getränke. *Alcoholica* in den ersten zwei Jahren bei gesunden Kindern nicht nothwendig, dagegen bei Krankheiten, die leicht zu Collaps führen, sehr indicirt, und zwar für Säuglinge Rum oder Cognac in Milch,  $\frac{1}{2}$  Kaffeelöffel pro Dosi bis zu 3 Esslöffeln pro die; bei grösseren Kindern süsser Wein kinderlöffelweise zu geben. Bier nur bei abgemagerten Kindern zu verwenden. Bei Rhachitis, Scrophulose etc. Wein und Bier ebenfalls angezeigt. Cacao als Pulver, oder als Fruchtschalen. Das Pulver in Wasser abzukochen und dann mit Milch zu mischen, ist gut bei älteren Säuglingen, die zu Diarrhöe neigen, 1—2mal täglich. Die Schalen nur vorübergehend bei Diarrhöen als Zusatz zur Milch zu verwenden. Von Kindern unter 3 Monaten wird Cacao nicht vertragen. Eichelkaffee statt Cacao bei älteren Säuglingen und bei grösseren Kindern recht gut. (Gerstenkaffee und Reiskaffee ohne Bedeutung.)

Russischer Thee zur Verdünnung der Milch nur bei Enterokataarrh, sonst ebenso wie Kaffee mit Milch erst vom zweiten Lebensjahre an zulässig.

Resumé: Diät des gesunden Kindes nach der Entwöhnung: 1. Milch, im Minimum 3 Mahlzeiten, bis zu vollendetem zweiten Lebensjahr. 2. Amylacea in kleinen Dosen zur Milch und Suppe. 3. Gekochtes Obst, im fünfzehnten Monate probeweise etwas grünes Gemüse. 4. Fleisch 1—2mal täglich. 5. Eidotter, 1—2mal täglich der Suppe zuzusetzen. Die meisten Mahlzeiten flüssig oder halbflüssig. Zwischen den einzelnen Mahlzeiten Pausen von mindestens 3 Stunden.

**Hauptpflege bei Säuglingen.** Täglich ein Bad, in den ersten 8 Tagen von 29° R., dann von 28—26° R.; während des Bades die Haut nicht oft zu reiben. Keine Badeschwämme, sondern am besten Bruns'sche Watte. Nach dem Bad die Hautfalten mit Reismehl einzustauben.

**Mundpflege im Kindesalter.** Bei Säuglingen der Mund mit in kaltes Wasser getauchten reinen Leinwandlappchen fleissig auszuwaschen. Während der ersten Dentition statt des Wassers auch antiseptische Lösungen wie:

Rp. 1104.

*Acid. boric.*  
 (od. *Natr. salicylic.*) 3·0,  
*Aqu. font. dest.* 200·0,  
*Tinct. Myrrh.* 2·0.  
*S. Mundwasser.*

Nach erfolgtem Durchbruch der Milchzähne dieselben täglich mittelst weichen Zahnbürstchens zu reinigen, entweder mit dem hier angeführten Mundwasser oder mit einem Zahnpulver. Bei kleinen Kindern:

Ro. 1105.

*Magnes. carbonic.* 5·0,  
*Cret. alb.,*  
*Natr. salicylic. aa* 15·0,  
*Ol. Menth. pip. gtt.* 6.  
*M. f. pulv. subtilissim.*  
*S. Zahnpulver.*

Bei grösseren Kindern:

Bp. 1106.

*Magnes. carbonic.,*  
*Sapon. medic. aa* 10·0,  
*Pulv. oss. Sepiae* 80·0,  
*Ol. Menth. pip. gtt.* 6.  
*D. S. Zahnpulver.*

## B. Therapie bei Kinderkrankheiten.

**Laryngitis acuta. Acuter Kehlkopfkatarrh.** Aufenthalt im Zimmer bei einer Temperatur von 14—15° R. Vermeidung jeden Temperaturwechsels, wenn das Krankenzimmer gelüftet wird, der Patient in ein Nebenzimmer mit gleicher Temperatur zu bringen. Die Zimmerluft durch Aufstellung von Gefassen mit bereits siedendem oder auf dem Ofen verdampfendem Wasser feucht zu erhalten. Wenn die Respiration des Patienten im Schlafe trocken und rauh wird, derselbe aufzuwecken, durch Stunden wach zu erhalten. Wärme, 3—4stündlich



zu wechselnde Priessnitz'sche Einwicklungen des Halses oder Kataplasmen aus Leinsamenmehl. Reichliche Zufuhr von warmen Getränken, wie warmes Zuckerwasser, Lindenblüthen-, Eibischthee etc. Inhalation von Wasserdämpfen. Der Kopf des Kindes über einem Gefäss mit siedendem Wasser durch 5–10 Minuten zu halten, Anfangs alle Stunden bis selbst alle halbe Stunden, im Stadium der Lösung seltener. Bei hochgradiger Larynxstenose:

Rp. 1107.

*Alum. crud. 2 0,*  
*Aqu. font. dest. 200 0.*  
*D. S. Zur Inhalation.*

Bei Trockenheit der Schleimhaut zur Anregung der Secretion statt der Wasserdämpfe auch Inhalationen 1procentiger Lösungen von Kali chloric., Natr. bicarbonic., Acid. boric. Ebenso:

Rp. 1108.

*Natr. benzoic. 6 0,*  
*Aqu. font. dest. 200 0.*  
*D. S. Zum Inhaliren.*

Oder:

Rp. 1109.

*Glycerin. pur. 20 0,*  
*Aqu. font. dest. 200 0.*  
*D. S. Zum Inhaliren.*

In neuerer Zeit auch:

Rp. 1110.

*Acid. carbolic. 2 0,*  
*Aqu. font. dest. 200 0.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

Oder:

Rp. 1111.

*Merc. sublim. corros. 0 01,*  
*Aqu. font. dest. 100 0.*  
*D. S. Zum Einathmen.*

Emetica nur bei hochgradigster Larynxstenose, wenn die Erscheinungen derselben schon mehrere Stunden gedauert haben und wahrscheinlich durch Schleimansammlung bedingt sind. Eine Viertelstunde vor Darreichung des Emeticums grosse Mengen lauwarmen Getränks zu reichen. Am besten:

Rp. 1112.

*Tartar. emetic.* 0·1,  
*Linct. gummos.* 50·0.  
*D. S.* 1 Esslöffel, nach  
 $\frac{1}{4}$  Stunde, wenn kein  
Erbrechen erfolgt ist,  
ein zweites zu geben.

Bei kräftigen Kindern  
über 2 Jahren:

Rp. 1113.

*Tartar. emetic.* 0·2,  
*Linct. gummos.* 50·0.  
*D. S.* Wie das Vorige.

Bei starkem Hustenreiz im Beginn der Erkrankung und  
bei nicht wesentlich erschwelter Respiration:

Rp. 1114.

*Pulv. Doveri* 0·1—0·5,  
(je nach dem Alter),  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S.* 2stündl. 1 Pulver.

Ebenso:

Rp. 1115.

*Pulv. Doveri* 0·1—0·5,  
*Sulf. aurat. Antimon.* 0·2,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S.* 2stündl. 1 Pulver.

Bei mässigem Hustenreiz auch:

Rp. 1116.

*Codein.* 0·03 0·1,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S.* Täglich 3—4 Pulver.

Bei trockenem Husten,  
zur Anregung der Secretion  
und Erleichterung der Ex-  
pectoration Alkalien:

Rp. 1117.

*Natri bicarb.* 1·0,  
*Aqu. font.* 90·0,  
*Syr. Cupill. Veneris* 10·0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kinderl.

In neuerer Zeit sehr gut  
bewährt:

Rp. 1118.

*Kal. iodat.* 1·0—2·0,  
*Aqu. font. dest.* 90·0,  
*Syr. Senegae* 10·0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kinder-  
löffel.

Bei langer Verzögerung  
der Lösung:

Rp. 1119.

*Sal. ammon. dep.* 0·3 – 0·4,

*Aqu. font.* 90·0,

*Syr. simpl.* 10·0.

*D. S.* 2stündlich 1 Kinder-  
löffel.

Nach Eintritt der Lösung  
bei reichlicher Secretion:

Rp. 1120.

*Inf. rad. Ipecac.*

*e* 0·12—0·2: 90·0,

*Liqu. Amm. anis. gtts.* 10,

*Syr. simpl.* 10·0.

*D. S.* 2stündl. 1 Kinderl.

**Prophylaxis** zur Verhütung von Recidiven. Bei Anämie, Scrophulose, schlechter Ernährung, Hebung der Kräfte durch gute Nahrung; bei wohlhabenden Leuten Winteraufenthalt im Süden (Meran, Arco, Mentone etc.), im Sommer nicht Gebirgsluft, sondern Aufenthalt in Orten mit geschützter Lage, wie Gleichenberg, Baden bei Wien, Vöslau. Zur Hebung der Ernährung Milchkuren, Tonica, Soolen- und Seebäder etc., im Winter Leberthran. Bei gesunden, aber verzärtelten Kindern systematische Abhärtung durch kalte Waschungen; jedoch nur im Frühjahr oder Sommer damit zu beginnen. Entweder Waschen der Wirbelsäule, des Rückens, des Halses und Brustkorbes mit einem Schwamm, oder das ganze Kind in ein in Wasser getauchtes und ausgewundenes Leintuch einzuschlagen, durch 5 Minuten abzureiben, dann abzutrocknen. Beide Procedures unmittelbar nach dem Aufstehen in mässig temperirtem Zimmer vorzunehmen; das Wasser Anfangs 24° R., dann allmählig immer um 1° kälter bis zu frischem Brunnenwasser. Chronischer Pharynxkatarrh als ursächliches Moment immer sorgfältig zu behandeln. Bei hypertrophischen Mandeln Tonsillotomie.

### **Laryngitis fibrinosa seu crouposa. Häutige Bräune.**

Zunächst Bekämpfung der Entzündungserscheinungen durch Kälte, und zwar innerlich alle 5—10 Minuten einige Eispillen, bei Kindern in den ersten Lebensjahren einige Kaffelöffel voll Eiswasser; um den Hals eiskalte, alle 5 Minuten zu wechselnde Compressen, Eisbeutel

oder Leiter'scher Apparat in Form einer Cravatte, mit Wasser von 5° R. gefüllt. Erst bei Beginn der Asphyxie die Kälte auszusetzen.

Zur Verhinderung des Exsudation versuchsweise Sublimat:

Rp. 1121.

*Merc. sublim. corrosiv.*  
0·01—0·05,

*Aqu. font. dest.* 90 0,

*Syr. rub. Idaci* 10 0.

*M. D. S.* 2stündl 1 Kinderlöffel.

Oder:

Rp. 1122.

*Merc. sublim. corrosiv.* 0·1,

*Aqu. font. dest.* 10·0,

*Natr. chlorat.* 0·3.

*D. S.* 2 - 4mal täglich  
1/2 Spritze zu injiciren.

Zu demselben Zwecke  
auch Alkali Salze, am besten:

Rp. 1123.

*Kal. iodat* 2·0,

*Aqu. font. dest.* 90·0,

*Syr. rub. Idaci* 10·0.

*D. S.* 2stündl. 1 Kinderl.

Bei hohem Fieber  
Wärmeentziehung durch Bäder  
oder Stammschläge;  
in Verbindung damit Chinin:

Rp. 1124.

*Chinin. sulfuric.*

1·0—2·0,

*Sacch. alb.* 3·0.

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ No. 10.*

*D. S.* 2stündlich 1 Pulver.

Zur Lösung der  
gesetzten Exsudate  
Priessnitz'sche Einwickelungen  
des Halses und Thorax  
oder der Leiter'sche Apparat,  
mit Wasser von 28—32° R.  
gefüllt, um den Hals.

Sehr erspriesslich Inhalationen mittelst des Sieg-  
le'schen Apparates, wenigstens stündlich zu wiederholen.  
Zur Inhalation verwendet man:

Rp. 1125.

*Alumin. crud.* 6·0,

*Aqu. font. dest.* 200·0.

*D. S.* Zu Inhalationen.

(Im Anfang, wenn die Stenose noch nicht hochgradig,  
besser Insufflationen von Alaunpulver mittelst Katheters  
in den Kehlkopf)

Sehr zweckmässig auch:

Rp. 1126.

*Aqu. Calcis* 150·0,  
*Aqu. font. dest.* 50·0,  
*Liquor. Natrii caustic.*  
gtts. 10—15.  
*M. D. S. Zur Inhalation.*

Rp. 1127.

*Alum. crud* 1·0,  
*Plumb. acetic.* 5·0,  
*Aqu. font. dest.* 100·0.  
*Misce et filtra.*  
*S. Zum Inhaliren.*

Am besten ist:

Rp. 1128.

*Acid. lactic. gtts.* 50—80,  
*Aqu. font. dest.* 200·0.  
*S. Zu Inhalationen.*

(Sobald die Lösung eingetreten, der Husten locker geworden u. Rasselgeräusche vorhanden sind, Tubage des Kehlkopfes od. ein Emeticum)

In neuerer Zeit mit Erfolg versucht:

Rp. 1129.

*Merc. sublim. corros.* 0·05,  
*Aqu. font. dest.* 200·0.  
*S. Zu Inhalationen.*

Recht wirksam auch Einblasungen von:

Rp. 1130.

*Jodoform.* 2·0,  
*Sacch. alb* 12·0.  
*D. S. 3mal täglich mittelst Pulverbläfers in den Kehlkopf einzublasen.*

Wenn deutliche Erscheinungen der Lösung vorhanden sind, ein Brechmittel angezeigt (s. Rp. 1112, 1113). Zur Beförderung der Expectoration auch:

Rp. 1131.

*Rad. Polygal. Seneg.* 15·0,  
*Coque cum Aqu. font. dest.* 250·0  
*usque ad remanent. colatur.* 125·0,  
*Syr simpl.* 10·0.  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderlöffel.*

In neuerer Zeit auch Pilocarpin als Injection von  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Spritze einer 1 $\frac{0}{10}$ -igen Lösung versucht.

Wenn schon Suffocationsanfälle aufgetreten sind und bei drohender Asphyxie unverzüglich die O'Dwyer'sche Tubage oder Tracheotomie.

Die Tracheotomiewunde wird nach den allgemeinen Grundsätzen der Chirurgie behandelt.



Die definitive Entfernung der Canüle nach der Tracheotomie so früh als möglich vorzunehmen; vorher versuchsweise die Canüle zeitweilig mit dem Finger zu verstopfen oder mit einem Stöpsel zu schliessen. Wird das Athmen ohne Canüle durch in die Trachea hineinragende Wundgranulationen gebindert, die Wundränder energisch zu touchiren, erst nach Schrumpfung der Granulationen die Canüle zu entfernen.

Allgemeinbehandlung nach der Tracheotomie: Das Kind befindet sich in gleichmässiger Temperatur (etwa 16° R.), stets gleichmässig feuchte Luft, beständig mit warmem Wasser gefüllte Gefässe im Zimmer, fleissige Lüftung. Nahrung nach der Operation: Wein, Suppe, Kaffee etc.; weiterhin, wenn kein Fieber vorhanden Milch, Kaffee, Fleischsuppe, hauptsächlich aber Fleisch und Wein, bei Fieber nur Milch und Suppe, von ersterer  $\frac{1}{2}$  - 1 Liter pro die. Zur Verhinderung neuer Fieberanfälle:

Rp. 1132.

*Chinin. tannic. 2·0 3·0,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. In 24 Stunden zu verbrauchen; das Pulver behufs Einnehmens in Milch oder Himbeersaft aufzulösen.*

Bei sehr anämischen Kindern statt des Chininum tannicum:

Rp. 1133.

*Chinin. ferrocitric.*

*2·0—3·0,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 3—4 Pulver tägl.*

Bei Complication mit Bronchitis catarrhalis Inhalation von Terpentin dampfen, wenigstens 4mal täglich. Bei complicirender Bronchitis crouposa Inhalation von 1°iger Carbolsäure oder 0·01 $\frac{0}{10}$  Sublimat; intern zur Beförderung der Expectoratio:

Rp. 1134.

*Ammon. carbon. sicc. 0·6,*

*Aqu. font. destill. 90·0,*

*Syr. Capill. Veneris 10·0.*

*D. S. 2stündlich 1 Kinderlöffel.*

Oder bei hochgradiger Dyspnoe:

Rp. 1135. *Infus. rad. Polyg. Senegae* e 8·0—12·0: 90·0,  
*Liq. Ammon. anis.* 1·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S.* 2stündlich 1 Kinderlöffel.

Bei anämischen Kindern:

Rp. 1136. *Infus. rad. Polyg. Senegae* e 8·0 12·0: 90·0,  
*Tinct. nervino-tonic. Bestucheffii* 0·5—1·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S.* 2stündlich 1 Kinderlöffel.

**Laryngospasmus Stimmritzenkrampf.** Im Anfall das Kind zu entkleiden, aufzusetzen, die Fenster zu öffnen; wenn dies nicht genügt, Hautreize, kalte Begiessungen, Douchen, Abreibungen. Bei drohender oder bereits eingetretener Asphyxie die Zunge vorzuziehen. Endlich künstliche Respiration durch Einführung eines elastischen Katheters bis in die Trachea und langsames Einblasen von Luft mit nachfolgender Compression des Thorax; Faradisation der Phrenici, eine Elektrode an den Sternocleidomastoideus, die andere in die Magengrube. Die Belebungsversuche nicht zu früh einzustellen, sondern, wenn nützlich, bis zu  $\frac{3}{4}$ —1 Stunde fortzusetzen.

Ausserhalb des Anfalls Therapie je nach der zu Grunde liegenden Krankheit. In allen Fällen Vermeidung jeder Aufregung; häufiges Lüften des Krankenzimmers, dabei aber Schutz vor Erkältung. Leichte, aber nahrhafte Kost; in den ersten Tagen nur flüssige Nahrung Entleerung des Darmes durch Irrigationen. Bei Rhachitis gute Ernährung, Salz- oder Soolenbäder, Leberthran.

Rp. 1137.

*Ol. jec. Aselli* 10·0,  
*Pulv. gum. Arab.*,  
*Aqu. destill. qu. s. ut f. mixtur. colat.* 90·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S.* 3—4 Esslöffel tägl.



Bei Hydrocephalus  
Jod, Brom, Chloralhydrat.

Rp. 1138.

*Natr. bromat.* 2·0—4·0,  
(bei 1jährigen Kin-  
dern 2·0),  
*Aqu. font. dest.* 90·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kinder-  
löffel.

Oder:

Rp. 1139.

*Natr. iodat.* 2·0 4·0,  
*Aqu. font. dest.* 90·0,  
*Tinct. Valerian. gtts.* 20,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Esslöffel.

Bei Gehirnreizung:

Rp. 1140.

*Chloral. hydrat.* 1·0—3·0,  
*Mixtur. gummos.* 90·0,  
*Syr. rub. Idaei* 10·0.  
*S.* 2stündlich 1 Kinder-  
löffel.

Chloralhydrat auch in  
Klysmen in 3 5<sup>6</sup>ziger Lö-  
sung. Zu versuchen auch:

Rp. 1141.

*Mixtur. oleos.* 90·0,  
*Tinct. Belladonnae*  
*gtts.* 2 6 8,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kinder-  
löffel.

Bei Tracheobron-  
chitis als Ursache, Inhalation  
von Wasserdämpfen,  
Terpentin oder von:

Rp. 1142.

*Acid. tannic.* 4·0,  
*Aqu. font. dest.* 200·0,  
*Aqu. Laurocer.* 10·0.  
*D. S.* 3 4mal täglich  
zu inhaliren.

Ferner ein Expectorans  
allein oder mit Chloral, z. B.:

Rp. 1143.

*Inf. rad. Polygal. Sc-*  
*negae e* 10·0 : 90·0,  
*Chloral. hydrat.* 2·0—3·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kinderl.

Bei Schwellung der  
Bronchialdrüsen:

Rp. 1144.

*Ferr. iodat. sacch.* 1·0,  
*Sacch. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aegu. No.* 10.  
*D. S.* 3—4 Pulv im Tag.

Bei gleichzeitig vor-  
handener Rhachitis Leber-  
thran pur oder mit Jodeisen:

Rp. 1145.

*Ol. iecor. Asell. mar.* 100·0,  
*Ferr. iodat. sacch.* 10·0.  
*Stent per hor.* 48, deinde  
*decanta.*  
*S.* Täglich 2 Esslöffel.

Bei Säuglingen statt dessen:

Rp. 1146.

*Ol. iecor. Asell. flav. 10·0,*  
*Pule. gumm. Arab,*  
*Aqu. font. dest. aa q. s. ut f. mixt. col. 90·0,*  
*Syr. Ferr. iodat. 10·0.*  
*D. S. 3–4 Essl. des Tages.*

**Bronchitis. Lungenkatarrh.** In leichten Fällen, bei Tracheobronchitis, dem Katarrh der grösseren Bronchien, Alkalien und leichte Expectorantia:

Rp. 1147.

*Inf. rad. Polygal. Senegae e 6·0 : 90·0,*  
*Kal. iodat. 1·0,*  
*Syr. capillor. Vener. 10·0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

Oder:

Rp. 1148.

*Natr. bicarbon. 1·0 2·0,*  
*Aqu. font. dest. 90·0,*  
*Syr. Senegae 10·0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

Bei acuter Bronchitis feinerer Bronchien im Anfang, so lange Fieber besteht, antipyretische Behandlung, bei Säuglingen:

Rp. 1149.

*Natrii salicyl. 1·0–2·0,*  
*Aqu. font. dest. 90·0,*  
*Syr. rub. Idaei 10·0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

Bei grösseren Kindern:

Rp. 1150.

*Chinin. sulfuric. 0·8,*  
*Acid. muriatic. dil. 1·0,*  
*Syr. simpl. 50·0.*  
*S. Auf 4 Dosen im Tag.*

Bei mässigem Husten reiz keine Narcotica, bei sehr starkem Tinct. Opii, z. B.:

Rp. 1151.

*Inf. rad. Ipecacuanh. e 0·2 : 90·0,*  
*Tinct. Opii simpl. gtts. 1–2–3,*  
*Syr. simpl. 10·0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

Wenn einmal reichliche Secretion vorhanden:

Rp. 1152.

*Inf. rad. Polygal. Senegae e 5·0 : 90·0,*  
*Syr. simpl. 10·0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

Bei Bronchitis capillaris der Säuglinge Bekämpfung des Fiebers durch:

Rp. 1153.

*Chinin. tannic. 1·0,*

*Sacch. alb. 2·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 2stündl. 1 Pulver.*

Ausserdem bei hohem Fieber über 39° auch Wärmeentziehung durch Wasser; Stammumschläge von der Axilla bis abwärts mit in Wasser von 15—18° getauchten Tüchern, nach einer Viertelstunde zu wechseln; 4 solche Umschläge nach einander, dann einige Stunden auszusetzen; im Tag 3—4 solche Cyklen. Bei sehr hohem Fieber auch Bäder von 18—24° R. in der Dauer von einigen Minuten. Zur Verhinderung der Secretstauung das Kind fleissig herumzutragen, öfters ihm mit dem Finger in den Rachen zu fahren; innerlich Expectorantia (am besten Seneg.) combinirt mit Excitantien (Kampher, Liqu. Ammon. anis.), ferner Wein, Cognac, Thee mit Rum (Recepte s. unter „Bronchitis crouposa“, S. 280 f.).

**Pertussis. Keuchhusten.** Isolirung des Kranken. Luftveränderung. Inhalationen von:

Rp. 1154.

*Acid. carbolic. 1·0,*

*Aqu. font. dest. 100·0.*

*D. S. Mittelst Siegle'schen*

*Apparates 3—4mal im*

*Tag zu inhaliren.*

Intern:

Rp. 1155.

*Natr. benzoic. 2·0,*

*Aqu. font. dest. 90·0,*

*Syr. simpl. 10·0.*

*D. S. 2stündl. 1 Kinder-*

*bis 1 Esslöffel.*

Sehr gut bewährt sich oft der Gebrauch von Chinin.

Rp. 1156.

*Chinini sulf (od tannic.)*

*1·0—2·0,*

*Sacch. alb. 9·0.*

*M. f. p. Div. in dos. aequ.*

*No. 10.*

*D. S. 4 Pulver täglich.*

(Nach 3tägiger Auwendung das Chinin durch 3 Tage auszusetzen und statt desselben ein mehr indiffe-

rentes Mittel, z. B. Rp. 1155, dann wieder durch 3 Tage Chinin etc., im Ganzen 3 solche Cyklen.)

In schweren Fällen zur Linderung der Anfälle und Besserung der Nachtrube auch Atropin:

Rp. 1157.

*Pulv. rad. Belladonn.* 0·1,  
*Natr. bicarbon.,*  
*Sacch. alb. aa* 1·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*

*D. S.* Bei kleineren Kindern 1 2 Pulver im Tag, bei grösseren 2—5, bei grossen selbst bis 10 Pulver im Tag.

Bei Säuglingen besser:

Rp. 1158.

*Mixtur. oleos.* 90·0,  
*Tinct. Belladonn.*  
*gtt.* 1 - 6,  
*Syr. simpl.* 10·0.

*D. S.* 3 Löffel des Tags, bei grösseren Kindern die ganze Portion im Tag.

In sehr schweren Fällen am Abend Chloralhydrat bei Säuglingen in 2<sup>o</sup>/<sub>o</sub>iger, bei grösseren Kindern in 3—4<sup>o</sup>/<sub>o</sub>iger Lösung, also:

Rp. 1159.

*Choral. hydr.* 2·0—4·0,  
*Mixtur. gummos.* 90·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.

*D. S.* Vor dem Schlafengehen 1 Esslöffel; wenn das Kind nicht schläft, nach 2 Stunden einen zweiten.

Rp. 1160.

*Sulfonal.* 2·5.  
*Div. in dos. aequ. No. 5.*  
*D. S.* Abends 1 Pulver in warmer Milch.

In neuester Zeit wird auch Oxymel Scillae oft mit Erfolg gegeben u. zw. in der Zeit von 4—6 Uhr Nachmittags jede halbe Stunde ein Kaffeelöffel voll.

Bei Pertussis inflammatoria mit Fieber und Bronchitis Inhalation von 1—2<sup>o</sup>/<sub>o</sub>iger Carbollösung, 2<sup>o</sup>/<sub>o</sub>iger Lösung von Natrium benzoicum, oder Terpentin-Einathmungen. Zur Herabsetzung des Fiebers Chinin, also z. B.:

Rp. 1161.

*Chinin. muratic.* (Bei Säuglingen *Chinin. tannic.*) 1·0,  
*Flor. Benzoës* 0·4,  
*Sacch. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S. 2stündlich 1 Pulver.*

Bei sehr hoher Temperatur hydropathische Stamm-  
 umschläge (s. „Bronchitis capillaris“, S. 284). Zur Nah-  
 rung Suppe, kalte Milch, bei schwachen Kindern Milch  
 mit Cognac, Thee mit Rum, auch etwas Wein.

**Emphysema pulmonum. Lungendampf.** Aufenthalt  
 in Gebirgsgegenden, im Winter im Süden. Bei Neigung  
 zu asthmatischen Anfällen Terpentin Inhalationen;  
 über Nacht nasse Umschläge um die Brust. Gegen die  
 chronische Bronchitis leichte Expectorantia, wie:

Rp. 1162.

*Roos Juniperi,*  
*Syr. capillor. Veneris* (bei Stuhlverstopfung *Syr.*  
*mannat.*)  
*Aqu. font. dest. aa* 30·0.  
*M. D. S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Bei starken asthmatischen Anfällen:

Rp. 1163.

*Natr. iodat.* 2·0,  
*Aqu. font. dest.* 90·0,  
*Syr. Seneg.* 10·0.  
*S. 2stündlich 1 Kinderlöffel.*

Danach, wenn keine Anfälle mehr auftreten, durch  
 längere Zeit:

Rp. 1164.

*Sol. ars. Fowler.,*  
*Aqu. font. dest. aa* 10·0.  
*D. S. 2—3mal täglich je 5 Tropfen.*

**Pneumonia. Lungenentzündung.** Gegen das Fieber  
Stammumschläge, Bäder, innerlich Chinin, tannic. oder:

Rp. 1165.

*Natr. salicylic.* 1·0—2·0,  
*Aqu. font. dest.* 90·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kinderl.

Bei sehr frequentem Puls:

Rp. 1166.

*Inf. fol. Digital.*  
*e* 0·15—0·20: 90·0,  
*Syr. rub. Idaei* 10·0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kinderl.

Im Stadium der Lösung  
ein Expectorans:

Rp. 1167.

*Inf. rad. Polygal. Se-*  
*negae e* 10·0 : 90·0,  
*Liqu. Ammon. anisat.* 1·0,  
*Syr. cort. Aurant.* 10·0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kinder-  
löffel.

Wenn in diesem Stadium  
noch das Fieber andauert:

Rp. 1168.

*Inf. rad. Polygal. Se-*  
*negae e* 8·0—10·0: 90·0,  
*Natr. salicylic.* 2·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kinderl.

Bei Eintritt von Ath-  
mungs-Insufficienz und Herz-  
schwäche Thee mit Rum,  
Wein, Waschungen mit war-  
mem Essig u. Wasser, ferner:

Rp. 1169.

*Camphor. ras.* 0·2,  
*Spir. vin. rectificatissim.*  
*Pulv. gumm. Arabic. aa*  
*q. s. ut solvatur ad:*  
*Inf. rad. Polygal. Se-*  
*negae e* 10·0 : 90·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S.* <sup>1,2</sup>—1stündlich  
1 Kinderlöffel.

**Tuberculosis pulmonum. Lungenschwindsucht.**

Aufenthalt in gesunder Luft, im Winter südliches  
Klima, im Sommer Gebirgsaufenthalt. Gebrauch von alka-  
lisch-muriatischen Wässern, Molken und Kefir. Innerlich  
gegen das Fieber und als Tonicum:

Rp. 1170.

*Solut. arsenic. Fowleri,*  
*Aqu. font. dest. aa* 10·0.  
*D. S.* 10 Tropfen im Tag.



Rp. 1161

*Chinin-mucosa* (Bei Stuplingen *Chinin-tannic.*) 10,  
*Flur. Benzoi* 04.

*Natr. sul.* 20.

*M.* 1 *pass.* *Dec.* in *dec. aqua.* No. 10.

*D.* 8 *stündlich* 1 *Pauc.*

Bei sehr hoher Temperatur hydropathische Stamm-  
 umschläge s. „*Bronchitis capillaris*“, S. 284. Zur Nah-  
 rung Suppe kalte Milch, bei schwachen Kindern Milch  
 mit Cognac. Thee mit Rum. auch etwas Wein.

**Emphysema pulmonum. Lungendampf.** Aufenthalt  
 in Gebirgsgegenden im Winter im Süden. Bei Neigung  
 zu asthmatischen Anfällen Terpentin Inhalationen;  
 über Nacht nasse Umschläge um die Brust. Gegen die  
 chronische Bronchitis leichte Expectorantia, wie:

Rp. 1162

*Ros. Juniperi.*

*Syr. cupular. Ventris* (bei Stuhlverstopfung *Syr.*  
*acut.*)

*Aqu. font. dest.* ad 300.

*M.* *D.* 8 *stündlich* 1 *Esslöffel.*

Bei starken asthmatischen Anfällen:

Rp. 1163

*Natr. sulat.* 20.

*Aqu. font. dest.* 900.

*Syr. Seneg.* 100.

*S.* *stündlich* 1 *Kindel.*

Danach, wenn keine Aufblähung auftritt:  
 längere Zeit:

Rp. 1164.

*Sol. us.* *Fourier.*

*Aqu. font. dest.* ad

*D.* 8 *2* *3mal tagl.*



Oder:

Rp. 1171.

*Ferr. arsenicos. cum Am-  
monio citrico 0·2,  
Sacch. alb. 2·0.  
M. f. pulv. Div. in dos.  
aegu. No. 10.  
D. S. 2mal tägl. 1 Pulv.*

Gegen das Fieber auch  
Chinin oder Antipyrin:

Rp. 1172.

*Antipyrin. 1·0,  
Sacch. alb. 2·0.  
M. f. pulv. Div. in dos.  
aegu. No. 5.  
D. S. 2—3 Pulver in  
1stündig. Intervallen.*

Die Hustenerscheinungen nach den unter Bronchitis  
angegebenen Methoden zu bekämpfen.

Gebrauch von Leberthran. In neuerer Zeit statt des-  
selben empfohlen Morrhuol in Kapseln von Chapo-  
teaut, 2—4 Kapseln im Tag.

Bei beginnender Lungenschwindsucht neuestens ver-  
sucht Creosot, dasselbe jedoch bei Appetitlosigkeit aus-  
zusetzen.

Rp. 1173.

*Creosot. 1·0,  
Aqu. Cinnamom.,  
Syr. Cinnamom. aa 15·0.  
D. S. 3mal täglich 10—15 Tropfen.*

Oder:

Rp. 1174.

*Creosot. 1·5,  
Spir. vin. rectific. 25·0,  
Aqu. Cinnamon. 100·0,  
Syr. Cinnamom. 30·0.  
S. 3mal täglich 1 Kaffeelöffel.*

Rp. 1175.

*Creosot. gtts. 5—15,  
Spir. Aether. gtts. 5—10,  
Aqu. font. dest. 50·0,  
Sacch. alb. 10·0.  
S. 2stündlich 1 Theelöffel.*

(Soltmann).

**Pleuritis. Rippenfellentzündung.** Gegen die Schmerzen Kälte, gegen das Fieber Chinin und Stammumschläge; bei starker Pulsbeschleunigung Digitalis. Nach Ablauf des Fiebers zur Resorption des Exsudates leichte Diuretica, wie:

Rp. 1176.

*Decoct. rad. Ononid. spinos. e 30:900,*  
*Oryz. Scillae 100.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderlöffel.*

In neuerer Zeit auch:

Rp. 1177.

*Natr. chlorat. 20,*  
*Aqu. font. dest. 900,*  
*Succ. Liquirit. 100.*  
*D. S. Die Hälfte in einem Tag zu nehmen.*

Bei eitrigem Exsudat kräftige Nahrung, Chinin, Eisen, Punction des Thorax, eventuell Rippen-Resection.

**Endocarditis. Entzündung des Endocardiums.**

Betruhe, kalte Umschläge, bei sehr stürmischer Herzaction Eisbeutel oder besser Leiter'scher Kühlapparat auf die Herzgegend.

Rp. 1178.

*Inf. folior. Digitalis*  
*e 0.2—0.5:900,*  
*Nutr. salicylic. 20,*  
*Syr. rub. Idaei 100.*  
*D. S. 2stündlich 1 Kinderlöffel.*

Bei starkem Oppressionsgefühl:

Rp. 1179.

*Inf. folior. Digitalis*  
*e 0.2—0.4:900,*  
*Aqu. Laurocer. 20—30,*  
*Syr. simpl. 100.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderlöffel.*

Bei Stuhlverstopfung:

Rp. 1180.

*Calomelan. laevigat,*  
*Pulv. folior. Digitalis*  
*aa 01,*  
*Sacch. alb. 30.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No 10.*  
*D. S. 4 Pulver täglich.*

Bei Fieber:

Rp. 1181.

*Acid. tartaric. 20,*  
*Aqu. font. dest. 900,*  
*Aqu. Laurocer. 20,*  
*Syr. rub. Idaei 100.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderlöffel.*

Kein Antipyreticum, nur Zusatz von *Natr. salicylic.* zum *Digitalis-Infus.*

Bei Anämie:

Rp. 1182.

*Inf. fol. Digital. e* 0·2—0·4: 90·0,  
*Tinct. nervino-tonic. Bestuscheffii* 2·0,  
*Syr. cort. Aurant.* 10·0.  
*D. S.* 2stündl. 1 Kinderlöffel.

Bei Eintritt von Collaps Aussetzen der *Digitalis*, Wein, Cognac, Rp. 1217, 1252.

**Coryza. Schnupfen. Nasenkatarrh.** Zur Beseitigung des Secrets Auswischen der Nasenlöcher mit nassen Wicken von Bruns'scher Watta; wenn dies nichts nützt, die Nase mittelst einer kleinen Spritze auszuspritzen (s. „*Diphtheritis narium*“). Bei Trockenheit und starker Schwellung der Schleimhaut Einführung von Wicken mit:

Rp. 1183.

*Merc. praecip. rubr.* 0·2,  
*Ungu. emollient.* 10·0.  
*D. S.* Salbe.

Dieselbe Therapie neben entsprechender Allgemeinbehandlung auch bei der scrophulösen Ozaena.

**Diphtheritis narium. Nasendiphtheritis.** Prophylaxis und Allgemeinbehandlung s. unter „*Angina diphtheritica*“, S. 294, 296 ff. Local gründliche Reinigung der Nasenschleimhaut durch fleissiges Ausspritzen mittelst einer Spritze mit olivenförmigem Ansatzrohr oder eines Irrigationsapparates. Die eingespritzte Flüssigkeit soll durch das zweite Nasenloch und den Mund herausfliessen, Patient während des Ausspritzens den Mund offen halten. Diese Injectionen 2--6mal im Tag vorzunehmen. In leichten Fällen einfach ausgiebige Wasserinjectionen; die Nasenhöhlen verstopfende Pseudomembranen vorher mittelst

Kornzange oder Sonde zu entfernen, die Schleimhaut mit Lapis, Carbolsäure oder Sublimat zu cauterisiren. In schweren Fällen statt Wasserinjectionen:

Rp. 1184.

*Jod. tribrom. gtt. 20,*  
*Aqu. destill. 200·0.*  
*D. S. Zum Ausspritzen.*

Rp. 1185.

*Acid. boric. 2·0,*  
*Aqu. destill. 200·0.*  
*D. S. Zum Ausspritzen.*

Rp. 1186.

*Aqu. Calcis,*  
*Aqu. font. dest. aa 100·0,*  
*Spir. vin. 2·0.*  
*D. S. Zum Ausspritzen.*

Ebenso:

Rp. 1187.

*Acid. tannic. 5·0,*  
*(od. Alum. crud. 3·0),*  
*Aqu. font. dest. 100·0,*  
*Spir. vini 2·0.*  
*D. S. Zum Ausspritzen.*

Rp. 1188.

*Merc. sublim. corrosiv.*  
*0·03—0·05,*  
*Aqu. font. dest. 200·0.*  
*D. S. 4mal täglich die*  
*Nase auszuspritzen.*

Empfohlen sind auch Einblasungen von Tannin, Alaun, Natr. benzoic. als Pulver. Besser ist:

Rp. 1189.

*Jodoform.,*  
*Magnes. carbon. aa 10 0.*  
*D. S. 3mal täglich davon*  
*in die Nase einzublasen.*

Auch auf Watte-Wicken gestreut oder in Salbenform (1 : 20 Fett) ist das Jodoform zu verwenden.

Ebenso auch:

Rp. 1190.

*Merc. praecip. alb. (oder*  
*rubr.) 1·0,*  
*Natr. bicarbonic. 10·0.*  
*D. S. Zum Einblasen.*

Auch Bougies zweckmässig, wie:

Rp. 1191.

*Bougies nasal Jodoform.*  
*(Merc praec. alb. oder*  
*rubr.) 0·1 No. 10.*  
*D. S. 2mal täglich in die*  
*Nase einzuführen.*

In schweren Fällen Combination all dieser Behandlungsmethoden, daneben Inhalationen von Carbolsäure, Terpentin, Sublimat oder Jod. tribromat., 3 mal täglich durch 5 Minuten. Wenn Bronchitis oder sonstige Complication von Seite der Lungen besteht, dürfen Inhalationen mit letzterem Mittel nicht vorgenommen werden.

**Stomatitis aphthosa. Aphthen.** Jede mechanische Beleidigung der Mundschleimhaut (Quetschen, Reiben) zu vermeiden. Im Beginn der Krankheit Kälte, Eisstückchen schlucken lassen, Eiswasser, bei Säuglingen der Mund 3—4mal täglich mittelst Spritze mit frischem Brunnen- oder mit Eiswasser auszuspritzen. Ferner:

Rp. 1192.

*Kal. chloric. 4·0,*

*Aqu. font. dest. 200·0,*

*Tinct. Myrrh. 3·0.*

*S. Zum Ausspritzen des Mundes.*

Auch intern:

Rp. 1193.

*Kal. chloric. 1·0,*

*Aqu. font. dest. 90·0,*

*Syr. rub. Idaei 10·0.*

*D. S. In Eis eingekühlt,  
2stündlich 1 Kinderl.  
zu geben.*

Bei starken Schmerzen, namentlich bei Geschwüren der Zunge:

Rp. 1194.

*Merc. sublim. corros. 0·1,*

*Aqu. font. dest. 50·0.*

*S. Zum Bepinseln.*

Ebenso auch:

Rp. 1195.

*Acid. salicylic. 1·0,*

*Aqu. font. dest. 90·0,*

*Spir. vin. 2·0.*

*D. S. Zum Einpinseln.*

Als Nahrung, solange die Mundschleimhaut sehr empfindlich ist, nur in Eis gekühlte Milch, später kalte Suppe, kaltes Fleisch bis zum Uebergang zur gewöhnlichen Diät. Wenn, was häufig, Complicationen von Seite des Magens und Darms bestehen, dieselben nach den entsprechenden Regeln zu behandeln

**Stomacace. Mundfäule.** Entfernung etwa vorhandener cariöser Zähne. Kalte, Ausspritzen mit kaltem Wasser. Die Mundhöhle zu desinficiren durch:

Rp. 1196. *Kali chloric. 2·0,*

*Aqu. font. dest. 200·0,*

*Tinct. Myrrh. 10·0.*

*D. S. Hiermit täglich mehrmals die Mundhöhle auszuspritzen od. mittelst Haarpinsels genau auszubepinseln.*



Ebenso wird in neuerer Zeit verwendet:

Rp. 1197.

*Chinolin. tartaric. 1 0,*  
*Aqu. font. dest. 180 0,*  
*Spir. vin.,*  
*Aqu. Menth. aa 10 0.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

Im Stadium der Nekrose das Zahnfleisch täglich mehrmals mit 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>iger Carbonsäure zu bestreichen, oder:

Rp. 1198.

*Jodoform. 2 0,*  
*Natr. benzoic. 20 0*  
*Detur ad scatul.*

*S. Das Zahnfleisch mit Bruns'scher Watte trocken abwischen, dann das Pulver mittelst Pinsels einzureiben.*

Wenn sich Gangrän der Mundschleimhaut (Noma) entwickelt hat, das gangränöse Gewebe herauszuschneiden, die Wunde mit Jodoform zu bestreuen.

**Soor. Mehlhund.** 2stündlich der Mund mit sehr nassem Leinwandfleck systematisch zu reinigen, gebrauchte Leinwandflecke wegzuwerfen. Als Reinigungswasser benützt man:

Rp. 1199

*Natr. boracic 3 0,*  
*Aqu. dest. 200 0.*  
*S. Mundwasser.*

Rp. 1200.

*Kal. hypermangan. 0 05,*  
*Aqu. dest. 200 0.*  
*D. S. Mundwasser.*

Ebenso kann man anwenden: Kali chloricum in 1<sup>0</sup>/<sub>0</sub>iger, Natrium benzoicum in 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub>iger, Natrium salicylic. in 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>iger Lösung etc.

**Angina (tonsillaris). Hals- (Mandel-) Entzündung.**

Kalte Umschläge um den Hals, Eisstückchen oder bei ganz kleinen Kindern Eiswasser esslöffelweise zu verabreichen; ferner, wenn Fieber vorhanden, eine 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>ige, bei Kindern über 5 Jahren eine 3<sup>0</sup>/<sub>10</sub>ige Lösung von Natr.

salicylic. (2stündlich 1 Esslöffel), wenn kein Fieber, Kali chloric. in 1—2<sup>o</sup> iger Lösung innerlich, bei grösseren Kindern auch ein Gurgelwasser von Kali chloric. oder:

Rp. 1201.

*Chinolin. tartaric. 5·0,*

*Aqu. font. dest. 180·0,*

*Aqu. Menth.,*

*Spir. vin. aa 10·0.*

*M. D. S. Gurgelwasser.*

Prophylaktisch zur Verhütung von Recidiven systematische Abhärtung (s. „Laryngitis catarrhalis“. S. 277), bei Hypertrophie der Mandeln Tonsillotomie.

**Angina diphtheritica. Rachendiphtheritis, Rachenbräune.** *a.* Prophylaxis: Möglichst vollständige Isolirung des Kranken; die gesunden Kinder aus dem Wohnhaus des Patienten zu entfernen; bevor sie in dasselbe zurückkehren dürfen, muss das erkrankte Kind seit 14 Tagen vollständig gesund und die Wohnräume gründlich desinficirt sein. Behufs der Desinfection die Möbel, der Boden, alle waschbaren Gegenstände mit grüner Seife und Lauge zu waschen, die Wände und der Boden mit 1<sup>o</sup> iger Carbol säure-Lösung zu waschen, oder wo dies nicht möglich ist, durch mehrere Stunden Carbol-Spray oder Sublimat-Spray (von einer Lösung von 1 : 4000) zu entwickeln, hierauf das Zimmer einen halben Tag lang gut zu ventiliren, danach Boden und Wände trocken abzuwischen. Mit denselben Lösungen die Wäsche des Patienten zu reinigen; der Kranke und alle Personen, die mit ihm während der Krankheit verkehrten, am ganzen Körper mit Carbolseife zu waschen und durch ein warmes Bad zu reinigen.

*b.)* Locale Behandlung. Im Beginn Kälte. Eispillen oder Eiswasser alle 5—10 Minuten innerlich, um den Hals kalte Compressen, Eisblase oder Leiter'sche Halseravatte mit Wasser von 5 - 8° R. Sobald Ver-



eiterung und Verjauchung begonnen, die Kalte auszusetzen; die erkrankten Rachengebilde durch Ausspritzen mit lauem Wasser zu reinigen. Keine Cauterisation; nur gründliche Reinigung des Schlundes durch Irrigation mittelst Wundspritze oder Irrigators; bei gleichzeitiger Larynx Diphtheritis jedoch keine Ausspritzungen vorzunehmen. Zur Ausspritzung verwendet man: Kali chloric. ( $1^0/0$ ), Natr. chlorat. ( $\frac{1}{2}^0/0$ ), Aqu. Calcis ( $50^0/0$ ), Natr. salicylic. ( $2^0/0$ ), Natr. benzoic. ( $5^0/0$ ), Kal. hypermangan. ( $0.1^0/0$ ), Acid. carbolic. ( $\frac{1}{3}^0/0$ ), Acid. boric. ( $1^0/0$ ), Sublimat ( $0.3^0/00$ ), endlich:

Rp. 1202.

*Acid. thymic. 1.0,*  
*Aqu. font. dest. 1000.0.*  
*S. Zur Ausspritzung.*

Rp. 1203.

*Aqu. Chlorig 100.0,*  
*Aqu. font. dest. 1000.0.*  
*S. Aeusserlich.*

Ebenso Jod. tribromat. (s. Rp. 1184)

Noch besser als Irrigationen wirken Insufflationen. Wenn im Beginn bedeutende Schwellung und Röthung besteht, dreimal täglich fein pulverisirter Alaun einzustauben. Wenn mächtige, speckige Membranen vorliegen:

Rp. 1204.

*Kal. chloric. 2.0,*  
*Sacch. alb. 8.0.*  
*D. S. 3mal täglich hievon einzublasen.*  
Ebenso Natr. benzoic.

oder salicylic. pur zu gebrauchen, oder:

Rp. 1205.

*Borac. venet.,*  
*Sacch. alb. aa 5.0.*  
*D. S. Zum Einblasen.*

Bei übelriechenden, missfärbigen Membranen am besten:

Rp. 1206.

*Jodoform. 2.0,*  
*Natr. bicarbon. 8.0.*  
*S. Zum Einblasen.*

In schweren Fällen Ausspritzungen und Insufflationen zu combiniren, grössere Kinder daneben auch 2stündlich gurgeln zu lassen; bei rapider Ausbreitung des Processes 3—4mal täglich Inhalationen mittelst Siegleschen Apparates von Acid. carbolic. in 1—2 $\frac{0}{10}$ iger,

Sublimat in 0·1%iger oder Natr. benzoicum in 2%iger Lösung oder Jod tribromat. nach den S. 291 angegebenen Grundsätzen.

Bei rapider Neubildung der Membranen oder bei grosser Neigung derselben zur Gangrän Irrigationen mit Spir. vin. und Aqu. dest  $\overline{aa}$ , mehrere Male des Tages vorzunehmen. Bei eingetretener Gangrän oder bei rascher Ausbreitung der diphtheritischen Producte:

Rp. 1207.

*Merc. sublim. corros.* 0·03,  
*Spir. vini rectific.*,  
*Aqu. font. dest. aa* 100 0.  
*D. S.* Zu Ausspritzungen.

Innerlich zur Befeuchtung der Schleimhaut alkalische Lösungen als Getränk, z. B. Aqu. Calc zu gleichen Theilen mit Wasser, Natr.

bicarbon. in 2%iger Lösung oder:

Rp. 1208.

*Kal. chloric.* 2·0 – 3 0,  
*Aqu. font. dest.* 300·0,  
*Syr. rub. Idaei* 25·0.  
*D. S.* Zum Getränk.

Die alkalischen Lösungen beim Eintritt von Collaps auszusetzen.

c) Allgemeinbehandlung. Nahrung Anfangs nur flüssig, Milch, Schleimsuppe, Fleischbrühe mit oder ohne Ei. Nach Reinigung des Schlundes Fleischkost, Wein, Rum, Cognac. Das Krankenzimmer gehörig zu lüften, auf einer Temperatur von 14° R zu erhalten. Gegen das Fieber Wärmeentziehungen; bei Temperaturen von 40—41° C. Bäder von 18—20° R, 2–4mal im Tag, jedoch bei Kohlensäure-Ueberladung oder Collaps zu unterlassen; bei Temperaturen zwischen 38·5 und 39·5° Einpackungen mit in Wasser von 24—18° R getauchten Leintüchern,  $\frac{1}{2}$ stündlich zu wechseln und durch 2 Stunden fortzusetzen; bei Symptomen der Kohlensäure-Ueberladung und niederen Temperaturen Einpackungen mit Wasser von 24—28° R, 3stündlich zu wechseln. Intern:

Rp. 1209.

*Natr. salicylic. 1·0—4 0,*  
(je nach Alter),  
*Aqu. font. dest. 90·0,*  
*Syr. simpl. 10 0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Esslöffel.*

Oder:

Rp. 1210.

*Chinin. muriatic. (oder*  
*sulf.) 0 5 - 1·0,*  
*Sacch. alb. 3·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10*  
*D. S. 2stündl. 1 Pulver.*

Bei geringer Temperatursteigerung und starken Vergiftungserscheinungen:

Rp. 1211.

*Chin. ferrocitr. 0·5—1 0,*  
*Aqu. font. dest. 90·0,*  
*Syr. cort. Aurant. 10·0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kinder-*  
*löffel.*

Versuchsweise kann man im Beginn der Krankheit intern Sublimat geben.  
(Rp. 1121.)

Bei Collaps warme Bäder mit allmählicher Temperatursteigerung bis auf 30° R. und nachfolgender 3stündiger feuchtwarmer Einwicklung, alle 3 Stunden zu wiederholen, bis Schweiss eintritt. Ausserdem starker russischer Thee mit Rum, schwere Weine, Cognac, Kaffee, Suppe.

In neuerer Zeit ist gegen Diphtheritis sehr empfohlen:

Rp. 1212.

*Solut. Hydrogen. hyper-*  
*oxydat. 2% 97·0,*  
*Glycerin. 3·0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Esslöffel.*

Daneben eine 5<sup>0</sup>/<sub>10</sub>ige Lösung zum Einpinseln der erkrankten Theile.

Gegen die sich entwickelnde Anämie und Schwäche roborirende Diät, Milch, Kaffee, Suppe, Fleisch, Wein, daneben Eisenpräparate, wie:

Rp. 1213.

*Ferr. oxyd. dialysat. 1·0,*  
*Aqu. font. dest. 80·0,*  
*Aqu. Menth. pip.,*  
*Syr. cort. Aurant. aā 10·0.*  
*D. S. 4—5 Esslöffel im Tag.*

Oder:

Rp. 1214.

*Ferr. albuminat. sacch.*  
*solubil. 2·0,*  
*Sacch. alb. 3·0*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 3stündl. 1 Pulver.*

Rp. 1215.

*Tinct. nervino-tonic. Bestuscheffii* 1·0—2·0,  
*Mixtur. gummos.* 80·0,  
*Aqu. Menth. pip.,*  
*Syr. simpl. au* 10·0.  
*D. S.*  $\frac{1}{3}$ stündl. 1 Kaffee-  
löffel.

Oder:

Rp. 1216.

*Inf. semin. Coffeae tost.*  
*e* 10·0:80·0,  
*Extr. Chin. frigide pa-*  
*rat.* 12·0,  
*Syr. simpl.* 8·0.  
*D S*  $\frac{1}{3}$ stündl. 1 Kaffee-

Bei vorgeschrittenem Collaps:

Rp. 1217.

*Camphor. ras.* 2·0,  
*Spir. vin.* 10·0.  
*D. S* 5—10 Tropfen sub  
cutan zu injiciren.

Oder:

Rp. 1218.

*Aether. acetic.* 5·0,  
*Ol. Cinnamom.* 1·5.  
*D. S.* Stündl. 3—5 Tropf.

d) Bei diphtheritischen Lähmungen kräftige Ernährung (bei Lähmung des Gaumensegels oder Kehlkopfs durch die Schlundröhre), Gebrauch von Eisen und Chinin, Eisenbäder oder Kaltwasserkur. Inductions- und galvanische Electricität an den gelähmten Muskeln. Eventuell täglich oder jeden zweiten Tag subcutane Injection von 0·001—0·002 Strychnin. nitric. Bei Lähmung des Gaumensegels fleissige Ausspritzung des Rachens mit Eiswasser oder Wasser mit Spiritus *aa.*

**Dyspepsie.** Das Wichtigste die causale Behandlung: Bei Brustkindern strenge Ordnung in der Darreichung der Brust, dieselbe eher seltener zu geben, als bei gesunden Kindern; sobald das Kind die Brust auslässt, die Mahlzeit nicht fortzusetzen. Bei Menstruation der Stillenden zunächst nur symptomatisches Verfahren; wenn das Kind an Gewicht verliert, Ammenwechsel. Bei Dyspepsie in Folge der Entöhnung geregelte Diät, gewässerte Milch mit Zusatz von einem Alkali (s. S. 270) oder Milch mit Kallsbrühe; wenn trotzdem die Dyspepsie fort dauert, wieder eine Amme zu nehmen. Bei künstlich

genährten Kindern, wenn möglich, Ammenbrust, wenn dies nicht durchführbar, jedenfalls Wechsel der Nahrung; Milch womöglich sterilisirt, mit Wasser oder Kalbsbrühe verdünnt (die Mischungsverhältnisse s. S. 270), Biedert'sches Rahmgemenge, Liebig'sche Suppe od. Löflund's peptonisirte Milch. Bei gleichzeitigem Enterokatarrh wird russischer Thee als Zusatz zur Milch verwendet.

Medicamentöse Behandlung: Bei Frühgeborenen, wegen mangelhafter Secretion von Magensaft:

Rp. 1219.

*Pepsin. Germanic. 0·5,  
Acid. muriatic. dil. 2·0,  
Aqu. font. dest. 90·0,  
Syr. simpl. 10·0.  
D. S. Nach jeder Mahl-  
zeit 1 Kinderlöffel.*

Bei saurem Erbrechen,  
saurem Geruch aus dem  
Munde Alkalien:

Rp. 1220.

*Aqu. Calc. 25·0,  
Aqu. font. dest. 75·0,  
Syr. simpl. 10·0.  
D. S. Nach jeder Mahl-  
zeit 1 Kinderlöffel.*

Ebenso auch eine 2 $\frac{0}{10}$ ige  
Lösung von Natr. bicarbon.  
oder benzoic. Bei gleichzeiti-  
ger Stuhlverstopfung besser:

Rp. 1221.

*Magnes. carbonic. 0·4,  
Aqu. font. dest. 90·0,  
Syr. simpl. 10·0.  
D. S. Nach jeder Mahl-  
zeit 1 Kinderlöffel.*

Wenn die Milch unver-  
ändert erbrochen wird, das  
Erbrochene alkalisch reagirt,  
Pepsin in Lösung oder besser:

Rp. 1222.

*Acid. mur. dil. 2·0—3·0,  
Aqu. font. dest. 90·0,  
Syr. simpl. 10·0.  
D. S. Nach jeder Mahl-  
zeit 1 Kinderlöffel.*

Ebenso kann man auch  
Acid. tartaric. (1 $\frac{0}{10}$ ) geben.  
Bei chronischer Dyspepsie  
mit Stuhlverstopfung:

Rp. 1223.

*Tinct. Rhei Darelli 30·0.  
D. S. 2—3 Kinderlöffel täglich.*

Rp 1224.

*Pulv. rad. Rhei* 1·0,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*acqu. Nr 10.*  
*S. 3 Pulver täglich.*

Sind jedoch die Stühle vermehrt, dyspeptisch:  
 Rp. 1225.

*Tinct. Ratanh.* 2·0,  
*Aqu. font. dest.* 90·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S. 4mal täglich oder*  
*2stündl. 1 Kinderlöffel.*

Bei Kolikanfällen ein Bad von 28° R., warme Umschläge um das Abdomen, am besten aber eine Darmirrigation mit Wasser von 29° R., eventuell mit Zusatz von  $\frac{1}{2}\%$  Kochsalz.

Die Menge des Wassers  
 bei Neugeborenen mit einem Körpergewicht  
     unter 3 Kilo . . . . 200 — 300 gr.  
 „ Neugeborenen mit einem Körpergewicht  
     über 3 Kilo . . . . 300 — 500 „  
 „ Säuglingen unter 4 Monaten . . . 500 — 700 „  
 „ Kindern über 4 Monaten . . . . 700 — 1200 „

Die Irrigation geschieht mittelst Irrigators oder eines Trichters und eines 1—2 M. langen elastischen Schlauches, der an seinem Ende mit einem Hahn versehen ist. In das Rectum wird ein gut geölter elastischer Katheder (Charr. No. 14) eingeführt.

Das Kind in Rückenlage mit durch einen untergeschobenen Polster stark erhöhtem Becken und angezogenen Oberschenkeln. Anfangs die Irrigation unter geringem Druck vorzunehmen, der Druck durch Heben des Irrigators allmählich zu steigern. Wenn die Kolikschmerzen sich erneuern, Wiederholung der Irrigation.

Bei chronischen Dyspepsieen mit Meteorismus systematische, 1—2mal täglich vorzunehmende Darmeingiessungen mit Zusatz von Kochsalz (5‰).

**Catarrhus ventriculi. Magenkatarrh.** In acuten Fällen strenge Diät, Suppe, Thee, Milch, Sodawasser



oder ein alkalischer Säuerling. Gegen Ueblichkeiten und Brechreiz:

Rp. 1226.

*Acid. tartaric. 1·0,*

*Aqu. dest. 90·0,*

*Aqu. Laurocer. 2·0,*

*Syr. simpl. 10·0.*

*D. S. 2stündl. 1 Kinderlöffel.*

Nach Ablauf der Reizungserscheinungen noch Gebrauch eines Amarum, etwa:

Rp. 1227.

*Extr. Chinae frigide parat. 1·0,*

*Aqu. font. dest. 90·0,*

*Syr. cort. Aur. 10·0.*

*S. 3 stündlich 1 Kaffeelöffel.*

Bei chronischem Katarrh ebenfalls Regelung der Diät: Anfangs bloss Milch, am besten saure Milch, nach einigen Tagen etwas Suppe, später auch gebratenes Fleisch. Sehr gut wirkt auch hier der Gebrauch von Kefir (meist Nr. 2.)

Gebrauch von Karlsbader Wasser oder Marienbader Kreuzbrunnen, Anfangs 50 Gr., später 150—200 Gr. nüchtern zu geben. Bei Neigung zu Obstipation auch Bitterwasser (von Friedrichshall oder Ofen) in derselben Weise zu gebrauchen. In neuerer Zeit mit gutem Erfolg Magen ausspülungen verwendet (s. „Cholera infant.“, S. 306), und zwar mit 1--2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>igen Lösungen von Natr. bicarb. oder Natr. benzoic. oder mit  $\frac{1}{2}$ <sup>0</sup>/<sub>0</sub>iger Kochsalzlösung.

Rp. 1228. *Chinin. muriatic. 0·2,*

*Zinc. sulfuric. 0·1,*

*Sacch. alb. 6·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 5 Pulver täglich, vor der Mahlzeit zu nehmen.*

Bei Anämie Gebrauch von eisenhaltigen Mineralwässern (Franzensbad, Pyrawart, Spaa etc.).



**Enterocatarrhus. Katarrh des Dünndarms.** Therapie vorwiegend diätetisch und causal. Bei Brustkindern regelmässige Eintheilung der Mahlzeiten, Qualität der Milch zu untersuchen; eventuell neben der Brust Kalbsbrühe mit Milch, Liebig'sche Suppe. Bei älteren Säuglingen Cacao oder Eichelkaffee mit Milch. Bei künstlich genährten Kindern unter 3 Monaten, wenn irgend möglich, Frauenmilch zu beschaffen, bei Kindern von 6—9 Monaten wenigstens für kurze Zeit Ernährung durch die Brust; im Uebrigen Kalbsbrühe mit Milch, oder Bieder'sches Rahmgemenge mit geringem Milchezusatz oder Löflund's peptonisirte Milch. (s. S. 270 f.).

Bei acutem Katarrh grösserer Kinder russischer Thee mit Milch, Cacao, Eichelkaffee, Kindermehl.

Bei chronischem Dünndarmkatarrh älterer Kinder rohes Fleisch, Kefir. Gutes Wasser in kleinen Quantitäten gestattet, sonst kalter russischer Thee mit Rum, kaltes Salep Decoct (eine Messerspitze auf 1 Liter), tanninhaltiger Rothwein, esslöffelweise. Bäder sollen fortgesetzt werden, besonders bei Collaps Bäder von 28° R.

Unter den Medicamenten am besten Opium als Tinct. Opii simpl. oder Pulv. Dover., jedoch mit Vorsicht anzuwenden. Dasselbe ist contraindicirt 1. bei Frühgeburten, 2. bei Erscheinungen von Gehirnreizung, 3. bei gleichzeitiger Bronchitis mit reichlichem Secret, 4. bei Collaps, 5. Vorsicht auch bei Hydrocephalus geboten. Die Empfindlichkeit für Opium ist individuell sehr verschieden; man beginnt stets mit kleinen Dosen und gibt es nach folgender Tabelle:

Alter des Kindes	Tinct. Opii simpl.		Pulv. Doveri	
	Mischung	Einzeldosis	Dispensation	Einzeldosis
Bis zu 6 Wochen	1 gtt. : 100 0 Flüssigkeit		0·05 in 10 Dosen	2—3 Pulver täglich
6 Wochen bis 3 Monate	1 gtt. : 70 0 Flüssigkeit	2stündlich 1 Kinderlöffel	0·07 in 10 Dosen	
3 Monate bis 6 Monate	2 gtt. : 100 0 Flüssigkeit		0·1 in 10 Dosen	2stündlich 1 Pulver
6 Monate bis 12 Monate	2 gtt. 70 0 Flüssigkeit		0·1 in 10 Dosen	
1 Jahr bis 2 Jahre	3 gtt. : 100 0 Flüssigkeit		0·1—0·2 in 10 Dosen	

Wenn sich der Katarrh aus Dyspepsie entwickelt hat, namentlich wenn die Stühle unverdaute Speisereste zeigen:

Rp. 1229.

*Paullin. sorbil.* 0·4,  
*Pulv. Dover. n. A \**),  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 2stündl. 1 Pulver*  
*in Milch.*

Bei gleichzeitigem saurem Erbrechen u. sauren Stühlen:

Rp. 1230.

*Natr. benzoic. (od. bi-*  
*carbonic.)* 1·0,  
*Aqu. font. dest.* 90·0,  
*Tinct. Opii spl. n. A \*),*  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S. Nach jeder Mahl-*  
*zeit 1 Esslöffel.*

Früher gab man häufig:

Rp. 1231.

*Pulv. lapid. Cancror.* 3·0,  
*Pulv. Doveri n. A \*),*  
*Sacch. alb.* 1·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 3stündl. 1 Pulver.*

Bei Complication mit acutem Magenkatarrh:

Rp. 1232.

*Acid. muriatic. dil. (od.*  
*tartaric.)* 1·0,  
*Aqu. font. dest.* 90·0,  
*Tinct. Opii simpl. n. A \*),*  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

Bei reinem acutem Darmkatarrh ein Astringens:

Rp. 1233.

*Tinct. Ratanhiae (Cate-*  
*chu, Cascarillae)* 2·0,  
*Aqu. font. dest.* 90·0,  
*Tinct. Opii simpl. n. A \*),*  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

Rp. 1234.

*Alum. crud.* 0·5,  
*Aqu. font. dest.* 90·0,  
*Tinct. Opii simpl. n. A \*),*  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

Rp. 1235.

*Acid. tannic.* 0·5,  
*Pulv. Doveri n. A \*),*  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 2stündl. 1 Pulver,*  
*in Milch gelöst.*

Bei chronischem Dünndarmkatarrh jeden zweiten

\*) Nach dem Alter des Kindes. Siehe die vorstehende Tabelle S. 303.

Tag eine Darmirrigation mit Kochsalzlösung (5<sup>0</sup>/<sub>100</sub>) oder mit Natr. benzoic. (3<sup>0</sup>/<sub>10</sub>).

Als internes Medicament:

Rp. 1236.

*Decoct. rad. Colombo*  
*e 10·0 : 90·0,*  
*Tinct. Opii simpl. n. A. \*),*  
*Syr. cort. Aurant. 10·0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

Besser ist:

Rp. 1237.

*Extr. Colomb. 1·0,*  
*Pulv. Doveri n. A. \*),*  
*Sacch. alb. 3·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 2stündl. 1 Pulver.*

Zu versuchen ist auch:

Rp. 1238.

*Bismuth. subnitric. 0·4,*  
*Pulv. Dover, 0·1—0·2,*  
*Sacch. alb. 3·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 3 Pulver täglich.*

Auch Zinc. sulfuric. in sehr kleinen Dosen:

Rp. 1239.

*Zinc. sulfuric. 0·1,*  
*Aqu. font. dest. 90·0,*  
*Tinct. Opii simpl. n. A. \*),*  
*Syr. simpl. 10·0.*  
*D. S. Nach jeder Mahl-*  
*zeit 1 Kinderlöffel.*

Bei chronischer Diarrhöe neuerlich empfohlen:

Rp. 1240.

*Cotin. 0·2,*  
*Pulv. Dover. 0·1—0·2,*  
*Sacch. alb. 3·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 2stündl. 1 Pulver.*

Kommt es zu Anämie, Eisenpräparate in kleinen Dosen:

Rp. 1241.

*Tinct. nervino-tonic. Be-*  
*stuscheffii 2·0,*  
*Aqu. font. dest. 90·0,*  
*Tinct. Opii simpl.*  
*gtt. 1—2,*  
*Syr. rub. Idaei 10·0.*  
*D. S. 3—4mal tägl. 1 Kin-*  
*derl. nach der Mahlzeit.*

\*) Nach dem Alter des Kindes. Siehe die Tabelle auf Seite 303.

Rp 1242.

*Ferr. carbon. saccharat. (od. Ferr. peptonat.),*

*Pulv. Doveri aa 0·1—0·2,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div in dos. aequ.*

*No. 10.*

*D. S. 4mal tägl. 1 Pulver  
in Milch.*

Bei Meteorismus Priessnitz-Umschläge, bei chronischem Darmkatarrh besser kalte Umschläge, von 18° R. abwärts.

### **Cholera infantum. Brechdurchfall der Kinder.**

Nahrung zu wechseln, neue Amme, bei künstlich genährten Kindern die Brust, bei grösseren Kalbsbrühe mit Milch, stündlich 3—4 Kaffeelöffel, oder Liebig'sche Suppe. Gleich im Beginn Alcoholica, starker kalter russischer Thee, Kaffee u. s. w.

In medicamentöser Beziehung im Beginn bei starkem Erbrechen am besten Magenauswaschungen, bei Säuglingen mit einem Nélaton-Katheter (No. 8—10), bei grösseren Kindern mit einer dünnen Magensonde, beide durch ein kurzes Glasrohrchen mit einem langen Gummischlauch verbunden, in dessen oberes Ende ein Glas-trichter eingefügt ist; man giesst bei Säuglingen 30—50 gr., bei grösseren Kindern je nach dem Alter 100—300 gr. der auf Körpertemperatur erwärmten Flüssigkeit auf einmal ein, lässt durch Senken des Schlauches die Flüssigkeit wieder ausfliessen und wiederholt diese Procedur 2—3mal. Man benützt zum Ausspülen:

Rp. 1243.

*Resorcin. 0·5—1·0,*

*Aqu. font. dest 1000·0.*

*S. Zur Auswaschung des  
Magens.*

Rp. 1244.

*Natr. benzoic. 20·0,*

*Aqu. font. dest 1000·0.*

*S. Wie das Vorige.*

Ferner sind im Beginn der Cholera und so lange kein Collaps erfolgt, auch Darmirrigationen angezeigt mit 1<sup>0</sup>/<sub>0</sub>iger Kochsalz- oder 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>iger Tanninlösung, in schweren Fällen auch mit 5—10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>iger Lösung von Natr. benzoicum oder mit:

Rp. 1245.

*Creosot. gtts. 6,*  
*Aqu. font. dest. 1000·0.*  
*S. Zur Irrigation.*

Intern im Beginn der Krankheit Antifermentativa:

Rp. 1246.

*Natr. benzoic. 2·0,*  
*Aqu. font. dest. 90·0,*  
*Tinct. Opii simpl. n. A. \*)*  
*(so lange kein Collaps),*  
*Aqu. Menthae pip.,*  
*Syr. simpl. āā 5·0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

In schweren Fällen:

Rp. 1247.

*Creosot. gtts. 2—3,*  
*Aqu. font. dest. 90·0,*  
*Tinct. Opii simpl. n. A. \*)*  
*(wenn kein Collaps),*  
*Aqu. Cinnamom.,*  
*Syr. simpl. āā 5·0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

Bei grösseren Kindern auch:

Rp. 1248.

*Acid. carbolic. 0·05,*  
*Aqu. font. dest. 90·0,*  
*Tinct. Opii simpl. n. A. \*),*  
*Aqu. Menth, pip.,*  
*Syr. simpl. āā 5·0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

In neuerer Zeit auch Resorcin:

Rp. 1249.

*Inf. flor. Chamomill.*  
*e 10·0 : 90·0,*  
*Resorcin. pur. 0·1,*  
*Aqu. Menth. pip.,*  
*Syr. simpl. āā 5·0,*  
*Tinct. Opii simpl. n. A. \*)*  
*(wenn kein Collaps).*  
*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

Bei Collaps Stimulantia, heisse Einpackungen, Senfbäder.

Intern:

Rp. 1250.

*Aether. sulfuric. 2·0,*  
*Mixtur. gummos. 90·0,*  
*Aqu. Cinnamom.,*  
*Syr. simpl. āā 5·0.*  
*D. S. Stündl. 1 Kinder-*  
*löffel.*

\*) Nach dem Alter des Kindes. Siehe die Tabelle auf Seite 303.



Rp. 1251.

*Flor. Benzoës* 0·1,

*Spir. vin.* 15·0.

*D. S.* 2stündl. 2 Tropfen in Wasser oder Milch.

Rp. 1252

*Camphor. ras.* 0·2,

*Spir. vin.*,

*Pulv. gumm. Arabic. añ q. s. Solve in:*

*Aqu. font. dest.* 90·0,

*D. S.* Stündl. 1 Kaffeelöffel.

Rp. 1253.

*Aether. acetic.* 5·0,

*Ol. Cinnam.* 15·0.

*S.*  $\frac{1}{4}$ stündl. 3—5 Tropfen.

Wenn auf die internen Mittel Erbrechen erfolgt,  
subcutane Injection von Aether oder Kampher:

Rp. 1254.

*Camphor. ras.* 2 0,

*Spir. vin.* 10·0

*S.* 5—10 Tropfen auf einmal zu injiciren.

Gut bewährt hat sich die Hypodermoklyse nach Cantani mittelst des von Monti construirten Apparates: Ein langer Gummischlauch trägt an einem Ende die Injectionsnadel, am anderen einen durchbohrten schweren Knopf aus Zink oder Hartgummi, der in ein graduirtes, mit der zu injicirenden Flüssigkeit gefülltes, hochstehendes Gefäß eintaucht, nachdem der Schlauch ebenfalls mit der Flüssigkeit gefüllt und mittelst eines Hahnes verschlossen wurde. Die Injection am besten in der Ileocöcalgegend zu machen, 50 - 100 gr. folgender auf 39°—40° C. erwärmter Flüssigkeit:

Rp. 1255.

*Natr. chlorat.* 4·0,

*Natr. carbon.* 3·0,

*Aqu. font. dest.* 1000·0.

*Coque et filtra.*

*S.* Zur Hypodermoklyse.

Tritt Wendung zum Besseren ein (Meteorismus, seltenerer Stuhlgang, leichte Temperatursteigerung), die erwähnten Medicamente auszusetzen; Diät wie bei acutem Enterokatarrh, täglich ein Bad, intern:

Rp. 1256.

*Chinin. tannic. 1·0,*

*Flor. Benzoës 0·3,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. Täglich 3—4 Pulver.*

**Enteritis follicularis. Dickdarmkatarrh.** Regelung der Diät wie beim Dünndarmkatarrh. In acuten Fällen zunächst eine Irrigation mit Wasser von 18° R.; bei Fieber, blutigen Entleerungen, starkem Tenesmus, mit Wasser von 10—12° R. (Die Menge der Irrigationsflüssigkeit s. unter „Dyspepsie“, S. 300.) Sobald der Drang und die Entleerungen sich wieder einstellen, eine zweite Irrigation, und zwar nicht mehr mit Wasser, sondern:

Rp. 1257.

*Acid. tannic. 10·0—20·0,*

*Aqu. font. dest. 1000·0.*

*D. S. Irrigationsflüssigkeit.*

In leichten Fällen auch Irrigation mit einer 1—2%igen Alaunlösung Bei starkem Tenesmus und Blutungen besser:

Rp. 1258.

*Plumb. acetic. 5·0,*

*Aqu. font. dest. 1000·0.*

*D. S. Irrigationsflüssigkeit.*

Diese Irrigationen 1—2mal täglich vorzunehmen, bis entschiedene Besserung eintritt, dann allmählich seltener.

Bei sehr starkem Tenesmus vor Anwendung der ersten Irrigation allenfalls Klystiere von:

Rp. 1259.

*Acid. tannic. (od. Alum. crud.) 2·0,*  
*Aqu. font. dest. 1000·0,*  
*Tinct. Opii simpl. gtts. 2 - 4.*  
*D. S. Zu 2 Klystieren.*

Bei Fieber innerlich:

Rp. 1260.

*Chinn. tannic. 0·4 10,*  
*Pulv. Doveri 0·07—0·15,*  
*Sacch. alb. 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos. acqu. No. 10.*  
*D. S. 2stündl. 1 Pulver in Milch*

In chronischen Fällen neben entsprechender Diät  
zunächst täglich 1—2mal Irrigationen mit Wasser von  
24° R., allmählich mit der Temperatur bis auf 10—12°  
herabzugehen. Bei anhaltend stinkenden Stühlen 1—2mal  
täglich Irrigation mit desinficirenden Flüssigkeiten, wie:

Rp. 1261.

*Natr. benzoic. 30·0,*  
*Aqu. font. dest. 1000·0.*  
*S. Irrigationsflüssigkeit.*

Rp. 1262.

*Aqu. Calcis 400·0,*  
*Aqu. font. dest. 600·0.*  
*D. S. Zur Irrigation.*

Bei sehr stark stinkenden Stühlen auch:

Rp. 1263.

*Resorcin. 0·5,*  
*Aqu. font. dest. 1000·0.*  
*D. S. Zur Irrigation.*

Ebenso 1—2% ige Lösungen von Borsäure oder Natr.  
salicylic.

Wenn die Stühle nicht mehr übelriechend sind, Aus-  
waschungen mit adstringirenden Lösungen, wie beim acuten  
Katarrh, abwechselnd mit einfachen Wasser Irrigationen.

**Obstipatio alvi. Stuhlverstopfung.** Zunächst Be-  
seitigung der angesammelten Kothmassen, durch inner-  
lich zu nehmende Laxantia, wie:

Rp. 1264.

*Hydromell. infant. 50·0.*  
*S. 1—3 Esslöffel je nach*  
*dem Alter des Kindes.*

Bei Säuglingen:

Rp. 1265.

*Mannit. 12·0,*  
*Aqu. font. dest. 50·0.*  
*D. S. 3—4 Esslöffel im*  
*Tage.*

Gut wirkt:

Rp. 1266.

*Podophyllin. 0·1,*  
*Spir. vin. rectificat. 1·0,*  
*Syr. rub. Idaei 49·0.*  
*S. 1—2 Esslöffel.*

Auch Panis laxans, Rici-  
 nus-Chokolade etc.

Ferner:

Rp. 1267.

*Aqu. laxat. Viennens.,*  
*Syr. rub. Idaei āā 30·0,*  
*Aqu. Lauroc. 2·0.*  
*D. S. 1—3 Esslöffel je*  
*nach dem Alter des*  
*Kindes.*

Bei älteren Kindern  
 auch:

Rp. 1268.

*Inf. folior. Sennae*  
*e 12·0 : 80 0,*  
*Sal. amar. 2·0,*  
*Syr. mannat. 20·0.*  
*D. S. Die Hälfte auf*  
*einmal zu nehmen.*

Zu längerem Gebrauch bei grösseren Kindern:

Rp. 1269.

*Pulv. rad. Rhei chinens.,*  
*Magnes. carbon.,*  
*Elaeosacch. Anis. āā 10·0.*  
*D. S. Täglich 1—2mal eine Messerspitze voll.*

Rp. 1270.

*Extr. fluid. Cascar. Sagradae,*  
*Syr. rub. Idaei āā 25·0.*  
*D. S. Abends 1 Kaffeelöffel zu nehmen.*

Besser als innerliche Mittel wirken Irrigationen  
 entweder mit Wasser, oder bei hochgradiger Kothansamm-  
 lung mit Laxantien, am besten:

Rp. 1271,

*Aqu. laxativ. Viennens.,*  
*Aqu. font. dest. āā 500·0.*  
*D. S. Zur Irrigation.*

Wenn nicht rasch eine Wirkung eintritt, noch 1 Liter Wasser zu irrigiren.

Oder:

Rp. 1272.

*Infus. folior Sennae*  
e 80·0: 500·0,

Adde:

*Aqu. font. dest. 500·0.*

*D. S. Zur Irrigation.*

Ebenso:

Rp. 1273.

*Ol. Ricini 300 0—500 0,*  
*Aqu. font. dest. q. s. ad*  
*colatur. 1000·0.*

*D. S. Zur Irrigation.*

Auch eine 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>ige Lösung von *Sal amarus* kann man verwenden.

Wenn die Kothstase nach der ersten Irrigation nicht vollständig beseitigt wurde, diese sofort zu wiederholen.

Nach Beseitigung der Koprostase causale Behandlung. Der Mastdarm mit dem Finger zu untersuchen, *Stenosis recti* durch mechanische Dilatation mittelst weicher Gummischläuche zu beseitigen. Fissuren am Anus mit *Lapis* zu touchiren. Regelung der Ernährung; bei zu grossem Caseingehalt der Ammenmilch neben dieser 1—2mal des Tages nicht abgerahmte Kuhmilch oder Biedert'sches Rahmgemenge, oder bei grösseren Säuglingen gut gesalzene Suppe. Bei Obstipation in Folge der Entwöhnung zur Kuhmilch etwas Soda zuzusetzen oder dieselbe mit Kalbsbrühe zu mischen. Bei künstlich genährten Kindern womöglich eine Amme, wenn nicht, Milch mit Sodazusatz oder mit Kalbsbrühe. Bei grösseren Kindern gemischte Nahrung, nicht ausschliessliche Fleischkost, sondern auch grüne Gemüse, Obst, Butter, Kohlehydrate etc. Bei Erschlaffung der Darmmuskulatur als Ursache Frottirungen des Abdomens, kalte Abreibungen, systematische Darm-Irrigationen, täglich zu bestimmter Stunde, mit 1 2 3 Litern Wasser, mit 24° R zu beginnen und täglich um 1° bis auf 10—12° R herabzugehen, Eventuell auch die Irrigation 2mal täglich auszuführen. Nach 8 Tagen auszusetzen; wenn dann nicht spontane Entleerungen eintreten, die Irrigationen noch durch 10 14 Tage fortzusetzen.

Gymnastische Uebungen. Massage des Abnomens im Bade. Bei sehr starkem Meteorismus Faradisation der Bauchdecken.

**Taenia. Bandwurm.** Zunächst 1 Tag vor der eigentlichen Kur der Darm von Kothmassen zu entleeren, entweder durch innerliche Mittel, wie *Aqu. laxativa* (s. Rp. 1267) oder *Podophyllin* (s. Rp. 1266), oder besser durch Irrigation des Darmes mit lauem Wasser (bei Säuglingen 800—1000 gr., bei älteren Kindern  $1\frac{1}{2}$ —2 Liter), am Morgen und Abend auszuführen; statt des Wassers noch besser *Aqu. laxativ. Viennens.* (300 – 500 gr.) zu gleichen Theilen mit Wasser gemischt. Dabei blande Diät: Suppe, Milch, Thee. Am nächsten Tage das eigentliche Bandwurmmittel, am besten:

Rp. 1274.

*Cort. rad. Punic. Granat. 50·0—60·0,*

*Inf. cum Aqu. fervid. 200·0;*

*Stent in loco calido per horas 48,*

*dein coque ad rem. colat. 100·0.*

*Decanta et adde:*

*Syr. Zingiber. 20·0.*

*(Ol. Terebinth. gtts. 6—8).*

*S. In 2 Portionen zu nehmen.*

Dabei Bettruhe; gegen etwa nachfolgende Ueblichkeiten Pfeffermünz-Bonbons, schwarzer Kaffee mit Rum, russischer Thee mit Rum. Wenn nach 3 Stunden kein Stuhl erfolgt, ein Abführmittel.

Frisch bereitet wirkt auch das Extract der Granatwurzel gut:

Rp. 1275.

*Extract. cortic. Punic. Granat. aether. 10·0,*

*Electuar. lenitiv. 20·0.*

*D. S. Auf 2 Hälften zu nehmen.*

Oder in Pillenform:

Rp. 1276.

*Extract. Punic. Granat. spir. vel aeth. rec. praep. 12 0,*  
*Pulv. cortic Punic Granat. q. s. ut f. pill. No. 20.*  
*Consperge elaeosacch. Citri.*

*D. S. Auf 2 Hälften im Verlauf einer Stunde zu nehmen, nach 2 Stunden ein Laxans.*

Ein vorzügliches Mittel, aber nur, wenn frisch bereitet, ist das ätherische Extract von Filix mas. Man verschreibt:

Rp. 1277.

*Extr. Filic Maris aether. 5·0 8·0,*  
*Mell. despumat. 12·0.*

*S. Auf 2 Hälften zu nehmen*

Für grössere Kinder:

Rp. 1278.

*Extr. Filic. Maris aether.*  
*rec. parat. 10·0.*

*Pulv Filic Mar. q s. ut*  
*f. pill. No. 30.*

*Consp. elaeosacch. Citri.*

*D. S.  $\frac{1}{4}$ stündlich je 3—4*  
*Stück zu nehmen.*

Oder die Peschier-  
 schen Pillen (die von Genf  
 bezogen werden). Bei grös-

seren Kindern ist auch ver-  
 wendbar:

Rp. 1279

*Pulv. Kamal. 20·0,*  
*Extr. Filic. Mar. aether.*  
*10·0,*

*Syr. cort Aur.,*  
*Pulv. gummos. aa q. s.*  
*ut f. electuar.*

*D. S. In Oblaten zu*  
*nehmen.*

Rp. 1280.

*Extr. Filic. Maris aeth,*  
*Pulv. rad. Punic. Granat. aa 2·5.*  
*M. f. boli Nr. 10.*  
*D. S.  $\frac{1}{4}$ stündl. 1 Bolus.*

(Wenn kein Erbrechen folgt, genügen 6 Boli.)

Rp. 1281.

*Flor. Kouso,*  
*Ol. Ricini aa 20·0,*  
*Gumm. Tragacanth. q. s. ut f. pill. Nr. 20.*  
*D. S. Jede  $\frac{1}{4}$  Stunde 2 Pillen.*



Im Gegensatze zu den meisten bisher bekannten Bandwurmmitteln wird das *Pelletierinum tannicum* von den Kindern gerne genommen und gut vertragen; es ist aber nicht immer wirksam und sehr theuer.

Rp. 1282.

*Pelletierini tannici* 0·5—1·5,

*Sacch. alb.* 1·0.

*M. f. pulv. Div. in dos.* 2.

*D. S. In 1½ständiger Pause zu nehmen.*

**Oxyuris vermicularis. Madenwurm.** Zunächst als Laxans:

Rp. 1283.

*Herbae Tanacet. florid.,*

*Fol. Sennae aa* 12·0,

*Infunde cum Aqu. fervidae q. s. per quadrant hor. ad colatur.* 80·0,

*Adde:*

*Sal. amar.* 3·0,

*Syrup. mannat.* 20·0.

*D. S. Die Hälfte des Medicaments auf einmal, am nächsten Tag die zweite Hälfte.*

Nach Wirkung des Laxans, am zweiten und dritten Tag der Kur Beginn der Irrigationen mit:

Rp. 1284.

*Sapon. medicinal.* 5·0,

*Aqu. font. dest.* 1000 0.

*D. S. Durch 8 Tage täglich 1mal 1½ – 3 Liter zu irrigiren.*

Ebenso auch Irrigationen mit Infus von Knolllauch, eine Handvoll auf 1 Liter Wasser, oder mit 1½%iger Carbollösung.

**Ascaris lumbricoides. Spulwurm.** Zunächst ein Laxans oder Irrigation, dann:

Rp. 1285.

*Pulv. sem. Cinæ* 3·0—  
5 0.

*Dent. tal. dos. No. 3.*

*D. S. Tägl. 1 Pulver.*

Rp. 1286.

*Pulv. sem. Cinæ.* 3·0—5·0,  
*Elect. lenitiv.* 10·0.

*M. dent. tal. dos. No. 3.*

*D. S. Früh und Abends  
eine Portion.*

Rp. 1287.

*Santonin.* 0·06—0·6,

*Sacchari alb.* 3 0.

*M. f. p. Div. in dos. aequ. No. 6.*

*D. S. 3mal täglich 1 Pulver.*

**Typhlitis et Perityphlitis. Entzündung des Blinddarms.** Im ersten Beginn, wenn grössere Fäcalanlaufungen im Coecum bestehen, vorsichtige Darmirrigation mit Wasser oder *Aqu. laxativ. Viennensis* mit *Aqu. dest. aa part. aequ.* Weiterhin vollständige Ruhe, rein flüssige Nahrung, gegen die Schmerzen Leiter'scher Kühlapparat am Abdomen, innerlich Opiate.

Rp. 1288.

*Acid. tartaric.* 1·0,

*Aqu. font. dest.* 90 0,

*Tinct. Opii simpl. gtts.* 2 -5,

*Syr. simpl.* 10·0.

*D. S. 2stündlich 1 Kinderlöffel.*

**Icterus catarrhalis. Gelbsucht, Katarrh der Gallenwege.** So lange die Leber geschwellt ist, Bettruhe, strenge Diät: Milch, etwas Suppe. Behufs Erzielung ausgiebiger Entleerungen:

Rp. 1289.

*Tinct. Rhei aquos. (od. cin's)* 50·0.

*D. S. 2—4 Esslöffel im Tage.*

In neuerer Zeit mit gutem Erfolg: tägliche Darmirrigationen mit  $\frac{1}{2}$ —1  $\frac{1}{2}$  Liter Wasser, Anfangs von 12° R., allmählich steigend bis 18° R. Ferner neuerlich auch Faradisation der Gallenblase mit kräf-

tigen Strömen, entweder beide Elektroden auf die Gallenblasengegend aufgesetzt, oder nur die eine, während die andere horizontal gegenüber rechts neben der Wirbelsäule applicirt wird.

**Sarcomphalus. Nabelschwamm.** Ein- bis zweimalige Touchirung mit Lapis oder Anwendung von:

Rp. 1290.

*Acid. salicylic. 1·0,*

*Pulv. Oryzae 10·0.*

*S. Streupulver.*

Bei stärkerer Entwicklung Abbinden mit einem Seidenfaden, am nächsten Tag kein Bad.

**Nephritis acuta. Acute Nierenentzündung.** Ausschliesslich Milchdiät, höchstens noch etwas Suppe, aber kein Fleisch, bevor das Eiweiss nicht gänzlich aus dem Harn geschwunden. Zunächst gibt man dann weisse Fleischgattungen, einmal täglich, aber auch dann noch auf Eiweiss zu untersuchen. Kohlensäuerlinge, Biliner, Giesshübler, ferner täglich ein Bad von 27—28° R. und 5—10 Minuten Dauer. Keine Diuretica! Glaubersalz oder glaubersalzhaltige Wässer, aber nicht in drastischen Dosen, z. B. Marienbader Kreuzbrunnen oder Karlsbader Mühlbrunnen, 50 – 200 gr. oder:

Rp. 1291.

*Sal. amar. 2·0,*

*Aqu. font. dest. 90·0,*

*Syr. rub. Idaei 10·0.*

*D. S. In 4 Portionen zu trinken.*

Wenn Blut im Urin:

Rp. 1292.

*Alum. crud. 1·0,*

*Aqu. font. dest. 90·0,*

*Syr. acetos. Citri 10·0.*

*D. S. 2 stündl. 1 Kinderl.*

Oder:

Rp. 1293.

*Acid. tannic. 0·5—1·0,*

*Aqu. font. dest. 90·0,*

*Syr. simpl. 10·0.*

*D. S. 2stündl. 1 Kinderlöffel.*

Bei Fieber und Blut  
im Urin:

Rp. 1294.

*Chinin. tannic. 1·0—2·0,*  
*Sach. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*

*D. S. 2stündl. 1 Pulver*  
*in Milch.*

Bei Urämie und Eklamp-  
sie täglich 2 Bäder von  
27—28° R. Entleerende Kly-  
stiere von Aqu. laxativ. Vien-  
nens. Dann Klystiere mit  
Chloralhydrat.

Rp. 1295.

*Chloral hydrat 1·0 - 2·0,*  
*Aqu. font. dest. 200·0.*

*D. S. Die Hälfte auf*  
*1 Klystier.*

Ist binnen einer halben  
Stunde keine Wirkung, Wie-

derholung des Klystiers. Im  
Anfall selbst am besten  
Chloroformnarkose.

Im Beginn der urämischen  
Erscheinungen:

Rp. 1296.

*Flor. Benzoës 0·4,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*

*D. S. 2stündl. 1 Pulver.*

Bei Herzschwäche Kam-  
pher oder Aether, bei Anä-  
mischen Tinct. nervino-tonic.  
Bestusch. Bei Somnolenz,  
starkem Kopfschmerz:

Rp. 1297.

*Natr. iodat. 2·0 (od.*  
*Natr. bromat. 3·0).*

*Aqu. font. dest. 90·0,*

*Syr. cort. Aurant. 10·0.*

*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

**Vulvitis. Katarrh (Entzündung) der weiblichen  
Schamtheile** Behandlung der gleichzeitigen Anämie  
oder Scrophulose. Bei mässigen Graden schwache Astrin-  
gentia, z. B.:

Rp. 1298.

*Zinc. sulfuric. 4·0.*

*Aqu. font. dest. 200·0.*

*S. Zum Ausspritzen.*

Auch Einlegen von Tam-  
pons aus Bruns'scher  
Watte.

Bei schmerzhaftem  
Brennen:

Rp. 1299.

*Plumb. acetic. bas. sol.*  
*20·0,*

*Aqu. font. dest. 200·0.*

*D. S. Zum Ausspritzen.*

Bei bedeutendem Secret und grossen Schmerzen Bett-  
ruhe, täglich laue Sitzbäder mit Zusatz von Astringentien  
(z. B. 10—15 gr. Alaun auf ein Bad). Bei Jucken und  
Excoriationen grosse Reinlichkeit, Gebrauch von:

Rp. 1300.

• *Merc. praecip. alb.* 0·2,  
*Ungu. emollient.* 10·0.  
*S. Salbe.*

Von guter Wirkung ist:

Rp. 1301.

*Jodoform. pulv. (od. Natr. benzoic.)* 1·0,  
*Natr. bicarbon pulv.,*  
*Pulv. Oryzae aa* 10·0.  
*S. Zum Einstauben.*

**Enuresis nocturna. Nächtliches Bettpissen.** Von  
inneren Mitteln nicht viel zu erwarten; am wirksamsten  
noch Extr. fluid. *Rhus aromat.*, wovon man Früh und  
Abends je 10 Tropfen in Milch gibt. Mit dem Aussetzen  
des Mittels hört auch die Wirkung desselben auf. Man  
beginnt daher besser gleich mit der Faradisation der  
Blase oder mit der von Dr. Csillag modificirten schwe-  
dischen Massage.

**Meningitis tuberculosa. Tuberculöse Gehirnhaut-  
entzündung.** a) Prophylaxis (wenn schon mehrere  
Kinder derselben Familie die Krankheit gehabt haben):  
Die Mutter darf das Kind nicht stillen, sondern eine  
gute Amme; die Ernährung mit strenger Regelmässig-  
keit zu besorgen; nebst der Brust frühzeitig salzreiche  
Nahrung (im vierten Monat Rindssuppe, im fünften Monat  
Fleischsaft); Entwöhnung nur mit Kuhmilch; Impfung  
nur bei Blatterngefahr vorzunehmen; Traumen zu meiden,  
ebenso viel Sonne; Behandlung etwa vorhandener Scro-  
phulose, Ekzeme etc. Bei anämischen Kindern Leber-  
thran oder Jodeisen:

Rp. 1302.

*Ferr. iodat. saccharat. 1·0,*

*Sacch. alb 2·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. Täglich 1—2 Pulver, durch lange Zeit fortzusetzen.*

b) Eigentliche Therapie. Antiphlogose, Kälte auf den Kopf, bei Stuhlverstopfung ein Laxans:

Rp. 1303.

*Aqu laxativ. Viennens,*

*Syr. rub. Idaei aa 30 0.*

*S. Ein Viertel davon bis zur ganzen Gabe nach dem Alter des Kindes.*

Von sonstigen Medicamenten am ehesten angezeigt Jod:

Rp. 1304.

*Jod. pur. 0 1,*

*Kal. iodat. 1·0,*

*Aqu. font. dest. 80·0*

*Syr. simpl. 20 0.*

*D. S. Stündl. 1 Kaffee-  
loffel.*

Oder:

Rp. 1305.

*Natr. iodat 2 0,*

*Aqu. font. dest. 90·0,*

*Syr. simpl. 10 0.*

*D. S. In 24 Stunden zu  
verbrauchen.*

Versuchen kann man auch (nach Moleschott):

Rp. 1306.

*Jodoform. 1·0,*

*Collodii elastic. 30·0.*

*D. S. Am Warzenfort-  
satz und am Nacken  
einzupinseln.*

Daneben innerlich:

Rp. 1307

*Jodoform. 0 1,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos.  
aequ. No. 10.*

*Da ad chart. cerat.*

*S. In Milch gelöst 1—2  
Pulver täglich.*

Oder in neuerer Zeit:

Rp. 1308.

*Jodol. 5·0,*

*Ungu. simpl. 50·0.*

*M. f. ungu.*

*D. S. Einreibung.*

Zugleich innerlich:

Rp 1309.

*Jodol. 0·2 —0·3,*

*Sacchuri alb. 3·0.*

*M. f. p. Div. in dos aequ.  
No. 10.*

*D. S. 3mal tägl. 1 Pulver.*

Bei Convulsionen Chlo-  
ralhydrat 0·5 —1·5 intern  
oder in Klysmen.

**Chorea minor. Veitstanz.** Am häufigsten gibt man jetzt Arsen. Man beginnt gewöhnlich mit einem Laxans, 10—30 gr. Aqu. laxativ. Viennens. Dann:

Rp. 1310.

*Solut. arsenical. Fowleri,*

*Aqu. font. dest. āā 10·0.*

*D. S. Nach jeder Mahlzeit 2 Tropfen, allmählich steigend bis zu 5 Tropfen nach jeder Mahlzeit.*

Bei Intoxicationserscheinungen (Erbrechen, Diarrhöe etc.) 2—3 Tage auszusetzen.

In schweren Fällen auch Chloralhydrat, Anfangs 1 gr., später 2—3 gr. pro die. Daneben Galvanisation des Rückenmarks und der Extremitäten, mit sehr schwachen Strömen zu beginnen. Ferner Abreibungen des ganzen Körpers, zunächst mit Wasser von 26° R., allmählich geht man herunter bis 14° R.; daneben laue Bäder.

**Hysterie.** Aenderung der Lebensweise, leichte Beschäftigung, Aufenthalt bei fremden Leuten oder in Anstalten. Mechanische Ermüdung durch Bewegung, Turnen, Gartenarbeiten, Tanzen u. s. w. Bei Anämie Eisen oder Arsen, besonders bei nervösen Aufregungen:

Rp. 1311. *Ferr. arsenicos. cum Ammon. citric. 0·2,*

*Extr. et Pulv. Liquir. āā q. s. ut f. pill. No. 10.*

*D. S. Täglich nach dem Frühstück 1 Pille.*

Bromsalze nur gegen Erregungszustände. Die Kost nicht ausschliesslich aus Fleisch bestehend, sondern gemischt mit Gemüse. Leichte Kaltwasserkuren.

**Lichen urticatus. Urticaria. Nesselausschlag.** Leichte Diät. Sorge für regelmässigen Stuhl. Gegen das Jucken Essigwasser oder:

Rp. 1312.

*Natr. salicylic. 5·0,*

*Pulv. Oryzae 25·0.*

*D. S. Streupulver.*

Bei hohen Graden auch:

Rp. 1313.

*Balsam. peruvian. 5·0,*

*Glycerin. 30·0.*

*D. S. Zum Einpinseln.*



**Prurigo. Juckblätterchen.** Bei Säuglingen genügt:

Rp. 1315.

*Ol. Petrae,*

*Glycerin aa 25·0*

*D. S.* Die Haut mit einem  
mit dieser Flüssigkeit  
befeuchteten Flanell-  
lappen einzureiben.

Bei Kindern von besse-  
ren Classen statt Petroleum  
Balsam peruvian., also:

Rp. 1315.

*Balsam. peruvian.,*

*Glycerin aa 25·0.*

*D. S.* Mittels Pinsels auf-  
zutragen.

Bei Prurigo mitis grösserer Kinder Schwefelbäder:

Rp. 1316.

*Hep. Sulfur. Kalin. pro balneo 200·0—250·0.*

*D. S.* Zusatz zu einem Bad.

Wenn die Haut trocken ist, dieselbe mit irgend einer indifferenten Salbe zu befeuchten. Zweckmässig auch Astringentia, z. B. eine Handvoll Cortex Quercus mit 2 Liter Wasser abgekocht, dann abgekühlt und damit der ganze Körper des Kindes gewaschen

Bei Prurigo agria, wenn noch frische Entzündungs-  
erscheinungen da sind:

Rp. 1317.

*Empl. Diachylon simpl,*

*Ungu. emollient. aa 25·0,*

*Ol. cadini 5·0.*

*M. f. ungu.*

*D. S.* Salbe.

Wenn die Entzündungs-

erscheinungen fehlen oder  
schon abgelaufen sind:

Rp. 1318.

*Acid. bor. 3·0,*

*Ungu. emollient. 20·0.*

*M. f. unguent.*

*D. S.* Salbe.

Der Körper wird jeden Abend zuerst mit einer Kali-  
seife eingeseift, dann gewaschen und mit der Salbe  
eingeschmiert, die über Nacht liegen bleibt.) Ebenso ge-  
braucht wird auch:

Rp. 1320.

*Naphthol. 2·0,*

*Ungu. emollient. 40·0.*

*M. f. unguent.*

*D. S.* Salbe.

Innerlich kann man Arsen geben, entweder Solut. Fowleri oder:

Rp. 1319.

*Ferr. arsenicos. cum Ammonio citrico* 0·1,  
*Sacch. alb.* 3·0,  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ.* No. 10.  
*D. S. Anfangs 1mal, später 2mal täglich 1 Pulver.*

In neuerer Zeit wird auch versucht:

Rp. 1321.

*Ammon. sulfoichthyolic., Aqu. dest. āā* 5·0.  
*D. S. Tägl. 5—10 Tropf.*

Rp. 1322.

*Jodol.* 2·0,  
*Ung. simpl.* 40·0.  
*M. f. ungu.*  
*D. S. Salbe.*

Daneben innerlich:

Rp. 1323.

*Jodol.* 0·3—0·5,  
*Sacchari alb.* 3·0.  
*M. f. p. Div. in dos. aequ.*  
*Nr. 10.*  
*D. S. 3 Pulver täglich.*

**Eczema. Nässende Flechte.** Bei acutem Ekzem Umschläge mit *Aqu. Plumbi*, später Einstauben von:

Rp. 1324.

*Flor. Zinc.* 2·0,  
*Amyl. Oryzae* 20·0.  
*D. S. Streupulver.*

Bei *Eczema impetiginosum*, namentlich des Gesichts:

Rp. 1325.

*Empl. Diachylon simpl., Lanolin. pur. āā* 20·0,  
*Ungu. simpl.* 10·0.  
*D. S. Salbe.*

Zum Aufweichen der Krusten nimmt man:

Rp. 1326.

*Aqu. Calc., Ol. Olivar. āā* 10·0.  
*D. S. Aeusserlich.*

Bei schuppendem, nicht nässendem Ekzem:

Rp. 1327.

*Ol. Fagi* 5·0,  
*Glycerin. pur.* 50·0,  
*Amyl. Tritic. q. s. ut f. ungu. molle.*  
*D. S. Salbe.*

Bei chronischem Ekzem mit Hautverdickung Waschungen mit Kaliseife.

**Pediculi capitis. Kopfläuse.** Der Kopf 2—3mal mit *Sapo mercurialis* einzuseifen und zu waschen, oder:

Rp. 1328.

*Acid. carbolic. 2·0—3·0,*

*Ol. Olivar. 100·0.*

*D. S. Der Kopf damit einzuölen, dann mit einem Tuch zu verbinden.*

Ebenso auch Petroleum mit Glycerin *aa*.

**Scabies. Krätze.**

Rp. 1329.

*Balsam. peruvian.,*

*Glycerin. aa 25·0.*

*D. S. Der Körper mit Kaliseife zu waschen, dann die Flüssigkeit einzupinseln und über Nacht liegen zu lassen. Am nächsten Morgen, ohne zu waschen, neu aufzupinseln.*

Ehenso auch:

Rp. 1330.

*Styrac. venet. 50·0,*

*Ol. Olivar. 10·0,*

*Spir. vin. rectificat. 5·0.*

*M. f. ungu.*

*D. S. Salbe.*

Bei grösseren Kindern auch Waschungen mit Carbol-seife.

**Morbilli. Masern.** Bis zum Aufhören des Fiebers Bett-ruhe, strenge Diät. Bei Hustenreiz laue Getränke, sowie:

Rp. 1331.

*Mixtur. oleos. 90·0,*

*Aqu. Laurocer. 2·0,*

*Syr. simpl. 10·0.*

*D. S. 2stündl. 1 Kinderlöffel.*

Bei hohem Fieber:

Rp. 1333.

*Natr. salicylic. 3·0—4·0,*

*Aqu. font. dest. 90·0,*

(Bei gleichzeitigem Husten:

*Tinct. Opü simpl. gtts. 2—6),*

*Syr. rub. Idae 10·0.*

*D. S. 2stündlich 1 Kinderlöffel.*

In heftigeren Fällen:

Rp. 1332.

*Mixtur. gummos. 90·0,*

*Tinct. Opü spl. gtts. 2—6,*

*Syr. simpl. 10·0.*

*D. S. 2stündl. 1 Kinderl.*

Gegen Jucken Einreibung mit Ol. Olivar., Ungu. emolliens etc. Wenn das Fieber und die katarrhalischen Erscheinungen geschwunden, darf das Kind aufstehen; in diesem Stadium Bäder von 28° R. Ausgehen (namentlich im Winter) erst, wenn die Haut vollkommen normal.

**Scarlatina. Scharlach.** Strengste Fieberdiät; der Urin täglich auf Eiweiss zu untersuchen; vor dem Ende der vierten Woche, auch wenn kein Albumin im Urin, kein Fleisch. Wenn die Urinmenge sehr vermindert ist, lässt man Selters-, Biliner oder Giesshübler Wasser trinken. Bei starkem Jucken der Haut Fetteinreibungen. Wenn kein Eiweiss im Urin und sonst keine Complication besteht, lässt man das Kind im Beginn der 4. Woche zum ersten Male baden und am Ende der 4. Woche aufstehen. Im Uebrigen symptomatische Behandlung.

**Intermittens. Wechselfieber.** Wenn möglich, Verlassen der Fiebergegend, Gebirgsluft.

Drei Stunden vor dem Anfall bei Säuglingen:

Rp. 1334.

*Chinin. sulfuric. neutral. 0·5,*

*Acid. sulfuric. dil. q. s. ad sol.,*

*Syr. simpl. 20·0.*

*D. S. In 3 Portionen in 1stündigen Intervallen zu nehmen.*

Bei Säuglingen, die sich weigern, das Chinin in dieser Form zu nehmen, gibt man:

Rp. 1335.

*Chinin. tannic.,*

*Sacch. alb. aa 2·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 6.*

*D. S. 3 Pulver, in Milch aufgelöst, in 1stünd. Intervallen.*

Bei grösseren Kindern:

Rp. 1335.

*Chinin. bisulfuric.* 2·0,

*Sacch. alb.* 3·0.

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*

*D. S.* 3 Pulver vor dem  
Anfall; wenn dies  
nicht wirkt, zu steigen  
bis zu 10 Pulvern.

Bei sarkem Milztumor  
und Kachexie auch an fieber-  
freien Tagen Chinin, halb  
so viel wie an Fiebertagen.

In veralteten Fällen, bei  
bedeutender Kachexie, Chinin  
mit Arsen:

Rp. 1337

*Chinin. sulfur.* 0·7,

*Ferr. arsenicos. cum Am-*  
*mon. citric.* 0·2,

*Sacch. alb.* 3·0.

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*

*D. S.* Bei kleineren Kin-  
dern 1 Pulver im Tag,  
bei grösseren Kindern  
2—4 Pulver täglich.

**Lues hereditaria. Angeborene Syphilis.** Wenn die  
Mutter genug Milch hat und nicht kachektisch ist, soll  
sie das Kind ernähren, sonst wenn möglich, eine Amme,  
die aber von der Infectionsgefahr zu verständigen ist.  
Wenn keine Amme zu beschaffen, Ernährung mit ver-  
dünnter Kuhmilch; frühzeitig daneben Rindsuppe, schon  
im sechsten bis siebenten Monat etwas Fleisch. Für die  
medicamentöse Behandlung am besten:

a) Endermatisch:

Inunctionscur mit Ungu ciner. Mit kleinen Gaben zu  
beginnen, allmählich zu steigen.

Rp. 1338.

*Ung. ciner.* 2·0.

*Div. in dos. Nr. 4 -6.*

Anfangs nur ein halbes Paquet und einmal täglich  
einzureiben; dabei die Lieblingsstellen des Eczema  
intertrigo zu meiden.

Besser, wenn frisch bereitet, ist Quecksilberoleat  
(28 Theile Quecksilberoxyd mit 110 Theilen Oel); das-  
selbe wird in Dosen von 0·3, 0·5 bis 1·0 pro die ein-  
gerieben.

Quecksilber-Pflaster-Mull im Stücken von  $\frac{1}{15}$  bis  $\frac{1}{4}$  Meter, namentlich bei exanthematischen Formen indicirt, der Verband alle 4—5 Tage zu wechseln.

Die Quecksilberseife (4 gr. Quecksilber auf 20 gr. Seife) wird bei Kindern in Stücken von 0·5 bis 1·0 angewendet.

b) Innerlich:

Rp. 1339.

*Calomel laevigat.* 0·1,  
*Ferr. lactic.* 0·2,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. Nr. 10.*  
*D. S. Früh und Abends 1 Pulver.*

Bei Enterokatarrh oder Dyspepsie auszusetzen, sonst bis zum Verschwinden des Exanthems zu geben.

Bei acuter Anämie ist Calomel sofort auszusetzen.

Rp. 1340.

*Hydrarg. subl. corros.* 0·01,  
*Aqu. font. dest.* 40·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S. 2—3 Kaffeelöffel täglich.*

Gut zu vertragen, weil die Verdauung nicht störend:

Rp. 1341.

*Hydr. oxydul. tannic.* 0·2—0·4,  
*Sacchar. alb.* 3·0.  
*M. f. p. Div. in dos. aequ. Nr. 10.*  
*D. S. 3 Pulver täglich.*

Bei Knochen-Lues oder Lähmungen:

Rp. 1342.

*Protojod. Hydrarg.* 0·1,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. p. Div. in dos. Nr. 10.*  
*D. S. 2—3 Pulver täglich.*

Von Jodpräparaten kommen auch zur Anwendung:

Rp. 1343.

*Kal. hydrojod. 1·0 – 2·0,*

*Aqu. font. dest. 90·0,*

*Syr. simpl. 10·0.*

*D. S. 2–3 Kaffee- bis Kinderlöffel täglich.*

Ferner, besonders nach Ablauf der manifesten Syphilis-Erscheinungen:

Rp. 1344.

*Ferr. jod. sacch. 1·0,*

*Sacchar 2·0.*

*M. f. p. div. in dos Nr. 10,*

*D. S. 3mal täglich 1 Pulver.*

c) Bäder neben den innerlichen Mitteln oder für sich:

Rp. 1345.

*Hydr. subl. corros. 1·0,*

*Sal. ammon. dep. 6·0,*

*Aqu. font. 200·0.*

*D. S. Zu 1–2 Bädern von 20 Lit. Wasser.*

Bei schwerer Bronchitis oder Pneumonie sind Bäder contraindicirt.

d) Zur subcutanen Injection:

Rp. 1346.

*Hydr. subl. corros. 0·1,*

*Natr. chlor. 0·4,*

*Aqu. font. destill. 10·0.*

*D. S. Zur Injection.*

Säuglingen und kleineren Kindern  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ , grösseren Kindern eine ganze Spritze zu injiciren.

**Anaemia. Blutarmut.** Frische Luft, Gebirgsluft. Gemischte Kost, neben Fleisch und Milch auch grüne Gemüße, ebenso etwas Alkoholica, z. B. Cognac zur Milch. Eisenpräparate werden oft nicht vertragen, daher namentlich im Sommer besser Stahlwasser von Pyrmont oder Spaa, 1 Esslöffel vor jeder Mahlzeit, steigend eventuell



bis zu 25 Löffeln im Tag. Unter den Eisenpräparaten am besten:

Rp. 1347.

*Ferr. oxyd. dial.* 1·0,  
*Aqua font. dest.* 90·0,  
*Syr. simpl.* 10·0.  
*D. S.* 3 Esslöffel täglich.

Rp. 1348.

*Ferr. peptonat.* 1·0,  
*Sacch. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S.* 2—5 Pulver täglich.

Rp. 1349.

*Ferr. pyrophosphor. cum*  
*Ammon. citric* 1·0—2·0,  
*Pulv. rad. Rhei chin.* 0·2,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S.* 2—4 Pulver tägl.

**Morbus maculosus Werlhofii. Blutfleckenkrankheit.**

Gemischte, aber kräftige Nahrung; fleissiger Aufenthalt im Freien, gesunde Wohnung.

Ebenso:

Rp. 1350.

*Ferr. arsenicos. cum Am-*  
*mon. citric.* 0·1,  
*Extr. Secalis cornut.* 0·5,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S.* Täglich 3 Pulver.

Rp. 1351.

*Ferr. citric. (od. Chinin.*  
*ferrocitric.)* 1·0,  
*Extr. Secal. cornut.*  
*0·3—0·5,*  
*Sacch. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S.* Tägl. 3—5 Pulver.

**Rhachitis. Englische Krankheit.** Bei Säuglingen natürliche Ernährung. Regelmässigkeit in der Ernährung, um Dyspepsie zu vermeiden. Bei künstlich genährten Kindern frühzeitig neben der Kuhmilch Kalbsbrühe, vom dritten Monat an einmal des Tags, im vierten Monat 2mal des Tags, dann Rindsuppe, Fleischsaft, vom achten

Monat an Fleisch. Entwöhnung nur mit Milch und Kalbsbrühe. Wird letztere nicht vertragen, so gibt man Biedert'sches Rahmgemenge, s. S. 270. Bei Kindern im zweiten Lebensjahre Amylacea möglichst zu meiden; Milch, Suppe, Fleisch, Eier. Leguminosen nur bei sehr abgemagerten Kindern 1—2mal täglich als Zusatz zur Milch oder Suppe, z. B. die Hartenstein'sche Leguminosen-Mischung (1 Esslöffel auf eine Tasse Suppe oder Milch), oder besser die Zealenta von Durioz (1 Esslöffel auf eine Tasse warmen Wassers mit etwas Butter und Salz), ebenso auch Liebig's Maltoleguminose. Ausschliessliche Nahrung dürfen aber diese Substanzen nie sein. Alcoholica, Wein, Malzbier, Theo mit Milch und Cognac, besonders bei abgemagerten Kindern Frische Luft, Aufenthalt in Gebirgsgegenden oder an der Seeküste. Die Betten sollen nur Rosshaar-Matratzen und -Polster enthalten. Leichte Bedeckung, bei Tag möglichst kühle Bekleidung. Bei ganz kleinen Kinder häufiger Lagewechsel, das Kind nicht sitzend, sondern liegend zu tragen; Gehversuche erst, wenn Stillstand der Rhachitis eingetreten. Bäder, Salz-, Soolen-, Seebäder namentlich, wenn Abmagerung und Anämie nicht stark sind. Bei Kindern unter 6 Monaten  $\frac{1}{8}$  Kilo Salz, bei Kindern von 6 Monaten bis 1 $\frac{1}{2}$  Jahr  $\frac{1}{4}$  Kilo Salz auf ein Bad von mindestens 24 Litern und 24—26° R.; auch Hal-leiner Mutterlaugensalz oder Kreuznacher Salz ebenso zu verwenden. Bei hochgradiger Anämie Eisenbäder, Globuli martiales minores 1 Stück auf ein Bad oder:

Rp. 1352.

*Kali carbonic. crud.,*

*Ferr. sulfuric. aa 500·0.*

*S. Zusatz zu 4—8 Bädern.*

Ebenso Kochsalz mit Eisenvitriol, oder Franzensbader Eisenmoorsalz  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Kilo pro Bad. Alle diese Bäder durch Monate zu gebrauchen. Später kalte Waschungen, Anfangs mit Wasser von 20° R., dann allmählich kälter bis zu 14° R.

Intern Leberthran. Bei Säuglingen:

Rp. 1353.

*Ol. iecor. Aselli 3·0—12·0,*  
*Pulv. gumm. Arabic.,*  
*Aqu. font. dest. āā q. s. ut f. mixtura colat. 90·0,*  
*Syr. simpl. (od. Syr. Ferr. jodat.) 10·0.*  
*D. S. 3—4 Esslöffel täglich.*

Rp. 1354.

*Lipanini 10·0,*  
*Pulv. gumm. Arab.*  
*Aqu. font. d. āā q. s. ut f. mixtura colat. 90·0,*  
*Syr. simpl. 10·0.*  
*D. S. 3 Esslöffel täglich.*

Für ältere Kinder purer, gereinigter Leberthran; bei Kindern von 1—2 Jahren 1 Esslöffel, bei solchen von 2—4 Jahren 1—3 Esslöffel vor dem Schlafengehen oder vor der Mahlzeit durch 4 Tage, dann Pause von 8 bis 14 Tagen u. s. f. den ganzen Winter hindurch. Im Hochsommer ist Leberthran nicht zu geben. Eisen ist von grossem Werth:

Rp. 1355.

*Ferr. et Natr. pyro-*  
*phosphoric. 1·0,*  
*Sacch. alb. 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 1—3 Pulver tägl.*  
*(am besten in Milch.)*  
 Noch besser verdau-  
 lich ist:

Rp. 1356.

*Ferr. pyrophosphor. et*  
*Natr. citric. 1·0,*  
 (Bei Appetitlosigkeit:  
*Pulv. rad. Rhei Chin. 0·2),*  
*Sacch. alb. 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 1—3 Pulver tägl.*

Bei Diarrhöe besser:

Rp. 1357.

*Ferr. carbonic. saccharat. 1·0,*  
*Sacch. alb. 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

Rhachitische Verkrümmungen sind frühzeitig orthopädisch zu behandeln.

### C. Wachstumsverhältnisse bei gesunden Kindern.

a) **Die durchschnittliche Körperlänge** des neugeborenen Knaben beträgt 50 *cm.*, die des neugeborenen Mädchens 49·5 *cm.*

**Das Längenwachsthum** gestaltet sich dann bei gut genährten und entwickelten Kindern im Durchschnitt, wie folgt:

Alter	Zunahme	Körperlänge	
		Knaben	Mädchen
1 Monat	4 <i>cm</i>	54	53·5
2 Monate	4 "	58	57·5
3 "	2 "	60	59·5
4 "	2 "	62	61·5
5 "	2 "	64	63·5
6 "	1 "	65	64·5
7 "	1 "	66	65·5
8 "	1 "	67	66·5
9 "	1 "	68	67·5
10 "	1 "	69	68·5
11 "	1·5 "	70·5	70
12 "	1·5 "	72	71·5

Bei ursprünglich geringerer Körperlänge ist auch das Längenwachsthum gewöhnlich geringer; im Durchschnitt beträgt die Längenzunahme im 1. Lebensjahre 20 *cm.*

Nach dem 1. Jahr nimmt die Länge ungefähr nach folgender Tabelle zu:

Alter	Zunahme	Körperlänge	
		Knaben	Mädchen
1 Jahr	19—23 <i>cm</i>	69—73	68·5— 72·5
2 Jahre	9—10 "	78—83	77·5— 82·5
3 "	7— 8 "	85—91	84·5— 90·5
4 "	6 "	91—97	90·5— 96·5
5 "	6 "	97—103	96·5—102·5
6 "	6 "	103—109	102·5—108·5
7 "	6 "	109—115	108·5—114·5
9 "	6 "	115—121	114·5—120·5
9 "	6 "	121—127	120·5—126·5
10 "	6 "	127—133	126·5—132·5
11 "	5 "	132—138	131·5—137·5
12 "	5 "	137—143	136·5—142·5
13 "	5 "	142—148	141·5—147·5
14 "	4 "	146—152	145·5—151·5

b) Das durchschnittliche Körpergewicht des Neugeborenen ist 3000—3500 *gr.*

In den ersten 4 Tagen Gewichtsabnahme um  $\frac{1}{14}$ — $\frac{1}{15}$  des ursprünglichen Gewichts, im Durchschnitt um 170—222 *gr.* Dann bei guter, natürlicher Ernährung Ausgleichung des Gewichtsverlustes bis zum achten Tag, also am achten Tag das Körpergewicht so gross wie am ersten. Je geringer das ursprüngliche Gewicht, desto langsamer das Schwinden der Gewichtsabnahme; bei künstlich genährten Kindern erst am 10. Tag, bei unreifen Kindern Gewichtsabnahme bis zum 10.—14. Tag, Anfangsgewicht erst in der 3.—4. Woche erreicht, bei künstlicher Ernährung derselben noch später.

Vom neunten Lebenstag an unter normalen Verhältnissen, bei Brustkindern mit Anfangsgewicht von etwa 3250 *gr.* folgende Gewichtszunahme:

Alter des Kindes	Tägliche Gewichts- zunahme	Monatliche Gewichts- zunahme	Durchschnitt- liches Körpergewicht
1 Monat	25—35 gr. (je nach dem ur- sprünglichen Körpergewicht)	750 gr.	4000 gr.
2 Monate	23 gr.	700 "	4700 "
3 "	22 "	650 "	5350 "
4 "	20 "	600 "	5950 "
5 "	18 "	550 "	6500 "
6 "	17 "	500 "	7000 "
7 "	15 "	450 "	7450 "
8 "	13 "	400 "	7850 "
9 "	12 "	350 "	8200 "
10 "	10 "	300 "	8500 "
11 "	8 "	250 "	8750 "
1 Jahr	6 "	200 "	8950 9000gr.

Nach Ablauf des ersten Lebensjahres Gewichtszunahme im Durchschnitt wie folgt

Alter	Jährliche Zunahme des Körpergew.	Körpergewicht	
		Knaben	Mädchen
1 Jahr	6 kg.	9 — 10 kg.	8 — 9 kg.
2 Jahre	2 "	11 — 12 "	10 — 11 "
3 "	1½ "	12½ — 13½ "	11½ — 12½ "
4 "	2 "	14½ — 15½ "	13½ — 14½ "
5 "	1½ "	16 — 17 "	15 — 16 "
6 "	1 "	17 — 18 "	16 — 17 "
7 "	2 "	19 — 20 "	18 — 19 "
8 "	2½ "	21½ — 22½ "	20½ — 21½ "
9 "	2 "	23½ — 24½ "	22½ — 23½ "
10 "	2 "	25½ — 26½ "	24½ — 25½ "
11 "	2½ "	28 — 29 "	27 — 28 "
12 "	2½ "	30½ — 31½ "	29½ — 30½ "
13 "	2½ "	33 — 34 "	32 — 33 "
14 "	4 "	37 — 38 "	36 — 37 "
15 "	4 "	41 — 42 "	40 — 41 "

c) **Der Kopfumfang** (über die Stirnhöcker und die Protuberantia occipitalis gemessen) beträgt beim Neugeborenen durchschnittlich 34—36 *cm.*, bei Mädchen gewöhnlich um 0·5 *cm.* weniger.

Weiterhin findet man in den einzelnen Altersstufen folgende Durchschnittsmaasse des Kopfumfanges:

A l t e r	K o p f u m f a n g
1 Monat	36 <i>cm</i>
2—6 Monate	43 "
6—12 "	46 "
2 Jahre	47—48 "
3 "	48 "
5 "	50 "
10 "	51 "
12 "	52 "

d) **Der Brustumfang** (über die Brustwarzen und Schulterblattwinkel gemessen) beim Neugeborenen durchschnittlich 32—33 *cm.* Weiterhin:

A l t e r	Z u n a h m e	Brustumfang
1—3 Monate	3—4 <i>cm.</i>	35—37 <i>cm.</i>
3—6 "	4 "	39—41 "
6—12 "	5 "	44—46 "
2 Jahre	2—3 "	46—49 "
3 "	1 "	47—50 "
4 "	1·5 "	48·5—51·5 "
5 "	1·5 "	50—53 "
6—7 Jahre	2—3 "	52—56 "
8—12 "	3—4 "	55—60 "





Aus

## Hofrath Prof. Dr. Theodor Billroth's

Klinik und Ambulatorium für chirurgische Krankheiten.

**Anästhesirung.** a) Allgemeine Anästhesirung. Behufs Vornahme von grösseren Operationen oder von Untersuchungen, bei denen vollkommene Entspannung der Musculatur erwünscht ist, wird Patient in Narkose versetzt durch:

Rp. 1358.

*Chloroform. 200·0,  
Aether. sulfuric.,  
Alcohol. absol. aa 60 0.  
S. Zur Narkose.*

Eine entsprechende Quantität dieser Mischung wird aus einer graduirten, mit einem eng durchbohrten Stöpsel versehenen Flasche auf den Skinne-Esmarch'schen, mit Vortheil von v. Rosthorn modificirten Narkotisirkorb aufgeträufelt, der dem Patienten vor Nase und Mund, Anfangs in einiger Entfernung, dann allmählich immer näher gehalten wird. Der zu Narkotisirende soll einige Stunden vor der Narkose nichts geniessen; bei der Narkose nimmt Patient horizontale Rückenlage mit etwas erhobenem Kopfe ein; beengende Kleidungsstücke sind zu lockern oder zu entfernen, die vordere Fläche des Thorax zu entblößen; falsche Zähne müssen vor der Narkose entfernt werden.

Der Narkotisirende und eventuell auch ein Gehilfe desselben haben sorgfältig auf Athmung, Puls, Pupille zu achten. Wenn die Zunge des Patienten zurücksinkt

und durch Herabdrücken der Epiglottis die Respiration behindert, so ist der Unterkiefer mittelst des Esmarch-Heiberg'schen Handgriffes vorzuziehen: die beiden Daumen werden unter das Kinn, das zweite Glied des Zeigefingers jederseits hinter den aufsteigenden Ast des Unterkiefers aufgesetzt und ziehen den Unterkiefer kräftig nach vorne; nützt dies nicht, so muss die Zunge mittelst Zungenzange vorgezogen und zu diesem Behuf oft die obere und untere Zahnreihe mittelst Heister'schen Spiegels von einander enttérnt werden. Im Rachen oder im Aditus laryngis angesammelter Schleim ist mittelst weichen, von einer Korn oder Polypenzange gehaltenen Mundschwammes oder Tupfers zu beseitigen. Wenn trotz dieser Maassregeln die Respiration aussetzt, so muss der Kopf des Kranken gesenkt und künstliche Respiration eingeleitet werden: am besten die Methode Silvester's: Die im Ellbogengelenk flectirten Arme abwechselnd kräftig über den Kopf emporzuheben und dann zu senken und fest an die Seiten des Thorax anzudrücken. Eventuell Parodisation der Phrenici. Ferner Bespritzen des Körpers mit kaltem Wasser. Wenn ein Respirationshinder-niss im Kehlkopf zu vermuthen ist (Ansammlung von Schleim oder Blut im Larynx), Einführung des Larynx-katheters oder Tracheotomie. Spasmus glottidis verliert sich meist bei Fortsetzung der Narkose.

Wenn Patient erbricht, ist der Kopf desselben nach links und etwas nach vorne zu neigen; nach dem Erbrechen Mund und Rachen mit Mundschwamm auszuwischen.

Bei Herzfehlern oder Fettherz, sowie bei sehr grosser Schwäche soll nicht narkotisirt werden.

Bei kleineren Eingriffen wird jetzt häufig Brom-äthyl (Präparat von Merk in Darmstadt) angewandt. Bei Erwachsenen genügen 20—40 Gramm, die auf eine Compresse oder besser auf den Gleich'schen Korb aufgegossen werden, um sehr schmerzhafté Eingriffe wie Incisionen bei Phlegmonen vollkommen schmerzlos machen

zu können. Ein weiterer Vortheil dieser Narkose besteht in der Gefahrlosigkeit, in dem schnellen Eintritt der Anästhesie und in dem Mangel von Übelkeit bei dieser Narkose.

Ein Kind ist durch 10 gr. in  $\frac{1}{2}$  Minute, ein Erwachsener durch 20 gr. in 1 bis längstens (bei Potatoren) 2 Minuten betäubt.

Erbrechen wird sehr selten beobachtet, Herzfehler sind keine Gegen-Indication.

b) Locale Anästhesirung. Bei kleineren Operationen wurde bisher vielfach der Richardson'sche Zerstäubungs-Apparat zur Erzeugung von Local-Anästhesie benutzt.

Rp. 1359.

*Hydramylaether. 100·0.*

*S. Aeusserlich.*

Mit dieser Flüssigkeit wird die Flasche des Richardson'schen Apparates gefüllt und der Aether durch denselben in feiner Zerstäubung auf das Operationsfeld getrieben, das durch die entstehende Kälte anästhetisch wird.

Von viel grösserer Wichtigkeit ist das Cocain, das nach dem Vorgang von Wölfler und Landerer jetzt häufig bei kleineren Operationen, oder wenn die Chloroform-Narkose contraindicirt ist, angewendet wird:

Rp. 1360.

*Cocain. muriat. 0·2 - 0·5,*

*Aqu. dest. 10·0,*

*Mercur. sublim. corrosiv. 0·001.*

*S. Zur Injection.*

Hievon werden mittelst Pravaz'scher Spritze an verschiedenen Stellen des Operationsfeldes je einige Tropfen, im Ganzen 1, seltener bis zu 2 Gramm direct unter die Haut (nicht ins subcutane Zellgewebe) injicirt und nach etwa 5 Minuten die Operation begonnen. Bei entzündlich infiltrirter Haut die Einstiche in die angrenzende ge-

sunde Haut zu machen und die Canüle subcutan nach dem Entzündungsberde vorzuschieben.

**Antiseptische Wundbehandlung\*).** 1. Reinigung und Desinfection der Hände. Vor jeder Operation und jeder Manipulation an einer Wunde sind die Hände und eventuell auch die Vorderarme des Arztes sorgfältig mit Seife und Bürste zu reinigen, eventuelle Tintenflecke mittelst Oxalsäure zu entfernen, die Nägel auszuputzen (der Nagelputzer liegt in 10%igem Carbolglycerin) und die Hände erst mit Alkohol, dann mit 1%iger Sublimat-, eventuell mit 2½%iger Carbol-Lösung abzuwaschen. Sind dieselben früher mit jauchigen oder sonst leicht inficirenden Wunden (Erysipel) oder mit Se- und Excreten in Berührung gekommen, was übrigens vor Operationen nach Thunlichkeit zu vermeiden ist, so sind sie nach der Reinigung mit Seife und Bürste noch mit einer dunkelvioletten Lösung von Kali hypermanganicum zu waschen, dann zur Entfernung der braunen Färbung mit einer Lösung von Oxalsäure zu übergiessen und schliesslich noch in der oben erwähnten Weise zu desinficiren.

2. Vorbereitung des Operationsfeldes. Vor grösseren Operationen ist der ganze Körper des Kranken durch ein Bad zu reinigen. Das Operationsfeld direct vor der Operation mit Seife gründlich abzuwaschen und abzubürsten (die Bürste stets sorgfältig gereinigt und im 1% Sublimat aufbewahrt), Haare schonungslos abzurasiren; ist die Haut durch fette Substanzen beschmutzt, Reinigung derselben mit Aether sulfuric. Nach der Reinigung das Operationsfeld mit Alkohol zu waschen, dann mittelst Irrigateurs mit Sublimatlösung (1:3000) abzuspielen. Rings um das Operationsfeld reine (sterilisirte),

\*) Die hier angeführten Vorschriften zur antiseptischen Wundbehandlung finden sich zum Theil ausführlicher dargestellt in Dr. Victor Ritter v. Haacker's „Anleitung zur antiseptischen Wundbehandlung nach der an Prof. Billroth's Klinik gebräuchlichen Methode“ 3. Aufl. Wien, 1890 Franz Deuticke. Dieser Broschüre sind auch die diesbezüglichen Daten mit freundlicher Bewilligung des Verfassers entnommen.

in  $2\frac{1}{2}\%$ ige Carbol- oder  $1\%$ ige Sublimatlösung getauchte Compressen auszubreiten.

3. Die Instrumente nach jeder Operation sorgfältigst mit Seife, Wasser und steifer Bürste gereinigt, werden vor der Operation sterilisirt\*) und dann während derselben aus  $1\%$ iger Carbollösung gereicht. Nach Verwendung bei jauchenden oder sonst inficirenden Wunden werden die Instrumente ausgekocht, schneidende danach noch frisch geschliffen und polirt.

4. Die Schwämme werden ausgeklopft, in hypermangansaurem Kali desinficirt, gebleicht, mehrere Tage lang in Wasser ausgewaschen, dann in  $5\%$ iger Carbollösung aufbewahrt. In den letzten Jahren ist jedoch der Gebrauch der Schwämme ganz verlassen worden und werden statt derselben die sogenannten Gersuny'schen Compressen verwendet: Entsprechend grosse quadratische Compressen, aus 8 mit weiten Stichen zusammengehefteten Schichten hydrophiler Gaze bestehend, deren Schnittländer vor dem Heften nach einwärts umgeschlagen wurden, werden 3mal an 1 oder an 2 Tagen  $\frac{1}{2}$  Stunde lang in einem verschlossenen Topf mit  $1\%$ iger Sublimatlösung gekocht, dann in frischer  $1\%$ iger Sublimatlösung aufbewahrt und während der Operationen aus  $0.2\%$ iger Sublimatlösung gereicht. Bei kleineren Operationen werden auch Bäuschchen aus Bruns'scher Watte, die mit  $2\frac{1}{2}\%$ iger Carbol- oder  $\frac{1}{2}\%$ iger Sublimatlösung getränkt sind, benützt.

5. Die Seide zu Ligaturen und Suturen in Brunnenwasser durch eine Stunde gekocht, dann in  $1\%$ iger Sublimat- oder  $5\%$ iger Carbollösung aufbewahrt, wird während der Operation aus  $2\frac{1}{2}\%$ iger Carbollösung gereicht.

---

\*) Die Sterilisirung von Instrumenten geschieht auf der Billroth'schen Klinik mittelst Kochen derselben in  $1\%$ iger Kalilauge im Papin'schen Topfe. Verbandstoffe werden seit neuester Zeit im trockenen Sterilisationsapparate 1—2 Stunden einer Hitze von  $120^\circ$  ausgesetzt und trocken gereicht. Statt eines solchen kann man einfach die Bratrohre eines Küchenherdes verwenden, in welcher man die betr. Gegenstände durch  $\frac{1}{2}$ —1 Stunde der trockenen Hitze aussetzt.



6. Die Nadeln, Stifte, Klammern, Silberdrähte, Elfenbeinzapfen und Sicherheitsnadeln werden in 15%igem Carbol-Glycerin aufbewahrt und aus 1%iger Carbollösung gereicht.

7. Die Drainröhren, erst mit Seife und Bürste gereinigt und mit Wasser durchgespritzt, dann durch 3—4 Tage an einem warmen Ort in lauem Wasser aufbewahrt, kommen dann in 1%ige Sublimatlösung, die nach den ersten 24 Stunden und dann alle 14 Tage erneuert wird. Vor der Einführung in die Wunde sind seitliche Locher in das Rohr zu schneiden. Das Drainrohr an den Enden schief abzuschneiden und nach der Einführung an dem nach Aussen gerichteten Ende mit einer desinficirten Sicherheitsnadel zu durchstechen.

8. Versorgung der Wunde vor Anlegung des Verbandes. Exakte Blutstillung, Ligatur auch der kleineren blutenden Gefässe; gründliche Durchspülung der Wunde in alle Buchten und Winkel, mit  $\frac{1}{2}$ —1%iger Sublimatlösung oder bei Operationen mit 1%iger, bei zufälligen Verletzungen mit 5%iger Carbol-säurelösung; Abtupfen; ausgiebige Drainage und Durchspülung der Drains; wo es möglich, Naht.

9. Verband. Auf die vernähte Wunde direct kommt hydrophile Gaze; nicht vernähte Wunden sind mit Streifen von Jodoformgaze locker auszufüllen, die auch in alle Buchten eingeführt werden muss, und dann noch mit einer 2—4-fachen Schicht von Jodoformgaze zu bedecken. Zur Ausfüllung von Hohlenwunden in neuerer Zeit statt der Jodoformgaze meist Jodoformdocht (dessen Bereitung s. S. 345) Ueber die Jodoformgaze gekrümmte, darüber geordnete hydrophile Gaze, dann ein entsprechend grosses Holzwollkissen, zuletzt eine Calicotbinde. Verbandwechsel alle 3—8 Tage. Andere Arten von Wundverbänden (mit Salben, essigsaurer Thonerde etc.) werden später bei den einzelnen Krankheiten besprochen.



Man braucht also zur antiseptischen Wundbehandlung folgende Medicamente:

Rp. 1361.

*Acid. carbolic. anglic.*  
*pur. 50·0,*  
*Aqu. dest. 1000·0.*  
*S. 5%ige Carbollösung.*

Rp. 1363.

*Acid. carbolic. anglic. pur.*  
*10·0,*  
*Aqu. dest. 1000·0.*  
*S. 1%ige Carbollösung.*

Rp. 1362.

*Acid. carbolic. anglic.*  
*pur. 25·0,*  
*Aqu. dest. 1000·0.*  
*S. 2½%ige Carbollösg.*

Rp. 1364.

*Mercur. sublim. corr. 1·0,*  
*Acid. tartaric. 5·0,*  
*Aqu. dest. 1000·0.*  
*S. 1‰ige Sublimatlösg.*

Rp. 1365.

*Mercur. sublim. corrosiv. 0·5,*  
*Acid. tartaric. 2·5,*  
*Aqu. dest. 1500·0.*  
*S. Sublimatlösg. 1 : 3000.*

Ferner zur Desinfection der Hände:

Rp. 1366.

*Kal. hypermangan. cryst. 20·0.*  
*S. Einige Körnchen davon in einem Waschbecken*  
*voll Wasser aufzulösen.*

Rp. 1367.

*Acid. oxalic. cryst.,*  
*Aqu. font. aa 1000·0.*  
*S. Zum Händewaschen.*

Zur Reinigung des  
Patienten, eventuell:

Rp. 1368.

*Aether. sulfuric. 100·0.*  
*S. Aeusserlich.*

Zur Aufbewahrung von im Gebrauch stehenden Metallkathetern, Uterussonden, sowie von Silberdraht:

Rp. 1369.

*Acid. carbolic. angl. pur. 45·0,*  
*Glycerin. pur. 300·0.*  
*S. 15% Carbol-Glycerin.*

Zur Ausspülung der Peritonealhöhle (bei Laparotomien), der Brusthöhle (bei Empyem), statt der Carbonsäure behufs Vermeidung der Intoxication auch:

Rp. 1370.

*Acid. salicylic. 1·0,*  
*Aqu. dest. \*) 1000·0.*  
*S. Salicyllösung.*

Oder:

Rp. 1371.

*Acid. thymic. 1·0,*  
*Aqu. dest. 1000·0.*  
*S. Thymollösung.*

Die hydrophile Jodoformgaze ist in den meisten Apotheken vorrätig, wird aber jedenfalls besser unter Controle des Arztes oder von verlässlichem Wartepersonal bereitet, entweder trocken, durch Bestreuen von sterilisirter hydrophiler Gaze mit Jodoformpulver und Verreiben desselben bis zu gleichmässiger Gelbfärbung, oder feucht, indem die hydrophile Gaze mit der folgenden Mischung übergossen wird.

Rp. 1372.

*Jodoform. 35·0,*  
*Aether. sulfuric. 230·0,*  
*Alcohol. 95% 120·0.*  
*S. Zur Bereitung der Jodoformgaze (für 10 Meter).*

In neuerer Zeit wird die Jodoformgaze nicht mit Aether, sondern mit Glycerin und Alkohol hergestellt.

Rp. 1373. *Jodoform. 50·0,*

*Glycerin. 100·0,*

*Alkohol. 400·0.*

*S. Wie das Vorige.*

Bei Wunden in der Mundhöhle die sogenannte klebende Jodoformgaze, die mit folgender Mischung bereitet wird:

Rp. 1374. *Jodoform. 230·0,*

*Colophon. 100·0,*

*Alcohol. 95% 1200·0,*

*Glycerin. 50·0.*

*S. Für 6 Meter klebender Jodoformgaze*

\*) Besser und auf der Klinik stets verwendet sterilisirtes Wasser.

Der Jodoformdocht wird aus gewöhnlichem käuflichen Strickgarn (stärkeren Kalbers) bereitet, indem dasselbe in Stränge von 12 -15 Fäden zusammengefasst, sterilisirt und in derselben Weise, wie die hydrophile Gaze bei Bereitung von Jodoformgaze, mit Jodoform imprägnirt wird.

**Blutstillung.** Exakte Blutstillung bildet ein wesentliches Moment der modernen Wundbehandlung und ist namentlich, wenn Heilung per primam intentionem angestrebt wird, dringend erforderlich.

1. Blutungen aus Arterien werden am besten durch Ligatur gestillt; die Arterie wird, soweit es möglich, von dem umgebenden Gewebe isolirt, mittelst Sperrpincette oder einer Péan'schen Pince hémostatique gefasst und mit einem genügend starken Faden antiseptischer Seide (gewöhnlich Nr. 4 oder 5) durch Bildung eines chirurgischen, fest zuzuschnürenden und darüber eines einfachen Knotens unterbunden. Seitlich angeschnittene Arterien werden ganz durchtrennt und am centralen und peripheren Ende ligirt. Statt der Ligatur bei kleineren Arterien auch 'Torsion' die das Gefässende haltende Schieberpincette und damit auch die Arterie wird 5—6mal um ihre Längsachse gedreht. Wenn die Arterie sich so tief in das umgebende Gewebe zurückgezogen, dass sie nicht isolirt gefasst werden kann, Umstechen derselben: mittelst halbkreisförmig gebogener Nadel wird ein Faden um die Arterie im umgebenden Gewebe herumgeführt und fest um dieselbe zusammengeschnürt. In manchen, im Ganzen seltenen Fällen, wenn das spritzende Gefäss sehr tief liegt, Unterbindung in der Continuität, oberhalb der Wunde an einer vom Arzt zu wählenden Stelle nothwendig. In seltenen Fällen, wenn das Gefäss zwar in loco gefasst, aber nicht unterbunden werden kann, lässt man eine Pince durch 48 Stunden liegen.

2. Blutungen aus Venen. Grössere Venen werden ebenso wie Arterien unterbunden, die Blutungen aus kleineren Venen stehen bald durch Compression.

3. Parenchymatöse und capillare Blutungen. Bei parenchymatösen Blutungen an den Extremitäten nach Unterbindung der spritzenden Arterien Theden'sche Einwicklung der Extremität mit Leinwandbinden, von der Peripherie, in der Gegend der Metacarpo-, resp. Metatarso-Phalangealgelenke zu beginnen; die Wunde vorher mit Jodoformgaze und hydrophiler Gaze zu bedecken.

Bei Blutungen aus Körperhöhlen (Nase, Rectum, Vagina) Tamponade mit Tampons und Streifen aus klebender Jodoformgaze oder aus Tannin-Jodoformgaze. Diese wird in derselben Weise wie die klebende Jodoformgaze hergestellt (s. S. 344, Rp. 1374), nur wird das Jodoform mit der gleichen Menge Tannin gemengt.

Blutende Wundhöhlen können auch mit Jodoformdocht oder mit Tannin-Jodoformdocht tamponirt werden, welch' letzterer durch Imprägnirung des sterilisirten Strickgarns mit folgender Lösung bereitet wird:

Rp. 1375.

*Acid. tannic.,*

*Jodoform. pulv. aa 5·0,*

*Colophon. 10·0,*

*Alcohol. 120·0,*

*Glycerin. 5·0.*

*S. Zur Bereitung des Tannin-Jodoformdochts.*

Bei sehr profusen Blutungen auch Penghawar-Djambi-Tampons, durch Einwickeln einer entsprechenden Menge Penghawar in ein Stück Jodoformgaze und Vernähen derselben hergestellt. Heftiges Nasenbluten durch Tamponade mittelst der Belloc'schen Röhre zu stillen. Bei Blutungen aus der Vagina auch Einführung des v. Braun'schen Colpeurynters. In manchen Fällen wird zur Stillung einer Blutung das Ferrum candens

oder besser der Thermocauter von Paquelin angewendet, doch dient derselbe eher als Prophylacticum gegen Blutungen, indem gefässreiche Stiele von Geschwülsten, der zu amputirende Penis etc. statt mit dem Messer durchschnitten, mit dem rothglühenden Paquelin durchgebrannt werden. Zu warnen ist jedoch vor dem von den Aerzten noch so vielfach verwendeten Liquor Ferri sesquichlorati, der wegen des schmierigen Aëtzschorfes, den er setzt, und der unter demselben sich leicht entwickelnden Jauchung an der Billroth'schen Klinik gänzlich aus der Reihe der localen Blutstillungsmittel verbannt ist.

Bei durch profuse Blutungen entstandener acuter Anämie Riechmittel (Aether, Ammoniak), Besprengen mit Wasser gegen die Ohnmachten; weiterhin starker Wein, Cognac, Rum, schwarzer Kaffee, Injection von:

Rp. 1376.

*Aether. sulfuric. 10·0.*

*S. 1—2 Pravaz'sche Spritzen zu injiciren.*

Erwärmen der Extremitäten durch Einwickeln in warme Tücher; gegen die drohende Hirnanämie der Kopf des Kranken tief zu lagern, die Extremitäten mit elastischen Binden einzuwickeln, die später, nachdem sich der Kranke erholt hat, ganz allmählich zu lösen sind. Im äussersten Fall Infusion einer 0·6%igen, mit einem Tropfen Natronlauge versetzten sterilisirten Kochsalzlösung in eine Armvene.

**Vulnus scissum. Schnittwunde.** Reinigung der Umgebung der Wunde, exacte Blutstillung, Entfernung von etwa in der Wunde vorhandenen Fremdkörpern, genaue Desinfection der Wunde, eventuell Drainage, Vereinigung der Wundränder durch Naht. Darüber Jodoformverband in der unter „Antiseptische Wundbehandlung“ (s. S. 342) beschriebenen Weise; bei tieferen Wunden an den Extremitäten behufs Ruhestellung des verletzten Gliedes

Schienenverband oder Application eines Organtilverbandes.

Bei oberflächlichen Schnittwunden im Gesicht nach genauer Vereinigung durch Naht und vollkommenem Aufhören der Blutung statt des Jodoformverbandes:

Rp. 1377.

*Jodoform. 1·0,*

*Collodii 10·0.*

*S. Auf die Wunde und 1 Centimeter über ihre Ränder hinaus aufzupinseln.*

Bei sehr oberflächlichen, nicht einmal die Cutis durchdringenden Schnittwunden, oder wenn bei tieferen die Nähte entfernt sind, die Wundränder durch Pflaster aneinander zu halten, indem direct auf die Wunde ein Streifen Jodoformgaze und darüber das Pflaster applicirt wird. Man verwendet hierzu englisches Pflaster, gewöhnliches oder amerikanisches Heftpflaster oder:

Rp. 1378.

*Emplastr. Diachyl. simpl.,*

*Emplastr. Ceruss. aa 25 0.*

*M. f. empl.*

*D. S. Auf Leinwand aufzustreichen.*

Wenn die Vereinigung durch Nähte nicht thunlich ist, oder wegen Retention von Secret die Nähte vor der Verwachsung der Wundränder entfernt werden müssen, wird Heilung durch Granulation angestrebt. In diesem Fall ebenfalls der typische, Seite 342 beschriebene Jodoformverband. Wenn in der Umgebung der Wunde starke entzündliche Infiltration besteht, wird die hydrophile Gaze, die über die Jodoformgaze zu liegen kommt, mit Burow'scher Lösung getränkt. Dieselbe verschreibt man:

Rp. 1379.

*Alum. crud. 5·0,*

*Ptumb. acet. basic. 25·0,*

*Aqu. dest. 500·0.*

*Misce et filtra.*

*D. S. Burow'sche Lösung.*

Ueber die feuchte Gaze kommt ein Stück Billrothbattist. Diese nassen Verbände müssen täglich gewechselt werden. Bei bereits granulirenden Wunden Salbenverbände, z. B.:

Rp. 1380.

*Acid. boric.* 3·0,  
*Cerae alb.* 4·0—6·0,  
*Ol. Olivar.* 20·0.  
*D. S. Salbe.*

In den letzten Stadien:

Rp. 1381.

*Zinc. oxydat.* 2·0,  
*Ungu. emoll.* 40·0.  
*S. Salbe.*

Seltener verwendet wird das Unguent. basilicum:

Rp. 1382.

*Ol. Olivar.* 45·0,  
*Cerae flav.*,  
*Seb. ovill.*,  
*Colophon. aa* 15·0,  
*Ol. Terebinthin.* 10·0.  
*M. f. ungu.*  
*D. S. Salbe.*

Bei zu üppig wuchernden oder bei schlaffen, leicht blutenden Granulationen Aetzung mit dem Lapisstift, darauf Verband mit:

Rp. 1383.

*Argent. nitric.* 0·5,  
*Balsam. peruv.* 1·5—2·5,  
*Ungu. simpl.* 50·0.  
*S. Salbe.*

Statt der Lapisätzung auch:

Rp. 1384.

*Hydrarg. praecip. rubr.*  
10·0.

*S. Täglich auf die Wundfläche aufzustreuen.*

Oder auch starke Compression der Wunde mit Heftpflasterstreifen.

Bei erethischen Granulationen zunächst Mandelöl, Ungu. cereum etc. zu versuchen. Wenn dies nicht hilft, in der Narkose die Granulationen mit Aetzmitteln (*Argent. nitric.*, *Kal. caustic.*) oder durch Excochleation mittelst scharfen Löffels zu zerstören.

Bei Excoriationen der Narben milde Salben (*Vaselin*, *Zinksalbe*).

**Contusio.** Quetschung der Weichtheile ohne Wunde.

Ruhe, Compression durch Einwicklung in nasse



Binden, darüber 3 — 4stündlich zu erneuernde Umschläge mit Wasser oder:

Rp. 1385.

*Aqu. Plumb. 300·0.*

*S. Zu Umschlägen.*

Wenn nach 14 Tagen noch nicht Resorption des Extravasates eingetreten:

Rp. 1386.

*Tinct. Jodin.,*

*Glycerin. aa 20 0.*

*S. Die erkrankte Stelle täglich 1 — 3mal damit zu bepinseln, darüber Compression und Application feuchter Wärme fortzusetzen.*

Bei Vereiterung des Extravasats feuchtwarme Umschläge, wenn der Durchbruch droht oder heftige Reaction besteht, eine grosse oder mehrere kleine Incisionen, Entleerung des Eiters, Desinfection, Jodoformverband.

**Vulnus contusum. Quetschwunde.** Blutstillung, Desinfection, Drainage wie bei Schnittwunden; wenn nur die Hautränder der Wunde gequetscht sind, Abtragung des zweifellos zur Mortification kommenden Saumes und Vereinigung durch Naht; bei ausgedehuter Quetschung einfach Anlegen eines Jodoformverbandes über die Wunde, wobei die Calicotbinde mit ziemlich starkem Druck anzulegen ist. Ist die Umgebung der Wunde stark entzündet, die hydrophile Gaze, die über die Jodoformgaze zu liegen kommt, mit Burow'scher Lösung zu tränken, darüber Billrothbattist. Ist die Quetschwunde an einer Extremität, Application eines Schienenverbandes. Hochlagerung der Extremität auf Polster oder Suspension an einer über dem Bette befestigten Querstange. Im Uebrigen Bettruhe, Vermeiden jeder Anstrengung und Aufregung; Sorge für regelmässige Stuhlentleerung; wenn dieselbe nicht erfolgt, Bitterwasser oder:

Rp. 1387.

*Ol. Ricini* 15·0,  
*Gelat. q. s. ut f. capsul.*  
*No. 5.*

*D. S. Am Morgen zu nehmen.*

Oder:

Rp. 1388.

*Inf. folior. Sennae*  
*e 10·0:150·0,*

*Syr. simpl. 30·0.*

*S. Auf 2 Portionen zu nehmen.*

Wenn trotz der antiseptischen Behandlung hohes Fieber auftritt, Verbandwechsel, genaue Untersuchung der Wunde, ob keine Secretverhaltung besteht, ob die Drains durchgängig sind; einschnürende Nähte zu trennen, absterbende Gewebsetzen zu entfernen. Wenn trotzdem das Fieber fortbesteht, der Verband täglich oder jeden zweiten Tag zu wechseln, bei übelriechender Secretion die Wunde mit 5%iger Carbollösung oder 1%iger Sublimatlösung durchzuspülen. Intern kühlende Getränke, Alcoholica, sowie gegen das Fieber:

Rp. 1389.

*Chinin. muriat. 1·5,*

*Natr. bicarbon. 2·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 5.*

*D. S. 3stündl. 1 Pulver.*

Bei starken Schmerzen:

Rp. 1390.

*Morph. mur. 0·05,*

*Sacch. alb. 2·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 5.*

*D. S. Am Abend 1 Pulv.*

Oder:

Rp. 1391.

*Opii pur. 0·4,*

*Natr. bicarbonic. 2·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 5.*

*D. S. Am Abend 1 Pulv.*

Wenn in der Wunde sich Fistelgänge bilden, oder dieselbe an sich die Form eines engen Canals hat, so führt man in diese Hohlgänge Jodoformstäbchen ein, jedoch so, dass neben denselben Secret abfliessen kann. Dieselben werden in folgender Weise verschrieben:

Rp. 1392.

*Jodoform. pulv 20·0,*  
*Gumm Arabic.,*  
*Glycerin.,*  
*Amyl. aa 2·0.*  
*M. f. bacill. div. magnit.*  
*S. Jodoformstäbchen.*

In neuerer Zeit statt der Jodoformstäbchen vielfach auch Jodoformdocht.

Wenn die Wunde bereits mit Granulationen ausgefüllt ist, Salbenverbände (s. *Vulnus scissum* S. 349).

**Fractura ossis. Knochenbruch.** Baldmöglichste Reposition der Fragmente, wenn dieselben dislocirt sind; hierauf Anlegung eines festen Verbandes, sogen. Contentivverbandes. Während derselben die Fragmente durch zwei Assistenten in der richtigen Stellung zu fixiren. Man wählt gewöhnlich den Gypsverband: Am oberen und unteren Ende der in den Verband zu legenden Strecke wird je ein Streifen von Flanell oder nasser Leinwand um die Extremität gelegt (sogen. Umschläge), hierauf Einwicklung der zu verbindenden Strecke sammt der Hälfte der Umschläge mit Wattebinden, dieselben namentlich an der Fracturstelle, sowie an Stellen, wo der Knochen unmittelbar unter der Haut liegt (Olecranon, Condylen des Humerus und Oberschenkels, Crista tibiae, Malleolen) dick aufzulegen. Darüber Anlegung einer Flanell- oder Calicotbinde unter mässiger Compression. Endlich Application der Gypsbinden, die durch gleichmässiges Aufstreuen von feingepulvertem, trockenem Gyps auf eine Calicotbinde und lockeres Aufrollen der-

selben hergestellt sind und unmittelbar vor der Anlegung für einige Minuten in warmes Wasser getaucht werden, dem eine Handvoll gepulverten Alauns zugesetzt ist; beim Anlegen der Gypsbinden absolut kein Zug auszuüben, der Gyps mit den Händen zu verstreichen, die freigebliebene Hälfte der Umschläge wird vor dem Anlegen der letzten Touren umgelegt und nun von den oberflächlichsten Schichten des Verbandes mit bedeckt. Wird der Verband nicht rasch genug hart, mit den Händen gleichmässig Gypsbrei (Gypspulver mit Wasser angerührt) aufzutragen.

Leichter und eleganter, aber nur für Fracturen ohne Neigung zur Discolation geeignet ist der Wasserglasverband. Man verschreibt:

Rp. 1393.

*Natr. silicic. bas. solut. bis inspissat. 500·0 — 1500 0*  
*S. Wasserglas.*

Baumwollene oder leinene Rollbinden werden mit dem Wasserglas imprägnirt und statt der Gypsbinden applicirt.

Für Fracturen mit kürzerer Heilungsdauer (Malleolarfracturen, Fracturen des Radius etc.), ebenso in den letzten Stadien bei Fracturen dickerer Knochen eignen sich die Organtinverbände, sogen. Blauc-Binden-Verbände, bei denen statt der Gypsbinden solche aus Organtin in feuchtem Zustand angelegt werden; diese Verbände allenfalls durch Einlegen von Schienen aus Fournierholz und Schusterspänen zu verstärken.

Strenge Regel ist, spätestens 24 Stunden nach Anlegen eines Contentivverbandes denselben zu controliren, und wenn er starke Schmerzen verursacht oder die Finger oder Zehen angeschwollen, bläulich oder gefühllos werden, zu entfernen. Sonst Entfernung und Wechsel des Verbandes, sobald derselbe zu weit geworden ist, jedenfalls spätestens nach drei Wochen. Bei grosser Neigung zur Dislocation ad longitudinem, namentlich bei Schenkelhals- oder hohen Oberschenkelfracturen, statt der Con-

tentivverbände permanente Extension mittelst Heftpflasterverbandes und Volkmann'schen Schlittens: Zwei lange Heftpflasterstreifen laufen entlang der Extremität zu beiden Seiten derselben herab, werden mittelst circularer Heftpflasterstreifen und einer Rollbinde angedrückt und umgreifen eine steigbügelartige Holzplatte, an welcher eine Schnur befestigt ist, die über eine am unteren Bettrand angebrachte Rolle läuft und an ihrem unteren Ende einen Sack mit Gewichten trägt. Die Extremität ruht auf dem Volkmann'schen Schlitten. Behufs Contraextension das untere Bettende höher zu stellen.

Bei verzögerter Callusbildung, Psendarthrose, Hebung der Gesamternährung durch kräftige Diät, Landaufenthalt; allenfalls versuchsweise Gebrauch von Phosphor; wirksamer sind jedenfalls locale Mittel; kräftiges Reiben der Bruchenden aneinander, energisches, wiederholtes Bepinseln der Haut mit Jodtinctur; Application von Blasenpflaster oder Ferum candens; Compression der Extremität oberhalb der Fracturstelle mittelst Bindentouren. Wenn dies Alles nicht hilft, lange, dünne Acupuncturnadeln in den fibrösen Callus einzustecken und mehrere Tage liegen zu lassen, eventuell dieselben mit den Polen einer electrischen Batterie zu verbinden, die man täglich durch einige Minuten functioniren lässt; als letztes Mittel Resection der Bruchenden und Vernähung der neuen Bruchenden.

Bei schief geheilten Knochenbrüchen, wenn nothwendig, Geraderichtung durch Infraction (Geradebiegen in Narkose) oder völliges Zerbreehen des Callus (mit den Händen oder dem Apparat von Rizzoli), wenn dies nicht durchführbar, Osteotomie (Einschnitt bis auf den Callus und Durchmeisselung des Knochens, eventuell Excision eines keilförmigen Stückes aus demselben).

Bei complicirten Fracturen sorgfältige Reinigung *zunächst* der Umgebung der Wunde, dann dieser selbst;

genaue Untersuchung derselben mit dem eingeführten, desinficirten Finger; eventuell behufs Reinigung und Desinfection die Wunde durch einen Längsschnitt zu erweitern; sorgfältige Entfernung aller Fremdkörper, Blutcoagula, loser Knochensplitter; exacte Blutstillung; Reposition der Fragmente; Drainage, wo sie geboten, eventuell mit Anlegen von Gegenöffnungen; ausgiebige Desinfection mit Durchspülung der Drainröhren; Jodoformverband; darüber Gypsverband; in denselben später, wenn wieder Besichtigung der Wunde angezeigt ist, ein Fenster zu schneiden; die Ränder desselben mit untergeschobener Bruns'scher Watta oder hydrophiler Gaze und mit Billroth-Battist zu decken.

**Distorsio. Verstauchung.** Am besten Ruhigstellung des Gelenks durch Anlegen eines Gypsverbandes, der 10 Tage bis 3—4 Wochen zu tragen ist. Wenn man schon in den ersten Stunden nach der Verletzung dieselbe zur Behandlung bekommt, Massage.

**Luxatio. Verrenkung.** Baldmöglichst vorzunehmende Einrichtung, wenn nöthig in tiefer Narkose; durch blosse Händekraft oder mit Hilfe von Tüchern, Riemen etc., an denen angezogen wird; im letzteren Falle zweckmässig vorher die Extremität mit nassen Binden einzuwickeln. Nach der Reposition Ruhigstellung des Gelenks, kalte Umschläge, nasse Einwicklung, eventuell Anlegung eines Gyps- oder Organtinverbandes. Nach 1—3 Wochen bei zurückbleibender Gelenksteifigkeit passive Bewegungen, Massage, Dunstumschläge, nach und nach auch active Bewegungen.

**Combustio. Verbrennung.** Bei Verbrennungen ersten Grades nur Einstreuen von Amylum, oder von:

Rp. 1394.

*Acid. salicylic. 10·0,*

*Talc. venet. 100·0.*

*S. Streupulver.*



Bei Verbrennungen zweiten Grades Aufstechen und Ausdrücken der Blasen, ohne jedoch die Blasendecke zu entfernen. Darüber ein Salbenverband mit Ungu. simpl oder Auflegen von:

Rp. 1395.

*Aqu. Calcis,*

*Ol. Lin. aa 50·0*

*D S. Damit getränkte Leinwandbinden aufzulegen.*

Bei Verbrennungen dritten Grades Jodoformverband. Bei sehr ausgedehnten Verbrennungen am besten das Hebra'sche Wasserbett; wenn dieselben nur eine Extremität betreffen, dieselbe fortwährend im Wasserbad zu halten. Ferner innerlich bei ausgebreiteten Verbrennungen Excitantia, Wein, warme Getränke, eine Aether-Injection, oder auch:

Rp. 1396.

*Liqu. Ammon. anisat. 10 0.*

*S 5—10 Tropfen auf 1 Löffel Wein.*

Bei bereits granulirenden ausgebreiteten Brandwunden gewöhnlich häufiges Touchiren mit Lapis nothwendig; ferner Verband mit Lapissalbe (Rp 1383); eventuell Compression mit Heftpflasterstreifen.

Bei zurückbleibender Narbencontractur ebenfalls Compression, Massage, wenn dies nicht zum Ziele führt, Excision der Narbe, Plastik.

**Congelatio. Erfrierung.** Bei vollständigerer Erstarrung Wiederbelebungsversuche durch Abreiben mit kalten, nassen Tüchern im ungeheizten Zimmer; hierauf ein 2stündiges Bad von 16 - 18° R., das unter fortwährendem Krottiren des Körpers allmählich auf 30° R. erwärmt wird; im Bad auch Aether-Injectionen und wenn der Patient schlucken kann, reichliche Zufuhr von Alcoholis. Bei starken Schmerzen im Bade Begiessungen mit kaltem Wasser.



**Erfrorene Extremitäten** mittelst geeigneten Verbandes vertical zu suspendiren, bei eingetretener Gangrän antiseptischer Verband. Wenn progressive Entzündung entsteht, mehrfache Incisionen ins infiltrirte Gewebe. Gegen nach Erfrierung einzelner Theile (z. B. Nase, Ohren) zurückbleibende Teleangiectasieen Stiche- lung mittelst Scarificationsmessers.

**Perniones. Frostbeulen.** Hebung der Ernährung des Individuums; Vermeiden von zu knappen Schuhen und Handschuhen.

Local sehr viele Mittel empfohlen, wie Baden der betr. Stellen in geschmolzenem Leim oder:

Rp. 1397.

*Acid. nitric. pur. 2·0,*  
*Aqu. dest. 60·0.*  
*S. Zu Umschlägen.*

Rp. 1398.

*Tinct. Cantharid. 10·0.*  
*S. Zum Bepinseln.*

Rp. 1399.

*Acid. mur. pur. 100·0.*  
*S. Die Hälfte davon*  
*mit der entsprechenden*  
*Menge Wassers zu*  
*einem Hand- od. Fuss-*  
*bad.*

Rp. 1400.

*Merc. praecip. alb. 1·0,*  
*Ungu. simpl. 20·0.*  
*S. Salbe.*

Rp. 1401.

*Jod. pur. 0·5,*  
*Collod. elast. 20·0.*  
*S. Zum Bepinseln.*

Ferner Bepinseln mit Jodtinctur und darüber warme Umschläge, oder Einwicklung mit Heftpflasterstreifen. Wenn die Frostbeulen wund sind:

Rp. 1402.

*Zinc. oxyd. 3·0,*  
*Ungu. emoll. 20·0.*  
*S. Salbe.*

Oder:

Rp. 1403.

*Argent. nitric. 0·5,*  
*Ungu. simpl. 20·0.*  
*S. Salbe.*

**Furunculus. Blutschwär.** Feuchtwarme Ueberschläge bis zum spontanen Aufbruch des Furunkels, dann Ausdrücken des centralen Zapfens; bei grossen, sehr schmerzhaften Furunkeln ein tiefer Längs- oder Kreuzschnitt bis ins gesunde Gewebe; Jodoformverband, über die Jodoformgaze in essigsaurer Thonerde (s. Rp. 1379) getränkte hydrophile Gaze und Billroth-Battist.

Bei allgemeiner Furunculosis kräftige Kost, Eisen, Chinin, warme Bäder. Behandlung von etwa zu Grunde liegendem Diabetes

**Anthrax. Carbunkel.** Ausgiebige, die Cutis durchdringende, sich kreuzende Schnitte bis in die gesunde Umgebung, Desinfection mit 5<sup>o</sup>iger Carbollösung oder 1<sup>o</sup>iger Sublimatlösung; Einführung von Jodoformgazestreifen in die Wunden; darüber hydrophile Gaze in Burow'scher Lösung oder 2<sup>o</sup>iger Carbollösung getränkt; der Verband täglich 2mal zu erneuern, und wo sich neue Infiltration zeigt, wieder Incisionen zu machen. Innerlich Wein, Chinin.

**Phlegmone. Zellgewebsentzündung.** Im Beginn:

Rp. 1404.

*Ungu. einer. 20·0.*

*S. Salbe.*

Die entzündete Partio damit einzureiben, darüber Umschläge mit in Liquor Burowi getauchten Compressen, darauf ein wasserdichter Stoff (Billroth-Battist), das Ganze mit Calicotbinde zu befestigen, und wenn die Erkrankung eine Extremität betrifft, dieselbe auf eine ebenfalls durch Bindentouren zu fixirende Schiene zu lagern und entweder vertical zu suspendiren oder auf eine schiefe, gegen das periphere Ende aufsteigende Ebene zu legen. Wenn hiedurch nicht Zertheilung bewirkt wird, die Salbe anzusetzen, im Uebrigen die gleiche Behandlung fortzuführen; sowie Fluctuation zu fühlen, Incision, eventuell an mehreren Stellen, Desinfection, Drainage, Jodoformverband.

**Tendovaginitis. Sehnenscheidenentzündung.** Ruhigstellung der Extremität auf einer Schiene, Bepinseln mit Jodtinctur, feuchtwarme Umschläge, gleichmässig comprimirender Verband; hilft dies nicht bald, Application eines Blasenpflasters; bei sehr heftigen Erscheinungen elevirte Lagerung der Extremität, Unguent. ciner.; wenn die Entzündung sich zertheilt hat, lauwarme Bäder, Massage. Bei Abscessbildung ausgiebige Incisionen, eventuell Auskratzung mit dem scharfen Löffel, Desinfection, Jodoformverband mit starker Compression; wenn trotzdem die Eiterung weiterschreitet, die Gelenkknorpel ergriffen werden, Amputation.

**Osteomyelitis. Knochenmarkentzündung.** Im Beginn Bestreichen der ganzen Extremität mit Jodtinctur, feuchte Einwicklung, Compression durch Bindenverband, Ruhigstellung auf einer Schiene. Bei heftigem Fieber Chinin (1·0—1·5 pro die); wenn sich Eiter angesammelt hat, Entleerung desselben durch ausgedehnte Eröffnung, Desinfection, Drainage, Jodoformverband; Fixation der dem Entzündungsherd zunächst liegenden Gelenke durch Schienen- oder gefensternten Organtinverband.

**Hydrops articulationis acutus. Acute Gelenk-Wassersucht.** Wiederholtes Bestreichen mit Jodtinctur, Vesicantien, Compression mit nassen Leinenbinden, Lagerung der Extremität auf der Volkmann'schen Schiene, leichte Massage. Erreicht man auf diese Behandlung keine Heilung, Punction und Injection von Jodtinctur.

Rp. 1405.

*Tinct. Jod. 40·0,*  
*Aquae destill. 20·0.*  
*S. Jodtinctur 2 : 1.*

Nachdem die Jodtinctur 5 Minuten eingewirkt hat, lässt man die Flüssigkeit wieder ablaufen.

**Arthritis acuta purulenta. Eitrige Gelenkentzündung.** Das Gelenk, wenn nöthig in Narkose, in zweckmässige Stellung zu bringen (Hüft- und Kniegelenk in Extension, Fuss und Ellbogengelenk in rechtwinkelige Beugung), Fixirung in dieser Stellung durch Gypsverband oder Extension mit Volkmann'schem Schlitten. Bei starken Schmerzen:

Rp. 1406.

*Morph. mur. 0·2,*

*Aqu. dest. 10·0,*

*Merc. sublim. corr. 0·001.*

*D. S. 1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren*

Auf die Gelenksgegend Application von Eisblasen (auch über dem Gypsverband anzuwenden). Wenn trotzdem die Entzündung und Eiterung fortschreitet, Eröffnung des Gelenks unter streng antiseptischen Cautelen; Entleerung des Eiters, Ausspülung des Gelenks mit 1<sup>o</sup>/<sub>10</sub>iger Carbollösung, Drainage, Jodoformverband.

**Rheumatismus articulorum acutus. Acuter Gelenksrheumatismus.** Immobilisirung der erkrankten Gelenke durch Pappschiennen-Organinverband. Innerlich neben kühlenden Säuren:

Rp 1407.

*Natr. salicylic. 10·0*

*Da in capsul. amyloc. No. 20.*

*D. S. 2stündlich 1 Stück.*

**Gangraena. Brand.** Gegen Decubitus prophylaktisch bei Krankheiten, die zu demselben disponiren, sorgfältigste Pflege der Haut; zweimal täglich die Haut des Rückens und Gesässes, sowie des Perineums mit verdünntem Essig zu waschen; scrupulöse Reinigung nach jeder Stuhlentleerung. Als Unterlage für den Kranken eine gut gepolsterte Rosshaarmatratze, das Leintuch darf keine Falten machen; zweckmässig dient zur Herstellung

einer glatten faltenlosen Unterlage der v. Hackler'sche Bettuchspanner: 2 gegenüberliegende Ränder des Leintuchs werden miteinander vernäht und durch den so gebildeten Sack ohne Boden 2 Stangen derart durchgesteckt, dass sie zu beiden Seiten des Bettes entlang laufen und durch Riemen unter dem Bett miteinander verbunden das Leintuch stets gespannt erhalten. Unter dem Gesäss ein Stück Kautschuk oder feines Handschuhleder zwischen Leintuch und Matratze. Sowie Röthung in der Sacralgegend auftritt, neben grösster Reinlichkeit tägliche Einreibung der Stelle mit frischem Citronensaft; Luft- oder Wasserpolster, in Ermangelung eines solchen ein Watterkranz. Wenn trotzdem eine Excoriation entstanden ist, Bepinseln mit: -

Rp. 1408.

*Argent. nitric. 1·0,*

*Aqu. dest. 20·0.*

*S. Täglich 2mal einzupinseln.*

Darauf:

Rp. 1409.

*Emplastr. Ceruss. 30·0.*

*S. Auf weiches Leder gestrichen aufzulegen.*

Bei feuchter Gangrän und starkem Gestank auch Bedeckung mit Gypstheer:

Rp. 1410.

*Bitumin. Fag. 100·0,*

*Calcar. sulfuric. 400 0.*

*S. Auf die brandige Stelle dick aufzutragen; täglich 2mal zu erneuern.*

Bei bereits entwickelter Gangrän Jodoformver-

band oder bei ausgebreiteter Zersetzung Bedeckung mit Compressen, die in Liquor Burowi getaucht sind oder in:

Rp. 1411.

*Calc. chlorat. 10·0,*

*Aqu. dest. 400·0.*

*S. Zu Umschlägen.*

Diese Verbände 2mal täglich zu wechseln.

Weniger dauernde Wirkung hat Abspülung mit:

Rp. 1412.

*Kal. hypermangan. 1·0,*

*Aqu. dest. 100·0.*

*S. Zur Abspülung.*

Bei tiefgreifender Gangrän die Haut durch mehrere Einschnitte zu spalten. Abgestorbene Fetzen mit der Scheere abzutragen.

Bei Gangrän der Extremitäten nicht eher zu amputiren, als bis sich eine deutliche Demarcationslinie gebildet hat. Nur bei sehr langsam vorschreitender Gangrän und relativ gutem Allgemeinbefinden schon früher Amputation, hoch oben über der gangränösen Stelle.

Innerlich bei Gangrän roborirende Kost, reichliche Zufuhr von Alcohol, eventuell auch Kampher:

Rp. 1413.

*Camphor. trit. 0·5,*

*Sacch. alb. 20*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 3—4 Pulver im Tag.*

Bei heftigen Schmerzen Morphin.

Bei Gangrän durch Stomatitis in Folge von Quecksilber Intoxication Aussetzen des Quecksilber-Gebrauchs, Wechseln der Leib- und Bettwäsche, wemöglich auch des Zimmers. Fleissiges Gurgeln mit:

Rp. 1414.

*Kali chloric. 4·0,*

*Aqua font. 200·0.*

*S. Gurgelwasser.*

**Wunddiphtherie.** Strenge Isolirung des Kranken. Roborirende und excitirende Allgemeinbehandlung. Die Wunde in Narkose mit scharfem Löffel auszukratzen bis auf das gesunde Gewebe; die Hautränder abzutragen; nach Stillung der Blutung:

Rp. 1415.

*Acid. nitric. fum. 10·0.*

*S. Die Wundfläche damit bis zur Schorfbildung zu ätzen.*

Darüber Jodoformverband, eventuell auch mit Liquor Burowi. Die Ätzung eventuell nach theilweiser Abstossung des Schorfes zu wiederholen. Statt mit Salpetersäure auch Verschorfung mit dem Thermocauter.

**Erysipelas traumaticum. Wundrose.** Isolirung des Kranken. Die Haut reichlich mit Oel zu bestreichen, darüber Watte aufzulegen. Blasen mit einer Nadel aufzusteichen. Abgrenzen der erkrankten Stelle durch Heftpflasterstreifen (Wölfler), oder Bestreichen mit Leinöl-Firniss (in jeder Drogenhandlung käuflich.)

Verband mit Gaze, die in 1<sup>o</sup>/<sub>100</sub>-iger Sublimatlösung oder Burow'scher Lösung getränkt wurde. Innerlich reichlich Alcoholica, bei längerer Dauer der Krankheit auch excitirende Medicamente wie:

Rp. 1416.

*Camphor. trit. 0·2,*  
*Sacch. alb. 3·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 3stündl. 1 Pulver.*

Oder:

Rp. 1417.

*Mosch. opt. 0·3,*  
*Sacch. alb. 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 2stündllch 1 Pulver.*

**Lymphangioitis. Lymphgefässentzündung. Phlebitis. Venenentzündung.** Ruhigstellung und Hochlagerung des erkrankten Gliedes, Bestreichen desselben mit Unguent. ciner., Eisumschläge, bei beginnender Suppuration Dunstumschläge, resp. Umschläge mit Liquor Burowi (s. Rp. 1379), später Incision. Bei langer Dauer oder öfterer Recidive der Krankheit tägliche warme Bader.

**Septichaemie, Pyaemie.** Bestes und sicherstes Prophylacticum: Strengste Antisepsis bei Operationen und Wundbehandlung; Sorge für reine Krankensäle und reine Luft in denselben. Bei bereits bestehender Krankheit, namentlich bei Schüttelfrösten:

Rp. 1418.

*Chinin. muriat.,*  
*Sacch. alb. āā 2·5.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 5.*  
*D. S. Am Nachm. 2—3*  
*Pulv. in ¼stündl. Paus.*

Dazu:

Rp. 1419.

*Opii pur. 0·4,*  
*Sacch. alb. 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 5.*  
*D. S. Am Abend 1 Pulv.*



Ferner Alkohol in Form schwerer Weine, oder als Rum, Cognac, sowie auch:  
Rp. 1420.

*Tinct. amar. 30·0,*

*Tinct. Nuc. vom. gtt. 3*

*D. S. Mehrmals täglich*

*1 Kaffeelöffel*

Erzeugung starker Diaphoresis durch ein warmes Bad mit nachfolgender Einwicklung in warme, nasse Leintücher bei Septicämie oft von günstiger Wirkung.

### **Tetanus. Wundstarrkrampf.**

Rp. 1421.

*Chloral. hydr. 3·0 - 5·0,*

*Aqu. font. 150·0.*

*S. Auf 3 Klystiere tagsüber zu verbrauchen.*

Damit combinirt Morphin-Injectionen.

Beiden einzelnen Anfällen Chloroform-Inhalationen.

Zu versuchen wäre gegen den Tetanus auch:

Rp. 1422.

*Curar. 0·05,*

*Aqu. dest. 5·0.*

*S.  $\frac{1}{2}$  Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

Grosse Vorsicht wegen Ungleichheit der Präparate!

### **Delirium potatorum traumaticum. Säuferwahnsinn.**

Zur Verhütung desselben Trinkern täglich etwas Alkohol zu geben. Ferner sowohl prophylaktisch, als besonders nach Ausbruch der Krankheit:

Rp. 1423. *Opia pur. 0·5 - 2·0,*

*(Tartar emetic 0·05),*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 2stündlich 1 Pulver, bis Beruhigung eintritt.*

Auch Chloralhydrat (bei normaler Herzkraft) gut zu verwenden:

Rp. 1424.

*Chloral. hydrat. 2·0 - 4·0,*

*Aqu. dest. 80·0,*

*Syr. rub. Idae 20·0.*

*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Bei mehr chronischen Fällen ohne maniakalische Anfälle Grog oder:

Rp. 1425.

*Arrac. 35·0,*  
*Vitell. ov. unius,*  
*Sacch. alb. 70·0,*  
*Aqu. dest. 140·0.*  
*S. Löffelweise.*

**Scrophulosis.** Regulirung der Diät; Fleisch, Milch, Eier. Aufenthalt in guter Luft, im Sommer, wenn möglich, im Gebirge oder an der See. Rationelle Abhärtung. Bei fetten Kindern zeitweilig leichte Abführmittel, insbesondere:

Rp. 1426.

*Calomelan. 0·2 – 0·6,*  
*Sacch. alb. 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 3mal tägl. 1 Pulv.*

Bei fetten und zugleich anämischen Kindern Jod-eisen angezeigt.

Rp. 1427.

*Ferr. iodat. saccharat.*  
*0·5,*  
*Sacch. alb. 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 3mal tägl. 1 Pulv.*  
*nach der Mahlzeit.*

Bei mageren Kindern Gebrauch von Leberthran im Winter. Von günstiger Wirkung bei Scrophulose sind Salzäder, 500 bis 1500 Gr. Steinsalz auf ein Bad, oder die Bäder von Hall, Darkau, Ischl, Kreuznach, Reichenhall etc., bei grösseren Kindern auch Seebäder.

**Chronische Entzündung von Weichtheilen.** Wo es möglichst ist, Beseitigung der Ursache (scrophulöse, tuberculöse, syphilitische Dyskrasie). Local Ruhe des erkrankten Theils und wo es geht, Hochlagerung oder Suspension. Compression durch Einwicklung mit Flanellbinden oder mit elastischen Binden; noch wirksamer oft hydropathische Einwicklungen: nasse, gut ausgedrückte Tücher, die mit wasserdichtem Stoff zu bedecken und 2—3stündlich zu wechseln sind. Gebrauch von

Schlammhädern (Pystian, Ofen, Teplitz in Böhmen) oder Moorhädern (Franzensbad, Marienbad etc., eventuell künstlichen mit Moorsalz oder Moorextract; Umschläge mit jodhaltigem Wasser (von Hall, Darkau. Von resorbirender Wirkung sind öfters längere Anwendung von festanzulegenden Quecksilberpflasterstreifen oder Bepinselungen mit Jodtinctur. Zur Beseitigung alter Infiltrate methodische Massage oft von grossem Nutzen.

**Ulcus. Geschwür.** Bei entzündeten und erethischen Geschwüren:

Rp. 1428.

*Cer. alb.,*

*Ol. Olivar. aa 20·0.*

*M. f. cerat.*

*S. Salbe, auf Leinwand gestrichen aufzulegen.*

Rp. 1429.

*Zinc. oxydat. 3·0,*

*Vaselin. 30·0.*

*S. Wie das Vorige.*

Rp. 1430.

*Aqu. Plumb. 200·0.*

*S. Zu Umschlägen.*

Wenn trotzdem die Granulationen schmerzhaft bleiben oder schlecht aussehen, Cauterisation mit Argent. nitric. oder mit dem Thermocauter, darauf Compression mit Heftpflasterstreifen.

Bei fungösen Geschwüren tägliches Bestreichen mit Lapis in Substanz; wenn dies nicht genügt, Aetzen mit Kali caustic. oder Ferr. candens, oder Auskratzung mit scharfem Löffel.

Bei callösen Geschwüren (insbesondere beim Ulcus cruris) Compression mit Heftpflasterstreifen; wenn dies nicht zum Ziel führt, nasse Einwicklung mit in Liquor Burowi getauchten Compressen oder continuirliches warmes Bad. Wenn die Haut in der Umgebung des Geschwürs hart, callös ist, Massage. Wenn die Geschwürsränder vollkommen unverschiebbar sind, Circumcision des Geschwüres mit tiefen Schnitten, 3 cm. vom Geschwürsrand entfernt. Bei mässigen Graden von Unterschenkelgeschwüren und namentlich nach Heilung derselben zur Verhütung von Recidiven tagüber Einwick-

lung des Unterschenkels mit einer sogen. Martin'schen elastischen Binde. Bei ausgedehnten Geschwüren auch Hauttransplantation zu versuchen.

Bei gangränösen Geschwüren Verwendung der unter „Gangraena“ (S. 361) erwähnten Mittel, namentlich Gypstheer oder Jodoformverband.

Bei phagedänischen Geschwüren Aufstreuen von Jodoformpulver oder:

Rp. 1431. *Hydragyr. praec. rubr. 10·0.*  
*S. Streupulver.*

Wenn dies nicht rasch wirkt, Auskratzung mit scharfem Löffel und darauffolgende Aetzung mit Kal. caustic. oder Ferr. candens.

Bei lupösen Geschwüren intensive, bis in die gesunde Umgebung reichende Aetzung mit Argent. nitric. oder Kal. caustic. in Form von Stiften, oder mit:

Rp. 1432. *Zinc. chlorat.,*  
*Amyl. Tritic. aa 15·0,*  
*Aqu. dest. q. s. ut f. pasta mollis.*  
*D. S. Auf das Geschwür aufzustreichen.*

In den meisten Fällen ist besser Auskratzung mit dem scharfen Löffel (in Narkose) und nach Stillung der Blutung durch Compression Aetzung mit Kalistift; bei flachen Infiltraten auch Stichelung mit Scarificationsmesser. Bei Lupus exfoliativus und hypertrophicus Bestreichen mit:

Rp. 1433.  
*Jod. pur. 0·3,*  
*Kal. iodat. 3·0,*  
*Glycerin. 30·0.*  
*S. Aeusserlich.*

Beischorbutischen Geschwüren des Zahnfleisches:

Rp. 1434.  
*Borac. venet.*  
*(od. Acid. mur.) 3·0 — 5·0,*  
*Mell. rosat. 35·0.*  
*S. 2mal tägl. das Zahn-*  
*fleisch damit zu be-*  
*pinseln.*

Statt dessen auch Bestreuen mit Jodoformpulver. Säuerliche Getränke, leicht verdauliche Diät.

**Ostitis et Periostitis chronica. Chronische Knochen- und Beinhautentzündung. Caries. Beinfrass.** Behandlung zu Grunde liegender Dyskrasie. Möglichste Ruhe des erkrankten Theiles; eventuell Fixirung durch Contentivverbände. Im Beginn bei starken Schmerzen feuchtwarme Umschläge oder Einwicklung mit nassen Rollbinden; Elevation des Gliedes. Ferner Bepinseln mit Jodtinctur oder Auflegen von:

Rp. 1435.

*Jod. pur. 0·3,  
Kal. iodat. 3·0,  
Ungu. simpl. 30·0  
S. Salbe; auf Leinwand  
gestrichen aufzulegen.*

Oder:

Rp. 1436.

*Ungu. Hydrarg. cin. 20·0,  
Ungu. simpl. 10·0.  
M. f. ungu.  
D. S. Wie das Vorige.*

Ebenso: Rp. 1437.

*Argent. nitric 0·3,  
Balsam. peruv. 2·0,  
Ungu. simpl. 30·0.  
S. Salbe.*

Auch Gebrauch der unter „Scrophulosis“ (S. 365) angegebenen Bäder recht angezeigt

Kalte Abscesse, wenn von den Weichtheilen oder von Knochen, die einer Operation zugänglich sind, ausgehend, zu spalten, mit scharfem Löffel auszukratzen, Jodoformverband. Bei kalten Abscessen, die von solchen Knochen stammen, an denen eine Operation nicht oder nur durch sehr schwere Eingriffe ausführbar entweder spontane Eröffnung abzuwarten oder Punction mittelst Troiscart's und, wenn kein Eiter mehr ausfließt, durch die Canüle zu injiciren:

Rp. 1438.

*Jodoform 10·0,  
Glycerin. 100·0.  
S. Wohl aufgeschüttelt mit Spritze zu injiciren, bis die Abscesshöhle halb gefüllt ist.*

Darüber dann ein mässig comprimirender Verband.

Bei Caries an den Extremitäten, wenn bereits Fisteln ausgebildet sind, die erkrankte Knochenmasse auszukratzen, Jodoformverband. Im äussersten Fall Amputation.

**Rhachitis. Englische Krankheit.** Kräftige Nahrung (Fleisch, Milch, Eier), Einschränkung der Zufuhr von Kohlehydraten. Steinsalz- oder Malzbäder, Landaufenthalt. Innerlich:

Rp. 1439.

*Calcar. phosphoric.*,  
*Ferr. lactic. aa* 3·0,  
*Sacch. lact.* 10·0.  
*S.* 2mal tägl. 1 Messerspitze voll.

In neuerer Zeit nach der Empfehlung von Kassowitz  
Phosphor:

Rp. 1440.

*Phosphor.* 0·01,  
*Ol. Amygdal. dulc.* 70·0,  
*Sacch. alb.* 30·0,  
*Aether. Fragar. gtts.* 20.  
*S.* Täglich 1 Kaffeelöffel.

Rp. 1441.

*Phosphor.* 0·01,  
*Ol. Amygdal. dulc.* 30·0,  
*Aqu. dest.* 40·0,  
*Pulv. gumm. Arab.*,  
*Sacch. alb. aa* 15·0.  
*S.* Täglich 1 Kaffeelöffel.

Oder einfach:

Rp. 1442.

*Phosphor.* 0·01,  
*Ol. iecor. Asell.* 100·0.  
*S.* Täglich 1 Kaffeelöffel.

Nach Sistiren der Rhachitis bei zurückbleibenden Knochenverkrümmungen subcutane Infractio des Knochens in Narkose und Anlegung eines Gypsverbandes, eventuell auch, wenn der Knochen sehr fest geworden, Osteotomie oder Keil-Excision.

**Tumor albus. Fungöse Gelenkentzündung.** Im Beginn ähnliche Behandlung, wie bei chronischer Ostitis (s. das.), Bepinseln mit Jodtinctur, starke Argent. nitric. Salben, hydropathische Einwicklung, täglich vorzunehmende Esmarch'sche Einwicklung der

Extremität, Anfangs durch 5 Minuten, allmählich länger. Bessert sich durch diese Maassregeln der Process nicht, Anlegung eines (wenn bereits ein Abscess durchgebrochen, gefensternten) Gypsverbandes; bei Affection des Hüftgelenks und bei hochgradiger Erkrankung des Kniegelenks besser Extensionsverband mit Volk mann'schem Schlitten Ueber Behandlung der kalten Abscesse s. „Ostitis chronica.“ (S. 368.) Wenn die Krankheit sehr weit vorgeschritten, Excochleation, resp. Resection oder Amputation.

**Hydrops articulorum chronicus. Chronische Gelenkwassersucht** Vollkommene Ruhe, Hochlagerung, Jodtinctur. Compression durch Einwicklung mit elastischen oder nassen Binden, Massage. Wenn dies Alles trotz fortgesetzter Anwendung nicht nützt, Punction mit feinem Troiscart und darauf Bestreichen der Gelenksgegend mit Jodtinctur und feste Entwicklung mit nassen Binden oder Punction mit nachfolgender Injection von:  
Rp. 1443.

*Tinct. Jod. 300,*

*Aqu. dest. 60 0.*

*S. Eine Spritze damit zu füllen, 40—80 Gramm in das Gelenk zu injiciren, nach 3—5 Minuten wieder ablaufen zu lassen.*

Hierauf die Wunde mit Jodoformgaze und Heftpflaster zu schliessen und immobilisirender, mässig comprimirer Verband.

Auch Auswaschung des punetirten Gelenks mit 2—4%iger Carbolsäurelösung oft von Vortheil.

**Arthritis urica Gicht.** Im Anfall Wärme, mässige Compression und Immobilisirung, sowie Hochlagerung. Gegen die Krankheit selbst Gebrauch von Karlsbad, Kissingen, Homburg, Vichy etc., sowie indifferente und Schwefelthermen (Teplitz, Wiesbaden, Aachen, Baden bei Wien).



**Angioma. Gefäßgeschwulst.** Bei flachen Angiomen, wenn dieselben nicht im Gesicht sitzen, Cauterisation mit rauchender Salpetersäure; bei weit ausgebreiteten Gefässektasieen Stichelungen mit Scarificationsmesser an den peripheren Theilen, nach hiedurch erzielter Verkleinerung des Tumors rauchende Salpetersäure. Bei plexiformen und cavernösen Angiomen Exstirpation mit Messer und Scheere; bei mehr diffusen grossen Angiomen meist tiefe Punctionen mit dem Thermocauter; letztere Methode auch bei Angiomen des Gesichts gewöhnlich die beste.

**Lymphoma malignum. Bösartige Lymphdrüsen-  
geschwulst.** Arsenikbehandlung, und zwar:

Rp. 1444.

*Solut. arsen. Fowleri,  
Tinct. Ferr. pomat.*

*āā 10·0.*

*S. Anfangs tägl. 2mal  
10 Tropfen, nach je  
3 Tagen um 2 Tropfen  
pr. dos. zu steigen bis zu  
2mal 30 Tropfen, dann  
ebenso herunterzugehen.*

Damit combinirt:

Rp. 1445.

*Sol. arsen. Fowler. 10·0.  
S. Anfangs tägl. 2 Tropf.,  
später 4—5 Tropfen in  
die Geschwulst an ver-  
schiedenen Stellen zu  
injeciren.*

NB. Bei Intoxicationerscheinungen nicht plötzliches Aussetzen des Arsens, sondern allmälliche Verringerung der Dosis.

**Verrucae. Warzen.** Aetzung mit rauchender Salpetersäure; am nächsten Tag der Schorf mit Messer abzutragen bis zur Blutung, dann erneuerte Aetzung; dieses Verfahren bis zum Verschwinden der Warzen fortzusetzen.

**Carcinoma. Krebs.** Möglichst frühzeitige und gründliche Exstirpation mit dem Messer. Bei sehr alten oder sehr anämischen Individuen auch Aetzmittel, am besten:

Rp. 1446.

*Zinc. chlorat. 10 0,*  
*Farin. Secal. (oder Gumm. Arabic.) 30·0,*  
*Aqu. dest. q. s. ut f. massa, ex qua form.*  
*bacill. No. 6.*  
*D. S. Aetzpfeile.*

Man macht mit einer Lancette Einstiche in die Geschwulst und drückt die Aetzpfeile in den Stichcanal hinein.

Bei inoperablen Carcinomen manchmal Entfernung eines Theils wegen Blutung oder Jauchung indicirt; im Uebrigen zur Beseitigung der schlechten Secretion auch Ferrum candens; gegen den Gestank Jodoformverband, Gypstheer, Liquor Burowi, Kal. hypermanganic. etc.

Aus

**Hofrath Professor Dr. Eduard Albert's**  
**Klinik und Ambulatorium für chirurgische Krank-**  
**heiten.**

---

**Anästhesirung.** Bei grösseren Operationen Narcose mit reinem Chloroform, bei kurz dauernden Operationen auch mit Bromäethyl. Von letzterem nur ganz frisch bezogene Fläschchen zu benützen; 15—20 Cubikcentim. auf einmal aufzugiessen, nach 50 Secunden der Korb zu entfernen und die Operation zu beginnen.\* (Dauer der Anästhesie 2—5 Minuten).

Bei kleineren Operationen auch Localanästhesirung durch subcutane Cocaininjection, jedoch nur, wo centrale Abschnürung möglich (z. B. Finger, Penis, nicht am Kopf). Verwendet wird eine 2—5%ige Lösung, jedoch nie mehr als 0.03 Cocain. mur. Sofort nach Beendigung der Operation Entfernung des abschnürenden Schlauches. Bei Intoxicationerscheinungen Excitantia (Cognac, Einathmung von Amylnitrit.)

An Schleimhäuten statt der Injection Bepinselung mit einer 10—20%igen Lösung von Cocain in Glycerin.

**Antiseptische Wundbehandlung.** Das an der Klinik Albert hauptsächlich verwendete Antisepticum ist Sublimat, und zwar in folgenden Lösungen:

Rp. 1447. *Mercur. sublim. corros.,*  
*Natr. chlorat. aa 1.0,*  
*Aqu. dest. 1000.0.*  
*S. 1%ige Sublimatlösung.*

Rp. 1448.

*Merc. sublimat. corrosiv.,*  
*Natr. chlorat aa 20,*  
*Aqu. dest. 1000·0.*  
*S. 2°<sub>00</sub>ige Sublimatlösung.*

Rp. 1449.

*Merc. sublim. corros.,*  
*Natr. chlorat. aa 0·5,*  
*Aqu. dest. 1000·0.*  
*S. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>°<sub>00</sub>ige Sublimatlös.*

Um die Sublimatlösungen von Wasser leicht unterscheidbar zu machen, werden denselben zweckmässig einige Tropfen einer concentrirten Eosin- oder Methylviolettlösung zugesetzt, bis zum Entstehen einer hellrosa oder hellvioletten Färbung.

Die Hände des Arztes werden vor Ausführung von Operationen oder Wundverbänden mit Schmierseife und Bürste gründlich gereinigt, die Nägel gut ausgeputzt, dann die Hände mit 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>°<sub>00</sub>iger Carbol- oder 1°<sub>00</sub>iger Sublimatlösung desinficirt: ebenso Reinigung des Operationsfeldes, mit Aether, dann Seife und Bürste; Desinfection desselben durch Ausspülen mit 1°<sub>00</sub>iger Sublimatlösung mittelst Irrigateurs. Die Umgebung des Operationsfeldes mit Sublimat Compressen zu bedecken (reine Leinen-Compressen, die durch 1 Stunde in 1°<sub>00</sub> Sublimat gekocht, dann in einer gleichen Lösung aufbewahrt werden.) Die Instrumente nach dem Gebrauch stets gründlich gereinigt, werden vor jeder Operation <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunden lang in 1°<sub>00</sub>iger Sodalösung gekocht, hierauf kommen sie in 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>°<sub>00</sub>ige Carbollosung und werden aus derselben gereicht.

Nadeln, Silberdraht, Uterussonden etc. liegen beständig in:

Rp. 1450.

*Acid. carbolic. 15·0,*  
*Glycerin 300·0.*  
*S. 5°<sub>00</sub>iges Carbol-Glycerin.*

Schwämme werden gar nicht mehr verwendet. Zum Abtupfen dient trockene (sterilisirte) oder in Sublimat getränkte und ausgepresste Gaze, bei Laparotomien genähte Gazebündelchen, die in Sublimatlösung ausgekocht

worden sind. Jeder Tupfer wird nur bei einer Operation verwendet und dann vernichtet.

Zum Nähen wird Seide verwendet, die in 5%iger Carbol- oder 1%iger Sublimatlösung durch eine Stunde gekocht, dann in frischer 5%iger Carbol- oder 2%iger Sublimat-Lösung mindestens 8 Tage aufbewahrt ist, und aus 2%iger Sublimatlösung gereicht wird; zu Ligaturen Catgut, der mit Seife und Bürste gereinigt, 12 Stunden in 2%iger Sublimat-Lösung desinficirt, dann durch mindestens 14 Tage in öfters gewechseltem Sublimat-Alkohol gelegen ist und aus demselben gereicht wird.

Rp. 1451.

*Merc. sublim. corrosiv. 1·0,*

*Alcohol. absolut. 500·0,*

*Glycerin. 100·0.*

*S. Sublimat-Alcohol.*

Die Drains liegen nach der Reinigung mit Seife und Bürste und einstündiger Auskochung in 5%iger Carbol- oder Sublimatlösung durch mindestens 3 Wochen in 2%iger, alle 5 Tage zu wechselnder Sublimatlösung. In sehr schmale Wundcanäle wird statt eines Drainrohrs ein Streifchen von Jodoformgaze oder von Silk eingeführt, letzterer trocken aufzubewahren, vor der Anwendung aber in Carbol- oder Sublimatlösung zu tauchen.

Der Verband wird gewöhnlich in folgender Weise angelegt: Nachdem die Wunde mit 2½—5%iger Carbol- oder ½—1%iger Sublimatlösung mittelst Irrigateurs gründlich gereinigt ist, Bestreuen derselben mit Jodoformpulver (mittels Zerstäubers); hierauf kommt direct auf die Wunde Jodoformgaze, in 2—4facher Schichte, darüber gekrüllte feuchte Sublimatgaze, dann geschichtete feuchte Sublimatgaze, hierauf wasserdichter Stoff oder (bei stark secernirenden Wunden) ein Holzwoilkissen; das Ganze wird mittelst Calicotbinde befestigt; darüber eventuell ein Schienenverband oder Anlegung eines Organtilverbandes. Bei Wunden in Mund- und Nasenhöhle wird nur Jodoform-

gaze verwendet. Auf frische Narben wird Jodoformpulver gestreut oder ein Jodoformgaze-Streifchen angelegt, darüber englisches Pflaster, in Sublimat eingetaucht, angelegt und mit Collodium befestigt. Verbandwechsel nur, wenn Indication dazu durch Blutung, starke Schmerzen, Fieber oder Durchschlagen der Wundsecrete gegeben ist oder wenn die Nähte oder Drains zu entfernen sind.

Sublimatgaze wird bereitet durch Einlegen von hydrophiler Gaze in kalte, 2<sup>0</sup>/<sub>00</sub>ige Sublimatlösung, nach 24 Stunden wird die Gaze herausgenommen und zum Trocknen aufgehängt, bei Anlegung des Verbandes zweckmässig wieder in 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub>ige Sublimatlösung getaucht.

Die Bereitung der Holzwollkissen geschieht, indem Holzwolle, die 1 Stunde in 2<sup>0</sup>/<sub>00</sub>iger Sublimatlösung gekocht wurde, auf ein entsprechend grosses Stück Sublimatgaze locker aufgelegt wird, dessen Ränder über der Holzwolle umgeschlagen und mit weiten Stichen vernäht werden.

Bei Laparotomien wird zur Durchspülung der Bauchhöhle nicht Sublimat verwendet, sondern:

Rp 1452.

*Acid. salicylic. 1·0,*

*Aqu. dest. 1000·0.*

*S. Salicyllösung; erwärmt anzuwenden.*

Aus derselben Lösung werden auch die für die Blutstillung oder Reinigung in der Bauchhöhle zu verwendenden Tupfer gereicht.

Ebenso verwendet auch 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub>ige Thymollösung.

Bei Phlegmonen und septischen Wunden zu Umschlägen Liquor Burowi:

Rp 1453.

*Alum. crud. 8·0,*

*Plumb. acet. 40·0,*

*Aqu. font. 400·0.*

*S. Stärkere Burow'sche Lösung.*

Rp. 1454.

*Alum. crud. 4·0,*

*Plumb. acetic. 20·0,*

*Aqu. dest. 400·0*

*S. Schwächere Burow'sche Lösung.*

Bei schlecht heilenden Geschwüren Betupfen mit in Chlorzinklösung getauchten Wattebäuschchen:

Rp. 1455.

*Zinc. chlorat.* 5·0—20·0,

*Aqu. dest.* 250·0.

*S. Chlorzinklösung.*

Danach der gewöhnliche Sublimatverband.

**Commotio cerebri. Gehirnerschütterung.** Strengste Ruhe. Achtung auf die Blasenentleerung, bei gefüllter Blase Anwendung des Katheters. In schweren Fällen, bei andauerndem Coma, periphere Reize: Frottirungen der Haut, Auflegen eines warmen Schwammes in der Herzgegend, Application kalter Klysmen. Im darauffolgenden Reizungsstadium, wenn der Puls verlangsamt und stark gespannt ist, bei kräftigen Individuen ein Aderlass oder einige Blutegel an die Warzenfortsätze; ferner kalte Wasser- oder Essigklystiere. Weiterhin mässig kühle Umschläge auf den Kopf; durch drei Wochen Bettruhe, leichte Diät. Sorge für regelmässige Stuhlentleerung.

### **Fractura ossium cranii. Bruch von Schädelknochen.**

Bei subcutanen Fracturen nur strenge Ruhe, allenfalls Application von Kälte. Nur wenn Blutung aus der Arteria meningea media diagnosticirt wird, Trepanation und Unterbindung der Arterie. Wenn Depression eines Fragments besteht und schwere Gehirnerscheinungen veranlasst, operative Elevation oder Entfernung des Knochenstücks.

Bei complicirter Fractur, wenn bloss eine Fissur vorhanden, Desinfection der Wunde, Drainage, Naht, antiseptischer Verband. Bei Splitterung in geringer Ausdehnung Entfernung der beweglichen Splitter, Glättung der Wundränder; wenn möglich, auch hier Vernähung der Wunde. Bei ausgedehnteren Fracturen mit weit auslaufenden Fissuren nur die ganz losen Splitter zu entfernen und scharfe Knochenzacken abzukueipen. Sind



fremde Körper in den Schädel eingedrungen und stecken dieselben noch im Knochen, so sind sie mittelst Schraubstöcke, Zangen etc. durch entsprechende Bewegung der Fremdkörper zu entfernen; wenn dies nicht gelingt, Abmeisselung der umgebenden Knochensubstanz oder selbst eigentliche Trepanation, ebenso bei gänzlich im Schädelraum steckenden Fremdkörpern (Kugeln), wenn sich ihr Sitz mit Sicherheit bestimmen lässt und einem operativen Eingriff zugänglich ist.

**Atheroma capitis. Balggeschwulst am Kopf.** Incision der Geschwulst in ihrem längsten Durchmesser, Auspräparirung des Balges von der Umgebung. Desinfection, Naht, Sublimatverband.

**Kephalhaematoma. Kopfblutgeschwulst.** Rein expectative Behandlung; nur wenn Eiterung eintritt, Incision.

**Vulnus scissum faciei. Schnitt-, resp. Hiebwunde des Gesichts.** Naht, am besten Knopfnah. Wenn viele Gefässe spritzen, einzelne derselben mit Sperrpincette zu fassen, die man liegen lässt, bis man mit der Naht bis zu der betreffenden Stelle gekommen ist. Ligatur gewöhnlich überflüssig. Reicht die Wunde bis in eine der Gesichtsoffnungen (Nasenbohle, Mundspalte), die Naht an dieser Stelle zu beginnen. Ueber die genähte Wunde der gewöhnliche Sublimatverband. Bei Entfernung der Nähte zwischen denselben Jodoformgaze-Streifen mit englischem Pflaster und Collodium zu befestigen, erst wenn diese festkleben, die Fäden herauszunehmen.

**Noma. Wasserkrebs.** Roborirende und excitirende Diät. Abtragung gangranöser Theile und Aetzung der Wundfläche mit Ferrum candens (Paquelin) oder mit rauchender Salpetersäure.

**Angioma faciei. Gefäßgeschwulst im Gesicht.** Bei flachen Teleangiectasien Bestreichen mit Collo-

dium zu versuchen. Beim eigentlichen Tumor cavernosus Ignipunctur mit spitzem Paquelin oder einfach mit an der Spitze glühend gemachten Nadeln; in anderen Fällen Durchziehen von in Liquor Ferri sesquichlorati getauchten und abgetrockneten Fäden, die man über der Geschwulst knüpft, und wenn sie stark locker geworden, entfernt. Exstirpation mit dem Messer nur, wenn die zurückbleibende Wunde sich nähen lässt.

### **Epithelioma faciei. Epithelialkrebs des Gesichts.**

Exstirpation mit dem Messer; bei alten Leuten, wenn die Neubildung flach ist, auch Aetzen mit Chlorzinkpasta:

Rp. 1456.

*Zinc. chlorat. 20·0,  
Gumm. Arab. sol. inspiss. 5·0,  
Amyl. pur. q. s. ut f. pasta consist. spissior.  
D. S. Liniendick auf die Geschwulst aufzu-  
streichen; die Umgebung mit Heftpflaster  
zu schützen.*

**Fractura nasi. Bruch des Nasenknochens.** Bei starker Blutung Einspritzung von kaltem Wasser, eventuell Tamponade der Nasenhöhle (s. S. 380 „Epistaxis“). Dislocation durch Emporheben des verschobenen Fragments mittelst in die Nase eingeführter Kornzange oder weiblichen Katheters zu beheben; hierauf zur Stützung des Fragments Röhrchen aus Blei oder Silber oder Stücke von elastischen Kathetern, eventuell auch nur Jodoformgaze einzuführen.

**Fractura maxillae inferioris. Bruch des Unterkiefers.** Bei Dislocation Fixirung der Fragmente durch Naht mittelst Silberdrahtes; im Uebrigen Anlegen eines Kinn-tuchs. Seltener Anlegen von Guttapercha-Schienen

an die Zahnreihe. Gegen die leicht erfolgende Zersetzung der Mundsecrete;

Rp. 1457.

*Kali chloric. 5·0,*

*Aqu. font. 200·0.*

*S. Gurgelwasser.*

### **Luxatio maxillae. Verrenkung des Kiefergelenks.**

Reposition: Mit den in die Mundhöhle eingeführten Daumen der Unterkiefer in der Gegend der letzten Backenzähne nach abwärts zu drücken und zugleich mit den übrigen Fingern das Kinn von unten zu heben; ein Gehilfe steht hinter dem Patienten und fixirt den Kopf mit den an die Ohrgegend gelegten Flachhänden, die zugleich einen sanften Zug nach oben ausüben sollen.

**Periostitis maxillaris. Parulis. Subperiostaler Kieferabscess.** Spaltung des Abscesses von der vorderen Mundhöhle aus; in jedem Falle Extraction des kranken Zahnes.

**Epistaxis Nasenbluten.** Ruhe, Entfernung eng anschliessender Halsbinden oder Kragen; bei bettlägerigen Patienten nur leichte Bedeckung. Aufschneuben von kaltem Wasser, Essig oder Alaunlösung ist gewöhnlich schon vor der Ankunft des Arztes versucht worden; am besten daher sofort Compression oder Tamponade auszuführen. Zunächst also drückt man dem mit nach vorne geneigtem Kopfe sitzenden Patienten, während derselbe ruhig athmet, den Nasenflügel der blutenden Seite fest an das Septum. Steht nach 10 Minuten die Blutung nicht, Einführung eines genügend grossen, an einem Faden befestigten Watte- oder Charpietamppons in die Nasenhöhle. Wenn trotzdem die Blutung andauert, das Blut nach den Choanen abfliesst, Tamponade der Choanen: Am meisten verwendet die Belocqu'sche Röhre:

dieselbe wird bei zurückgezogener Feder durch den unteren Nasengang bis an die hintere Rachenwand eingeführt: dann die Feder vorgeschneilt, das Knöpfchen derselben durch den Mund mittelst Kornzange vorgezogen und an demselben ein vorher vorbereiteter, etwa daumendicker Tampon mittelst eines Fadens, der durch die Oese des Knöpfchens gesteckt und festgeknüpft wird, befestigt, hierauf das Instrument langsam durch die Nase herausgezogen. Der beim Nasenloch heraushängende Faden mit Heftpflaster an der Wange zu befestigen. Nach 24 Stunden der Tampon zu entfernen. Statt der Belocqu'schen Röhre im Nothfall auch ein elastischer Katheter, ein dünnes Wachskerzchen etc. zu verwenden. Besser als all dies ist der Doppelballon von Englisch, der unter Zusammenpressen des hinteren Ballons mit dem Finger oder einer Schieberpincette durch den unteren Nasengang eingeführt, bis in die Choane geschoben und mit kaltem Wasser gefüllt, dann durch Zuschnüren des Schlauchs mit einem Faden geschlossen wird.

Nach Stillung der Blutung noch Ruhe angezeigt, Vermeiden von heissen Speisen, aufregenden Getränken.

**Corpora aliena in cavo narium.** Fremdkörper in der Nasenhöhle. Entfernung gewöhnlich am leichtesten mit dem Ohrlöffel; wenn der Körper nach vorne nicht extrahirbar, kann man ihn nach rückwärts stossen und mit zwei vom Munde aus in den Rachen gesteckten Fingern der linken Hand daselbst auffangen (jedoch nie ohne Assistenz!). Stets genaue Inspection der Nasenhöhle, weun nöthig selbst in Narkose, geboten, namentlich wenn schon von anderer Seite Extractionsversuche gemacht worden. Wenn Insecten oder Fliegenmaden in der Nase stecken, Chloroform-Inhalation; dann Ausspritzung der Nasenhöhle und Extraction der hiedurch sichtbar gewordenen Thiere.

**Ranula.** Entweder Incision, Excision eines Theils des Sackes und Vernähen der Ränder; oder Exstirpation des Sackes soweit als möglich.

**Angina tonsillaris Mandelentzündung.** Kälte, astringierende oder desinficirende Gurgelwasser. Bei nach wiederholter Angina zurückbleibender hochgradiger Hypertrophie der Mandeln Tonsillotomie, nur zu einer Zeit, wo die Mandeln nicht acut entzündet sind, auszuführen, am besten die Tonsille mit Hakenpincette oder schlanker Museux'scher Zange zu fassen und mittelst eines Knopfbistourris oder Dumreicher'schen Cystotoms abzutragen; zur Stillung der Blutung lässt man kaltes Wasser in den Mund nehmen und in den Rachen fließen, aber nicht gurgeln.

**Parotitis. Entzündung der Ohrspeicheldrüse.** Im Beginn kalte, wenn Eiterung eingetreten, feuchtwarme Umschläge; bei deutlicher Fluctuation Incisionen, parallel dem Verlauf der Facialisäste, bei Eitersenkung nach dem Halse Gegenincision, Drainage. Bei chronischen Formen Massage.

**Verletzungen am Halse.** Wenn bloss Haut und Platysma durchschnitten sind, Naht, am abhängigsten Punkt der Wunde eine Gegenöffnung und Drainage. Bei tiefer greifenden Wunden zunächst für exacte Blutstillung zu sorgen, eventuell behufs Auffindung des spritzenden Gefässes die Wunde zu erweitern. Ist trotzdem das Gefäss nicht aufzufinden, (doppelte) Unterbindung der Carotis externa, oder selbst der Carotis communis in loco electionis. Provisorisch Compression der Gefässe durch den in die Wunde eingeführten Finger, oder wenn dies nicht thunlich, directe Compression der Carotis in der Weise, dass der Arzt hinter den Kranken tritt, den Daumen der der Verletzung entsprechenden Seite in den Nacken des Kranken, die vier übrigen Finger an den vorderen Rand des Kopfnickers, entlang dem Stamm der Carotis anlegt und mit den letzteren abwechselnd drückt.

Nach vollzogener Blutstillung gründliche Desinfection der Wunde, Entfernung etwa eingedrungener Fremdkör-

per; wenn nöthig, günstige Formirung durch Zuschneiden der Wunde; Drainage, Sublimatverband.

Bei subcutaner Fractur des Zungenbeins Reposition des dislocirten Fragments am besten vom Rachen aus. Bei subcutaner Fractur des Larynx oder der Trachea, sowie Dyspnoë eintritt, Tracheotomie.

Bei offenen Fracturen der Luftwege, wenn sich Blut in die Bronchien ergossen hat, ein elastischer Katheter durch die Wunde in die Trachea einzuführen und das Blut auszusaugen; während dessen provisorische Blutstillung durch Compression oder durch zweckmässigen Zug an in die Wunde eingesetzten Haken; danach definitive Blutstillung, Ligatur blutender Gefässe. Niemals Naht der Trachea. Wenn ein Stück der Zunge oder Epiglottis abgetrennt und auf den Aditus laryngis gefallen ist, dasselbe wieder anzunähen oder wenigstens mittels eines durchgestochenen Fadens an passender Stelle zu fixiren. Ferner in jedem Falle prophylaktische Tracheotomie; dieselbe nur, wenn der Arzt jederzeit sofort zur Hand ist, bis zum etwaigen Eintritt von Dyspnoë zu verschieben. Ernährung mittelst durch die Nase einzuführender Schlundsonde. Bei Verletzung des Oesophagus Naht zu versuchen; wenn dieselbe nicht gelingt, behufs Ernährung die Schlundsonde von der Wunde aus einzuführen, bei wenig ausgedehnter Verletzung auch Einführung durch die Nase. Wenn wegen hochgradiger Schwellung des Pharynx die Einführung der Schlundsonde in keiner Weise möglich, Oesophagotomie und Einführung durch die Operationswunde.

**Struma. Kropf.** Bei der parenchymatösen Form, sowie bei kleineren gelatinösen Kröpfen Jodbehandlung zu versuchen: Innerlich Haller Jodwasser oder bei Erwachsenen:

Rp. 1458. *Kal. iodat.* 0·5,  
    *Aqu. dest.* 80·0,  
    *Syr. cort. Aurant.* 20·0.  
    *S. Tagsüber zu verbrauchen.*



Aeusserlich:  
Rp. 1459.  
*Jod. pur. 0·3,*  
*Kal. iodat. 3·0,*  
*Ungu. simpl. 30·0.*  
*S. Am Morgen einzureiben,*  
*Abends wegzucaschen.*

Rp. 1460.  
*Jod. pur. 0·3,*  
*Kal. iodat. 1·5,*  
*Glycerin. 30·0.*  
*S. Morgens einzupinseln,*  
*Abends wegzucaschen.*

Bei Struma cystica Punction mit einem mittelstarken, sperrbaren, nicht federnden Troiscart, nach Ausfliessen der Flüssigkeit Injection einer entsprechenden Menge der Lugol'schen Lösung:

Rp. 1461.  
*Jod. pur. 0·4,*  
*Kal. iodat. 2·0,*  
*Aqu. dest. 30·0.*  
*S. Zur Injection.*

Diese Flüssigkeit durch 5 Minuten in der Cyste zu belassen, dann durch den Troiscart wieder ausfliessen zu lassen. Wenn bei diesen Fällen die Jodbehandlung, resp. die Punction nicht zum Ziele führt, sowie bei allen anderen Formen Enucleation (nur unter genügender Assistenz).

### **Lymphoma colli Schwellung der Halslymphdrüsen.**

Wenn möglich, Ermittlung und Beseitigung der Ursache (Furunkel oder Ekzem der Kopf- oder Gesichtshaut, Pediculosis, Geschwüre der Nasenhöhle, cariöse Zähne, chronischer Rachenkatarrh etc.); bei scrophulösen Individuen gute Ernährung (Fleisch, Milch, Eier), Gebrauch von Leberthran, Jod, Eisen. Exstirpation nur bei ganz begrenzter Schwellung; wenn Eiterung und Durchbruch nach Aussen eingetreten, Excochleation.



**Lymphoma malignum.** Arsenikbehandlung, und zwar innerlich:

Rp. 1462.

*Sol. arsen. Fowleri,*  
*Ferr. oxydat. dialysat.*  
*liqu. aa 10·0.*

*S. 2mal täglich nach der*  
*Mahlzeit je 5 Tropfen.*

(Man steigt jeden zweiten oder dritten Tag um 1 Tropfen pr. dos., bis zum Auftreten von Intoxications-Erscheinungen,

dann ebenso langsames Abfallen der Dosis.)

Zugleich subcutan:

Rp. 1463.

*Sol. arsenic. Fowler. 10·0.*  
*S. Täglich an 2 oder 3*  
*verschiedenen Stellen*  
*je 1 Theilstrich einer*  
*Pravaz'schen Spritze*  
*zu injiciren.*

Gegen nach den Injectionen auftretende neuralgische Anfälle feuchtwarme Umschläge; bei Schlaflosigkeit und nervöser Aufregung am Abend einige Gläser Bier oder:

Rp. 1464.

*Kal. bromat. 10·0.*

*Div. in dos. aequ. No. 5.*

*D. S. Am Abend 1 Pulv. in Wasser zu nehmen.*

**Corpus alienum in tractu respiratorio. Fremdkörper in den Luftwegen.** Sitzt der Fremdkörper oberhalb der Stimmritze, so suche man ihn mittelst Kornzange, eines gebogenen Drahtes, gekrümmter Polypenzange etc. zu entfernen; wenn dies nicht gelingt, Tracheotomie. Ist der Körper in der Trachea oder in einem Bronchus, Aufstellen des Kranken auf den Kopf, Verabreichung eines Brechmittels; wenn dies nicht sehr rasch zum Ziele führt, Tracheotomie, worauf der Fremdkörper gewöhnlich beim Husten oder auf ein Brechmittel hin ausgestossen wird oder auch von der Wunde aus mit Münzenfänger oder Kugelzange entfernt werden kann.

**Corpus alienum in oesophago. Fremdkörper in der Speiseröhre.** Weiche Körper, die im Halstheil stecken, können durch Anpressen gegen die Wirbelsäule

oder Drücken und Kneten von Aussen verschluckbar gemacht werden; wenn nicht, so sucht man sie mittelst gekrümmter Korn- oder Polypenzange, amerikanischer Schlundzange oder Gräfe'schen Münzenfängers zu extrahiren.

Tiefer sitzende weiche Körper werden mittelst Schlundstössers in den Magen hinabgestossen. Harte, namentlich aber spitze Körper müssen stets extrahirt werden, wozu man sich verschiedener Mittel (Münzenfänger, Schlundzange, zusammengedrehter Wachstock etc.) bedient; gelingt dies nicht, Oesophagotomie oder unter Umständen selbst Gastrotomie.

### **Fractura vertebrae. Bruch eines Wirbelknochens.**

Wenn der Kranke noch transportirt werden muss, derselbe auf eine feste Bahre zu legen. Um ihn ins Bett zu bringen, mindestens 6 Personen nothwendig, 2 einander gegenüberstehende greifen unter die Schultern des Patienten und reichen sich dort die Hände, 2 andere ebenso unter dem Becken und 2 unter den Beinen und heben so den Kranken langsam ins Bett; bei Bruch der Halswirbelsäule muss noch ein Gehilfe den Nacken und Kopf fixiren. Wenn der Patient bereits im Bett liegt, Reposition der Fragmente mit Vorsicht durch Zug und Gegenzug (an Kinn und Schultern, oder Achseln und Becken) zu versuchen; Fixirung der Bruchgegend durch Gypscravatte oder Gypspanzer oder, wo dies nicht ausführbar, locker gefüllte Sandsäcke unter die Bruchgegend in passender Weise zu legen. Decubitus nach Möglichkeit zu verhüten.

### **Caries vertebrarum. Beinfrass der Wirbelsäule.**

Diätetisches Regime; gute, frische Luft, kräftige Fleischnahrung, Leberthran, Eisenpräparate, z. B.:

Rp. 1465.

*Pill. Bland. No. 50.*

*D. S. 2mal tägl. je 2—4*

*Pillen nach der Mahlzeit.*

Rp. 1466.

*Tinct. Ferr. pomat.,*

*Tinct. Rhei Darelli āā*  
*15·0.*

*D. S. 3mal tägl. 5—15*  
*Tropfen.*

Rp. 1467.

*Extr. Malat. Ferr.,*

*Extr. Quass.,*

*Extr. Chin reg. āā 3·0.*

*M. f. pill. No. 60.*

*D. S. 3mal tägl. 1 Pille, allmählich steigend*  
*bis zu 9 Pillen pro die.*

In Bezug auf locale Behandlung bei Caries der Halswirbelsäule Cravatte von Filz oder Guttapercha, oder die Glisson'sche Schwinge; bei Affection der Brustwirbelsäule Anlegung von abnehmbaren Filz- oder Gypsmiedern, die nur während des Herumgehens zu tragen sind; endlich bei Localisation an den Lendenwirbeln permanente Extension nach Volkmann. In den meisten Fällen am vortheilhaftesten das Gypsbett nach Lorenz.

**Arthritis difformans der Wirbelsäule.** Indifferente Thermen, Sool- und Schwefelbäder.

Rp. 1468.

*Kal. iodat. 10·0.*

*Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. Früh und Abends 1 Pulver.*

Ferner auch Galvanisation mit aufsteigenden Strömen zu versuchen.

**Habituelle Skoliose.** Wenn dieselbe noch redressirbar, orthopädische Behandlung: gymnastische Uebungen, forcirtes Redressement, so dass die Wirbelsäule die ent-

gegengesetzte Krümmung zeigt, und Anlegung eines Gypsmieders in der übercorrigirten Stellung. Bei bereits fixer Skoliose Stützmieler, um Verschlechterung zu verhüten

**Fractura costae. Rippenbruch.** Bei Dislocation Reposition nur, wenn sie durch die Beschwerden geboten erscheint, nothwendig, im Nothfall directe Reposition mit dem durch eine gemachte Incision eingeführten Finger. Im Uebrigen die Bruchgegend durch breite, den Thorax umschlingende Heftpflasterstreifen zu fixiren; Bettruhe; ein Abfuhrmittel (Bitterwasser, Ricinus-Oel, Aqu. laxativa Viennensis); wenn starker Hustenreiz besteht, ein Narcoticum, etwa:

Rp. 1469.

*Extr. Opii aquos. 0·15,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 6.*

*D. S. 3–6 Pulver täglich.*

**Penetrirende Wunden des Thorax.** Bei starker Blutung zunächst Stillung derselben; bei Blutung aus der Arteria mammaria interna Unterbindung derselben in der Wunde oder in der Continuität, bei Blutung von Inter-costalarterien Compression; bei Blutung aus der angeschnittenen Lunge Vernähung der Wunde. Ein Lungen-vorfall, wenn frisch und beweglich, zu reponiren; wenn eingeklemmt oder sogar schon gangränös, nicht zu reponiren, sondern nur mit antiseptischem Verband zu bedecken. Wenn nach der Vernähung einer Thoraxwunde starke Oppression durch Pneumothorax auftritt, Punction des Thorax oder Lüftung der Wunde an einer kleinen Stelle und darauf wieder Verschluss derselben. Wenn gefahrdrohende Dyspnoe durch Lungenhyperämie oder Lungenödem eintritt, ein Aderlass. Wenn Verdacht auf eine Verletzung des Herzens besteht (Sondirung zur Feststellung dieser Diagnose darf nicht vorgenommen

werden!), Verschluss der äusseren Wunde durch Naht, strengste Ruhe, der Kranke in einem kühlen Local zu isoliren, jede körperliche oder geistige Aufregung desselben zu vermeiden, am ersten Tage absolute Nahrungsenthaltung, zum Durstlöschen Eispillen, in den nächsten Tagen nur kalte Flüssigkeiten zu geben. Ein ausgiebiger Aderlass, der auch mehrmals wiederholt werden kann, falls der Puls selten und hart wird; auf die Herzgegend ein Eisbeutel.

**Abscessus frigidus thoracis. Kalter Abscess am Thorax.** Wenn der Abscess von der Wirbelsäule oder dem Sternum ausgeht, gewöhnlich Punction mit einem mittelstarken Troiscart, und durch die Canüle desselben Injection von:

Rp. 1470.

*Jodoform 15·0,*

*Glycerin. (od. Ol. Ricini) 100·0.*

*S. Bis zu mässiger Füllung der Abscesshöhle zu injiciren.*

Bei Abscessen in Folge von Rippencaries dasselbe Verfahren, oder in geeigneten Fällen auch Incision und Excochleation, eventuell mit Resection der Rippe.

**Mastitis. Brustdrüsen-Entzündung.** Wenn nur entzündliche Anschoppung besteht (starke Spannung bei nicht gerötheter Haut), feuchtwarme Umschläge (ein 2—4fach zusammengelegtes Leinwandstück in laues Wasser getaucht und mässig ausgewunden, darüber ein wasserdichter Stoff); das Säugen kann, wenn es nicht sehr schmerzhaft ist, fortgesetzt werden; wenn es grosse Schmerzen macht, auszusetzen, dabei der Kranken Ruhe zu empfehlen, Bewegungen des Armes der kranken Seite zu meiden, Diät nur aus Suppe, Mandelmilch und Aehnlichem bestehend; wenn das Säugen ausgesetzt wurde, ein *Drasticum*, etwa:

Rp. 1471.

*Inf. folior. Sennae e 8·0—15·0 : 150·0,*

*Syr. rub. Idaei 30·0.*

*S. Am Morgen die Hälfte oder das Ganze zu nehmen.*

Wenn evidente Entzündung eingetreten, Behandlung je nach dem Sitz. Subcutane Abscesse einfach zu incidiren; besonderes diätetisches Verhalten dabei unnöthig. Bei Entzündung des Drüsenparenchyms der Arm der kranken Seite mittelst Heftpflasters oder Binde am Stamm zu fixiren, das Kind an der kranken Brust nicht anzulegen, die Brust durch ein dreieckiges Tuch (*Suspensorium mammae*) oder durch Heftpflasterstreifen zu heben. Feuchtwarme Umschläge auf die Mamma. Bettruhe, strenge Diät, bei Fieber kühlendes Getränk, allenfalls ein gelindes Abführmittel, etwa:

Rp. 1472.

*Magnes ust. 5·0,*

*Aqu. dest. 50·0,*

*Syr. simpl. 20·0.*

*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Wenn Fluctuation vorhanden, ausgiebige Spaltung, wobei Incision stets in radiärer Richtung (gegen die Brustwarze hin) auszuführen, eventuell Anlegung einer Gegenöffnung; Drainage, antiseptischer Verband. Bei retromammären Abscessen das Sugen nur, wenn es schmerzhaft ist, zu unterbrechen; die Brustdrüse nicht durch einen Verband zu heben, sondern höchstens ganz leicht zu unterstützen; Incision an der Stelle der deutlichsten Fluctuation, gewöhnlich also oben.

Zurückbleibende Fisteln in Narkose zu erweitern und auszukratzen und Ausstopfung mit Jodoformgaze.

Bei Mastitis chronica ein *Suspensorium mammae*. *Priessnitz'sche Umschläge* oder etwa:



Rp. 1473.

*Jod. pur. 0·1,  
Kal. iodat. 1·0,  
Vaselin. 30·0.*

*S Salbe; jeden Morgen aufzulegen, Abends  
wegzuwischen.*

**Fractura claviculae. Schlüsselbeinbruch.** Sayre-  
scher Heftpflasterverband: 1. Streifen von der Mitte des  
Oberarms innen, spiralig, nach hinten oben und an die  
äussere Fläche des Oberarms, dann über den Rücken zur  
gesunden Achsel und unter derselben bis zur Gegend der  
Papille; 2. Streifen von der gesunden Schulter schief  
über die Brust unterhalb des gebeugten Ellbogens, dann  
schief über den Rücken nach der gesunden Schulter zu-  
rück; 3. Streifen von der kranken Schulter nach vorne  
um das Handgelenk und am Rücken wieder zurück. Bei  
Kindern statt dieses Verbandes eine Mitella mit der Breit-  
seite des Tuchs am Ellenbogen oder eine enganliegende  
Jacke, deren Aermel man, nachdem der Arm in die pas-  
sende Stellung gebracht ist, an den Brusttheil annäht.

**Luxatio claviculae. Verrenkung des Schlüsselbeins.**

Bei Verrenkung im Sternoclaviculargelenk nach  
vorne Reposition durch Druck und Fixirung durch eine  
Guttapercha-Hohlschiene, die mit Heftpflaster befestigt  
wird, darüber noch der Arm mit der Hand auf der ge-  
sunden Schulter durch einen Contentivverband zu fixiren.

Bei Luxatio retrosternalis die Schulter nach  
ausssen und rückwärts zu ziehen, während der Stamm  
fixirt wird, dann ähnlicher Verband wie bei Luxation  
nach vorne. Bei Luxation im Akromialgelenk nach  
oben Einrichtung durch Heben der Schulter und Nieder-  
drücken des Schlüsselbeins, Fixirung durch Heftpflaster-  
streifen.

**Luxatio humeri. Verrenkung des Oberarms.** Ein-  
fachstes Repositionsverfahren die Tractionsmethode.



Der Kranke sitzt auf einem Sessel, den gesunden Arm über die Lehne gelegt. Ein Gehilfe zieht an einem auf die kranke Schulter gelegten Tuch nach abwärts; ein zweiter an einem in die Achselhöhle möglichst hoch hinauf angelegten Tuch in horizontaler Richtung; ein dritter kniet an der gesunden Seite des Patienten und kreuzt seine Hände auf der kranken Schulter. Dies Alles zur Fixirung der Scapula. Ein Gehilfe zieht nun an einer um den Oberarm gleich oberhalb des Ellbogens gelegten Schlinge in horizontaler Richtung und etwas nach oben, während der Operateur den Kopf des Humerus umfaßt und in die Pfanne hineindrückt. In der Narkose ist dieses Verfahren noch leichter. Nach der Einrichtung Fixirung des Arms durch einen den Vorderarm an der vorderen Thoraxfläche befestigenden Organtinverband. Bei frischen Luxationen auch die Rotationsmethode: rechtwinkelige Beugung im Ellenbogengelenk, Rotation nach aussen, bis der Vorderarm in der Frontalebene steht, hierauf Rotation nach einwärts, bis der Vorderarm wieder dem Stamme anliegt.

Bei veralteter Luxation Einrichtungsversuche in der Narkose; der Kranke liegt auf einem niederen Tisch, die Schulter, die über den Rand desselben hinausragt, wird in der oben angegebenen Weise fixirt und der Arm mit allmählich steigender Kraft extendirt, zunächst in der pathognomonischen Stellung, dann in rechtwinkelig abducirter oder selbst in hyperabducirter Stellung, während der Oberarmkopf controlirt wird; sobald sich derselbe bewegt, wird medial von demselben von oben her ein Knebel in die Achselhöhe eingelegt, an demselben fest angezogen und unter allmählichem Nachlassen der Extension der Arm in die pathognomonische Stellung zurückgebracht. Eventuell auch Benützung des Flaschenzuges zu den Extensionen.

**Wunden der Schultergegend und Achselhöhle.** Bei starken Blutungen die Wundränder aneinanderzuziehen

oder (bei Stichwunden) die Wunde selbst zu erweitern, um die spritzenden Gefäße zu fassen und zu unterbinden. Bei Nachblutungen unter Umständen selbst Unterbindung der Subclavia oder Axillaris in der Continuität. Wenn das Gelenk eröffnet ist, dasselbe ausgiebig zu desinficiren, wenn nöthig unter Erweiterung der Wunde; wenn möglich, Vernähung bis auf die für Drainröhren offen zu haltenden Stellen; fixer Verband zur Immobilisirung des Gelenks.

**Fractura humeri. Oberarmbruch.** Bei Fractur des oberen Endes Middeldorpf'sches Dreieck, aus drei in entsprechenden Winkeln zusammengenagelten und sehr stark gepolsterten Bretchen improvisirt; liegt der Bruch in der Mitte des Oberarms, Pappschiennenverband; bei Fractur des unteren Endes Gypsverband in rechtwinkelig gebeugter Stellung des Ellbogengelenks, nach 8—14 Tagen abzunehmen und zu erneuern. Bei complicirter Fractur Narkose, die Extremität genau zu reinigen, zu desinficiren; dann Erweiterung der Wunde mit dem Messer, bis man die Fracturstelle genau mit dem Finger untersuchen kann; die Wunde bis in alle Höhlen und Buchten sorgfältig mit Sublimat zu desinficiren, Unterbindung blutender Gefäße, Entfernung von Coagulis und Fremdkörpern, sowie von losen Knochensplintern; scharfe Knochenzacken abzukneipen, der ganze Knochen in richtige Lage zu bringen, zerquetschte Weichtheile mit der Scheere abzutragen, nochmalige Desinfection der Wunde, Drainage, Naht, Einrichtung der Fractur durch Extension und Contraextension, antiseptischer Verband, darüber Schienenverband.

**Luxatio cubiti. Verrenkung des Ellbogengelenks.**

Bei Luxation beider Vorderarmknochen nach hinten Einrichtung entweder nach Roser: Hyperextension des Vorderarms, worauf ein Gehilfe das Olekranon nach abwärts drückt, dann rasche Beugung des

Gelenks; oder nach Dumreicher: Während ein Gehilfe an einem unter der Achselhöhle durchgeführten Handtuch nach oben zieht, ein zweiter den Oberarm umgreifend, ihn fixirt, zieht der Operateur an einer gleich unterhalb des rechtwinkelig gebeugten Ellbogengelenks angelegten Schlinge (der Patient liegt dabei) an und fasst mit der anderen Hand den Arm oberhalb des Handgelenks; so wie sich das Olekranon etwas bewegt, Streckung des Gelenks mit der oberhalb des Handgelenks angelegten Hand unter mässigem Anziehen in der Axe des Vorderarms.

Bei completer Luxation nach vorne einfache Extension und Zurückdrücken der Gelenkskörper; bei incompleter Luxation Beugung. Bei Luxation nach aussen Extension und Coaptation. Bei Luxation des Radius allein nach vorne Extension und Supination des Vorderarmes, bei Luxation desselben nach hinten Extension, Supination und directer Druck auf das Radiusköpfchen.

Bei veralteten, nicht mehr reponiblen Luxationen des Ellbogengelenks gewaltsame Beugung in der Narkose, dann passive und active Bewegungen. Bei der Luxation nach hinten ist es jedoch meist nöthig, die sich spannenden Ligamente und selbst die Tricepssehne subcutan zu durchtrennen, und wenn dies nicht zum Ziel führt, Arthrotomie oder selbst Resection des unteren Humerusendes auszuführen; bei alten Individuen besser nur die forcirte Beugung und Anstrebung der Anchylose in der rechtwinkelig gebeugten Stellung.

**Caries cubiti. Tuberculose des Ellbogengelenks**  
Entsprechende roborirende Allgemeinbehandlung (s. „Caries vertebrar.“ S. 386 f.). Bei geringer Ausdehnung der Erkrankung besonders bei Kindern Ignipunctur, in hochgradigeren Fällen Excochleation der erkrankten Theile; bei vorgeschrittener Caries Resection oder Am-

putation. Kalte Abscesse in der Umgegend des Ellbogengelenks zu incidiren und mit scharfem Löffel auszukratzen, oder Exstirpation der Abcessmembran.

**Fractura antibrachii. Bruch der Vorderarmknochen.** Bei Fractur des Olekranon zunächst gegen die Schwellung Compression mittelst von den Fingern bis zur Schulter aufsteigenden Bindentouren bei nahezu gestreckter Stellung des Gelenks. Häufiger Verbandwechsel. Nach Abnahme der Schwellung Verband in vollständiger Streckstellung des Gelenks; nach einiger Zeit kleine, allmählich ausgiebigere Beugebewegungen, wobei das obere Fragment mit den Fingern stark herunterzudrücken. Bei den übrigen Formen der Vorderarmknochenbrüche Anlegung der Dumreicher'schen Flügelschiene; später Blane-Banden-Verband.

**Luxatio manus et digitorum.** Bei Luxationen des Handgelenks gewöhnlich einfache Extension und Coaptation durch Druck von Erfolg. Dorsale Luxation des Daumens im Metacarpophalangealgelenk, wenn incomplet, durch Anziehen am Daumen und langsames Herumführen um das Metacarpusköpfchen einzurichten; bei completer Luxation mit den am Dorsum des Metacarpus angelegten Daumenspitzen die Phalange vorzuschieben, dann in Beugestellung zu bringen; eine complexe Luxation ist erst durch rechtwinkeliges Aufstellen der Phalange in die complete zu verwandeln.

**Distorsio manus. Verstauchung des Handgelenks.** Im Beginn Ruhigstellung der Hand auf einer Schiene, Application von Kälte; bei Ruptur der Gelenksbänder die Ruhe bis zur Verheilung des Risses einzuhalten; in leichteren Fällen dagegen baldiger Uebergang zur Massage: Leichte Friction der schmerzhaften Stellen mit den Fingerspitzen von unten nach oben; allmählich kann



man den Druck verstärken; nach der Massage leichte passive Bewegungen zu versuchen, aber nur, wenn sie schmerzlos sind, fortzusetzen.

**Wunden der Hand.** Blutungen aus dem oberflächlichen Hohlhandbogen durch Unterbindung in der Wunde zu stillen; bei Blutung aus dem tiefen Hohlhandbogen bei frischer Verletzung ebenfalls das blutende Gefäß nach Esmarch'scher Einwicklung der Extremität in der Wunde aufzusuchen und zu ligiren; wenn aber die Wunde bereits eitert, Ligatur der Radialis und Ulnaris ober dem Handgelenk; tritt trotzdem eine Nachblutung auf, unter allen Umständen Unterbindung in der Wunde.

Zur provisorischen Blutstillung, wenn die Ligatur in Folge äusserer Umstände nicht gleich gemacht werden kann, Compression durch Auflegen eines runden glatten, in ein Tuch gewickelten Steines (das Tuch fest um die Hand zu knüpfen oder durch Fixiren des Hand- und Ellbogengelenks in forcirter Beugung (nach Adelman)).

Bei querer Durchtrennung von Sehnen oder Muskeln Vernähen derselben, der Verband derart anzulegen, dass der verletzte Muskel möglichst verkürzt ist, und in dieser Lage die Extremität durch Schienenverband zu fixiren; bei Verletzung von Streckersehnen also Verband in maximaler Streckung, von Beugersehnen in maximaler Beugung; die Finger am besten durch einen Handschuh, dessen Fingerenden an die Volarfläche angenäht werden, oder durch passend angelegte Heftpflasterstreifen in Beugung zu erhalten.

**Peritonitis Bauchfellentzündung.** In acuten Fällen strenge Diät, Opium innerlich; bei starken Schmerzen Application von Kälte auf das Abdomen. Gegen hochgradigen Meteorismus Einführung eines langen Drain- oder Schlundrohrs in den Mastdarm; wenn dies nicht

gentügend wirkt, Aufträufeln von Aether, oder innerlich zu versuchen:

Rp. 1474.

*Calomel. laevigat. 1·0,*

*Sacch. alb. 2·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 6.*

*D. S. 3 Pulver im Tag.*

Auch Faradisation des Darms öfters von Erfolg; im äussersten Fall Punction des Darms mittelst Capillar-Troiscarts, eventuell an mehreren Stellen. Bei citrigem Exsudat schichtenweise Incision, Eröffnung und Drainage des Peritonealraums, wiederholte Ausspülung desselben mit warmer 1<sup>0</sup>/<sub>00</sub>iger Salicyl- oder Thymollösung.

**Occlusio intestini. Ileus. Darmverschluss.** In den meisten Fällen am besten Opium in dreisten Dosen; also:

Rp. 1475.

*Opii pur. 0·3,*

*Sacch. alb. 2·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 6.*

*D. S. 2stündl. 1 Pulver.*

Wenn jedoch die Er-

scheinungen des Ileus durch Koprostase bedingt sind, Klysmen zu geben.

Rp. 1476.

*Inf. fol. Nicotian.*

*e 8·0—15·0:150·0.*

*S. Auf 2 Klystiere.*

Genaue Untersuchung des Rectums nie zu verabsäumen; wenn daselbst das Hinderniss besteht, Beseitigung desselben, wenn möglich sofort, wenn nicht, nach vorheriger Anlegung eines Anus praeternaturalis. Wenn im Rectum nichts Abnormes zu finden, Application von Massenklystieren (Hegar'sche Eingiessungen). Wenn Invagination besteht und das Intussusceptum so weit vorgertückt ist, dass die Spitze desselben im Rectum sicht- oder tastbar ist, Reposition mittelst eines an seinem Ende einen Badeschwamm tragenden Fischbeinstabes.

Wenn alle diese Maassregeln nicht zum Ziele führen, Laparotomie, resp. Laparoenterotomie.

**Hernia.** Bei freier, reponibler Hernie ein passendes Bruchband tragen zu lassen; am besten die französischen mit fester Pelotte. Wird kein Bruchband vertragen, sowie bei angewachsenen Brüchen Radicaloperation.

Bei eingeklemmten Hernien zunächst Taxis zu versuchen, wenn diese nicht gelingt, baldigst Herniotomie.

**Wunden des Abdomens.** Wenn nur das Peritoneum und kein Eingeweide verletzt, Vernähung aller Schichten der Wunde mit Knopfnäht; die tiefen Nähte mit Silberdraht, die oberflächlichen mit Seide auszuführen. Ist Netz vorgefallen, so wird es, wenn der Fall frisch ist, mit 1<sup>o</sup>/<sub>100</sub>iger Salicylsäure oder 1<sup>o</sup>/<sub>10</sub>iger Carbollösung abgewaschen und reponirt oder mit der Wunde vernäht, wenn es aber bereits livid, kalt oder gar gangränös ist, ist es draussen zu lassen und nur mit antiseptischem Verband zu bedecken. Vorgefallener Darm ist bei frischer Wunde stets selbst unter Erweiterung der Wunde nach gründlicher Reinigung zu reponiren; wenn er jedoch bereits vertrocknet ist, die Wunde nur in der Haut zu nähen und der Darm durch eine durch das Mesenterium gezogene und mit der Bauchhaut verklebte Fadenschlinge zu fixiren. Bei Gangran des vorgefallenen Darms Resection und Vernähung der durchschnittenen Schlingen mit einander oder Anlegung eines Anus praeternaturalis.

Wunden des Magens zu vernähen, der meist vorgefallene Magen zu reponiren. Darmwunden ebenfalls wenn möglich zu vernähen; bei grösseren Wunden, mehrfachen Durchbohrungen, Substanzverlusten ist Resection auszuführen. Bei Wunden der Leber die Blutung durch Compression mittelst Schwammes zu stillen, die Wunde zu nähen; vorgefallene Lebertheile nur, wenn sie unverändert und leicht reponirbar sind, zu reponiren.

Wunden der Milz, wenn sie rein sind und nicht durch das ganze Gewebe dringen, zu vernähen, vorgefallene Milz, wenn sie nicht verändert ist, zu reponiren;



dagegen, wenn die grossen Gefässe der Milz verletzt sind und die Blutung anders nicht gestillt werden kann, oder wenn die Milz vorgefallen und pathologisch verändert ist, dieselbe zu entfernen.

**Corpus alienum in intestinis. Fremdkörper im Darmcanal.** Ein Brechmittel nur, wenn der Körper frisch geschluckt und so stark quellbar wäre, dass Occlusion des Darms zu befürchten; in allen anderen Fällen nur Speisen, die viel Stuhl machen, zu geben, wie Hülsenfrüchte, Kraut, schwarzes Brot etc.; am besten eine Kartoffelkur, bei der man den Patienten durch einige Tage fast ausschliesslich aus Kartoffeln bereitete Speisen essen und möglichst wenig Flüssigkeiten zu sich nehmen lässt (Salzer iun.) Bei spitzen Körpern zugleich Bettruhe einhalten zu lassen. Ist der Körper schon längere Zeit im Darmcanal, so ist bei Zeichen von Entzündung die Eiterung durch feuchtwarme Umschläge zu befördern, und wenn Fluctuation nachzuweisen, Incision vorzunehmen; sonst expectatives Verhalten, bis etwa Erscheinungen von Darmocclusion oder chronische, aber unerträgliche Beschwerden die operative Entfernung des Fremdkörpers indiciren.

Ist ein Fremdkörper im Rectum, so ist derselbe durch Klysme., mit dem Finger oder je nach seiner Beschaffenheit mit verschiedenen Hilfsmitteln, eventuell selbst in Narkose und unter Einführung der ganzen Hand mit oder ohne vorherige Sphincterotomie zu entfernen.

**Prolapsus recti. Mastdarmvorfall.** In manchen Fällen causale Behandlung durch Beseitigung von bestehendem Darmkatarrh, Blasenstein, Harnröhrenverengung möglich; nach jedem Stuhl ist der Mastdarm zu reponiren, für Regelmässigkeit in der Defäcation zu sorgen. Application von Kälte, von astringirenden Umschlägen von Vortheil. Wenn der Prolaps durch Erschlaffung der Gewebe entstanden, Bestreichung der Schleimhaut mit Lapis oder Ferrum candens, ferner auch zu versuchen.

Rp. 1479.

*Strychin. nitric. 0·05,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*S. Täglich  $\frac{1}{2}$  — 1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

Das Vorfallen beim Stehen und Gehen durch einen Verband zu hindern. Wenn der Zustand durch die Blutungen oder Schmerzen gefährlich wird, operative Behandlung: Cauterisiren der vorfallenden Wülste mit dem weissglühenden Paquelin bis zur vollkommenen Verkohlung der Theile; in anderen Fällen das vorgefallene Stück zu excidiren oder mittelst elastischer Ligatur abzubinden.

**Strictura recti. Mastdarmverengerung.** Stumpfe Dilatation mit dem Finger, wo dies nicht möglich, allmähliche Dilatation durch Einführung von immer dickeren Darmsaiten, Bougies etc., die man Anfangs nur kurz, allmählich länger liegen lässt, eventuell Colotomie.

**Proctitis catarrhalis. Mastdarmkatarrh.** Strenge Diät, Bettruhe bei Seitenlage; Klysmen mit schleimigen Abkochungen unter Zusatz von Opium, später mit desinficirenden und astringirenden Mitteln. Wenn der Katarrh durch Vorhandensein von Springwürmern bedingt ist, Einspritzungen kalter Sublimatlösung ( $1\frac{1}{100}$ ) oder Gebrauch von:

Rp. 1480.

*Ungu. ciner. 1·0,*

*But. Cacao 10·0.*

*M. f. suppos. No. 5.*

*S. Täglich 2 Stuhlzäpfchen zu gebrauchen.*

Bei Tripperinfection Einspritzung von Zinc. sulfuric. etc.

**Noduli haemorrhoidales. Hämorrhoiden.** Regelung der Diät, Vermeidung von scharfen Gewürzen, starken Alcoholicis, sowie Regelung des Stuhlgangs. Wenn

äußere Knoten entzündet sind, Ruhe, mässig kalte Umschläge, bei sehr starken Schmerzen Application von Blutegeln in der Nähe der Knoten. Wenn innere Knoten vorgefallen und eingeklemmt sind, Reposition, eventuell nach vorausgeschickter Morphinum-Injection; wenn jedoch der Knoten bereits stark entzündet ist, nicht zu reponiren, sondern Eisumschläge, Blutegel; bei starkem Tenesmus:

Rp. 1479.

*Extr. Opii aquos. 0·2,*

*But. Cacao q. s. ut f. supp. No. 6.*

*D. S. Früh u. Abends 1 Stück zu verwenden.*

Wenn schon Gangrän vorhanden, warme Umschläge zur Beförderung der Abstossung.

Behufs radicaler Entfernung der Knoten dieselben mittelst Langenbeck'scher Blattzange zu fassen und mit dem Paquelin abzubrennen; oder Abbindung mit elastischer Ligatur.

**Carcinoma recti. Mastdarm-Krebs.** Operative Entfernung, Resection des Rectums, Annäherung des Stumpfes an die Analgegend; bei weit hinaufreichendem Carcinom der Tumor durch Resection des Kreuzbeins leichter freizulegen (Operation nach Kraske, modificirt von Hochenegg).

**Epididymitis. Nebenhodenentzündung.** Bettruhe, das Scrotum durch ein zwischen die Beine gestecktes weiches kleines Kissen zu unterstützen. Kalte Umschläge; dem Wasser zuzusetzen:

Rp. 1480.

*Aqu. plumbic. 100·0,*

*Tinct. Opii simpl. 50·0.*

*S. Mit der doppelten Menge Wassers verdünnt,  
zu Umschlägen.*

Bei grösserem Exsudat auch Punction oder selbst Incision. Nach Aufhören des Fiebers und Zurückgehen der Schwellung kann Patient aufstehen, muss aber noch durch einige Wochen ein gutes Suspensorium tragen.

**Hydrocele. Wasserbruch.** Palliativ wirkt Punction: Mit der linken Hand wird das Scrotum umfasst, mit der rechten ein Troiscart an der vorderen Fläche des Scrotums eingestochen, wobei Venen zu vermeiden sind und durch die Canüle so viel entleert, als bei mässigem Drucke ausfliesst. Auf die Wunde Jodoformgaze und Heftpflaster.

Behufs radicaler Heilung Radicalincision in genügender Ausdehnung, die Scheidenhaut mit der Cutis zu vernähen, die Höhle mit Jodoformgaze zu tamponiren oder mit Jodtinctur auszuspülen; darüber antiseptischer Verband. Oder Punction mit darauffolgender Injection von Jodtinctur (nicht federnder Troiscart<sup>1</sup>), die man nach 5 Minuten wieder abfliessen lässt. Rathsam ist Anästhesirung durch Injection von 1<sup>o</sup>/<sub>10</sub>iger Cocainlösung in die Scheidenhaut vor Einspritzung der Jodtinctur.

**Varicocele. Krampfaderbruch.** Sorge für regelmässigen Stuhlgang, grösste Enthaltbarkeit in sexueller Beziehung. Das Scrotum häufig mit kaltem Wasser oder verdünntem Alkohol zu waschen; Tragen eines Suspensoriums. Eventuell operative Heilung durch Ligatur der Venen. (Nur unter absoluter Garantie für Asepsis vorzunehmen!)

**Cystitis. Blasenkatarrh.** In acuten Fällen Bettruhe, reizlose Kost oder bei Fieber strenge Diät. Viel gebraucht wird.

Rp. 1481.

*Decoct. semin. Lin. e 20·0: 300·0,*

*Tinct. Opii simpl. gtts. 10,*

*Syr. Diacodii 20·0.*

*S. Esslöffelweise.*

Besser wirkt eine subcutane Morphin-Injection oder ein kleines Klystier mit 20 Tropfen Opiumtinctur. Wenn die Blase gefüllt ist und in Folge der Reizung des Sphincters nicht entleert werden kann, Katheterismus mit englischem oder Metallkatheter. Warme Umschläge auf das Perineum, warme Sitzbäder.

Wenn die Cystitis durch Canthariden erzeugt wurde:

Rp. 1482.

*Emulsion. oleos. 200·0,*  
*Camphor. ras 1·0,*  
*Mucil. gumm. Arab. 10·0,*  
*Tinct. Opii simpl. gtts. 10.*  
*M f emulsio.*  
*S.  $\frac{1}{2}$ stündl. 1 Esslöffel.*

Bei chronischem Blasenkatarrh ursächliche Lithiasis oder Stricture der Harnröhre entsprechend zu behandeln, Vermeidung aufregender Getränke, namentlich von Kaffee, Thee, Bier (Rothwein in geringen Mengen zu gestatten); reichlicher Milchgenuss, Vermeidung von Erkältungen; warme Bäder. Gebrauch der Wässer von Ems, Wildungen, Vichy, Preblau etc. In leichten Fällen innerliche Mittel, wie:

Rp. 1483.

*Inf. fol. Uvae urs.*  
*e 10·0 : 200·0,*  
*Syr. capillor. Veneris*  
*20·0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Esslöffel.*

Rp. 1484.

*Acid. tannic. 1·5,*  
*Sacch. alb. 3·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 6.*  
*D. S. Täglich 4 Pulver.*

Ferner Blasenausspülungen zu versuchen mit:

Rp. 1485.

*Argent. nitric. 1·0—4·0,*  
*Aqu. dest. 1000·0.*  
*S. Zur Ausspülung.*

Am besten hiez zu ein Nélaton'scher Katheter zu verwenden, an dem eine T-förmige Canüle angebracht ist,

der eine Schenkel führt zu einem Irrigator, in dem die Ausspülungsflüssigkeit enthalten, durch den anderen fliesst dieselbe ab.

Wenn Blasenparese eingetreten, regelmässige Entleerung des Urins durch den Katheter.

**Haematuria vesicalis. Blasenblutung.** Ruhe, Eisbeutel oder Leiter'scher Kühlapparat ober der Symphyse, kalte Klysmen, selbst kalte Sitzbäder, innerlich:

Rp. 1486.

*Extr. Secal. cornut. 6·0,*

*Aqu. Cinnamom. 120·0,*

*Syr. Cinnamom. 20·0.*

*S. Stündlich 1 Esslöffel.*

Bei länger andauernden Blutungen Einspritzungen folgender Lösung in die Blase:

Rp. 1487.

*Argent. nitric. 1·0 — 2·0 = 4·0,*

*Aqu. dest. 2000·0.*

*S. Zur Injection.*

**Prostatitis. Entzündung der Vorsteherdrüse.** Bei acuter Entzündung Ruhe, strenge Diät, Sorge für ausgiebige und flüssige Stuhlentleerung; warme Sitzbäder, Kataplasmen auf die Blasengegend; bei grossen Schmerzen:

Rp. 1488.

*Morph. mur. 0·05,*

*But. Cacao q. s. ut f. suppos. No 6.*

*D. S. Früh und Abends 1 Stück zu gebrauchen.*

Bei Harnverhaltung Katheterisirung, nothigenfalls in Narkose. Sowie sich Eiterung zeigt, Eröffnung des Abscesses.

Bei chronischer Prostatitis, Prostatorrhöe, Berücksichtigung und Beseitigung der Ursache (chronische Gonorrhöe, Stricture), Excesse in Venere zu meiden, Einspritzung



einer 1<sup>0</sup>/<sub>0</sub>igen Lapislösung in den prostatiscben Theil der Harnröhre mittelst der Garreau'schen Sonde à piston, wobei vom Rectum aus ein Druck auf den oberen Theil der Prostata mit dem Finger auszuüben. Statt der Lapislösung auch:

Rp. 1489.

*Jod pur 0·1,*

*Kal. iodat. 0·4,*

*Aqu. dest. 10 0.*

*S. Zur Einspritzung.*

Die nun folgende Reaction wie eine acute Prostatitis zu behandeln. Nach 8 Tagen eventuell die Einspritzung zu wiederholen.

**Hypertrophia prostatae.** Regelmässiges, vom Patienten selbst zu erlernendes Katheterisiren mit elastischem Katheter, der strengstens reingehalten werden muss. Bei acuter Haruretention Katheterismus erst mit elastischen, dann mit englischen und Metallkathetern von verschiedener Dicke zu versuchen; wenn dies Alles erfolglos, Blasenstich.

**Verletzungen der Urethra.** Bei Contusion sofortiges Anlegen eines Verweilkatheters, der mit Heftpflaster am Penis zu befestigen ist; bei Ruptur, Stich- oder Schnittwunde der Urethra Urethrotomia externa bis in den gesunden Theil der Harnröhre und Anlegung eines Verweilkatheters.

**Phimosis. Vorhautverengerung.** Bei geringen Graden genügt es manchmal, namentlich bei Kindern, die Vorhaut öfters über die Glans zurückzuziehen und so den engen Ring zu dehnen. Sonst Operation, und zwar Dorsalincaision: Dorsalwärts von der Glans wird ein Scheerenblatt oder die Hohlsonde und auf dieser ein Spitzbistourri in den Präputialsack bis an den Sulcus coronarius vorgeschoben und das Präputium durchschnitten,



dann das innere Blatt vom Wundwinkel aus noch extra bis zum Wundwinkel des äusseren Blattes durch einen geraden oder zwei divergirende Schnitte zu spalten; Vernähung der beiden Präputialblätter. Bei starker Verlängerung und Hypertrophie des Präputiums besser Circumcision: Schnitt wie bei der Dorsalinsection, dann die Vorhaut vorzuziehen und durch zwei gegen das Frenulum ziehende Schnitte abzutragen, Vernähung der beiden Blätter im ganzen Umkreis.

**Paraphimosis.** Reposition, indem man die Daumenspitzen auf die Eichel, die Zeige- und Mittelfinger hinter den Vorhautwulst legt und so die Eichel durch den Ring durchzupressen sucht, während man den Wulst nach vorne schiebt. Zweckmässig dabei den Penis in kaltes Wasser zu stecken. Wenn die Reposition unmöglich, Debridement, indem man die Haut des Penis nach hinten, den Wulst nach vorne ziehen lässt und den angespannten Ring an einer oder zwei Stellen einschneidet.

**Verletzungen des Penis.** Bei Fractur Einführung eines Verweilkatheters; zur Verkleinerung des Extravasates Einwicklung des Penis mit nassen Binden, bei starkem Extravasat auch Spaltung der darüber befindlichen Haut und Vernähung des Risses im Corpus cavernosum. Bei blosser Quetschung Compression, Kälte, später spirituose Einreibungen. Offene Wunden des Penis, wenn möglich, zu nähen.

**Luxatio femoris.** Verrenkung des Hüftgelenks. Bei Luxation nach hinten: Zug in der pathognomonischen Stellung, dann Rotation nach aussen und Abduction. Wenn jedoch die Luxation zunächst durch Ueberbeugung des Oberschenkels entstand, starke Beugung, dann die Rotation nach aussen und Abduction. Zuletzt die Extremität der anderen parallel zu legen.

Bei Luxation nach vorne und unten der Schenkel rechtwinkelig zu beugen, dann etwas an demselben anzuziehen; hierauf unter Rotation nach innen und Abduction der Schenkel zu strecken.

Bei Luxation nach vorne und oben Abduction, dann Hyperextension, hierauf Einwärtsrollung und Abduction.

Bei veralteten Luxationen Sprengung der neugebildeten Kapsel durch Rotations- und Hebelbewegungen, und wenn der Schenkelkopf gut beweglich geworden, Einrichtung wie bei frischen Luxationen.

**Coxitis. Hüftgelenksentzündung.** Roborirende Allgemeinbehandlung, Aufenthalt in frischer Luft (s. „Caries vertebrarum“ S. 386 f.). Im Beginn gegen die Schmerzen Eisbeutel oft von guter Wirkung. Im Uebrigen Ruhe des entzündeten Gelenks das hauptsächlichste Erforderniss. Zu diesem Behuf in der Narcose Redressement und Anlegung einer Gyps- oder Wasserglashose, die das Becken umgreifend auf der kranken Seite bis oberhalb der Knöchel, auf der gesunden bis zum Knie reicht, und die man derart aufschneidet, dass sie leicht abgenommen und wieder angelegt werden kann. In Fällen, wo in Folge des starken Muskelzugs Schmerzen und Krämpfe entstehen, Extensionsverband nach Crosby: Ein breiter Heftpflasterstreifen läuft von der äusseren Seite des Oberschenkels, den Fuss in einiger Entfernung steigbügelförmig umgreifend, nach der inneren Seite des Oberschenkels, wird jedoch nach abwärts nur bis oberhalb der Knöchel an die Haut angeklebt, und durch circuläre Heftpflaster Touren, sowie darüber noch durch Bidentouren fixirt. Der Steigbügel wird durch ein eingelegtes Querbretchen ausgespreizt, durch dasselbe geht eine Schnur, die über eine am Fussende des Bettes befestigte Rolle läuft und an ihrem unteren Ende einen Sack mit Gewichten trägt; die Extremität ruht dabei im Volkmann'schen Schlitten. Behufs Contra-Extension das untere Bettende durch untergelegte Holzklötze höher zu stellen.

Wenn keine fehlerhafte Stellung besteht, ist auch der Taylor'sche Apparat, während des Herumgehens getragen, zweckmässig.

**Fractura femoris Bruch des Oberschenkels.** Bei Schenkelhalsbruch vor Allem auf Vermeidung von Decubitus und hypostatischer Pneumonie zu achten; deshalb grösste Reinlichkeit zu beachten, namentlich nach der Defaecation gründliche Reinigung, die Haut des Gesässes häufig gut abzuwaschen, die Gegend des Kreuzbeins und der Trochanteren stets genau zu controliren; wenn Decubitus eingetreten, Salben- oder Pflasterverband; als Unterlage weiche Flaumkissen, besser ein Wasserpolster. Von der zweiten Woche an soll Patient öfters zeitweilig halbsitzende Stellung im Bett einnehmen, von der dritten Woche an zeitweise wirklich sitzen, was am leichtesten durch eine getheilte Matratze bewerkstelligt wird, deren unteres Ende man herausnimmt. Zur Behandlung der Fractur selbst, bei sehr alten Leuten, ein Cooper'sches Kissen, sonst Heftpflaster-Extensionsverband.

Bei Fractur des Oberschenkelchaftes, wenn Dislocation besteht, permanente Extension in Streckstellung mittelst Heftpflasterverbandes und Volkmann'schen Schlittens oder noch besser mittelst des Dumreicher'schen Eisenbahnapparates. Bei mangelhafter Callusbildung die Bruchenden aneinander zu reiben; wenn dies nicht nützt, ober und unterhalb der Fracturstelle je ein Keil aus graduirten Compressen mit der Basis gegen die Fractur hin mittelst circularer Heftpflasterstreifen am Oberschenkel zu befestigen, dann die Extremität von den Zehen her bis über die Keile hinauf durch einige Tage fest eingewickelt zu lassen; wenn dann Callusbildung auftritt, Gypsverband. Wenn bereits Pseudarthrose besteht, die zwischen den Bruchenden liegende Bindegewebsmasse in der Narkose zu zerreißen; wenn dies nichts nützt, die Fragmente blosszulegen, in

dieselben Elfenbeinstifte einzubohren, und wenn auch dies nicht genügt, Resection der Bruchenden und Knochen-naht.

**Fractura patellae. Bruch der Kniescheibe.** Massage zur Beseitigung des Extravasates. Bei Querbruch der Patella zweckmässige Lagerung der Extremität, so dass Patient aufrecht sitzt, das Hüftgelenk bis zum rechten Winkel gebeugt, das Kniegelenk gestreckt ist und in dieser Stellung Anlegen eines Heftpflasterverbandes, dessen Touren theils das obere Fragment nach abwärts drücken, theils das untere am Hinabgleiten verhindern. Wenn Patient das andauernde Aufrechtsitzen nicht verträgt, halbsitzendes Liegen bei erhöhter Ferse. Wenn dies nicht hilft, Anwendung der Malgaigne'schen Haken unter strengster Antisepsis. Bei Längs- oder Splitterbrüchen der Patella Contentivverband in extendirter Stellung.

**Fractura cruris. Bruch der Unterschenkelknochen.**

Wenn keine starke Dislocation vorhanden ist oder dieselbe sich leicht und dauernd beheben lässt, Anlegung eines Gypsverbandes, während ein Gehilfe an der Ferse anzieht und an den Zehen behufs Vermeidung von Spitzfussstellung den Fuss hinaufdrückt. Bei bedeutender Schwellung vor Anlegung des Gypsverbandes einige Tage Bettruhe und Lagerung der Extremität auf einer gut gefütterten, bis über das Knie reichenden Schiene, so dass die Ferse höher liegt als das Knie. Bei starker Tendenz zur Dislocation das obere Fragment mittelst eines häufig zu wechselnden Druckverbandes oder, wenn dies nicht genügt, mittelst des Malgaigne'schen Stachels festzuhalten. In manchen Fällen von Fractur beider Knochen Tenotomie der Achillessehne zur Bekämpfung der Dislocation angezeigt. Bei Malleolarfractur mit Umkippen des Fusses die Dupuytren'sche Schiene. Bei Pseudarthrosenbildung an der Tibia dieselbe Behandlung wie am Oberschenkel (s. S. 408.).



**Caries genu. Fungöse Kniegelenksentzündung.** Roborirende Allgemeinbehandlung; im Uebrigen bei Kindern nur expectatives Verhalten; Verhütung von Contracturen durch Gypsverband oder permanente Extension. Bei Erwachsenen meistens Amputation des Oberschenkels angezeigt.

**Caries der Fusswurzel.** Im kindlichen Alter expectatives, resp hygienisches Verfahren. Bei Erwachsenen, wenn nur ein kleinerer Knochen erkrankt ist, Evidement; wenn das Sprunggelenk oder andere grössere Gelenke ergriffen sind, Amputatio cruris.

**Hallux valgus.** In leichten Fällen orthopädische Geradrichtung durch eine Sandale mit einer Stahlfeder am innern Rande, die durch elastischen Zug an die grosse Zehe gedrückt wird; sonst Resection des Metatarsophalangealgelenks.

**Unguis incarnatus. Eingewachsener Nagel.** Unter Cocainanästhesie am kranken Nagelrand ein Scheerenblatt unter den Nagel bis über den Falz hinaufzuschieben, der Nagel sammt dem Falz zu durchschneiden, dann ein Messerschnitt, der die Enden des Scheerenschnittes verbindet, um die geschwürigen Weichtheile des Nagels herumzuführen und der Nagelrand mit einer festen Sperrpincette herauszuziehen. Die Wunde antiseptisch zu verbinden und mit circulären Heftpflasterstreifen zu comprimiren.

**Poliomyelitis anterior acuta. Spinale Kinderlähmung.** Aromatische Einreibungen, Application der kalten Douche auf die Extremität und Priessnitzscher Umschläge auf das Rückenmark. Anwendung schwacher elektrischer Ströme. Später Anlegen von Schienen, um das Entstehen von Contracturen zu verhüten; schliesslich Fixirapparate, resp. Arthrodesen.

**Ulcus cruris. Unterschenkelgeschwür.** Prophylaktisch bei Varices der Unterschenkel andauerndes Tragen einer Flanellbinde oder der Martin'schen Binde (im Bett vor dem Aufstehen anzulegen und beim Schlafengehen abzunehmen, über Nacht ins Wasser zu legen). Bei bereits bestehendem Geschwür Bettruhe, Deckung mit einer Salbe, etwa:

Rp. 1490.

*Argent. nitric. 1·0,*  
*Ungu. simpl. 100·0.*  
*S. Salbe.*

Oder Sublimatverband. In hartnäckigen Fällen parallel den Geschwürsrändern tiefe, bis zur Fascie reichende Einschnitte in die umgebende Haut zu machen, oder Hauttransplantation nach Thiersch. Auch Compression mit spiralförmig um die Extremität gelegten Heftpflasterstreifen von Vortheil.

**Aneurysma der Arteria femoralis.** Compression der zuführenden Arterie mit dem Finger, abwechselnd von mehreren Leuten auszuführen, oder dauernde Compression durch eine an einer Hohlschiene befestigte Pelotte oder eine von der Zimmerdecke oder einem über dem Bett befindlichen Galgen herabhängende Stange. Bei Aneurysma in der regio poplitea Compression, durch Fixiren des Kniegelenks in forcirter Beugung mittelst einer Bandage zu bewirken; oder auch täglich vorzunehmende Einwicklung der Extremität mit der Esmarch'schen elastischen Binde, die man Anfangs 3—5 Minuten, allmählich immer länger liegen lässt. Wenn diese Verfahren alle nicht helfen, entweder Unterbindung der zuführenden Arterie oder die Methode von Antyllus: Unterbindung der Arterie oberhalb und unterhalb des Aneurysma's; hierauf Spaltung des Sackes, Ausräumung der Coagula und Tamponade des Sackes und exacter Compressivverband oder bei kleineren Aneurysmen auch Exstirpation des Sackes und Naht.

---





Aus  
**weiland Professor Dr. Robert Ultzmann's**  
**Poliklinik für Krankheiten der Harnorgane.**

---

**Urethritis catarrhalis Katarrh der Harnröhre.**

Berücksichtigung der Ursache; durch Katheterismus, eingebrachte Medicamente oder unreinen (nicht gonorrhoeischen) Coitus entstandene Urethritis heilt meist in einigen Tagen von selbst. Bei Dyskrasieen (Syphilis, Tuberculose) entsprechende Allgemeinbehandlung. Bei Onanisten strenge Bekämpfung des Lasters. Im Uebrigen gegen den Katarrh diätetisches Regime; Vermeidung zu starker Bewegung, scharf gewürzter Speisen, sowie der Alcoholicae; Coitus zu untersagen. Allenfalls leicht astrin- girende Einspritzungen, wie:

Rp. 1491.

*Zinc. sulfuric. 0·3,*

*Aqu. dest. 200·0.*

*S. 2—3mal täglich 1 Spritze in die Harn-  
röhre zu injiciren.*

(Ueber die Austübung der Einspritzung s. „Gonorrhoea acuta.“)

**Gonorrhoea acuta. Der acute Harnröhrentripper.**

Im Beginn nur entsprechendes diätetisches Verhalten: Möglichste Vermeidung von Bewegung; Einschränkung des Fleischgenusses, die Kost hauptsächlich aus Milch, Gemüse, Obst etc. bestehend. Gewürze, Alcoholicae, starker Kaffee, moussirende Getränke sind zu meiden. Tragen eines Suspensoriums. Geschlechtliche Erregungen nach Möglichkeit zu hindern; bei schmerzhaften Erectionen, Chorda, Gebrauch von Bromkali, Lupulin, Morphinum.

Bei starker Empfindlichkeit der Harnröhre kalte Umschläge auf den Penis applicirt.

Wenn der Ausfluss bereits reichlich ist, die anfängliche Schmerzhaftigkeit nachgelassen hat, vorsichtig mit Einspritzungen zu beginnen, zunächst, wenn noch Empfindlichkeit besteht, nur mit kaltem Wasser oder mit:

Rp. 1492.

*Acid. carbolic. 0·2,*

*Aqu. dest. 200·0.*

*S. 3mal täglich einzuspritzen.*

Späterhin Einspritzung leicht astringirender Lösungen wie:

Rp. 1493.

*Zinc. sulfuric.,*

*Alum. crud.,*

*Acid. carbolic aa 0·3,*

*Aqu. dest. 200·0.*

*S. Einspritzung.*

Oder:

Rp. 1494

*Kal. hypermangan. 0·02,*

*Aqu. dest. 200·0.*

*S. Einspritzung.*

Ausübung der Einspritzung: Patient soll zuerst uriniren, hierauf 2—4mal hintereinander je eine halbe Spritze injiciren und gleich wieder ausfliessen lassen. Diese Einspritzungen je nach der Intensität der Secretion 3—6mal täglich vorzunehmen.

Im weiteren Verlauf, in der zweiten und dritten Woche, kann man eine ganze Spritze voll mit einer der obigen Lösungen unter leichtem Druck injiciren und durch 1—2 Minuten durch Zudrücken des Orificiums darin behalten lassen; später, wenn die Secretion und Empfindlichkeit abnehmen, Uebergang zu stärkeren Lösungen wie:

Rp. 1495

*Zinc. sulfuric.,*

*Alum. crud.,*

*Acid. carbol. aa 0·6—1·0,*

*Aqu. dest. 200·0.*

*S. Aeusserlich.*

Oder Gebrauch eines andern Astringens, z. B.:

Rp. 1496.

*Acid. tannic. 1·0,*

*Aqu. dest. 200·0.*

*S. Einspritzung.*

**Gonorrhoea chronica Chronischer Harnröhren-**  
**tripper.**

Sondenkur: Etwas konische, schwere Metallsonden werden täglich in die Urethra dem dabei liegenden Patienten bis in den prostatiscben Theil oder bis in die Blase eingeführt und einige Minuten darin belassen. Man beginnt mit Charrière Nr. 22 bis Nr. 24 und steigt täglich oder jeden zweiten Tag um eine Nummer bis Charrière Nr. 29 oder Nr. 30. Wenn das Orificium zu eng ist, um Nr. 27 durchzulassen, muss es gegen das Frenulum zu mittelst Scheerenschlags leicht gespalten werden.

Genügt die Sondenkur allein nicht, so ist sie mit medicamentöser Localbehandlung zu verbinden, so dass man nach dem Herausnehmen der Sonde das Medicament applicirt. Hierbei sind die Sonden sowohl als alle anderen in die Urethra einzuführenden Instrumente nicht mit Oel, sondern mit Glycerin zu bestreichen. Man gibt also zunächst tiefe Irrigation der vorderen Harnröhre: Durch einen weichen Mercier'schen Katheter (Charrière Nr. 14) mit 2 seitlichen Oeffnungen, der bis in den Bulbus urethrae des stehenden Patienten vorgeschoben ist, wird täglich einmal eine entsprechende Lösung eingespritzt. Man verwendet am besten:

Rp. 1497.

*Zinc. sulfuric.,*  
*Alum. crud.,*  
*Acid. carbolic. aa 1·0 -2·0,*  
*Aqu. dest 100·0.*  
*S. Aeusserlich.*

Oder:

Rp. 1498.

*Kal. hypermangan.*  
*0·2—0·5,*  
*Aqu. dest. 400·0.*  
*S. Aeusserlich.*

Ferner kann man flüssige Medicamente auch in concentrirter Form anwenden mittelst des Pinselapparats. Die endoskopische gerade Röhre sammt dem Obturator wird dem horizontal liegenden Patienten bis in den Bulbus eingeführt, hierauf der Obturator entfernt und der Pinsel, mit dem Medicament imprägnirt, durch die Röhre gesteckt und sammt dieser rotirt. Man nimmt:

Rp. 1499.

*Argent. nitric. 1·0,*  
*Aqu. dest. 30 0.*  
*Da in vitr nigr.*  
*S. Zum Bepinseln.*

Eventuell auch:

Rp. 1500.

*Argent. nitric. 1·0,*  
*Aqu. dest. 20 0.*  
*S. Zum Bepinseln.*

Diese Pinselungen jeden 2. Tag anzuwenden.

Stärkere Lösungen müssen mit grosser Vorsicht und immer nur zur Bepinselung kleiner Strecken verwendet werden.

Recht gut wirken auch oft Urethral Suppositorien; man verschreibt entweder kurze, die ebenfalls mittelst der geraden endoskopischen Röhre und des Obturators eingeführt werden, oder lange, die sich der Patient selbst mit der Hand in die Haruröhre schiebt. Man verschreibt gewöhnlich eines der folgenden:

Rp. 1501.

*Alum crud. 1·0,*  
*But. Cacao. q. s. ut f.*  
*supp. urethral longa*  
*(resp. brevia) No. 5.*  
*D. S. Täglich 1 Stück*  
*einzuführen.*

Rp. 1502.

*Acid. tannic. 0·3 – 0·5,*  
*But. Cacao q. s. ut f.*  
*suppos urethr. longa*  
*(resp. brevia) No. 5.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

Rp. 1503.

*Zinc. sulfuric. 0·15 – 0·3,*  
*But. Cacao q. s. ut f. suppos. urethr. longa*  
*(resp. brev.) No. 5.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

Diese Stäbchen werden im Liegen eingeführt, danach soll Patient noch durch  $\frac{1}{2}$  Stunde liegen oder er schlägt den Penis nach oben und befestigt ihn so mit dem Leibgurt des Suspensoriums. Erst nach  $\frac{1}{2}$  Stunde soll Patient urinieren.

Bei lange andauernder chronischer Gonorrhoe ist stets eine etwa vorhandene Dyskrasie zu berücksichtigen und gegen Syphilis Jod oder Quecksilber, gegen Tuberculose Landaufenthalt und kräftige Nahrung zu verordnen.

**Stricture urethrae. Harnröhrenverengung.** In den allermeisten Fällen methodische, langsame Dilatation durch täglich oder jeden zweiten Tag einzuführende Metallsonden; man beginnt mit der dicksten Sonde, welche die Stricture passirt, lässt sie etwa  $\frac{1}{4}$  Stunde liegen, dann geht man nach der Charrière'schen Scala zu immer dickeren Sonden über und lässt dieselben, wenn sie Patient verträgt, immer länger liegen. Für Charrière Nr. 10—15 wählt man konische Sonden, für höhere Nummern cylindrische. Wenn die Stricture für die dünnsten Sonden (Nr. 8 oder 9) nicht passirbar ist, führt man in der ersten Zeit dünne elastische Bougies ein, eventuell auch mehrere neben einander. Häufig werden statt der Metallsonden auch Bleibougies verwendet, seltener Wachsbougies. In manchen Fällen, aber nur wenn die Blase nicht paretisch, auch raschere Dilatation, indem man ein dünnes elastisches Bougie einführt und liegen lässt, neben welchem der Urin herausfließt, den nächsten Tag ein dickeres u. s. f., bis die Stricture für Charrière Nr. 12 passirbar ist, dann führt man statt der Bougies einen Nélaton-Katheter ein, befestigt ihn und steigt nun jeden Tag bis zu Charr Nr. 22, danach noch Sondirung mit Bleibougies oder Metallsonden. Bei impermeablen Stricturen oder solchen, die wegen nach jeder Dilatation eintretender heftiger Reaction nicht zur methodischen Dilatation geeignet sind, Extraurethrotomie.

**Catarrhus colli vesicae. Blasenhalaskatarrh.** Die Behandlung des acuten Blasenhalaskatarrhs ist rein diätetisch und medicamentös, nie local, und fällt mit der der acuten Cystitis zusammen (s. das. S. 419—422). Wenn Harnverhaltung besteht und auf Bäder und Morphingebrauch nicht schwindet, vorsichtige Einführung eines weichen Katheters und Ausspülung mit Narcoticis oder Antisepticis.

Beim chronischen Blasenhalaskatarrh Localbehandlung, und zwar zunächst Injectionen mittelst des



Utzmann'schen Irrigationskatheters: Eine mit dem Medicament gefüllte, 100—200 Kubikcentimeter fassende Spritze wird an den Schlauch des Irrigationskatheters angesetzt, die Luft aus demselben getrieben und hierauf der Katheter, der sammt der Spritze mit der rechten Hand gehalten wird, dem liegenden Patienten bis in die Pars membranacea eingeführt; nun fasst man den Katheter mit der linken Hand und spritzt den Inhalt der Spritze mit der rechten Hand ein. Bei Entfernung der Spritze vom Katheter darf die Flüssigkeit nicht durch diesen zurückfliessen. Unmittelbar nach der Irrigation lässt man den Patienten uriniren. Bei nicht vollständig sufficienter Blase ist die Einspritzung mittelst des Irrigationskatheters nicht anzuwenden, sondern folgendes Verfahren: Der Patient urinirt, bierauf wird ihm im Stehen ein Katheter *condé* nach Mercier, mit zwei seitlichen Oeffnungen versehen, bis in die Blase geführt und diese vollständig entleert; dann der Katheter bis in den Blasenhalß zurückgeschoben, das Medicament eingespritzt und durch neuerliches Vorschieben des Katheters bis in die Blase diese wieder entleert. Zu diesen Irrigationen des Blasenhalßes verwendet man am besten eine der folgenden Lösungen:

Rp. 1504.

*Acid. carbolic. 1·0,*

*Aqu. dest. 500·0.*

*S. Erwärmt zur Irrigation zu verwenden.*

Rp. 1505

*Alum. crud.,*

*Zinc. sulfuric.,*

*Acid. carbol. aa 0·5-1·0,*

*Aqu. dest. 500·0.*

*S. Wie das Vorige.*

Rp. 1506.

*Kal. hypermang. 0·1-0·5,*

*Aqu. dest. 500·0.*

*S. Wie oben.*

Rp. 1507

*Argent. nitric. 0·2—1·0,*

*Aqu. dest. 500·0.*

*S. Wie oben.*

Zur Anwendung concentrirter Lösungen, die nur  
in der *prostatia* wirken sollen, benützt man den

Ultzmann'schen Tropfapparat oder Harnröhren-Injector: Man füllt die Pravaz'sche Spritze desselben mit 3—4 Tropfen der Lösung, fügt sie an den Kapillarkatheter an und führt diesen, mit Glycerin bestrichen, dem liegenden Patienten bis in die Pars prostatica (woselbst der vom Mastdarm aus controlirende Zeigefinger der linken Hand ihn fühlen kann), worauf der Inhalt der Spritze unter leichtem Fingerdruck entleert wird. Nach dieser Procedur soll Patient durch  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Stunde ruhig liegen bleiben. Man verwendet zu diesen Injectionen meist eine 5 $\frac{0}{10}$ ige Lapislösung und führt dieselben jeden zweiten Tag oder selbst jeden Tag aus.

Endlich kann man auch Suppositorien anwenden, die man am besten mittelst des v. Dittel'schen Portementé einführt. Man verwendet die in Rp. 1501—1503 angegebenen Suppositoria brevia oder behufs intensiverer Wirkung:

Rp. 1508.

*Argent. nitric. 0·1,*  
*But. Cacao q. s. ut f.*  
*suppos. urethr. brevia*  
*No. 5.*

*D. S. Täglich 1 Stück*  
*zu gebrauchen, im An-*  
*fang nur  $\frac{1}{2}$  Stück.*

Bei auf tuberculöser  
Grundlage sich entwickeln-

dem Blasenhalaskatarrh gegen  
den Harndrang:

Rp. 1509.

*Jodoform. pulv.,*  
*But. Cacao  $\overline{aa}$  q. s. ut*  
*f. suppos. urethr. brev.*  
*No. 5.*

*D. S. Täglich 1 Stück*  
*zu gebrauchen.*

Bei Blasenhalaskatarrh der Frauen Sondenkur mit starken Metallsonden (von Charr. Nr. 20 aufsteigend bis zu Nr. 30 und darüber), ferner Irrigation mit den oben genannten Lösungen (Rp. 1504—1507), zeitweilig auch Cauterisation mit 5 $\frac{0}{10}$ iger Lapislösung mittelst Ultzmann'schen Tropfapparates.

**Cystitis. Blasenkatarrh.** Beim acuten Katarrh Bettruhe oder wenigstens Verbleiben in horizontaler Lage,



wenn hohes Fieber besteht, Chinin, bei Schüttelfrösten warme Getränke (russischer Thee, Lindenbluthenthe) gegen die Schmerzen in der Blasengegend und den Harndrang warme Sitz- oder Wannenbäder ( $28^{\circ}$ — $30^{\circ}$  R.), warme Umschläge oder Kataplasmen, bei Schmerzen am Perineum und im Mastdarm einige Blutegel am Perineum anzusetzen. Sorge für leichte und regelmässige Stuhle- leerung.

Ferner bei häufigem und schmerzhaftem Harndrang Narcotica Innerlich.

Rp. 1510.

*Decoct. semin Lini* 500 0,  
*Syrup Diacodii* 250  
D. S. In 24 Stunden  
zu verbrauchen.

Rp. 1511.

*Tinct. Cannab. Indic* 30 0.  
D. S. 3mal tägl. 10—15  
Tropfen.

Rp. 1512.

*Extr. semin Hyoscyami,*  
*Extr. Cann. Indic. aa* 0·4,  
*Sacch. alb.* 5·0.  
M. f. pulv. Div. in dos.  
aegu. No. 12.  
D. S. 3 Pulver täglich.

Rp. 1513.

*Extr. fluid. Stigm. Maidis*  
25·0.  
D. S. 3mal täglich je 30  
Tropfen.

Rp. 1514.

*Lupulini puri* 2 0,  
*Extr. Belladonnae* 0 1,  
*Extr. Opii aquos.* 0·05,  
*Sacchari lactis* 4 0.  
M. f. pulv. Div. in dos.  
aegu. No. 12.  
D. S. 3 Pulver täglich.

Rp. 1515.

*Emuls. oleos.* 200·0,  
*Morph. muriat.* 0·03,  
*Aqu. Lauroceras.* 5·0.  
M. S. 2stündl. 1 Esslöffel.

Rp. 1516.

*Lupulin. pur.* 1·0,  
*Morph. muriat.* 0·05,  
*Sacch. alb.* 3·0.  
M. f. pulv. Div. in dos.  
aegu. No. 8.  
D. S. 3—5 Pulver tägl.

Gut auch Narcotica in Form von Stuhlzäpfchen:

Rp. 1517.

*Extr. Opii aquos* 0·15,  
*Butyr. Cacao q. s. ut f. suppos* No. 5.  
S. 2—3 Stück täglich zu gebrauchen.

Rp. 1518.

*Morph. muriat.* 0·1,  
*But. Cacao* 20·0.  
*M. f. suppos.* No. 10.  
*D. S.* Wie das Vorige.

Rp. 1519.

*Cocain. muriat.* 0·2,  
*Butyr. Cacao* 12·0.  
*M. f. suppositoria* No. 6.  
*D. S.* 2—3 Stück täglich.

Rp. 1520.

*Extr. Belladonn.* 0·2,  
*Morph. muriat.* 0·05,  
*But. Cacao* 10·0.  
*M. f. suppos.* No. 5.  
*D. S.* 1—2 Stück täglich.

Werden die Suppositorien schlecht vertragen, schleimige Klystiere mit 10—15 Tropfen Opiumtinctur 2—3mal täglich. Bei sehr heftigen Schmerzen eventuell auch Morphin-Injectionen. Restriringte Diät, zum Getränke Milch, Mandelmilch, Wasser. Wenn der schmerzhaftes Harndrang nachlässt, Natronsäuerlinge mit Milch gemischt. Erst wenn der Schmerz ganz aufgehört, unvermischte Mineralwässer (Giesshübler, Biliner, Preblauer, Selters). Viel gebraucht auch Theesorten, wie:

Rp. 1521.

*Fol. Uv. Urs.*,  
*Herb. Chenopod. ambros.*  $\overline{aa}$  20·0.  
*D. S.* Thee; 1 Kaffeelöffel auf 1 Tasse,  
2—3mal täglich.

Rp. 1522.

*Herb. Urtic. dioic.*,  
*Flor. Cannab. sativ.*  $\overline{aa}$  20·0.  
*S.* Wie das Vorige.

Wenn Harnverhaltung eintritt, ebenfalls ein Bad, Morphin innerlich oder in Stuhlzäpfchen: wenn trotzdem Patient nicht uriniren kann, Entleerung der Blase mittelst weichen Katheters, darauf die Blase anzuwaschen mit:

Rp. 1523.

*Aqu. dest. 3000,*  
*Tinct. Opi simpl. gttss. 30*  
*S. Erwärmt zum Aus-*  
*waschen der Blase.*

Oder:

Rp. 1524.

*Acid. carbolic. 0.3,*  
*Aqu. dest. 3000.*  
*S. Wie das Vorige.*

Bei chronischer Cystitis Berücksichtigung der Ursache: Vorhandene Stricture der Harnröhre oder ein Blasenstein zu beseitigen; bei Parese der Blase regelmässiger Katheterismus; bei Frauen Untersuchung auf eine etwa vorhandene Genitalaffection und Behandlung derselben: bei Tuberculose Landaufenthalt, entsprechender Kurgebrauch in Badeorten, Milchkur etc. Nebstdem stets Localbehandlung der Blase, und zwar Ausspülungen derselben: Nachdem Patient urinirt hat, wird ein Nelaton-Katheter oder ein Katheter coulé bis in die Blase eingeführt, etwa noch in derselben befindlicher Urin entleert, dann mit einer circa 100 Kubikcentimeter fassenden Spritze entweder sofort das Medicament oder zuerst Wasser, und erst wenn dasselbe rein abfließt, das Medicament eingespritzt, das man, indem man den Katheter comprimirt, 1 - 2 Minuten in der Blase lässt. Der Kranke soll bei dieser Procedur stehen, nur schwache oder fiebernde Patienten in halbsitzender oder liegender Stellung sich befinden. Ist der Blasenkatarrh durch eine Gonorrhoe entstanden und zugleich der Blasen Hals afficirt, so ist eines der Verfahren angezeigt, wie sie bei der Behandlung des chronischen Blasenhalbskatarrhs mit tiefen Irrigationen beschrieben sind (s. S. 118), bei Frauen ebenfalls entsprechende Behandlung des Blasenkatarrhs.

Gewöhnlich werden die Flüssigkeiten lauwarm eingespritzt, nur bei Blutungen und bei Parese der Blase kalt. Man verwendet bei grosser Empfindlichkeit

der Blase bloss lauwarmes Wasser oder Wasser mit Opiumtinctur (s. Rp. 1523), ferner auch:

Rp. 1525.

*Cocain. muriat.* 1·0,

*Aqu. dest.* 400·0.

*S. Zur Einspritzung.*

Zur Desinfection der Blase:

Rp. 1526.

*Acid. carbolic.* 0·5—1·0,

*Aqu. dest.* 400·0.

*S. Zur Einspritzung.*

Rp. 1527.

*Resorcin.* 2·0—4·0,

*Aqu. dest.* 400·0.

*S. Aeusserlich.*

Rp. 1528.

*Natr. salicylic.* 4·0—8·0,

*Aqu. dest.* 400·0.

*S. Aeusserlich.*

Wenn das Secret zähflüssig ist:

Rp. 1529.

*Natr. chlorat. (od. sulfur.)*  
12·0—20·0,

*Aqu. dest.* 400·0.

*S. Aeusserlich.*

Rp. 1530.

*Acid. boracic.* 12·0,

*Aqu. dest.* 400·0.

*S. Aeusserlich.*

In hartnäckigen Fällen stärkere Astringentien, wie:

Rp. 1531.

*Kal. hypermanganic.*

0·2—0·4,

*Aqu. dest.* 400·0.

*S. Zur Einspritzung.*

Rp. 1532.

*Alum. crud.* 2·0,

*Aqu. dest.* 400·0.

*S. Zur Einspritzung.*

Rp. 1533.

*Zinc. sulfuric.* 1·0—2·0,

*Aqu. dest.* 400·0.

*S. Aeusserlich.*

Rp. 1534.

*Argent. nitric.* 0·4—2·0,

*Aqu. dest.* 400·0.

*S. Aeusserlich.*

Bei stark ammoniakalischem oder jauchigem Geruch des Harns:

Rp. 1535.

*Amylaether. nitros.*

gtts. 3—6,

*Aqu. dest.* 500·0.

*S. Zur Einspritzung.*

Rp. 1536.

*Resorcin.* 12·0—20·0,

*Aqu. dest.* 400·0.

*S. Zur Einspritzung.*

Rp. 1537.

*Acid. salicylic.* 0·4—1·2,

*Aqu. dest.* 100·0.

*S.* Zur Einspritzung.

Rp. 1538.

*Creolin.* 2·0,

*Aqu. dest.* 100·0.

*S.* Aeusserlich.

Rp. 1540. *Kal. hypermangan* 0·4—1·0,

*Aqu. dest.* 100·0.

*S.* Zur Einspritzung.

Neben der stets anzuwendenden Localbehandlung bei chronischer Cystitis auch innerliche Mittel oft gebraucht, so namentlich die Natronsäuerlinge (Bilin, Giesshübl, Preblau, Vichy etc.) sowie auch die Wasser von Karlsbad und Marienbad. Ferner zur Verminderung des eitrigen Secrets auch Balsamica und Astringentia von einiger Wirkung:

Rp. 1541.

*Ol. Terebinthin* 0·25.

*Da in capsul. gelatinos.*

*Dent. tal. dos. No. 20.*

*D. S.* 2mal täglich je  
3 Stück.

Rp. 1542.

*Terpin. hydrat.* 2·0,

*Sacch. alb.* 3·0.

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. Nr. 12.*

*D. S.* 3mal tägl. 1 Pulv.

Rp. 1543

*Ol. Santal. aether.* 0·15.

*Da in caps. gelatinos.*

*Dent. tal. dos. No. 30.*

*D. S.* 3mal täglich je  
1—2 Stück zu nehmen.

Wenn der Harn sehr reich  
an Bacterien, auch:

Rp. 1539.

*Mercur. sublim. corros.*

0·02—0·04,

*Aqu. dest.* 100·0.

*S.* Zur Auswaschung der  
Blase.

Rp. 1544.

*Acid. tannic.* 2·0,

*Extr. Aloes aquos.* 1·0,

*Sacch. alb.* 3·0,

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 12.*

*D. S.* 3mal täglich 1 Pulv.

Bei ammoniakalischer  
Harnghrung:

Rp. 1545.

*Natr. salicylic.* 10·0,

*Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S.* 3—5 Pulver täglich.

Rp. 1546.

*Kal. chloric.* 4·0,

*Aqu. dest.* 200·0,

*Syr. rub. Idaei* 20·0.

*S.* 2stündlich 1 Esslöffel.

Rp. 1547.

*Naphthalin. purissim. cryst. 2·0,*  
*Sacch. alb. 4·0,*  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 8.*  
*D. S. 2—4 Pulver im Tag.*

Bei gleichzeitiger starker Bacteriurie neben den oben erwähnten Ausspritzungen (Rp. No. 1539, 1540) innerlicher Gebrauch von Salicyl (Rp. 1545) oder:

Rp. 1548.

*Salol. pur. 10·0.*  
*Div. in dos. aequ. No. 10.*  
*D. S. 3—5 Pulver täglich.*

Ueber Behandlung gleichzeitig bestehender Blasenblutungen s. „Haematuria“ S. 427 ff. Zur Nachkur nach der localen Behandlung des chronischen Blasenkatarrhs Kurgebrauch in Karlsbad, Marienbad, Wildungen oder Gebrauch einer indifferenten Therme (Gastein, Römerbad, Teplitz), bei Tuberculose Gleichenberg, Rožnau, Ems etc.

**Pyelitis. Entzündung des Nierenbeckens.** Berücksichtigung des Causalmoments; Behandlung ursächlicher Cystitis oder Calculose. Bei acuter Pyelitis Bettruhe, restringirte Diät; zum Getränk Milch, Mandelmilch, Wasser; wenn kein starker Harndrang besteht, Natronsäuerlinge mit oder ohne Milch. Bei hohem Fieber Chinin, bei gleichzeitiger Schmerzhaftigkeit Chinin mit Morphinum. Bei chronischer Pyelitis Milchkur, systematischer Gebrauch lauwarmer Bäder. Zur Beschränkung der Eiterung:

Rp. 1549.

*Acid. tannic. 1·0,*  
*Sacch. alb. 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 6.*  
*D. S. Täglich 3 Stück*  
*zu nehmen.*

Rp. 1550.

*Chinin. tannic. 1·0,*  
*Sacch. alb. 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 6.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

Rp. 1551.

*Ser. lact. clarificat.* 500·0,

*Alum. crud.* 3·0.

*D. S.* In einem Tag zu verbrauchen.

Rp. 1552.

*Aqu. Calc.* 100·0

*D. S.* 3mal tägl. je 1—2  
Essl. auf 1 Glas Milch.

Zuweilen ist auch von gutem Erfolg:

Rp. 1553.

*Balsam. Copaiv.* 6·0.

*Div. in dos. aequ.* No. 30.

*Da in capsul. gelatinos.*

*D. S.* 3mal täglich je  
1—4 Stück.

Rp. 1556.

*Acid. phosphoric.* 5·0,

*Syr. cort. Aurant.* 50·0.

*S.* Mit Wasser verdünnt in einem Tag zu verbrauchen.

Oder:

Rp. 1554.

*Ol. Terebinth. rect. gtt.* 3.

*Echib. in caps. gelatinos.*

*Dent. tal. dos.* No. 30.

*D. S.* Tagl. 2—5 Stück  
zu nehmen.

Bei hinzutretenden Magenbeschwerden (Appetitlosigkeit, Aufstossen, Erbrechen) Gebrauch von Säuren:

Rp. 1555.

*Acid. mur. pur dil.* 15·0.

*S.* 10—20 Tropfen in  
einem Weinglas voll  
Wasser nach jeder  
Mahlzeit zu nehmen.

### Nephrolithiasis. Steinbildung in den Nierenbecken.

Fleissige Bewegung im Freien: vorwiegend vegetabilische Kost, reichliches Getränk, Vermeidung von Alcoholicis und sauren Speisen, Gebrauch der Quellen von Vichy, Wildungen, Selters, Giesshübl etc. oder von Karlsbad. Ferner auch Gebrauch von Alkalisalzen als Pulver, namentlich von Lithium Verbindungen:

Rp. 1557.

*Lith. carbonic.* 3·0.

*Div. in dos. aequ.* No. 6.

*D. S.* 3mal täglich ein Pulver.



Besonders empfehlenswerth ist:

Rp. 1558.

*Natr. phosphoric.,*  
*Natr. bicarbon. aa 45·0,*  
*Lith. carbonic. 10·0.*

*Da in scatul.*

*S. 2mal tägl. 1 Kinderlöffel voll in Wasser aufgelöst.*

Bei Nierensteinkolik protrahirte, warme Bäder, Opium oder Morphinum.

**Haematuria. Blutharnen.** Absolute Ruhe im Bette, leichte Bedeckung. Restringirte Diät; namentlich Vermeidung von heissen oder sonst aufregenden Getränken. Ferner Anwendung der Kälte; Application von nassen, kalten Umschlägen auf die Nierengegend oder über das Abdomen und Perineum, darüber Eisbeutel oder auch Leiter'scher Kühlapparat. In manchen Fällen von Blasenblutungen auch kurze Sitzbäder in kaltem Brunnenwasser, in welches noch Eisstücke gelegt werden können. Bei Blasenblutungen auch kalte Klystiere oder Einführung des Atzberger'schen Apparates in das Rectum, durch den man eiskaltes Wasser laufen lässt.

Rp. 1559.

*Extr. Secal. cornut. 6·0,*  
*Aqu. Cinnamom. 120·0.*  
*D. S. Täglich 3 Esslöffel voll.*

Oder:

Rp. 1560.

*Extr. Secal. cornut. 1·0,*  
*Fulv. gummos. 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 6.*  
*D. S. 3stündlich 1 Pulver.*

Rp. 1561.

*Dragées d'Ergotine de Bonjean lagen.*  
*S. Täglich 4 – 10 Stück zu nehmen.*

Auch Suppositorien:

Rp. 1562.

*Ergotin. bis depurat* 3·0,

*But. Cacao* 12·0.

*M. f. suppos. No. 6.*

*D. S. Täglich 2—4 Stück.*

Rascher und sicherer wirken subcutane Injectionen von Ergotin, am besten:

Rp. 1563.

*Extr. Secal. cornut.* 3 0,

*Glycerin. pur.,*

*Aqu. dest. aa* 7·5.

*D. S. 3mal tägl  $\frac{1}{2}$ , Pra-  
raz'sche Spritze zu in-  
jiciren. Vor der Injec-  
tion die Lösung stets  
zu filtriren.*

Noch besser:

Rp. 1564.

*Ergotin. dialysat. Bom-  
bellon lagen.*

*S.  $\frac{1}{2}$ —1 Spritze mehr-  
mals täglich.*

Rp. 1567.

*Ferr. sulfuric. cryst.,*

*Natr. bicarbon. aa* 3·0,

*Extr. Millefol. q. s. ut f. pill. No 60.*

*D. S. 3mal täglich je 3 Stück zu nehmen.*

Wirksam sind auch:

Rp. 1565.

*Alum. crud.,*

*Sacch. alb. aa* 3·0.

*M. f. pulv. Div in dos.  
aequ. No. 6.*

*D. S. Stündl. 1 Pulver.*

Rp. 1566.

*Liqu. Ferr. sesquichlorat.*  
3·0,

*Aqu. Cinnamom. simpl.*  
100 0.

*S Stündl. 1 Esslöffel.*

Local bei Blutungen aus dem vorderen Theil der Harnröhre kalte Umschläge, Einspritzungen mit kaltem Wasser oder astringirenden Lösungen direct aus der Spritze in die Urethra, endlich Einführung eines Nélaton-Katheters, Befestigung desselben und Compression des Penis darüber mittelst Heftpflasterstreifen.

Bei Blutungen aus dem Blasenhalse Narcotica, wenn die Blutung sehr heftig ist, Einführung eines recht dicken weichen Katheters in die Blase und Befestigung desselben.

Bei Blutung aus der Blase Auswaschung derselben mit kaltem Wasser; wenn sich Coagula in der Blase angesammelt haben, dieselben mittelst sehr dicken Katheters (am besten sogen. Evacuations-Katheter) theils herauszuwaschen, theils mit der Spritze zu aspiriren; dies so lange fortzusetzen, bis das Waschwasser blutfrei abfließt; das ganze Verfahren täglich 1—2mal, manchmal auch öfter vorzunehmen. Nach Entfernung der Coagula (aber nur einmal täglich) Einspritzung von:

Rp. 1568.

*Argent. nitric. 0·2—0·5,*

*Aqu. dest. 500·0.*

*S. Zur Einspritzung.*

Oder:

Rp. 1569.

*Liqu. Ferr. sesquichlorat. 2·0—10·0,*

*Aqu. dest. 500·0.*

*S. Zur Einspritzung.*

Man beginnt namentlich bei empfindlichen Personen mit schwachen Lösungen, steigt aber (bei länger andauernden Blutungen z. B. in Folge von Tumor vesicae) allmählich zu starken auf. Bei hartnäckigen Blutungen auch Anwendung eines dicken Verweilkatheters (Nélaton-Katheter), Anfangs sehr häufig durch denselben kaltes Wasser einzuspritzen, um etwa sich bildende Coagula zu entfernen.

Nach Stillung der Blutung, wenn möglich, Beseitigung der Ursache. In der Blase befindliche Steine oder Fremdkörper zu entfernen; bei papillomatösen Wucherungen der Blasenschleimhaut Monate lang fortgesetzter innerlicher Gebrauch von Ergotin, sowie intravesicale Einspritzungen von Ferr. sesquichloratum; im Uebrigen wurden Neubildungen der Blase schon öfters mit glücklichem

Erfolge extirpiert. Bei Blutungen aus Katarrhalgeschwüren oder Fissuren am Blasenhals, wenn starker Haindrang und Cystospasmus besteht, Narcotica, sonst Einspritzungen von 2—10<sup>0</sup> igeu Alaun- oder Zinklösungen mittelst des Katheters (s. „Catarrhus colli vesicae“ S. 418), täglich einmal 50—100 Kubikcentimeter, unter leichtem Druck einzuspritzen.

**Phosphaturie.** Behandlung eines etwa vorhandenen Grundleidens (Cystitis, Nervenleiden etc.). Regelung der Diät; reichlicher Genuss von säuerlichen Speisen und Sodawasser; dagegen alle alkalischen Mineralwässer zu meiden. Gebrauch von Säuren, wie:

Rp. 1570.

*Acid. phosphoric. 10·0,*  
*Syrup. rub. Idei 50·0.*  
*D. S. In 24 Stunden mit*  
*kohlens. Wasser (Syph.)*  
*zu verbrauchen.*

Rp. 1571.

*Acid. muriat. dilut. 30·0.*  
*S. 3mal täglich 20 Tropfen*  
*in  $\frac{1}{2}$  Glas Wasser.*

Rp. 1572.

*Acid. lactic. 3 0,*  
*Aqu. dest. 200·0,*  
*Aqu. Menth. pip. 50·0.*  
*S. 3mal tägl. 1 Esslöffel*  
*in einem halben Glas*  
*Sodawasser.*

Rp. 1573.

*Acid. benzoic. 2·0,*  
*Sacch. alb. 1·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 6.*  
*D. S. 3mal täglich 1*  
*Pulver.*

Ferner Ausspülungen der Blase mit:

Rp. 1574.

*Acid. muriat. concentr.,*  
*Acid. carbolic aa 0 2,*  
*Aqu. dest. 200·0.*  
*S. Zur Einspritzung.*  
Oder:

Rp. 1575.

*Acid. salicylic. 0 4,*  
*Aqu. dest. 200·0.*  
*S. Zur Einspritzung.*

**Hyperaesthesia und Neuralgie der Urethra.** Warme Sitz- oder Vollbäder. Klystiere mit warmem Wasser (28° R.) oder Kamillen-Infus. Besteht nur Ueberempfindlichkeit bei Einführung von Instrumenten in die Harnröhre:

Rp. 1576.

*Cocain. mur. 0·5,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*S. Vor Einführung des Instrumentes  $\frac{1}{2}$ —1 Pravaz'sche Spritze voll in die Harnröhre zu injiciren.*

Diese Injectionen am besten mittelst des „Cocain-Apparates“ auszuführen, eines sehr dünnen geknöpften weichen Katheters, an dessen oberes Ende eine Pravazsche Spritze angesteckt werden kann.

Behandlung eines etwa bestehenden chronischen Trippers oder Blasenhalsskatarrhs; im letzteren Falle leichte Irrigationen mit dem Ultzmann'schen kurzen Katheter (s. „Catarrhus colli vesicae“ S. 418); zu der ersten und zweiten Einspritzung  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ ‰ige Carbollösung, weiterhin  $\frac{1}{2}$ ‰ige Lösung von Zinc. sulfuricum zu verwenden und allmählich bis zu einer 3—5‰igen Lösung zu steigen.

**Cystospasmus. Blasenkrampf.** Behandlung vorwiegend causal. Fernhaltung körperlicher Anstrengung und geistiger Aufregung; bei rein nervöser Grundlage (Neurasthenie, Hysterie) am besten der Patient zur Erholung auf das Land oder in ein Bad (Seebad oder indifferente Thermen) zu schicken, auch Kaltwasserkur oft von günstiger Wirkung; innerlich Brom. Bei anämischen Personen Eisen, Arsen, auch in Form von Mineralwässern. Wenn dem Cystospasmus vermehrte Harnsäure-Ausscheidung oder Oxalurie zu Grunde liegt, Gebrauch von Alkalien, namentlich von alkalischen Mineralwässern (Bilin, Radein). Zweckmässig in solchen Fällen auch:

Rp. 1577.

*Natr. phosphoric.,*

*Natr. bicarbonic.,*

*Natr. bromat. aa 30·0.*

*D. S. 1 Kaffeelöffel in  $\frac{1}{2}$  Liter Wasser tagsüber zu nehmen.*

Bei zu Grunde liegender Phosphaturie dagegen Säuren anzuwenden (s. Phosphaturie S. 430.)

Oder:

Rp. 1578.

*Natr. salicylic.*,

*Natr. bromat. aa* 10·0.

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 2–3 Pulver täglich.*

Fissuren oder Fisteln des Mastdarms chirurgisch zu behandeln. Entozoen zu beseitigen. Ist das Leiden durch Excesse in Venere, Onanie oder einen Tripper entstanden, Sondenkur (s. „Gonorrhoea chronica“ S. 415); nebstdem Irrigation der Pars prostatica und Blase mittelst kurzen Katheters oder Mercier'schen Katheters (s. S. 418) mit  $\frac{1}{4}$ °iger Cocain-Lösung, später mit Adstringentien; eventuell auch Aetzung der Pars prostatica mittelst des Tropfapparates mit 3–5°iger Lapislösung.

Bei Krampf des Sphincters speciell methodische, tägliche Einführung dicker Metallsonden (Ch. Nr. 24–30), bis in die Blase, dieselben anfangs durch 5 Minuten, dann immer länger liegen zu lassen. Vor der Einführung der Sonde Injection von 5°iger Cocain-Lösung in die Urethra mittelst Cocain-Apparates. In hartnäckigen Fällen, namentlich wenn Erosionen oder Fissuren am Blasenbals zu vermuthen sind, Aetzung der Pars prostatica mit 5°iger Lapislösung mittelst des Uitzmann'schen Tropfapparates. Bei Harnverhaltung Katheterismus.

Bei Frauen Untersuchung auf ein zu Grunde liegendes Genitalleiden und Behandlung desselben. Erweiterung der Harnröhre durch dicke Sonden, eventuell auch forcirte Dilatation mittelst der Simon'schen Specula in der Narkose, Irrigation mit Adstringentien oder Aetzung mittelst Tropfapparates.

Gegen die einzelnen Anfälle warme Bäder oder Sitzbäder, warme Umschläge auf Blasengegend und Mittelfleisch, warme Klysmen Narcotica (Morphin intern, in Suppositorien oder subcutan, Chloralhydrat, Tinct. Cannab.

indic. 10—15 Tropfen); bei rein nervösem Blasenkrampf ein aromatisches Infus (Valeriana, Chamomilla etc.), Bromsalze.

**Paresis vesicae.** In leichten Fällen, wenn nur schlechte Angewohnheit, selten Urin zu lassen, besteht, tägliche Massage der Blasengegend, Gebrauch eines Natronsäuerlings, warme Bäder mit nachfolgender kalter Douche auf die Lendengegend; vor Allem aber muss der Patient selbst darauf achten, etwa alle 4 Stunden, gleichviel, ob er Harndrang hat oder nicht, den Urin zu entleeren. Dem Leiden zu Grunde liegende Stricturen oder Blasensteine zu entfernen, ferner in ausgeprägteren Fällen Landaufenthalt, Kaltwasserkur, namentlich Douchen auf die Lendenwirbelsäule, die Blasengegend, das Perineum; innerlich:

Rp. 1579.

*Extr. Secal. cornut. 1·0,  
Elaeosacch. Foenicul. 2·0.  
M. f. pulv. Div. in dos.  
aequ. No. 6.  
D. S. 3mal tägl. 1 Pulver.*

Oder:

Rp. 1580.

*Strychnin. nitric. 0·02,  
Sacch. alb. 3·0.  
M. f. pulv. Div. in dos.  
aequ. No. 10.  
D. S. Täglich 1, später  
2 Pulver.*

Auch endermatischer Gebrauch von Strychnin, indem der Mons Veneris rasirt, die Epidermis daselbst mittelst eines Kantharidenpflasters entfernt und die Wunde bestreut wird mit:

Rp. 1581.

*Strychnin. nitric. 0·1,  
Sacch. alb. 5·0.  
M. f. pulv. Div. in dos.  
aequ. No. 10.  
D. S. Auf die wunde  
Fläche täglich 1 Pul-  
ver aufzustreuen.*

Besser und zweckmässiger

ist:

Rp. 1582.

*Strychnin. nitric. 0·05,  
Aqu. dest. 10·0.  
S. Täglich  $\frac{1}{2}$ —1 Pra-  
vaz'sche Spritze in die  
Bauchhaut z. injiciren.*

(NB. Sobald Muskelzuckungen oder erhöhte Muskel-  
erregbarkeit auftreten, das Strychnin auszusetzen.)



In vorgeschrittenen Fällen ist das wichtigste Moment der Behandlung der regelmässige Katheterismus. Der Kranke soll einige Wochen hindurch liegen und wenn er nach dem Katheterismus auch spontan Harn zu lassen im Stande ist, täglich einmal, wenn nicht, mindestens dreimal im Tag die Blase mittelst Nélaton-Katheters entleert, dann mit  $\frac{1}{3}\%$ iger Carbolsäurelösung,  $3\%$ iger Borsäure-Lösung oder wenn sich bereits Cystitis entwickelt hat, mit einem entsprechenden anderen Medicamente ausgewaschen und ca. 100 Kubikcentimeter dieser Lösung in der Blase gelassen werden. Die Entleerung soll, namentlich wenn die Blase stark gefüllt ist, nicht schnell vorgenommen werden, sondern allmählich, indem man öfters den Katheter mit den Fingern eine Zeit lang comprimirt und so das Ausfliessen des Urins unterbricht. Der Katheter muss nach jedesmaligem Gebrauch mit  $5\%$ iger Carbol- oder  $0.1\%$ iger Sublimatlösung, darauf mit Wasser gewaschen und durchgespritzt und dann am besten in Carbolgaze oder Sublimatgaze eingewickelt aufbewahrt werden. Das Katheterisiren und Ausspülen der Blase wird gewöhnlich vom Patienten oder seiner Umgebung erlernt und ausgeführt. Wenn Prostata-Hypertrophie besteht, gelingt es oft nicht, mit dem Nélaton-Katheter in die Blase zu gelangen, man greift dann zum Mercier'schen Katheter coudé, zu englischen und endlich auch zu Metallkathetern.

In vorgeschrittenen Fällen, wenn die Patienten schon an den Katheterismus gewöhnt sind, auch Elektrisiren der Blase (mit constanten oder inducirten Strömen) angezeigt; bei Lähmung der Detrusoren ein Pol auf die Lendenwirbelsäule, der andere besteht in dem Uitzmann'schen Blasen Excitator, einer bis gegen die Spitze mit Hartgummi umhüllten Metallsonde, die in die Blase eingeschoben wird: wenn Parose des Sphincters vorwaltet, dieser Reophor nur in die Pars prostatica einzuführen oder bei empfindlichen Personen der Sphincter vom Mastdarm aus (er unter Enuresis, [s. S. 435] zu beschreibenden Weise)

**Enuresis.** Der Harn sowohl, als die Genitalien und Blase genau zu untersuchen und etwaige pathologische Zustände derselben (Cystitis, Lithiasis, Stricturen, Phimosis, Balanitis, Polypen der weiblichen Harnröhre, Kolpitis etc.) zu beseitigen. Bei schwachen Kindern Eisen, Chinin, Bäder, Kaltwasserkur, Landaufenthalt. Von Erfolg ist öfter:

Rp. 1583.

*Extr. Belladonn. 0·1,*  
*Sacch. alb. 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. Vor dem Schlafengehen 1 Pulver.*

Oder:

Rp. 1584.

*Atropin. sulfuric. 0·01,*  
*Pulv. et extr. Liquir.*  
*q. s. ut f. pill. No. 20.*  
*D. S. Vor dem Schlafengehen 1 Pille.*

(Mit Vorsicht zu gebrauchen.)

Rp. 1585.

*Extr. fluid. Rhus aromatic. 20·0.*  
*D. S. 3mal täglich 15—20 Tropfen.*

In anderen Fällen auch Extr. Secal. cornut. oder Tinet. Nuc. vom. von Erfolg. Am besten jedoch Faradisation des Sphincter vesicae vom Mastdarm aus. Von einem Dubois-Reymond'schen Inductionsapparat geht der eine Draht zu einer gewöhnlichen Schwamm-Elektrode, die bei Knaben auf die Raphe Perinei, bei Mädchen in eine Backenfalte aufgesetzt wird, der andere zu einem 7 Centimeter langen Metallzapfen (Mastdarmreophor nach Ultzmann), der gut eingeölt in das Rectum geschoben wird. Der Strom Anfangs sehr schwach zu nehmen, dann allmählich zu steigern. Täglich oder jeden zweiten Tag eine Sitzung, Behandlung mindestens durch 4—5 Wochen.

**Impotentia.** Bei Impotentia generandi die Therapie selten von Erfolg. Nur, wenn es sich um eine Erkrankung der Pars prostatica urethrae oder des Caput gallinaginis handelt, Aetzungen derselben mit 5%iger Lapislösung, von der 3—5 Theilstriche einer Pravaz'schen Spritze mittelst des Ultzmann'schen Tropfapparates applicirt

werden. Diese Actzungen jeden dritten Tag auszuführen. (Naheres s. „Cat. colli vesicae chron.“ S. 419). Bei Oligozoospermie Faradisation der Testikel, dieselbe auch bei Azoospermie zu versuchen.

Bei *Impotentia coeundi*, wenn dieselbe durch organische Veränderungen des Genitalapparates bedingt ist, Behandlung der letzteren. Bei Hypospadie und Epispadie, Tumoren, Elephantiasis des Penis, operative Abhilfe, bei durch Cavernitis entstandener Verkrümmung des Gliedes Anwendung von Jod innerlich und local, Compression mit Heftpflasterstreifen, warme Bäder; wenn Syphilis die Ursache der Cavernitis, Jod, Quecksilber.

Bei psychischer Impotenz der Zuspruch des Arztes von grossem Einfluss. Landaufenthalt, Zerstreuung, Kaltwasserbehandlung, Eisen, Chinin; bei starker Aufregung Bromkali (3 gr. pro die). Am wirksamsten bei der psychischen und paralytischen Impotenz jedoch locale Behandlung, und zwar zunächst Sondenkur, tägliche Einführung von Metallsonden bis in die Blase bei horizontaler Lage des Patienten, und zwar Anfangs Charrière Nr. 20, dann steigend bis zu Nr. 30; die Sonde durch 5—10 Minuten in der Blase zu belassen. In ähnlicher Weise wirkt auch die Kuhlsonde, durch die man Wasser, Anfangs von 14—16° R., dann sinkend bis zu 9—10° R. strömen und die man in den ersten Sitzungen 5 Minuten, später bis zu 30 Minuten liegen lässt. In manchen Fällen wirkt warmes Wasser von 30° R. besser als das kalte. Weiter kann man auch Irrigation der Pars prostatica mit schwachen Lösungen von Zink, Alaun etc. versuchen; besser aber wirken Urethral-suppositorien, die mittelst des v. Dittelschen Porte-remède in die Pars prostatica gebracht werden, namentlich:

Rp. 1586. *Acid. tannic.* 0.5,

*But. Cacao q. s. ut f. suppos. urethral. longitud. centim. No. 5.*

*D. S. In den ersten Tagen je ein halbes, später je ein ganzes Suppositorium einzuführen.*

Aehnlich wirken auch Aetzungen der Pars prostatica mit 5%iger Lapislösung mittelst des U l t z m a n n'shen Tropfapparates (s. Seite 419).

Auch elektrische Behandlung oft von Erfolg, und zwar der faradische Strom; die eine Elektrode ist ein länglicher Metallzapfen und wird ins Rectum gesteckt, die andere abwechselnd am Bulbus urethralis, am linken und rechten aufsteigenden Schambeinast applicirt. Wenn jedoch häufige Pollutionen bestehen, diese Behandlungsmethode nicht indicirt.

**Spermatorrhoea. Samenfluss. Pollutionen.** Causale Behandlung bei Phimose, Blasensteinen, Mastdarmleiden. Regelung der Lebensweise; geschlechtliche Erregungen nach Möglichkeit zu meiden; hat der Kranke eine anstrengende körperliche oder geistige Thätigkeit, so ist zeitweiliges Aussetzen derselben indicirt. Land- und Gebirgsaufenthalt. Kaltwasserkuren, Fluss- oder Seebäder. Die Kost leicht verdaulich; Gewürze, Alcoholica, Thee, Kaffee zu meiden; die einzelnen Mahlzeiten nicht zu gross, dafür eventuell zahlreicher, besonders vor dem Schlafengehen nicht zu spät und nicht zu reichlich essen. Frühes Aufstehen; Bett mit harter Matratze, nur leichte Bedeckung; Rückenlage zu vermeiden. Nach dem Erwachen sofort die Blase zu entleeren. Bei anämischen Personen Chinin, Eisen. Bei Erregungszuständen Bromkali (3—4 *gr.* pro die) gelöst zu nehmen. Zuweilen, namentlich bei Spermatorrhoe, auch Extr. Secal. corn. von guter Wirkung (s. Rp. 1579).

Local: Sondenkur, mit möglichst dicken Sonden (s. „Gonorrhoea chron.“ S. 417) oder K ü h l s o n d e (s. „Impotentia“ S. 436). Sehr gut wirken Astringentia in Form von Injectionen mittelst des Irrigations-Katheters (s. „Cat. coll. vesic.“ S. 418) oder energischer in Form von Suppositorien, entweder mit Tannin (s. Rp. 1586) oder:

Ex. 1587.

*Argent. nitric. ʒ (15,*

*Ext. Cacao q. s. ut f. suppos. urethr. form.*

*gran. hordei. No. 5.*

*S. Mittelst Porte-remède einzuführen.*

Will man das Caput gallinaginis ätzen, so verwendet man doppelt so starke Suppositorien oder injicirt einige Tropfen einer 5<sup>o</sup>igen Lapislösung mittelst des Uitzmann'schen Tropfapparates (s. „Cat. coll. vesic.“ S. 419).

Danach muss sich Patient zu Bett legen und am besten durch 2—5 Tage im Bett bleiben: wenn Blutung eintritt, kalte Umschläge auf das Perineum.

Bei vorwaltender Spermatorrhoe Faradisation vom Mastdarm aus in der unter „Enuresis“ (s. S. 435) beschriebenen Weise.

---

Aus

**Prof. Dr. Friedrich Schauta's**

**Klinik für Geburtshilfe und Gynäkologie.**

**A. Geburtshilfe.**

**Diätetik der Schwangerschaft.** Im Allgemeinen soll die Frau in der Schwangerschaft ihre gewohnte Lebensweise fortführen, nur grosse Anstrengungen, Heben und Tragen schwerer Lasten, übermässige Bewegung etc. sind zu meiden. Die Kost ausreichend, nahrhaft, Ueberladungen des Magens jedoch, namentlich am Abend, zu meiden. Kaffee, Thee, leichter Wein und Bier können, wenn die Frau nicht allzu reichlichem Genuss dieser Getränke ergeben ist, in gewohnter Weise fortgenommen werden; jedes Uebermaass ist auch hier zu verbieten; der Genuss von schweren Weinen und Liqueuren, ebenso wie von scharfen Gewürzen zu untersagen. Die eigenthümlichen Gelüste mancher Schwangeren nach besonderen Speisen, soweit es angeht, zu befriedigen.

Die Regelung der Stuhlentleerung sehr wichtig, wird gewöhnlich durch ausreichende Bewegung, Genuss von gekochtem oder rohem Obst erzielt; bei stärkerer Stuhlverstopfung Klystiere mit lauem Wasser oder bei höheren Graden milde Abführmittel (Bitterwasser, Ol. Ricin., Electuar. lenitiv.) namentlich in der letzten Zeit der Schwangerschaft gestattet.

Fleissige Waschungen der äusseren Genitalien sind geboten, dagegen dürfen Ausspritzungen der Vagina nur durch den Arzt selbst vorgenommen werden. Sehr vor-



theillhaft der Gebrauch von Bädern von 26° R., im siebenten und achten Monat einmal wöchentlich, im neunten Monat zweimal in der Woche. Flussbäder sind erlaubt, jedoch anstrengendes Schwimmen zu verbieten.

Die Kleidung der Schwangeren soll genügend warm sein, namentlich das Tragen von Unterbeinkleidern, die jedoch nicht zu fest gebunden werden dürfen und von warmen Strümpfen zu empfehlen; die Röcke sollen nicht gebunden, sondern durch Achselbänder gehalten werden: Mieder, namentlich Fischbeinmieder und enge Strumpf-bänder zu meiden. Bei Hängebauch eine passende Leibbinde.

Mässige, nicht anstrengende Bewegung im Freien sehr zu empfehlen; dagegen Tanzen, Springen, Reiten, Fahren in stossenden Wagen, ebenso wie Anstrengungen der Brust- und Armmusculatur zu verbieten. Für passende geistige Beschäftigung, Erhalten der Schwangeren in heiterer Stimmung stets Sorge zu tragen.

Die Brüste genügend warm zu halten, vor jedem Druck zu schützen. Fleissige Waschungen derselben: bei zarten und empfindlichen Brustwarzen Waschungen mit alkoholischen Flüssigkeiten. Hohlwarzen dürfen während der Schwangerschaft nicht hervorgezogen werden.

**Hyperemesis gravidarum. Unstillbares Erbrechen der Schwangeren.** Gegen nur manchmal auftreten des Erbrechen, als gegen eine fast gewöhnliche Erscheinung, keine besondere Therapie. Allenfalls Gebrauch von alkalischen Wässern (Giesshübler, Selters, Bilinear). Daneben fleissige Bewegung im Freien, Sorge für regelmässigen Stuhl. Bei höheren Graden, wenn der Ernährungszustand der Patientin leidet, Eispillen, Cognac, Champagner. Nahrungsaufnahme in horizontaler Lage und Verharren in dieser durch etwa 1 Stunde nachher. Von Medicamenten zu versuchen:



Rp. 1588.

*Chloroform. gtts. 10,*  
*Aqu. dest. 100·0.*  
*S. 10 – 12 Tropfen nach*  
*jedem Erbrechen.*

Oder die Bernatzik'-  
schen Tropfen:

Rp. 1589.

*Morph. mur. 0·2,*  
*Acid. acet. glacial. q. s.*  
*ad sol.,*  
*Chloroform. 5·0,*  
*Alcohol. absol. 15·0.*  
*D. S. 5 Tropfen in*  
*Zuckerwasser.*

In neuerer Zeit auch:  
Rp. 1590.

*Cocain. mur. 0·25,*  
*Sacch. alb. 3·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 2—3maltägl. 1 Pulv.*

In schweren Fällen an-  
dauernde Bettruhe; wenn  
absolut keine Nahrung vom  
Magen behalten wird, ernäh-  
rende Klysmen (mit Milch,  
Eigelb, Fleischpankreas-Kly-  
stiere etc.).

Bei hartnäckigem Leiden oft von sehr gutem Erfolg:

Rp. 1591.

*Argent. nitric. 2·0,*  
*Aqu. dest. 20·0.*  
*Da in vitr. nigr.*

*S. Die Vaginalportion damit zu bepinseln, eventuell*  
*jeden 2. Tag zu wiederholen.*

Wenn alle genannten Mittel erfolglos und die Patien-  
tin in gefahrdrohendem Maasse herabkommt, als ultimum  
refugium Einleitung der künstlichen Frühgeburt  
oder des Abortus.

**Hydraemia gravidarum.** Bei starken Oedemen Bett-  
ruhe, heisse Bäder, Diuretica. In sehr hochgradigen  
Fällen oberflächliche Punctionen unter antiseptischen  
Cautelen, an den Labien jedoch nicht oder nur in spär-  
lichem Maasse auszuführen, um nicht vorzeitige Wehen  
zu erzeugen.

NB. Ueber Affectionen des Genitaltractes während der  
Schwangerschaft siehe den gynäkologischen Theil.

**Diätetik der Geburt.** Mit Eintritt der ersten stärkeren Wehen soll die Gebärende das Bett aufsuchen. In der Eröffnungsperiode Rückenlage einzunehmen; bei Nahrungsbedürfniss etwas Suppe sowie kalte, nicht aufregende Getränke zu reichen. Rechtzeitige Entleerung des Rectums durch ein Klysma; die Fäces im Bett in ein Steckbecken mit lauem Wasser abzusetzen. Auf die Harnentleerung zu achten, event. dieselbe mittelst Katheters zu bewerkstelligen.

Während der Austreibungsperiode linke Seitenlage mit ausgestrecktem linken und im Kniegelenk gebeugtem rechten Fusse. Der Arzt, resp. die Hebamme steht auf der Rückenseite der Gebärenden; die linke Hand von der Symphyse her gegen die Schamspalte gehalten, regulirt den vortretenden Fruchtheil, die rechte Hand wird behufs Dammschutzes flach auf das Perineum gelegt und drückt während der Wehe gegen den sich vordrängenden Fruchtheil. Anfangs soll die Gebärende während der Wehen auch die Bauchpresse benutzen; sobald jedoch der vorliegende Fruchtheil das Perineum vorstülpt, darf sie nicht mehr mitpressen. Bei drohender Dammraktur seitliche Einschnitte (Episiotomie) mit geknüpftem Bistouri oder Scheere. Nach der Geburt des Kopfes, wenn die Nabelschnur etwa um den Hals geschlungen ist, dieselbe durch mässigen Zug zu lockern und über den Rumpf zurückzustreifen. Bei Verzögerung der Geburt des Rumpfes der Bauch und der Fundus uteri zu massiren, die Gebärende zum Mitpressen aufzufordern, event. der Zeigefinger in die mehr nach rückwärts gekehrte Achselhöhle des Kindes einzubaken und damit ein Zug nach abwärts auszuüben. Der Dammschutz mit der rechten Hand bis nach der Geburt des Thorax fortzusetzen.

In der Nachgeburtsperiode die Mutter wieder in Rückenlage, erhält wärmende Tücher. Der Contractionszustand des Uterus mit der wiederholt aufgelegten Hand zu überwachen, nach Ablauf einer halben Stunde die bis dahin normalerweise gelöste Placenta durch leichten Druck

zu exprimiren. Bei Verzögerung der Austreibung der Placenta die unter „Blutungen in der Nachgeburtsperiode“ (S. 450) zu erwähnenden Maassnahmen. Nach Austreibung der Placenta dieselbe zu untersuchen, ob sie vollständig ist und ob auch die Eihäute alle abgegangen. Nach Beendigung der Geburt der Genitalschlauch auf etwa vorhandene Verletzungen zu untersuchen, stärkere Einrisse in den Cervix, die Vagina oder die Labien, Dammrupturen, durch Episiotomie gesetzte Wunden unter strengsten antiseptischen Cautelen mit Sublimatseide zu vernähen, die Wunde mit Jodoformpulver zu bestreuen; Entfernung der Nähte am 6. oder 7. Tage. Oberflächliche Epithelabquetschungen mit Jodtinctur zu bepinseln

Vor jedem Eingehen in die Scheide die Hände und Vorderarme des Arztes oder der Hebamme mit Seife und Bürste gründlich zu reinigen, die Nägel sorgfältig zu putzen, dann die Hände in 1.  $\frac{0}{00}$  iger Sublimatlösung, hierauf in absolutem Alcohol und schliesslich abermals in Sublimatlösung zu desinficiren.

Rp. 1592. *Mercur. sublim. corrosiv. 1·0,*  
*Aqu. dest. 1000·0.*  
*S. 1  $\frac{0}{00}$  ige Sublimatlösung.*

In neuerer Zeit:

Rp. 1593. *Mercur. sublim. corrosiv. 1·0,*  
*Acid. tartar 5·0.*  
*M. Fiat pastill. Dent. tal. dos. No. 10.*  
*S. 1 Pastille auf einen Liter Wasser.*

Die Scheide vor und nach jeder Untersuchung auszuspielen mit:

Rp. 1594. *Acid. carbolic. pur. 20·0,*  
*Aqu. dest. 1000·0.*  
*S. 2  $\frac{0}{0}$  ige Carbollösung. (Erwärmt anzuwenden)*

Oder mit:

Rp. 1595. *Lysol. pur. 20·0,*  
*Aqu. dest. 1000·0.*  
*S. 2  $\frac{0}{0}$  ige Lysollösung.*

Nach jedem in der Uterushöhle vorgenommenen operativen Eingriff auch diese mit 2%iger Carbol- oder Lysollösung mittelst gläsernen Mutterrohres zu irrigieren, das Rohr dabei bereits laufend einzuführen und die Irrigation unter nur mässigem Druck vorzunehmen, um Lufteintritt in die Uterusvenen zu verhüten.

**Diatetik des Neugeborenen.** Sobald das Kind geboren ist, muss der im Mund und Rachen befindliche Schleim mit dem Finger und einem Lappchen hydrophiler Gaze entfernt werden. Wenn die Pulsation der Nabelschnur aufgehört hat, das Abnabeln vorzunehmen: etwa 3 Centimeter vom Nabelring entfernt die Nabelschnur mit desinficirten Bändchen doppelt zu unterbinden und zwischen denselben zu durchschneiden; der Nabelschnurrest in Bruns'sche Watte einzuwickeln. Das Kind wird dann mit Fett, Glycerin oder Crème céleste, namentlich an den Hautfalten, dünn bestrichen, darauf ein Bad von 27—28° R. Zur Verhütung von Ophthalmoblennorrhoe Instillation von:

Rp. 1596.

*Argent. nitric. 0·2,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*S. In den Bindehautsack jedes Auges 1 Tropfen einzuträufeln.*

Nach dem ersten Schläfe der Wöchnerin soll das Kind zum ersten Male an die Brust der Mutter gelegt werden. Die Kleidung des Neugeborenen warm, aber nicht beengend; bei Frühgeburten wird am besten der ganze Körper von den Schultern an in Watte eingehüllt.

Bei Asphyxie des Kindes untersuche man zuerst den Rachen und den Mund mit dem kleinen Finger und entferne eventuelle Schleim- oder Blutpartikelchen, event. dieselben durch Aspiration mit dem Ballonkatheter (oder mit dem eigenen Munde) heraufzuholen. Hierauf gibt man das Kind in ein warmes Bad und spritzt rhythmisch kaltes Wasser gegen das Epigastrium. Nun nimmt

man das Kind heraus, hüllt es in warme Tücher und ahmt durch regelmässige Compression mittelst der im Epigastrium sanft aufgelegten Finger die Respirationsbewegung nach. Des Ferneren sind auch die sogenannten Schultze'schen Schwingungen, bei denen der Arzt das von rückwärts unter den Achseln gefasste Kind in die Höhe und wieder herabschwingt, von Wirksamkeit. Man versuche ferner directe Lufteinblasung mit dem G. Braun'schen Katheter, achte aber darauf, dass das Ansatzstück in den Larynx und nicht, wie es gewöhnlich geschieht, in den Oesophagus eingeführt werde. Jedenfalls die Wiederbelebungsversuche so lange anzustellen, als Herzschlag zu verspüren ist.

**Krampfwehen. Spastische Strictur des Muttermundes.** Am wirksamsten tiefe Chloroformnarkose.

Rp. 1597.

*Chloroform. 300·0,*

*Aether sulfuric.,*

*Alcohol. absol. aa 100·0.*

*S. Zur Narkose.*

Wenn die Einleitung der Narkose wegen krankhafter Zustände des Respirations- oder Circulations Apparates gefährlich erscheint, Injection von 0·01—0·02 Morphin. Wenn der äussere Muttermund einen derben, wenig dehnbaren Ring darstellt, seitliche Einschnitte zu machen (Hysterostomatotomie). Nach Beendigung der Geburt Vereinigung der Wandränder mit Seidennähten.

**Geburt bei engem Becken.** In jedem Falle nicht nur nach dem Grade, sondern auch nach der Form der Verengung streng zu individualisiren. Im Allgemeinen gelten, namentlich für das allgemein gleichmässig verengte und für das platte Becken folgende Regeln:

Die Frau in sehr frühem Stadium der Geburt zu Bett zu bringen. Bei einer Coniugata vera von über 9 Centimeter Länge gewöhnlich kein beson-



derer Eingriff nöthig, nur bei Lebensgefahr für das Kind oder drohenden Erscheinungen von Seite der Mutter Beendigung der Geburt durch Wendung und nachfolgende Extraction, oder wenn der Muttermund verstrichen und der Kopf des Kindes im kleinen Becken feststeht, durch Anlegung des Forceps, bei besonders grossem Schädel Craniotomie nothig.

Bei einer Coniugata vera von 7—9 Centimeter zunächst ebenfalls nur sorgfältige Ueberwachung des Geburtsverlaufes, insbesondere die Herztöne der Frucht genau zu controliren. Wenn der Kopf nicht in das kleine Becken eintritt, obwohl der Muttermund bereits für die ganze Hand durchgängig ist, Wendung vorzunehmen; wenn der Kopf in der Verengung feststeht, nicht mehr vorrückt, bei Lebensgefahr für Mutter oder Kind, Forcepsversuch am hochstehenden Schädel; wenn dieser nicht mehr gelingt, Perforation am lebenden oder toten Kinde. Wenn der Kopf durch die enge Stelle hindurch getreten, spontane Beendigung der Geburt abzuwarten, nur bei secundärer Wehenschwäche Zangenanlegung.

Bei einer Coniugata vera von  $5\frac{1}{2}$ —7 Centimeter Perforation am lebenden oder toten Kinde, eventuell, wenn das Kind voraussichtlich lebensfähig ist, Sectio caesarea.

Bei Coniugata unter  $5\frac{1}{2}$  Centimeter absolute Indication zur Sectio caesarea.

Ist die Beckenverengung schon während der Schwangerschaft constatirt, so ist mit Vortheil bei einer Coniugata vera zwischen  $7\frac{1}{2}$  und 9 Centimeter die künstliche Frühgeburt in der 33. bis 36. Woche (je nach dem Grade der Verengung) einzuleiten.

**Querlage der Frucht.** Die Frau rechtzeitig ins Bett zu bringen; zunächst zu versuchen, durch entsprechende Seitenlagerung der Frau die Einstellung des Schädels oder des Beckenendes zu ermöglichen; und wenn dies

nicht zum Ziele führt, Rectification der Lage durch äussere Handgriffe anzustreben. Wenn dies nicht gelingt, ist, sobald der Muttermund für 2 Finger durchgängig ist, Wendung auf den Kopf nach Braxton Hicks durch combinirte äussere und innere Handgriffe vorzunehmen; wenn auch dies nicht ausführbar, wenn möglich noch bei stehender Blase Wendung auf einen Fuss, den man bis über das Knie in die Scheide herabzieht; die Extraction nach der Wendung nicht zu übereilen, sondern erst, wenn das Kind bis zum Nabel spontan geboren ist, vorzunehmen; nur bei Lebensgefahr für die Mutter (Eklampsie etc.) oder für das Kind sofortige Extraction, sobald der Muttermund genügend erweitert ist

Bei vernachlässigter Querlage, wenn eine Schulter bereits im Becken fest eingekellt ist, alle Wendungsversuche zu unterlassen und Decapitation oder Exenteration vorzunehmen.

**Vorfall einer Extremität.** Bei Vorfall eines Armes neben dem Kopf bei noch stehender Blase Lagerung der Frau auf die dem Vorfall entgegengesetzte Seite; wenn die Blase bereits gesprungen, Reposition des Armes derart, dass er vor dem Gesicht vorbeigeschoben wird, hierauf wieder Lagerung der Frau in der eben erwähnten Weise. Wenn der Arm immer wieder vorfällt, oder seine Reposition nicht gelingt, obwohl der Kopf noch hoch steht, Wendung auf einen Fuss mit etwas später nachfolgender Extraction. Wenn der Kopf schon im kleinen Becken fixirt ist und der Arm nicht mehr repouirt werden kann, spontaner Ablauf der Geburt abzuwarten; wenn derselbe nicht erfolgt, Craniotomie. Bei Vorfall beider Arme neben dem hochstehenden Kopf Wendung auf einen Fuss. Bei Vorfall eines Fusses neben dem Kopf Wendung auf diesen Fuss, wenn möglich durch combinirten äusseren und inneren Handgriff; wenn der Kopf bereits tief im kleinen Becken steht, so dass die Wendung nicht mehr möglich, Perforation und Extraction mit dem Cranioklast.



Vorfall einer Extremität bei Querlage erfordert rechtzeitig Wendung auf den Kopf nach Braxton Hicks, oder Wendung auf einen Fuss. Das Ziehen am vorgefallenen Arme ist unter allen Umständen zu unterlassen.

**Vorlagerung und Vorfall der Nabelschnur.** Bei Vorlagerung (i. e. bei stehender Blase) in der Eröffnungsperiode möglichste Schonung der Blase, die Frau auf die der Vorlagerung entgegengesetzte Seite zu legen, nur Compression der Nabelschnur zu vermeiden; wenn der Muttermund für zwei oder drei Finger durchgängig ist, die Nabelschnur mit möglichster Schonung der Blase zu reponiren und die Frau auf die der Vorlagerung entsprechende Seite zu legen; gelingt die Reposition nicht, so ist die Blase zu sprengen und nun der Vorfall der Nabelschnur entsprechend zu behandeln.

Bei Vorfall der Nabelschnur (i. e. nach dem Blasensprung) Manual-Reposition derselben in der Rückenlage. Gelingt die Reposition manuell nicht leicht, so versucht man sie mit dem Carl Braun'schen Nabelschnurrepositorium. Nach gelungener Reposition absolute Ruhelage der Frau und strenge Controle der Geburt. Bei Lebensgefahr für das Kind Forceps, oder, wenn möglich, noch Wendung und Extraction. Gelingt die Reposition nicht, so versucht man die Wendung oder macht bei fixirtem Kopfe und lebendem Kinde Forceps, bei todttem Kinde die Craniotomie.

Bei Beckenendlage der Nabelschnurvorfalle zunächst expectativ zu behandeln, sowie aber Lebensgefahr für das Kind eintritt, rasch Extraction auszuführen.

Bei Querlage erfordert der Nabelschnurvorfall keine besondere Therapie; es wird nur die Querlage selbst entsprechend behandelt.

**Uterusruptur während der Geburt.** Bei drohender Uterusruptur möglichst schnelle Entbindung notwen-

dig, jedoch Wendung zu unterlassen; wenn der Kopf zangenrecht steht, der Muttermund genügend erweitert ist, Extraction mittelst Forceps; sonst Perforation, bei Querlage Embryotomie

Nach stattgefundener Uterusruptur ebenfalls möglichst schnelle Entfernung der Frucht; ist diese noch im Uterus und in Schädellage, Zange oder Perforation; ist das Kind in die Bauchhöhle ausgetreten, Extraction per vaginam nur, wenn die Füße in der Nähe des Risses liegen, leicht zu erreichen sind und der Muttermund weit ist; sonst Laparotomie. Die Nachgeburt ebenfalls baldmöglichst zu entfernen

**Blutungen während der Geburt des Kindes.** Bei Blutungen durch Uterusruptur möglichst rasche Entfernung des Kindes, Laparotomie zur Vernähung des Risses. Bei Blutungen in Folge von Placenta praevia, in der Eröffnungsperiode Tamponade der Scheide; sobald der Cervix für zwei Finger durchgängig ist, die Blase zu sprengen und Wendung auf einen Fuss, durch combinirte äussere und innere Handgriffe oder durch Eingehen der ganzen Hand in den Uterus; am heruntergeholten Fuss anzuziehen, damit der Steiss die blutende Stelle gut tamponirt. Die nachfolgende Extraction nicht zu übereilen. Die Nachgeburtperiode wird in gewöhnlicher Weise behandelt.

(Bei durch Placenta praevia bedingten Blutungen während der Schwangerschaft zunächst, wenn dieselben leicht sind, nur Bettruhe, leichte Dist, Vermeidung von Aufregungen und Anstrengungen. Bei stärkeren oder länger dauernden Blutungen Tamponade der Vagina mit Jodoformgazestreifen oder dem gut desinficirten Kolpeurynter von C. Braun.)

Bei Blutung in Folge vorzeitiger Lösung der Placenta (bei normalem Sitz derselben) im Beginn der Geburt kräftiges Reiben des Uterus; wenn die Blutung dennoch andauert, Sprengen der Blase; sobald der Muttermund genügend erweitert ist, Wendung auf einen Fuss und Extraction, eventuell Forceps.

Bei *Vasa umbilicalia praevia*, sobald der Muttermund genügend erweitert ist, Wendung und Extraction.

**Blutungen in der Nachgeburtsperiode.** Bei Blutungen in Folge von während der Austreibung des Kindes entstandenen Verletzungen der weichen Geburtswege Vernähung der Wunden nach Beendigung der Geburt unter strengster Antisepsis. Bei Blutung in Folge mangelhafter Contraction (Atonie) des Uterus und dadurch verzögerten Abgangs der Placenta Crédé'scher Handgriff. Derselbe besteht darin, dass man vorerst die Uteringegend sanft massirt, bis man Contractionen des Uterus wahrnimmt. Wenn dieselben ihre grösste Energie erreicht zu haben scheinen, umgreift man mit einer Hand (wenn man damit nicht ausreicht, mit beiden Händen) den Fundus und drückt dreist auf den Grund und die Wände des Uterus in der Richtung nach der Aushöhlung des Kreuzbeines. Gleichzeitig Gebrauch von Ergotin, am besten subcutan:

Rp. 1598. *Ergotin. bis depurat. 2·5,*

*Glycerin.,*

*Aqu. dest. aa 7·5.*

*S.  $\frac{1}{2}$  = 1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

In neuerer Zeit:

Rp. 1599 *Ergotin. de Bombellon lagen.*

*S. 1—2 Pravaz'sche Spritzen zu injiciren.*

Bei Verwachsung der Placenta mit der Uteruswand Lösung der Nachgeburt mit der in den Uterus eingeführten und zwischen Placenta und Uteruswand hingleitenden, vorher gut desinficirten Hand. Bei Retention der Placenta durch Contraction des Muttermundes Narkose und eventuell schonende Erweiterung des Orificiums mit den eingehenden Fingern.

Bei Blutung nach Abgang der Placenta der Uterus weiter kräftig zu massiren, entweder nur durch die Bauchdecken, oder indem man mit der einen wohl desinficirten Hand in das hintere Scheidengewölbe, oder

selbst mit der Faust in den Uterus eingeht und mit der anderen Hand von den Bauchdecken her entgegendrückt. Ferner Einspritzung von kaltem Carbolwasser, event. Eiswasser in die Uterushöhle, wobei das Rohr bereits laufend einzuführen ist. Die Harnblase, wenn sie stark gefüllt ist, zu entleeren. Etwa noch vorhandene Placentarreste oder Blut-Coagula zu entfernen.

Nach Sistirung der Blutung Ruhelage mit gestreckten, aneinanderliegenden Beinen, die Scheide mit Jodoformgaze zu tamponiren. Zur Verhütung der Wiederkehr der Blutung Gebrauch von Ergotin:

Rp. 1600.

*Pulv. Secal. cornut. 6·0,*  
*Elaeosacch. Cinnam. 4·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 20.*  
*D. S. 2—3 Pulver.*

Oder:

Rp. 1601.

*Inf. Sec. corn. e 10·0:200·0,*  
*Elixir. acid. Haller. 2·0,*  
*Syr. rub. Idaei 25·0.*  
*S. Anfangs  $\frac{1}{4}$  stündlich,*  
*dann 2stündl. 1 Esslöff.*

Bei in Folge der Blutung entstandener acuter Anämie Darreichung von Wein, Rum, Cognac, ferner:

Rp. 1602.

*Tinct. Cinnamom. 20·0.*  
*S. 1 Kaffeelöffel voll in*  
*Wasser.*

Rp. 1605.

*Natr. chlorat. 1·8,*  
*Aqu. dest. 300·0.*

*S. 150—200 Grammes der auf 37° erwärmten*  
*Lösung zu injiciren.*

Oder:

Rp. 1603.

*Ol. Cinnamom. aether.*  
*10·0,*  
*Aether. sulfuric. 4·0.*  
*S.  $\frac{1}{4}$  stündl. 5—10 Tropf.*  
*in Wasser.*

Bei Ohnmachtsanfällen, starker Blässe des Gesichts:

Rp. 1604.

*Aether. sulfuric. 10·0,*  
*Tinct. Opii. simpl. 5·0.*  
*S.  $\frac{1}{4}$  stündl. 5—10 Tropf.*  
*in Wasser.*

Schneller wirken noch subcutane Injectionen von Schwefeläther oder Kampher. In den höchsten Graden acuter Anämie subcutane Kochsalzinfusion mit dem Apparat von Dieulafoi:

**Eklampsie.** Während der Schwangerschaft entsprechende Behandlung der ursächlichen Nephritis. Gegen die Anfälle Narcotica, wie:

Rp. 1606.

*Morph. mur. 0·2,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*S. Zur subcutanen Injection.*

Oder:

Rp. 1607.

*Chloral. hydrat. 6·0,*

*Mixtur. gumm 100·0.*

*S. Die Hälfte auf ein Klysma; im Tag  
1—3 Klysmen.*

In sehr schweren Fällen auch Chloroformnarkose. Von grosser Wirksamkeit ist oft die hydriatische Behandlung: Man gibt der Kranken ein Bad von 32° R. und  $\frac{1}{4}$ stündiger Dauer und schlägt sie dann in heisse Tücher ein, in denen sie eine Stunde verbleiben soll. Wenn die Krankheit durch diese Mittel nicht zum Schwinden gebracht wird und einen lebensgefährlichen Grad erreicht, Einleitung der künstlichen Frühgeburt.

Im Anfall selbst das Herausfallen der Patientin aus dem Bett, sowie Beschädigungen des Kopfes zu verhüten; die Zunge durch ein in den Mund eingeführtes Tuch vor den sich an einander pressenden Zähnen zu schützen.

Treten die Anfälle erst während der Geburt auf, die Entbindung möglichst zu beschleunigen; künstlicher Blasensprung, Wendung, eventuell Forceps.

**Abortus.** Prophylaktisch im Allgemeinen die unter „Diätetik der Schwangerschaft“ (S. 439 f.) angegebenen Regeln. Bei Frauen, die schon wiederholt abortirt haben, die Ursache womöglich zu ermitteln und zu beseitigen: Behandlung einer etwa vorhandenen Endometritis oder Metritis ausserhalb der Schwangerschaft; eine Retroflexion oder Retroversion des schwangeren Uterus zu beheben



und derselbe durch ein passendes Pessarium zu stützen. Wenn der Genitalapparat der Frau die Ursache des Abortus nicht erkennen lässt, Nachforschung auf Syphilis bei Vater oder Mutter und eventuell antisypilitische Behandlung eines oder beider. Bei habituellem Abortus ohne nachweisbare Ursache wird empfohlen:

Rp. 1608.

*Kal. chloric. 10·0,*

*Extr. Liquir. q. s ut f. pill. Nr. 30.*

*S. 3mal täglich 1 Pille, nach je 3 Tagen um  
1 Pille pro die zu steigen bis zu 9 Pillen  
pro die.*

Bei drohendem Abortus absolute Bettruhe, bis der blutige Ausfluss vollständig verschwunden. Darreichung leicht verdaulicher Nahrung, Vermeidung jeder Aufregung. Bei starker Blutung Tamponade der Scheide mit Jodoformgaze oder mit dem Carl v Braun'schen Kolpeurynter, welcher, wohl desinficirt, eingeführt wird und liegen bleibt, bis entweder die Blutung steht oder, wenn der Abortus nicht mehr aufzuhalten war, bis das Ei im Cervix liegt. Alle 4—5 Stunden jedoch muss der Kolpeurynter herausgenommen, gereinigt und frisch desinficirt und ehe er wieder eingeführt wird, die Harnblase durch den Katheter entleert werden. Wenn das Ei vollkommen gelöst ist, dessen Durchtritt durch den Cervix sich aber verzögert, Entfernung des Eies mit dem Finger oder der Löffelzange. Zurückgebliebene Eireste sind ebenfalls mit dem Finger baldmöglichst zu entfernen. Nach Beendigung des Abortus, besonders wenn manuelle Eingriffe dabei nothwendig waren, gründliche Ausspülung der Uterushöhle mit 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>iger Carbollösung. Bei Blutung nach abgelaufenem Abortus Entfernung etwa im Uterus zurückgebliebener Eireste mit dem Finger oder dem Simon'schen Schablöffel, darnach Tamponade der Scheide mit Jodoformgaze und Gebrauch von Ergotin: bei Endometritis post abortum Excochleation (siehe „Endometritis puerperalis“, (S. 456).



**Diätetik des Wochenbettes.** Unmittelbar nach der Geburt Reinigung und Desinfection der Scheide und äusseren Genitalien; vor die Vulva eine in 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>ige Carbol-lösung getauchte Compresse zu legen, die immer nach mehreren Stunden gewechselt wird. Die beschmutzte Unterlage und Leibwäsche zu wechseln. Durch mindestens 3 Stunden nach der Geburt soll der Arzt oder eine verlässliche Hebamme bei der Wöchnerin bleiben, den Contractionszustand des Uterus überwachen und häufig nachsehen, ob keine Blutung erfolgt. Die Wöchnerin zunächst einem ruhigen, mehrstündigen Schlaf zu überlassen. Bettruhe, gewöhnlich bis zum neunten oder zehnten Tag; in den ersten 2—3 Tagen Rückenlage mit aneinanderliegenden Beinen; später auch beliebige Seitenlage. Das Zimmer mässig temperirt (15—16° R.), nicht zu verfinstern, fleissig zu lüften. Die Temperatur und der Puls fleissig zu controliren. Diät in den ersten 3—4 Tagen aus Milch und Suppe bestehend, vom vierten oder fünften Tage an leichtes Fleisch, allmählicher Uebergang zu kräftigerer Kost. Wenn bis zum dritten oder vierten Tage kein Stuhl erfolgt, ein Klysma mit Wasser oder Ol. Ricini; weiterhin bei Koprostase:

Rp. 1609.

*Infus. fol. Sennae*  
*e 10·00 ad 100·0,*  
*Syr. rub. Idaei 10·0.*  
*D. S. 2stündl. 1 Essl voll,*  
*bis Stuhlgang eintritt*

Rp. 1610.

*Hydromell. infant,*  
*Tinct. Rhei aquos.*  
*aa 25·0.*  
*D. S. Esslöffelweise.*

Bei starker Diarrhoe

Rp. 1611.

*Decoct. Salep. 500·00,*  
*Tinct. Opü simpl. gutt.*  
*20.*  
*D. S. Jede ½ Stunde*  
*1 Esslöffel.*

Rp. 1612.

*Pulv. Doveri 0·80,*  
*Opü pur. 0·10,*  
*Sacch. alb. 3·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos*  
*aequ. No 10.*  
*D. S. 2stündl. 1 Pulver.*

Rp. 1613.

*Acid. tannic. 1·0,*

*Opii pur. 0·08,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 3mal täglich 1 Pulver.*

Bei Harnverhaltung regelmässige Entleerung der Blase durch einen sorgfältigst gereinigten Katheter, vor Einführung desselben stets der Scheideneingang zu reinigen und zu desinficiren.

**Puerperalfieber. Wochenbettfieber.** In prophylaktischer Beziehung streng durchgeführte Antisepsis während der Geburt in der (S. 443) beschriebenen Weise. Sowie eine Wöchnerin fiebert, ist sie, wenn sie in einer Gebäranstalt liegt, von den übrigen Gebärenden und Wöchnerinnen streng zu isoliren; die Aerzte und Hebammen, die mit ihr in Berührung kommen, dürfen in den nächsten Tagen keine gesunden Gebärenden und Wöchnerinnen untersuchen; die Instrumente, die bei der Patientin verwendet wurden, auszukochen, die Wäschestücke in 5%iger Carbollösung zu kochen, ehe sie bei anderen Personen in Gebrauch gezogen werden.

Behufs der eigentlichen Therapie des Puerperalfiebers zunächst der ganze Genitalapparat gründlichst zu untersuchen und zu desinficiren, und zwar in aufsteigender Richtung. Zunächst also Untersuchung der Vulva und des Vestibulums; kleine, graubelegte Substanzverluste daselbst mit in 2 $\frac{1}{2}$ %ige Carbollösung getauchten Wattebäuschchen zu reinigen, dann mittelst Wattepinsels mit Jodtinctur zu betupfen. Gangränöse Stellen mit in Liqu. Burowi getauchten Wattebäuschchen zu bedecken, die zweimal täglich zu wechseln sind. Wenn das Fieber nicht bedeutend (nicht über 38·5°) ist und die Lochien nicht sehr übelriechend sind, begnügt man sich zunächst damit, die Uterushöhle mit Thymollösung auszuspülen:

Rp. 1614.

*Acid thymic. 5·0.*

*Aqu. font. 5000·0.*

*S. Zum Ausspülen.*

Oder:

Rp. 1615.

*Acid. thym.,*

*Alcoh. absol. aa 1·0.*

*M. Da in vitr.*

*S. Ein solcher Fläschcheninhalt in 1 Liter warmen Wassers zu lösen.*

Bei der Irrigation das Mutterrohr bereits laufend einzuführen, auch halte man den Irrigator nicht zu hoch, damit die Flüssigkeit nicht unter zu hohem Drucke injicirt werde.

Nach der Irrigation Einschiebung eines Jodoformstiftes in die Uterushohle:

Rp. 1616.

*Jodoform. 3·0,*

*But. Cacao q. s. ut f. bacill. No. 10.*

*D. S. Jodoformstäbchen.*

Steigt das Fieber schon frühzeitig bis zu 39·5—40·0° an und sind die Lochien jauchend und übelriechend, so kann man daran denken, dass in der Uterushohle zurückgebliebene Placenta- und Eihantreste verjaucht sind, oder aber durch anderweitige Infection eine Endometritis puerperalis zu Staude gekommen ist. In diesem Falle lagert man die Patientin auf dem Operationstische in die linke Seitenlage und zieht nach Einführung des Retractor perinei die vordere und hintere Muttermundslippe mit je einer Bozeman'schen Zange herunter. Hierauf wird intrauterin mit Thymollösung (1 : 1000) irrigirt und dann mit der Curette (nicht mit dem scharfen Löffel) die Uterusschleimhaut ausgekratzt. Insbesondere die Tubenwinkel und die Stelle des Placentarsitzes mit der Curette in langen Zügen zu bestreichen

und die ausgeschabten Gewebstheile aus der Uterushöhle zu entfernen. Ist auch die Cervicalschleimhaut fetzig oder mit gangränösen Stellen besetzt, so wird auch diese excochleirt. Hierauf irrigirt man wieder reichlich mit Thymollösung, etwa blutende Stellen oder Gewebsfetzen am Cervix mit Jodtinctur zu bepinseln. Nach gründlicher Desinfection der Scheide und der äusseren Genitalien entfernt man nun (nachdem man eventuell noch Jodoformstäbe in den Uterus eingeführt) die Bozeman'schen Zangen und tamponirt die Scheide mit Jodoformgaze, welche einen Tag liegen bleibt. Man excochleire möglichst frühzeitig.

Bei Parametritis Priesnitz'sche Umschläge, später die Bauchdecken und die Vaginalschleimhaut zweimal wöchentlich mit Jodtinctur zu bepinseln.

Allgemeinbehandlung: Fieberdiät, daneben reichlicher Gebrauch von Alcoholicis (Rum, Cognac, Sherry), bei hohem Fieber Antipyretica, kalte Einpackungen; bei Peritonitis gegen starke Schmerzen Morphin, innerlich oder subcutan; bei Stuhlverstopfung Klysmen oder leichte Abführmittel (Rp. 1609, 1610).

**Blutungen im Wochenbett.** In der Uterushöhle angehäufte Blutcoagula durch Expression zu entfernen; Placentarreste ebenfalls durch Expression oder durch Massage des Uterus herauszubefördern oder mit den Fingern oder der Curette zu lösen. Im Uebrigen Ergotin-Injectionen, bei mässigen, aber länger andauernden Blutungen, oder um Wiederkehr derselben zu verhüten:

Rp. 1617.

*Pulv. Secal. cornut. 6·0,  
Elaeosacch. Cinnam. 4·0.  
M f. pulv. Div. in dos.  
aequ No. 20.  
D. S. 3mal tägl 1 Pulver.*

Rp. 1618.

*Ergotin. 3·0,  
But. Cacao q. s. ut f.  
suppos. No. 10.  
D. S. Tägl. 1—2 Zäpf-  
chen.*

**Galactorrhoe.** Verminderung der Nahrung, Gebrauch von Abführmitteln, am besten Magnes. sulfuric. oder Natr sulfuric

**Mangelhafte Milchsecretion.** Hebung der Ernährung: namentlich reichlicher Genuss von Milch und Amylaceen, sowie Gebrauch von Bier in massiger Menge.

**Galactostase.** Die Brüste durch einen passenden Verband zu heben, mit Vaseline massirend einzureiben, indem man von der Peripherie gegen das Centrum streicht. Darüber Umschläge mit Liquor Burowi. Innerlich ein mildes Abführmittel. Wenn sich Mastitis entwickelt, entsprechende chirurgische Behandlung.

### Geburtshilfliche Maasse nach der durchschnittlichen Grösse.

Distanz beider Spinae ilei anterior, super. (ausserhalb des Ansatzes des Muscul. sartor.) . . . . .	26	cm
Distanz der Cristae ilei . . . . .	29	"
Distanz der grossen Trochanteren . . . . .	31	"
Coniugata externa (Diameter v. Baudelocque) vom Dornfortsatz des letzten Lendenwirbels zum oberen Rand der Symphyse . . . . .	20	"
Coniugata diagonalis vom Scheitel des Schambogens zum Promontorium . . . . .	13	"
Differenz der Coniugata diagonal. u. Coniugata vera . . . . .	1.7	"
Coniugata vera . . . . .	11	-11.5 "
Querdurchmesser des Beckeneinganges . . . . .	13.5	"
Schräger Durchmesser der Beckeneingangs, von der Articul. ileosacral. zum Tuber ileopectin. der anderen Seite . . . . .	12	"
Sagittaler Durchmesser des Beckenmitte, von der Verbindung des zweiten und dritten Kreuzbeinwirbels zur Mitte der Symphyse . . . . .	12.5	"
Querdurchmesser zwisch. beiden Pfannengegenden . . . . .	13	"

Innerer Durchmesser des Beckenausgangs zwischen beiden Sitzknorren . . . . .	11 cm.
Umfang des Schädels des Neugeborenen . . . . .	34·5 „
Gerader Durchmesser desselben, von der Glabella zum hintersten Punkt des Hinterhauptes . . . . .	11·5 „
Biparietaler Durchmesser . . . . .	9 „
Bitemporaler Durchmesser . . . . .	8 „
Grosser schräger Durchmesser von der kleinen Fontanelle zur Kinnspitze . . . . .	13·5 „
Kleiner schräger Durchmesser von der Mitte der grossen Fontanelle zur Grenze zwischen Hinterhaupt und Nacken . . . . .	9·5 „

## B. Gynaekologie.

**Vulvitis. Entzündung der Schamtheile.** Beseitigung der Ursachen wie: Unreinlichkeit (Carcinomjauche, Urin bei Blasenscheidenfisteln), onanistische Reizungen, eingedrungene Oxyuren; Pruritus vulvae (s. das.), Gonorrhoe (s. das.).

Gegen die Entzündung selbst locale Antiphlogose: Kälte, Bleiwasserumschläge; Sitzbäder und Sublimat-  
abspülungen (1 : 1000·0).

**Pruritus vulvae.** Wenn möglich Ermittlung und Beseitigung der Ursache wie: Vulvitis, Diabetes, Neurose bei alten Frauen, Eczem der Genitalien. Bei letzterem möglichste Vermeidung der Benetzung und lindernde Salben, wie Diachylonsalbe oder Einreibungen mit Theer (7<sup>0</sup>/<sub>0</sub> ige alkohol. Lösung) und nachträgliche protrahirte Bäder.

Rp. 1619.

*Ungu. Vaseline. plumbic. 50·0,*

*Zinc. oxyd.,*

*Cetacei aa 3·0.*

*M. f. ungu. D. S. Salbe.*



Bei anämischen Personen Eisen. Gegen das Jucken selbst innerlich:

Rp. 1620.

*Natr. brom.,*

*Kal. brom. aa 10·0,*

*Ammon. brom 5·0.*

*M. f. p. Div. in dos. aequ. Nr. 5.*

*D. S. 1 Pulver in Wasser gelöst, während  
24 Stunden zu verbrauchen.*

Bei isolirten Veränderungen der Haut nach Schröder und Küstner Excision der erkrankten Parteen und Naht.

Gegen den Pruritus vulvae als Symptom einer Neurose:

Rp. 1621.

*Acid. carbol. 1·5—5·0,*

*Aqu. dest 50·0.*

*D. S. Die juckenden Stellen damit zu bepinseln.*

Oder: Rp. 1622.

*Argent. nitr. 1·0,*

*Aqu. dest. 30·0.*

*D. S. Wie das Vorige.*

Bei hochgradiger Affection Bepinselung der erkrankten Parteen mit 10 -20%iger Lösung von Argentum nitricum.

Oder. Rp. 1623.

*Acid. carbol. pur.,*

*Alcohol. absol. aa 5·0.*

*D. S. Zum Bepinseln.*

Diese Bepinselung erst nach einer Woche zu wiederholen, inzwischen Anwendung obiger Salben (Rp. 1619) oder bei grosser Schmerzhaftigkeit:

Rp. 1624.

*Cocain. mur. 2·0,*

*Ungu. emoll. 20·0.*

*D. S. Salbe.*

Bei besonders excessiven Fällen selbst Excision der Nymphen oder der Clitoris.

**Vaginismus. Scheidenkrampf.** Ist derselbe durch locale Affectionen bedingt, Beseitigung derselben nebst psychischer Einwirkung. Etwaige Verletzungen, z. B. kleine Fissuren gründlich zu ätzen mit Lapisstift, rauchender Salpetersäure, Paquelin; entzündliche Vorgänge am Introitus und Hymen entsprechend zu behandeln. Bei durch häufige Coitusversuche entzündetem und verdicktem Hymen, unblutige Dehnung desselben mit den Fingern in Narkose. Bei der idiopathischen Form des Vaginismus, welche der Ausdruck einer localen Hysteroneurose ist, entsprechende Allgemeinbehandlung, welche jedoch oft genug nicht den gewünschten Effect hat.

**Fluor albus. Weisses Fluss.** Ermittlung und womöglich Beseitigung der Ursache. Ein schlecht liegendes Pessarium muss entfernt, ein allzulange liegendes gewechselt werden. Andere Fremdkörper, wie vergessene Tampons, Schwämme etc. sind zu beseitigen. Bei Prolapsus vaginae Reposition und Pessar oder Operation.

Ursächliche Chlorose entsprechend zu behandeln.

Local: Ausspülungen der Vagina mit desinficirenden und adstringirenden Flüssigkeiten. Die Ausspülungen werden von der Frau selbst vorgenommen, indem ein Irrigator mit der Flüssigkeit gefüllt und das Mutterrohr, das durch einen Schlauch mit demselben verbunden ist, in die Scheide eingeführt wird. Diese Procedur täglich 2mal vorzunehmen. Die Flüssigkeit darf nur unter geringem Drucke einfließen und soll eine Temperatur von etwa 28° R. haben. Die erste Portion wird in das untergehaltene Becken abgelassen, da dieselbe durch Berührung mit dem Schlauche immer kühler ist.

Rp. 1625.

*Kali hypermang. 5·0,*

*Aqu. dest 200·0.*

*D. S. Davon soviel dem Spülwasser zuzusetzen, bis die Mischung weinroth ist.*

Oder:

Rp. 1626.

*Zinc. sulf.,*

*Alum. crud. ad 25·0.*

*D. S. 1 Kaffeelöffel auf 1 Liter Spülflüssigkeit.*

Oder:

Rp. 1627.

*Alum. crud. 50·0.*

*S. 1 Kaffeelöffel — 1 Esslöffel auf 1 Liter Wasser*

Von antiseptischen Flüssigkeiten werden zumeist angewendet 1 -2% ige Carbollösung oder:

Rp. 1628.

*Creolin. 20·0,*

*Aqu. dest 200·0.*

*D. S. 1 Esslöffel auf 1 Liter Wasser.*

Rp. 1629.

*Lysoli pur. 50·0,*

*Aqu. dist. 100·0*

*D. S. 1 Esslöffel auf ein Liter Wasser.*

Bei jungfräulichen Personen möglichste Einschränkung der localen Therapie.

**Gonorrhoea. Tripper.** 1. *Gonorrhoea vulvae et vaginae.* Im acuten Stadium Antiphlogose: Kälte, Bleiwasserumschläge auf die äusseren Geschlechtstheile, ferner Ausspülung und vaginale Ausspülungen mit antiseptischen Flüssigkeiten. Am besten mit:

Rp. 1630.

*Merc. subl. corr. 1·0,*

*Aqu. dest. 1000·0.*

*D. S. 1% ige Sublimatlösung. Zu Handen des Arztes.*

Statt der Sublimatlösung auch sehr wirksam  $\frac{1}{2}$ —1% ige Lysollösung.

Die Ausspülungen sollen vom Arzte selbst täglich vorgenommen werden. Hierzu wird ein Röhrenspeculum

eingeführt, die Vaginalportion eingestellt, das vorhandene Secret mittelst Watte abgewischt und nun unter fortwährendem Vor- und Rückwärtsschieben des Speculums irrigirt. Das Verschieben des Speculums hat den Zweck, alle Parteen der Vaginalschleimhaut mit der Flüssigkeit in Berührung zu bringen. Hierauf Einführung eines mit einem Faden versehenen Wattetampons, der am nächsten Morgen von der Frau selbst zu entfernen ist. Zweckmässig wird dieser Tampon mit medicamentösen Ingredienzien imprägnirt. Zu solchen eignen sich:

Rp. 1631.

*Acid. tannic. 5·0,*  
*Glycerin. 100·0.*  
*S. Nach Bericht.*

Oder:

Rp. 1632.

*Ammon. sulfichthyol. 10·0,*  
*Glycerin. 100·0.*  
*S. Wie das Vorige.*

Rp. 1633.

*Jodoform. pulv.,*  
*Acid. tannic.  $\overline{aa}$  10·0.*  
*D. S. Damit bestreute*  
*Baumwolltampons ein-*  
*zuführen.*

Oder:

Rp. 1634.

*Alum. crud.,*  
*Amyl. Oryz.  $\overline{aa}$  20·0.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

Oder in neuerer Zeit:

Rp. 1635.

*Dermatol.,*  
*Acid tannic.  $\overline{aa}$  10·0.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

In mehr chronischen Fällen kann man zu adstringirenden Flüssigkeiten übergehen oder diese mit den früher erwähnten antiseptischen abwechselnd verwenden (s. Fluor albus, Rp. 1625—1627). Vielfach gebraucht werden Eingiessungen (mittelst Röhrenspeculums) von:

Rp. 1636.

*Argent. nitr. 10·0,*  
*Aqu. dest. 100·0.*  
*Da in vitr. caerul.*  
*S. 10% ige Lapislösung.*

Oder:

Rp. 1637.

*Cupr. sulf. 10·0—20·0,*  
*Aqu. dest. 100·0.*  
*D. S. Zur Eingiessung.*

Die selten fehlende complicirende Urethritis wird folgendermassen behandelt: Zunächst Ausstreichen des Secretes aus der Urethra. Man führt den Zeigefinger in die Vagina ein und streift längs des Urethralwulstes das angesammelte Secret nach aussen. Hierauf wird eine an der Spitze mit Watte umwickelte Playfair'sche Sonde in  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{0}{100}$ ige Sublimatlösung getaucht, die Watte gut ausgedrückt und mittelst derselben die Urethra gründlich ausgewischt.

Gegen den etwa vorhandenen Blasenkatarrh täglich 1—2malige Blasenausspülungen, bei leichteren Formen mit:

Rp. 1638.

*Acid. bor. 10·0—30·0,*

*Aqu. dest. 1000·0.*

*D. S. Blasenausspülung.*

Bei schweren Formen mit  $\frac{1}{2}$ — $1\frac{0}{100}$ iger Lösung von Argentum nitricum. Wenn grosse Schmerzhaftigkeit besteht, eine Anaesthesirung der Blase mittelst weniger Grammes einer 5—10<sup>0</sup>igen Cocainlösung vor der Ausspülung. Die Spülflüssigkeiten sind lauwarm zu verwenden.

Neben der localen Therapie intern: Giesshübler, Preblauer, Biliner Wasser, reizlose Diät, am besten Milchdiät, und medicamentös:

Rp. 1639.

*Herb. Herniar.,*

*Fol. Uv. urs. aa 20·0.*

*D. S. Thee 1 Kaffeelöffel  
auf eine Tasse. Früh  
und Abends zu nehmen.*

Oder:

Rp. 1640.

*Salol. 10·0.*

*Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 3 5 Pulver tägl.*

2. Ascendirende Gonorrhoe: Endometritis gonorrh. (Catarrhus cervicis), Salpingitis et Oophoritis gonorrh. (Tumor adnexorum e Gonorrhoea), Perimetritis gonorrh. siehe die betreffenden Abschnitte über Endometritis, Salpingitis und Oophoritis, Perimetritis.

**Metritis acuta. Acute Gebärmutterentzündung.** Therapie symptomatisch. Absolute Bettruhe, am besten mit tiefliegendem Oberkörper und Erhöhung der Beckengegend. Bei Fieber entsprechende Diät. Sorge für regelmässige Stuhl- und Harnentleerung. Bei heftigen Schmerzen und peritonealen Reizerscheinungen Auflegen eines nicht allzuschweren Eisbeutels oder eines Leiter'schen Kühlapparates auf das Abdomen.

Bei sehr grossen Schmerzen Narcotica:

Rp. 1641.

*Morph. mur. 0·1,*

*Sacch. alb. 30.*

*M. f. p. Div. in dos. aequ. No 10.*

*D. S. Täglich 3 Pulver.*

Oder:

Rp. 1642.

*Morph. mur. 0·1,*

*But. Cacao qu. s. ut f. suppos. vagin. No. 5.*

*D. S. Abends ein Suppositorium einzuführen.*

Statt der Vaginalsuppositorien können auch Rectalsuppositorien oder subcutane Morphinumjectionen angewendet werden. — Bei starker congestiver Hyperaemie und Empfindlichkeit des Uterus auch Blutentziehungen an der Vaginalportion, am besten Scarificationen mittelst Scarificationsmessers oder Spitzbistouri's. Im Röhrenspeculum werden an der eingestellten Portio 5—10 Einstiche gemacht, die man durch einige Minuten nachbluten lässt. Hierauf Einführung eines Jodoformtampons.

**Metritis chronica. Chronische Gebärmutterentzündung.** Prophylaktisch rationelle Leitung des Wochenbettes, Vermeidung geschlechtlicher Excesse, onanistischer Manipulationen etc.

Bei ausgebildeter Erkrankung vor allem richtiges diätetisches Verhalten: kräftige, aber leicht verdauliche, nicht zu viel Faeces erzeugende Nahrung, Sorge für



regelmässige Stuhlentleerung (durch möglichst leichte Mittel zu bewirken, starke Drastica zu meiden). Fleissige Bewegung im Freien, aber jede Ueberanstrengung, schwere Arbeit, Tanzen, Springen, Reiten zu verbieten.

Ausserdem muss die Therapie hauptsächlich darauf gerichtet sein, das erste Stadium der Hyperaemie in das zweite Stadium der Schrumpfung überzuführen.

Die Hyperaemie kann vermindert werden durch Einspritzungen entweder von kaltem oder von heissem Wasser in die Uterushöhle. Die heissen Einspritzungen werden in der Regel besser vertragen als die kalten. Bei horizontaler Rückenlage wird mit Hilfe eines Irrigators und des Bozeman-Fritsch'schen Uteruskatheters heisses Wasser von 36° R. eingespritzt. Dies macht keine Schmerzen, nur an den äusseren Genitalien erzeugt das rücklaufende Wasser ein unangenehmes Gefühl. Man soll deshalb die äusseren Genitalien vorher mit Vaseline bestreichen. Selbst Temperaturen von 38° bis 40° R. werden so gut vertragen. Ausserdem oft von Nutzen Scarificationen an der Portio, alle 4—5 Tage auszuführen (s. Metritis acuta).

Sehr gute Dienste leisten auch Sitzbäder von der Temperatur von 28° R. und  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ stündiger Dauer, sowie Application von Priessnitz'schen Umschlägen auf das Abdomen, die über Nacht liegen bleiben.

Im Sommer Gebrauch von Trink- und Badekuren: Bei anämischen Personen Trinkkuren in Franzensbad, Pyrawarth, Schwalbach, bei gut genährten Individuen mit Neigung zu Obstipation Marienbad, Kissingen; ferner Soolbäder in Reichenhall, Ischl, Kreuth, Kreuznach oder die beliebten Moorbäder in Franzensbad, Marienbad (eventuell künstliche Moorbäder mit Mattonis' Moorlauge oder Moorsalz).

**Endometritis chronica.** Womöglich Bettruhe, Enthaltung vom Coitus, Sorge für regelmässige Stuhl- und Harnentleerung und leicht verdauliche Diät. Therapie etwa vorhandener ursächlicher Chlorose oder Scrophulose. Ge-

brauch der unter „Metritis chronica“ angegebenen Trink- und Badekuren.

Bei Endometritis cervicis (Cervicalkatarrh), wenn, wie zumeist, Tripperinfection die Ursache ist, local nebst Behandlung der Vaginalblenorhoe (s. das.) täglich einmal Auswischen des Cervicalcanals mittelst Wattebäuschchen, welche um die Spitze der Playfair'schen Sonde gewickelt und in 1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>ige Sublimatlösung getaucht werden oder Aetzung des Cervicalcanals mit Jodtinctur, Argent. nitricum (3—10<sup>0</sup>/<sub>100</sub>igen Lösungen) oder in hartnäckigen Fällen mit Acid. nitr. fumans.

Hierauf Einführung eines mit medicamentösen Ingredienzien imprägnirten Vaginaltampons. Sind Erosionen an der Vaginalportion, so müssen dieselben speciell behandelt werden. Sind es Erosiones simplices, so genügen leichtere Aetzmittel: Baden der Portio in durch das Röhrenspeculum eingegossenen Flüssigkeiten. Sehr beliebt ist:

Rp. 1643.

*Acet. pyrolign crud. 100·0.*

*S. Aeusserlich.*

In gleicher Weise wird verwendet Liquor Bellosti, 10<sup>0</sup>/<sub>100</sub>ige Lapislösung, Jodtinctur, neutralisirtes Eisen chlorid.

Alle diese Mittel regen jedoch nur eine oberflächliche Plattenepithelbildung an, ohne dass es zur Ausheilung in den tieferen Schichten käme. Besser wirken Acid. nitricum fumans, Zincum chloratum (zu gleichen Theilen mit Wasser) oder Ferrum candens (Paquelin). Die Aetzungen mit Acid. nitr. fumans werden mit einem Holzstäbchen vorgenommen und alle 8 Tage wiederholt. Dabei ist es nothwendig, gründlich mit Wasser nachzuspülen, damit keine Verätzung der Vagina zu Stande kommt.

Bei papillären und folliculären Erosionen führen Aetzungen erst nach sehr langer Zeit oder gar nicht zum Ziele. In solchen Fällen ist es daher am besten, die Erosionen durch Amputation der Portio verbunden mit

keilförmiger oder kegelmantelförmiger Excision der Schleimhaut zu entfernen.

Bei Endometritis der gesamten Uterusschleimhaut, wenn Hypersecretion vorhanden, tägliche Ausspülungen der Uterushöhle mit lauwarmen antiseptischen Flüssigkeiten, wie 2<sup>o</sup>/<sub>o</sub>ige Carbolsäure, Creolin (1<sup>o</sup>/<sub>o</sub>o), Sublimat (1<sup>o</sup>/<sub>4</sub> <sup>o</sup>/<sub>o</sub>o), in neuerer Zeit Lysol in 1<sup>o</sup>/<sub>o</sub> iger Lösung. Die Ausspülungen werden unter geringem Druck mittels Bozeman-Fritsch'schen Uteruskatheters, welcher bereits fließend eingeführt wird, täglich applicirt.

Ferner kann man in solchen Fällen die Uterusschleimhaut mit verschiedenen Adstringentien und Aetzmitteln behandeln, wie Jodtinctur, oder:

Rp. 1644.

*Zinc. chlorat.* 50·0,

*Aqu. dest.* 100·0.

*D. S. Zu Handen des Arztes.*

Oder:

Rp. 1645.

*Argent. nitr.* 1·0—10·0,

*Aqu. dest.* 10·0.

*D. S. Zu Handen des Arztes.*

Die intrauterine Application von flüssigen Aetzmitteln geschieht am besten mittelst der Playfair'schen Sonde oder der E. von Braun-Fernwald'schen geösten Sonde. (In die Oese kommt ein dünner Gazestreifen.)

Nach der Aetzung Ausspülung der Vagina mit antiseptischen Flüssigkeiten und Einführung eines Jodoformtampons, den man nach einem Tage entfernt.

Die Aetzungen werden in achttägigen Zwischenräumen ausgeführt.

Sehr wirksam ist auch in vielen Fällen die Application fester Medicamente auf die Uterusschleimhaut mittelst des Chiarischen Aetzmittelträgers, in dessen Platinhülse ein entsprechend langer Stift des Aetzmittels eingeschoben wird, worauf man das Instrument rasch bis

über das Orificium internum einführt und je nach der Intensität der gewünschten Wirkung 2—4 Minuten darin belässt und ein wenig hin- und herbewegt. Nach dem Herausziehen des Instrumentes Ausspülung der Scheide, dann Einlegung eines Jodoform- oder Wattetampous, der am nächsten Tage entfernt wird. Diese Aetzungen sind erst nach etwa einer Woche zu wiederholen. Gewöhnlich benutzt man dazu *Argentum nitricum*:

Rp. 1646. *Argent. nitric. 10·0.*

*Funde in bacill. tenues No. 30.*

*D. S. Lapisstifte.*

Ebenso kann man auch Stifte von *Zincum sulfuricum*, Alaun, *Cuprum sulfuricum* verschreiben und verwenden.

Wenn die Endometritis häufige Blutungen verursacht, zweckmässig zur Stillung derselben innerlich:

Rp. 1647.

*Ergotin. bis depur. 15·0,*

*Pulv. Rad. Althaeae,*

*Pulv. Liquir. āā 2·0,*

*Cacao sine oleo qu. s. u. f. pill. No. 100.*

*D. S. Jeden Morgen und Abend je 3 Pillen.*

Oder:

Rp. 1648.

*Pulv. Secal. corn. 3·0,*

*Elaeosacch. Cinnamom. 2·0.*

*M. f. p. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. 3 Pulver täglich.*

Oder noch besser in Klysmenform:

Rp. 1649.

*Ergotin. dialys. 5·0,*

*Aqu. dest. 35·0,*

*Acid. salicyl. 0·1,*

*Glycerin. 10·0.*

*D. S. 1 Kaffeelöffel aut 2 Esslöffel lauwarmen Wassers mittest Ballonspritze (Nr. 2) tägl. 1 Mal (am besten nach dem Stuhl) zu appliciren.*

Als sehr wirksam wird bei Blutungen empfohlen:  
Rp. 1650.

*Extr. fluid. Hydrast. Canadens. 20·0.*

*D. S. 3 Mal tägl. 15 Tropfen.*

In schweren Fällen von Endometritis, bei starken Wucherungen der Schleimhaut oder wo die geschilderten Behandlungsmethoden nicht ausreichend sind, *Abrasio mucosae*: Die Portio wird mittelst Kugelzangen herabgezogen und fixirt, der Cervicalcanal, wenn er eng ist, mittels Hegar'scher Stifte dilatirt, dann nach Ausspülung des Uterus mittelst Uteruskatheters die Gebärmutter Schleimhaut mit der Roux'schen Cürette und dem Simon'schen scharfen Löffel ausgekratzt. Nach nochmaliger Desinfection des Uterusraumes wird ein dünner Jodoformgazestreifen bis zum Fundus uteri eingeführt und auch die Scheide mit Jodoformgaze tamponirt. In hochgradigen Fällen, sowie bei erwiesener Neigung der Patientin zu Recidive, nach der Operation noch intrauterine Behandlung mit Aetzungen von Jodtinctur, Liqueur Ferri sesquichlorati etc. fortzusetzen.

### **Retroversio et retroflexio uteri. Rückwärtsneigung und Rückwärtsknickung der Gebärmutter.**

Die Therapie muss darauf gerichtet sein, den Uterus 1. aufzurichten und 2. in der normalen Stellung fixirt zu erhalten.

1.) Vor jedem Repositionsversuch ist Blase und Mastdarm sorgfältig zu entleeren.

In den leichtesten Fällen gelingt es durch Druck auf die vordere Fläche der Portio den Uterus aufzurichten. In schwierigeren Fällen muss mittelst zweier in das hintere Scheidengewölbe eingeführter Finger ein Druck auf die hintere Wand des Uteruskörpers in der Richtung nach oben und vorne ausgeübt werden. Gleichzeitig sucht die andere von aussen auf die Bauchdecken aufgelegte Hand zwischen Uterusfundus und



Kreuzbein in die Tiefe einzudringen, bis sie den Uterusfundus umgreifen kann. Hierauf gehen die beiden eingeführten Finger an die vordere Seite der Portio und drängen diese nach hinten, während die den Fundus von aussen umgreifende Hand den Uteruskörper nach vorne schiebt.

Gelingt es nicht mit den in das hintere Scheidengewölbe eingeführten Fingern den Uterus über das Promontorium heraufzuschieben, so ist es zweckmässig, dies mit dem in's Rectum eingeführten Zeigefinger zu versuchen, indem man gleichzeitig mit dem auf die vordere Fläche der Portio aufgelegten Daumen derselben Hand den Cervix nach hinten und unten drückt.

(Aufrichtungen mit der Sonde wegen Perforationsgefahr nicht rathsam.)

Misslingt dieser Versuch, oder bei Vorhandensein ausgebreiteter Adhäsionen, Massage nach Thure-Brandt. (Bei leichten Fällen führt Massage in 8–10 Sitzungen, in schwierigen erst nach Wochen zum Ziele.)

## 2.) Fixation in normaler Stellung.

Einlegen von Hodge'schen-Pessarien. Der breitere, nach aufwärts gebogene Bügel kommt in das hintere Scheidengewölbe. Ist eine bedeutende Dehnung des hinteren Scheidengewölbes vorhanden, so ist eine Modification des Hodge-Pessariums, die von Thomas angegebene, zu verwenden. (Thomas'sche Pessarien haben den hinteren Bügel breit und dick geformt.) Vielfach angewendet werden auch die biegsamen mit Kautschuk überzogenen Drahtringe, welchen man durch einfaches Biegen die jedem einzelnen Falle entsprechende Form geben kann, ferner die 8 förmigen Pessarien nach Schulze. Der kleinere Ring der 8 umfasst die Portio und drängt sie nach hinten. Das Einlegen der Pessarien erfolgt in der Weise, dass man die kleinste Nummer probirt und dann zu grösseren, eventuell zu anderen Formen übergeht. Nach Einführung des Pessars untersucht man bimanuell, ob der Uterus gut, d. h. anteflectirt, resp. antevertirt, im Ringe liegt und lässt dann die Patientin herumgehen.



Sie darf keine Schmerzen, ja nicht einmal das Gefühl haben, dass ein Fremdkörper in der Vagina liegt.

Am nächsten Tage wird nochmals bimanuell geprüft, ob der Uterus die normale Lage bewahrt hat. Ist dies nicht der Fall, so reponirt man nach Herausnahme des Pessars und legt ein passenderes ein. Jedes Pessar muss längstens nach 1—2 Monaten vom Arzte gewechselt werden. Während des Tragens des Pessariums sind häufige vaginale Ausspülungen zu empfehlen und zwar mit lauem Wasser, Kali hypermanganicum 1 : 10000-0 oder  $\frac{1}{4}\%$  iger Lysollösung, bei besser Situirten:

Rp. 1651. *Acid. salicylic.* 20·0,

*Spir. Vin.* 300·0.

*D. S.* 2 Esslöffel auf 1 Liter Wasser.

Um das Pessar mit der Zeit entbehrlich zu machen, ist es wünschenswerth auch nach gelungener Reposition des Uterus und Fixation desselben mittels Pessariums, den Tonus der Douglas'schen Falten wiederherzustellen. Hier zu am wirksamsten die Hebung und Lüftung des Uterus nach Thure Brandt. Unterstützend wirken daneben kalte Bäder, kalte Vaginalirrigationen, kalte Klysmen (Morgens und Abends nach dem Stuhlgange).

In Fällen wo die angeführten Methoden die Reposition nicht bewirken, operative Fixation: Ventofixatio uteri oder Fixatio vaginalis uteri.

Bei Retroflexio uteri gravidi Sorge für regelmässige Entleerung der Blase (wenn nöthig mittelst Katheters) sowie Erzielung regelmässiger Defäcation durch Abführmittel (nicht Klysmen). Bei hochgradigen Incarcerationserscheinungen manuelle Aufrichtung des Uterus in Knie-Ellenbogenlage vom Rectum und der Scheide aus und Einlegen eines Hodge'schen Pessariums, das mindestens 2 Wochen getragen werden muss.

### **Anteflexio et anteversio uteri. Vorwärtsknickung und Neigung der Gebärmutter.**

Behandlung etwaiger para oder perimetritischer Exsulate (Adhäsionen) mittelst Massage.

Bei angeborener Antelexio, wenn in Folge derselben Dysmenorrhoe besteht, zunächst Sondirung des Uterus; wenn diese nicht zum Ziele führt, Discission. Mitunter Massage des Knickungswinkels von Erfolg.

Bei Anteversio uteri gravidi und starkem Hängebauch Tragen einer Leibbinde.

**Prolapsus vaginae vel uteri, elongatio cervicis. Scheiden- oder Gebärmuttervorfal, Verlängerung des Gebärmutterhalses.** Prophylaktisch rationelle Leitung der Geburt und des Wochenbettes, genaue Vereinigung eines noch so kleinen Dammrisses durch Naht. Therapie entweder palliativ oder radical.

Palliativ. Einlegen von Pessarien, wie Hegar'scher Ring oder gebogene Pessarien (siehe Retroflexio); am besten die siebförmigen Pessarien nach Schatz. Vorher sind allenfalls vorhandene Erosionen an der Portio, Vaginal- oder Cervicalkatarthe womöglich zu beseitigen. Ueber Reinigung der Scheide und Wechseln des Pessars gilt das bei Retroflexio uteri (Seite 472) Gesagte.

Besser als Pessarien ist die radicale Therapie durch operativen Eingriff:

Bei Vorfal der vorderen Scheidewand Kolporrhaphia anterior, bei Vorfal der hinteren Scheidewand Kolporrhaphia posterior, gewöhnlich verbunden mit Perineoplastik.

Bei prolapsus uteri et vaginae Kolpo-perineorrhaphie; bei elongatio cervicis Kolpoperineorrhaphie mit Amputation der Portio vaginalis

In Fällen, wo der Vorfal sehr gross ist und der Uterus wegen des hohen Alters der Frau nicht mehr functionirt, ist eine totale Exstirpation per vaginam indicirt.

**Inversio uteri. Umstülpung des Uterus.** Prophylaktisch Vorsicht beim Crédé'schen Handgriff, wenn der Uterus erschlafft ist; Vermeidung eines stärkeren Zuges an der Nabelschnur etc.

Bei frischen Fällen gelingt es leicht den Uterus zu reinvertiren. Man legt ein bis zwei Fingerspitzen in den unteren Pol des invertirten Uterus und drängt damit den Fundus gegen den durch die Ligamente gebildeten Trichter, welchen man von oben her mit der anderen Hand fixirt. Hat man einmal den Widerstand des Muttermundes überwunden, ist die weitere Reinversion sehr leicht.

Kommt man nicht zum Ziele, so kann man durch dauernden Druck auf die Geschwulst (am besten durch Anwendung des Kolpeurynters) die Erweiterung des Muttermundes anstreben.

Man führt den Kolpeurynter zusammengefaltet in die Scheide ein, füllt ihn dann mit Wasser und lässt ihn 2 – 3 Stunden liegen. Hierauf versucht man die Reposition mit der Hand.

Wenn man dies durch einige Tage, eventuell Wochen täglich wiederholt, so kann es in vielen Fällen gelingen, den Uterus allmählig vollständig zu reinvertiren.

In Fällen, wo die Wände des Trichters mit einander verwachsen sind oder die angeführten Methoden keinen Erfolg haben, ist die Amputation des invertirten Uterus gerechtfertigt.

Letztere wird nach vorheriger sorgfältiger Ligation mittelst Messers oder Scheere ausgeführt.

Die Operation erfordert Vorsicht, da mitunter Darmschlingen im Trichter, an demselben adherent, liegen.

**Fibromyoma uteri.** Therapie palliativ oder radical zunächst je nach dem Sitze der Geschwulst.

Submucöse Myome können von der Scheide aus operativ angegangen werden.

Ist das Myom gestielt (fibröser Polyp), so wird durch Contractionen des Uterus der Polyp oft in die Scheide geboren und es gelingt leicht, den Stiel mittelst der Scheere (von Siebold) durchzuschneiden.

Treten jedoch schwere Blutungen auf, während sich das Myom noch in der Uterushöhle befindet, oder sitzt

das Myom mit breiter Basis auf, so ist die Totalexstirpation des Uterus per vaginam oder die Enucleation des Myoma per vaginam nach Spaltung der Kapsel angezeigt.

Ist das Herausschälen des Tumors in toto unmöglich, eventuelle Zerkleinerung und stückweise Entfernung desselben.

Eine begonnene Enucleation muss auch trotz der grössten Schwierigkeiten zu Ende geführt werden, da wegen möglicher Gangrän des zurückbleibenden Tumors eine Sepsis zu befürchten ist.

Bei interstitiellen oder subserösen Myomen findet man mitunter mit palliativen Mitteln sein Auskommen.

Solche sind: Systematische Ergotinbehandlung entweder in Form von täglich zu wiederholenden subcutanen Injectionen, welche jedoch oft heftige Schmerzen und Abscessbildung verursachen oder besser in Form von kleinen Klysmen, die täglich, morgens nach dem Stuhle, von den Frauen selbst applicirt werden können.

Rp. 1652.

*Ergotin. dialys. 10·0,*

*Aqu. dest. 70·0,*

*Acid. salicyl. 0·2,*

*Glycerin. 20·0.*

*D. S. Ein Theelöffel voll mit 2 Esslöffeln*

*Wasser mittelst einer Ballonspritze*

*Nr. 2 ins Rectum zu bringen.*

Rp. 1653.

*Ergotin. bis depurat. 5·0,*

*Aqu. destill. 14·0,*

*Glycerin. 2·0.*

*D. S. Jeden 2. Tag eine Pravaz'sche Spritze  
zu injiciren.*

Rp. 1654.

*Ergotin. dialysat. Bombellon lagenam.*

*D. S.  $\frac{1}{2}$  bis 1 Pravaz'sche Spritze jeden  
2. Tag zu injiciren.*

Statt Ergotin kann Extractum fluidum Hydrastis canadensis. 3mal täglich 15—20 Tropfen intern genommen werden; oder:

Rp. 1655.

*Extract. Gossypiac 25·0.*

*D S. 3mal täglich 15 Tropfen.*

Alle diese Behandlungsmethoden müssen durch Monate fortgesetzt werden.

Anwendung des constanten Stromes nach Apostoli, in der Stärke steigend bis 150—250 Milliampère. Die positive Elektrode wird in Form einer Uterussonde in die Gebärmutterhöhle eingeführt, die negative in Form einer Platte auf die Bauchdecken aufgelegt. Letztere Behandlung bei starken Strömen sehr schmerzhaft, lässt häufig im Stiche

Symptomatisch bei Blutungen Tamponade der Scheide, eventuell des Cervix oder Injection von styptisch wirkenden Medicamenten in die Uterushöhle, wie Liquor Ferri sesquichlorati. Gleichzeitig Ergotin subcutan oder in Klyma.

Gegen die wehenartigen Schmerzen bei myomatösen Polypen Morphiumsuppositorien (S. Rp. 1642). Die Drucksymptome von Seite der Blase und des Mastdarmes werden oft durch Hinaufschieben der Geschwulst in das grosse Becken und Einlegen eines Pessars beseitigt.

Radicale Therapie bei subserösen und interstitiellen Myomen:

I. Castration. Macht das Myom an sich weder durch seine Grösse noch durch seine Lagerung Beschwerden, fordert jedoch die Menorrhagie wegen Erfolglosigkeit jeder anderen Therapie zu einem energischen Eingriffe auf, so macht man die Castration, um eine vorzeitige Menopause herbeizuführen und das Myom zur Schrumpfung zu bringen. Desgleichen bei grosseren Myomen, wenn sie den Nabel nicht überschreiten, wenn die Frauen zu sehr herabgekommen oder eine Myomotomie technisch undurchführbar.

II. Myomektomie bei gestielten subserösen Myomen oder bei kleineren interstitiellen, deren Entfernung ohne Eröffnung des cavum uteri durchführbar ist.

III. Totalexstirpation des myomatösen Uterus per vaginam, wenn noch technisch durchführbar, im anderen Falle

IV. Myomotomie per laparotomiam mit extraperitonealer Stielversorgung.

**Carcinoma uteri. Gebärmutterkrebs.** Sobald die Diagnose feststeht, Totalexstirpation des Uterus per vaginam und keine Theilexcisionen. Bei inoperablen Carcinomen roborirende Diät; gegen die Blutungen und den jauchigen Ausfluss am wirksamsten Excochleation der erweichten Massen mit scharfem Löffel und darauf folgende Cauterisation mit Ferrum candens (Paquelin). Die gesunden Theile der Vagina sind dabei durch Holzspatel oder Wattetampons zu schützen.

Bei profusen Blutungen Irrigation mit Eiswasser oder Liquor Ferri sesquichlorati, der durch ein Röhrenspeculum auf das eingestellte Geschwür eingegossen und einige Minuten dort belassen wird. Nachher Jodoformtamponade. Zur Desodorisation des Ausflusses Einstauben der carcinomatösen Wucherungen mit:

Rp. 1656.

*Jodoform in pulv.,*

*Carb. lign. Tiliae aa 15·0.*

*D. S. Täglich ein Mal einzustauben.*

Fleissige Ausspülungen mit 2%iger Carbollösung oder Kali hypermanganic. (1 : 1000). Ebenso auch:

Rp. 1657.

*Acid. thymic. 1·0,*

*Aqu. dest. 1000·0,*

*Spir. Vin. rectific. 10·0.*

*D. S. 1%ige Thymollösung.*



Oder:

Rp. 1658.

*Calcar chlorat.* 5·0—20·0,

*Aqu. font.* 1000·0.

*D. S. Aeusserlich.*

Gegen die Schmerzen Narcotica, deren Gebrauch jedoch so lange als möglich hinausgeschoben werden soll. Am besten Mastdarmsuppositorien oder kleine Klystiere mit Opiumtinetur:

Rp. 1659.

*Tinct. Opii simpl. gtts.* 15,

*Aqu. font.* 50·0.

*D. S. Klysma.*

Auch Chloralklystiere oft von guter Wirkung:

Rp. 1660.

*Chloral. hydrat.* 6·0,

*Mixt. gummos.* 150·0.

*D. S. Die Hälfte auf ein Klysma.*

Wenn die Carcinommassen den Mastdarm verengern, durch Abführmittel stets breiige Fäces zu erzeugen.

**Stenosis cervicis. Gebärmutterhalsverengung.**

S. Menstruationsanomalien.

**Atresia hymenalis.** S. Menstruationsanomalien.

**Parametritis. Beckenzellgewebsentzündung.** Prophylaktisch antiseptische Leitung der Geburt und des Wochenbettes. Bei frischen Exsudaten Bettruhe und Antiphlogose: Eisblase auf den Leib, Priessnitz'sche Umschläge. Sorge für regelmässige und leichte Stuhlentleerung. (Bei complicirender Peritonitis keine Abführmittel). Leichte, kräftige Diät, an Alkohol reiche Weine, Cognac, pur oder gemischt mit Milch, russischer Thee etc.

Bei bestehenden Diarrhoen Opiato.

Bei älteren Exsudaten resorptionsbefördernde Mittel wie: Einpackungen des Leibes, respective der Becken-

gend in feuchtwarme Umschläge, Soolsitzbäder, heisse Scheidenirrigationen, Jodpraeparate.

Die Soolsitzbäder werden am besten Abends genommen. Man setzt zu einem Sitzbade  $\frac{1}{2}$ —1 Kilogr. Hal-leiner oder Ebenseer Mutterlaugensalz oder Darkauer oder Haller Jodsalz, welches vorher in einer geringen Menge heissen Wassers gelöst wurde. Das Bad soll eine Temperatur von  $26^{\circ}$ — $30^{\circ}$  R. haben (bei frischeren Exsudaten kühler, bei älteren wärmer). Die Patientin bleibt 10—20 Minuten gut umhüllt im Bade und wird aus dem Bade direct ins Bett gebracht, wo sie abgetrocknet und in wärmende Decken gehüllt wird. Anfangs 3 Sitzbäder in der Woche, später, wenn sich Patientin wohler fühlt, bis zu einem Sitzbad täglich zu steigen.

Die Scheidenirrigationen werden am besten im Soolsitzbade von der Patientin selbst vorgenommen. Man nimmt hiezu Wasser von  $32$ — $38^{\circ}$  R. und verbraucht zu einer Ausspülung eine Menge von 5—8 Litern. Ebenso wie nach dem Bade hat die Frau auch nach der Irrigation (wenn selbe auch nicht im Sitzbade vorgenommen wurde) 2 Stunden wohlzugedeckt im Bette zu bleiben.

Die feuchtwarmen Einpackungen können permanent liegen bleiben. Zu denselben wird entweder reines Wasser oder Wasser mit einem Zusatz von Soole oder Mattoni's Moorsalz oder Moorlauge verwendet.

Sehr beliebt sind Jodpräparate in verschiedenster Anwendungsweise. Bepinseln des Abdomens und des Scheidengewölbes mit:

Rp. 1661.

*Tinct. Jodi,*  
*Tinct. Gall. aa* 25·0.  
*D. S. Zum Bepinseln.*  
Oder mit:

Rp. 1662.

*Jod. pur.* 0·3,  
*Kali jodat.* 3·0,  
*Glycerin.* 30·0.  
*D. S. Jodglycerin.*

Oder Bestreichen des Abdomens mit:

Rp. 1663. *Jodoform. pulv.* 4·0,  
*Ungu. emoll.* 20·0.  
*D. S. Jodoformsalbe.*

Dasselbe zum Bestreichen eines Scheidentampons  
In neuerer Zeit viel verwendet Ichthyolglycerin (1 : 10)  
zur Tamponade.

Ferner Jodkalisuppositorien:

Rp. 1664.

*Kali iodat.* 5·0,

*Butyr. Cacao* 20·0.

*M. f. supposit. rectal. No. 10.*

*D. S. Abends ein Stück in den Mastdarm ein-  
zuführen.*

Bei älteren Exsudatresten, insbesondere bei parametranen Narbensträngen leistet eine systematische Massagekur die besten Dienste.

Grosse Exsudate, welche sich der Oberfläche irgendwo so nähern, dass Fluctuation nachgewiesen werden kann, können incidirt und nach chirurgischen Regeln behandelt werden.

**Perimetritis. Pelveoperitonitis. Beckenbauchfell-entzündung.** Prophylaktisch sorgfältige Antisepsis bei Geburten, Aborten und jedem intrauterinen Eingriff.

Die Behandlung der acuten Perimetritis stimmt im Wesentlichen mit der der acuten Parametritis überein.

Bei der chronischen Form der Perimetritis (zumeist gonorrhoeischen Ursprungs) Massage der vorhandenen Adhäsionen nach Thure-Brandt. Contraindicirt ist dieselbe bei Vorhandensein von Pyosalpinx, weshalb vorher immer eine genaue gynaekologische Untersuchung vorzunehmen ist. Eventuell Lösung oder Dehnung perimetritischer Adhäsionen in Narkose nach B. S. Schultze. (Vorsicht wegen Gefahr einer Blutung!)

Badekuren in Franzensbad, Hall, Darkau, Jastrzemb, Kreuznach etc.

Führen alle diese Behandlungsmethoden nicht zum Ziele, Lösung der Adhäsionen und Castration per laparotomiam.

**Salpingitis und Oophoritis. Eileiter- und Eierstock-entzündung.** Da die Symptome der acuten Salpingitis und Oophoritis durch jene der fast immer gleichzeitig bestehenden Entzündungen der übrigen Beckenorgane gedeckt werden, entfällt eine specielle Therapie.

Die chronischen Formen einer Oophoritis und Salpingitis, zumeist Theilerscheinungen der ascendirenden Gonorrhoe, bessern sich häufig, jedoch nicht für lange Zeit, auf Bettruhe, Enthaltung vom Coitus, Dunstumschläge, warme Sitzbäder und Behandlung der ursächlichen (gonorrhoeischen) Kolpitis und Endometritis. Bei Schwellung und Adhärenz des entzündeten Ovariums hat die Massage nach Thure Brandt sehr gute Erfolge. Dieselbe darf jedoch nicht zur Anwendung kommen, wenn gleichzeitig Pyosalpinx besteht.

Nichtsdestoweniger ist oft genug, insbesondere bei Personen, die nicht für Jahre arbeitsunfähig sein können oder wollen, schliesslich die Adnexenextirpation per laparotomiam nothwendig.

**Haematokele retrouterina.** In frischen Fällen muss man dahin wirken, dass die vorhandene innere Blutung stille stehe, daher absolute Bettruhe, locale Kälteeinwirkung durch Umschläge und Scheidenausspülung, regelmässige Entleerung des Darmes und der Blase.

Wenn dieses durch 8 Tage hindurch geschehen, ohne dass sich die Erscheinungen steigern, kann man annehmen, dass die Blutung zum Stillstand gekommen.

Man kann dann nach einiger Zeit daran gehen, die Resorption durch Massage zu befördern, wodurch gleichzeitig die etwa hervorgerufenen perimetritischen Adhäsionen, sowie die Lageveränderung des Uterus behoben werden können.

Wenn jedoch die Blutung nicht steht, die Schmerzen immer heftiger werden, die Anämie immer gefahrdrohender sich gestaltet oder Fieber eintritt — ist Laparotomie indicirt.

## Menstruationsanomalieen.

**Amenorrhoe** Erforschung der ursächlichen Momente und deren Behebung. Etwa vorhandene Chlorose durch entsprechende Behandlung zu heilen, etwaige Hypoplasie des Uterus durch häufige Sondirung, Massage und „Kreuzbein-Klopfungen“ nach Thure-Brandt zu behandeln.

Bei schwächlichen, herabgekommenen Individuen roborende Diät, Landaufenthalt, Seebäder etc. Markirt sich bei sonst gesunden, nicht anämischen Frauen die „Menstruation“, ohne dass es zu Blutausscheidung kommt, durch Übelbefinden, Kopfschmerzen etc., so macht man gerade zu dieser Zeit Blutentziehungen aus der Portio, heisse Fussbäder und heisse Irrigationen.

Bei relativer Amenorrhoe in Folge von *Atresia hymenalis* (*Haematokolpos*, *Haematometra*, *Haematosalpinx*) Incision des Hymen und langsames Abfliessenlassen des angesammelten Menstrualblutes. (Zur Beschleunigung des Abflusses ist kein Druck auf das Abdomen auszuüben.)

Allenfalls höher gelegene Atresien operativ zu beseitigen.

**Dysmenorrhoe:** Erforschung und Behebung der ursächlichen Momente. Stenosen des Cervix sind durch unblutige Erweiterung mit Hegar'schen oder Laminaria Stiften oder auf blutigem Wege durch Discission zu beseitigen. Bei Stenosen des inneren Orificiums wirkt am besten der constante Strom: Man führt die negative Elektrode in Form einer Aluminiumsonde in den Uterus, während die breite positive Elektrode auf das Abdomen zu liegen kommt. Man lässt Stromstärken von 20–40 Milliampères durch 5 Minuten einwirken und wiederholt die Sitzungen alle 8 Tage. Lageveränderungen der Gebärmutter sind entsprechend zu behandeln. (Siehe Ante- und Retroflexio) Gegen die dysmenorrhöischen Schmerzen, besonders bei *Virginibus* symptomatisch: *Narcotica*, feuchtwarme Umschläge etc.

Bei Dysmenorrhoea membranacea intrauterine Ätzungen mit Jodtinctur oder Liquor Ferri sesquichlorati neutral. mittelst der Playfair'schen Sonde oder Abrasio mucosae.

Menorrhagia. Behandlung je nach Aetiologie verschieden.

Bei Jungfrauen, bei denen eine locale Therapie sehr schwierig, zunächst symptomatisch absolute, auch geistige Ruhe während der Menstruation, Enthaltung von Spirituosen, Kaffee, Thee, etc., Regelung des Stuhlganges; medicamentös Extract. fluid. Hydrastis canadensis (s. Rp. 1650) durch 2—3 Wochen zu gebrauchen oder Secale in Form von Klysmen (s. Rp. 1649) am besten die letzten 8 Tage vor erwartetem Eintritte der Menstruation und während derselben täglich einmal zu appliciren. Auch Extractum fluidum Gossypii, 3mal täglich 1 Theelöffel, wirkt oft recht gut.

Ausserdem Hautreize wie kalte Abreibungen, Seebäder. Eine eventuelle Chlorose oder Anämie entsprechend zu behandeln.

Nach Erschlaffung des Uterus in Folge rasch auf einander folgender Geburten oder Aborten (chronischer Uterusinfarct) ebenfalls systematische Ergotinbehandlung mittelst Klysmen. Intrauterine Aetzungen mit Jodtinctur, Liquor Ferri sesquichlor. neutral.

Oft von sehr gutem Erfolge die Apostoli'sche Methode der elektrischen Ausätzung der Uterusschleimhaut. Bezüglich der Menorrhagien bei Endometritis, Schleimpolypen, Myomen siehe die betreffenden Capitel.





Aus

**Professor Dr. Moriz Kaposi's**

**Klinik und Ambulatorium für Hautkrankheiten.**

(Revidirt von Dr. Eduard Spiegler.)

**Acne rosacea. Kupferrose. Rhinophyma. Pfund-  
nase.** Berücksichtigung des Causalmoments; Behand-  
lung des Grundleidens. Namentlich Untersuchung auf  
Genitalaffectionen bei Frauen und entsprechende  
Behandlung derselben. Bei Chlorose Eisen, Arsen  
(Roncegno- oder Levico-Wasser), kräftige Diät, starke  
Weine. Fluss- und Seebäder etc. Bei Dyspepsie Bitter-  
mittel, alkalische Wasser oder Alkalien in Pulver, z. B.:

Rp. 1665.

*Natr. bicarbonic.,*

*Natr. phosphoric.,*

*Magnes. carbonic. aa 10 0,*

*Sacch. alb.,*

*Elaeosacch. Macidis aa 15 0.*

*M. Da in scatul.*

*S. 3mal täglich 1 Kaffeelöffel.*

Bei Potatoren methodische Einschränkung des Alkohol-  
genusses.

Local, wenn bloss Knoten bestehen, Auflegen von  
Emplast. Hydrargyri oder Einpinselung von Schwefel-  
pasten für die Nacht und Schminksalben bei Tag, wie  
bei Acne vulgaris (s. das.) oder Einpinselung von Jod-  
glycerin (s. Rp. 1679) durch 4 Tage 2—3mal täglich.

Bei starker Röthung, Teleangiectasieen,  
derben Knoten wiederholte, methodische Scarificatio-  
nen: Mittelst eines feinen Scalpells oder der Vidal'schen

Scarificationslanze werden rasch hintereinander zahlreiche, dicht bei einander stehende parallele Schnitte und ebenso zu diesen senkrecht stehende Schnitte ausgeführt, oder Stichelung, zahlreiche Stiche mit der Hebra'schen Stichel-  
nadel. Nach Stillung der Blutung durch festes Anpressen von Bruns'scher Watte kalte Umschläge oder eine einfache Salbe. In neuerer Zeit statt der Scarificationen auch elektrolytische Acupunctur nach Lustgarten. Bei Rhinophyma schichtenweises Abtragen der Knollen mit dem Messer oder operative Entfernung durch Ex-  
cision, Abschnüren etc.

**Acne varioliformis.** Waschen der erkrankten Stellen mit Seifengeist, dann die Haut abzutrocknen. Darauf:  
Rp. 1666.

*Merc. praecip. alb. 5·0,*

*Ungu. simpl.\*) 50·0.*

*D. S. Dünn einzuschmieren, darüber ein Poudre.*

Bei Sitz der Erkrankung an Stirne oder Gesicht Auf-  
legen von grauem Pflaster.

**Acne vulgaris. Finnen.** Zunächst die vorhandenen Abscesschen mittelst Spitzbistouris zu incidiren und der Eiter zu entleeren; dies geschieht in mehreren Sitzungen je nach der Menge der Eiterherde. Nach jeder Sitzung kalte Umschläge. Erst wenn die fluctuirenden Knoten beseitigt, medicamentöse Behandlung der Acne. Dieselbe besteht in Folgendem: Abends die Haut mit fester oder flüssiger Glycerinseife, Schwefelsandseife,

---

\*) Statt der bei den einzelnen Salben Recepten angegebenen Constituentia können auch andere gewählt werden, z. B. statt Unguent. simpl. kann gegeben werden Lanolini, Vaselini *aa.* Für den behaarten Kopf eignen sich am besten Unguent. pomadinum oder Ungu. emoll. Neuestens wird vielfach das von Pick angegebene Linimentum exsiccans (Tragacanthi 5·0, Glycer. 2·0, Aqu. destill. 100·0) als Constituens angewendet.

Es empfiehlt sich, die mit Salben bestrichenen Körperstellen noch mit Amylum zu bestreuen.

Spir. sapon. Kalin., Naphtolseife oder Jodschwefelseife unter energischem Frottiren zu waschen, dann entweder der Schaum über Nacht liegen zu lassen (bei geringeren Graden verwendet man da Spir. sapon. Kalin. oder Glycerinseife, bei stärkeren eine Schwefelseife oder Naphtolseife); oder nach der Seifenwaschung die Haut mit Wasser abzdouchen und abzutrocknen und nur eine der folgenden Pasten mit Borstenpinsel einzureiben und über Nacht liegen zu lassen: eventuell darüber Flanell aufzulegen.

Rp. 1667.

*Lact. Sulfur. 10·0,*  
*Spir. vin. Gallic. 50·0,*  
*Spir. Lavandul. 10·0,*  
*Glycerin. 1·0.*

*D. S. Paste, gut aufgeschüttelt einzupinseln.*

Rp. 1668.

*Lact. Sulfur.,*  
*Kal. carbonic.,*  
*Glycerin.,*  
*Spir. vin. Gallic.,*  
*Aqu. Naphae aa 10·0.*  
*S. Der Bodensatz dünn*  
*einzupinseln.*

Bei höheren Graden:

Rp. 1669.

*Sulfur. citrin. 10·0,*  
*Spir. sapon. Kalin. 20·0,*  
*Spir. Lavandulae 60·0,*  
*Balsam. peruvian. 1·5,*  
*Spir. camphorat. 1·0,*  
*Ol. Bergamolt. gtts. 5.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

Rp. 1670.

*Lact. Sulfur. 10·0,*  
*Kal. carbonic. 5·0,*  
*Spir. sapon. Kalin. 20·0,*  
*Glycerin. 50·0,*  
*Ol. Caryophyllor.,*  
*Ol. Menth. pip.,*  
*Ol. Rosmarin. aa 1·0.*  
*D. S. Gut aufgeschüttelt*  
*einzupinseln.*

Viel verwendet auch:

Rp. 1671.

*Naphthol. pur. 1·0,*  
*Flor. Sulfur. 10·0,*  
*Spir. vin. rectific. 50·0,*  
*Spir. sapon. Kalin. 15·0,*  
*Glycerin. 5·0.*  
*D. S. Der Bodensatz*  
*Abends mittelst Borsten-*  
*pinsels aufzutragen.*

Auch das Kummerfeld'sche Wasser kann benützt werden:

Rp. 1672.

*Lact. Sulf.* 6·0,  
*Camphor. ras.* 0·5,  
*Mucil. gumm. Arab.* 3·0.  
*Subige et admisce:*  
*Aqu. Calc.,*  
*Aqu. Rosar. āā* 50·0.  
*D. S. Gut umgeschüttelt*  
*aufzutragen.*

Ebenso die Unna'sche  
 Essigsäure-Paste:

Rp. 1673.

*Kaolin.* 20·0,  
*Glycerin.* 15·0,  
*Acet. vin.* 10·0,  
*Ol. Bergamott. gtts.* 3.  
*D. S. Wie das Vorige.*

Am nächsten Morgen die Paste oder der Seifenschaum abzuwaschen und nun die Haut mit einer Salbe in dünner Schichte bis zum Verschwinden einzuschmieren, darüber Poudre einzustreuen, das Ganze dann leicht abzuwischen. Als Salbe benützt man Zinksalbe, Ungu. Wilsonii oder etwa eine der folgenden:

Rp. 1674.

*Zinc. oxydat.* 20·0,  
*Ungu. emoll.* 100·0,  
*Ol. Resedae* 2·0,  
*Ol. Rosar. gtts.* 5.  
*D. S. Salbe.*

Rp. 1675.

*Magist. Bismuth.,*  
*Zinc. oxydat. āā* 5·0,  
*Ungu. emoll.* 50·0,  
*Ol. Naphae gtts.* 4.  
*D. S. Salbe.*

Rp. 1676. *Ungu. emoll.* 50·0,  
*Zinc. oxydat.* 5·0,  
*Glycerin. pur.* 1·5,  
*Tinct. Benzoës* 1·0.  
*D. S. Salbe.*

Als Poudre die unter Eczema (s. S. 496 f. Rp. 1713, 1714) erwähnten Streupulver od. das sog. Damenpulver:

Rp. 1677. *Pulv. lapid. Baptistae,*  
*Talc. venet.,*  
*Amyl. Oryzae āā* 30·0,  
*Zinc. oxydat.* 10·0,  
*Ol. Neroli gtts.* 2,  
*Ol. Rosar. gtts.* 4.  
*D. S. Poudre.*

Oder *Eau de princesse* (nach Hebra):

Rp. 1678.

*Bismuth. carbon. bas.* 10·0,

*Talc. venet. pulv.* 20·0,

*Aqu. Rosar.* 70·0,

*Spir. Colon.* 30·0.

*D. S. Der Bodensatz einzupinseln.*

In hochgradigen Fällen statt der erwähnten Seifen- und Pastenbehandlung auch Bepinselung der erkrankten Stellen mit Jodtinctur oder Jodglycerin.

Rp. 1679.

*Jod. pur.,*

*Kal. iodat. āā* 5·0,

*Glycerin.* 10·0.

*D. S. 2mal täglich einzupinseln, durch 3—6 Tage.*

Nach Abstossung des Schorfes die erwähnten Salben und Poudres anzuwenden.

Weniger energisch wirkt die Lassar'sche Schälpaste:

Rp. 1680.

*Naphtol.* 20·0,

*Sulf. praecip.* 100·0,

*Lanolin.,*

*Sapon virid. āā* 50·0.

*D. S. Paste; aufzustreichen u. durch  $\frac{1}{4}$  Stunde liegen zu lassen.*

Bei Theer-, Jod- und Bromacne Aussetzen der betreffenden Medicamente, bei sehr starker Entzündung Kälte, bei Nassen Zinksalbe, Bleisalbe etc.

**Alopecia. Haarschwund.** Behandlung ursächlicher Chlorose, Anämie, Lues, Dyspepsie etc. Bei zu Grunde liegender Seborrhoe zunächst die Schuppen zu erweichen und durch Seifenwaschung zu entfernen (s. „Seborrhoea“. S. 533); dann wöchentlich 1—2mal die Kopfhaut mit Seifengeist zu waschen. Die Kopfhaut bei allen Formen von Alopecie täglich 1—2mal mit alkoholischen Lösungen einzupinseln, wie:

Rp. 1681. *Acid. salicyl.* 4·0,

*Spir. vini.* 100·0,

*Spir. Lavand.,*

*Spir. Coloniens. āā* 50·0.

*D. S. Täglich damit die Kopfhaut mittelst Borstenpinsels einzureiben.*



Rp. 1682.

*Tinct. Benzoës* 2·0,  
*Acid. salicylic* 5·0,  
*Spir. vin. Gallic.* 200·0.  
*D. S. Aeusserlich.*

Rp. 1683.

*Tinct. Aconit. (od. Cap-*  
*sic.)* 1·0,  
*Spir. vin. Gallic.* 200·0,  
*Balsam. peruvian.* 3·0.  
*D. S. Aeusserlich.*

Wegen der hiedurch entstehenden Trockenheit der Haut Gebrauch von Pomaden, wie:

Rp. 1684.

*Chinin. pur.* 1·0,  
*Acid. tannic.* 2·0,  
*Ungu. emoll.* 100 0,  
*Ol. Resedae,*  
*Ol. Naphae aa* gtts. 3  
*D. S. Pomade.*

Rp. 1685.

*Merc. praecip. alb.* 5·0,  
*Ungu. emoll.* 50·0,  
*Tinct. Benzoës* 1·0,  
*Ol. Rosar. gtts.* 5.  
*D. S. Pomade.*

Oder:

Rp. 1686.

*Extr. Chin.* 5·0,  
*Bals. peruvian.* 2·0,  
*Ungu. emoll.* 50·0.  
*D. S. Pomade.*

Oder die Dupuytren-  
sche Pomade:

Rp. 1687.

*Medull. ossium* 75·0,  
*Extr. Chin. frig. par.* 10·0,  
*Tinct. Cantharid.,*  
*Succ. Citri aa* 5·0,  
*Olei de Cedro,*  
*Ol. Bergam. aa* gtts. 10·0.  
*D. S. Pomade.*

**Angioma. Teleangiectasia. Gefässgeschwulst.**

Flache Teleangiectasieen durch Scarification zu veröden s. „Aene rosacea“ S. 485 f.), tumorenartig hervorstehende mittelst scharfen Löffels auszukratzen. Bei *Tumor cavernosus* Kälte, Compressiv-Verband oder Einspritzung einiger Tropfen von *Liqu. Ferr. sesquichlorat.*; auch Zerstörung durch Elektrolyse; sehr zweckmässig auch bei angeborenen kleinen Angiomen Einimpfung von *Vaccine-Lymphe* in dieselben statt in die Arme. Endlich Actzung mit rauchender Salpetersäure oder Zerstörung durch Paquelin; Auflegen eines ätzenden Pflasters, wie:

Rp. 1688.

*Tartar. stibiat. 0·75,*

*Empl. Diachylon simpl. 5·0.*

*M. f. empl.*

*D. S. Pflaster.*

Gestielte Geschwülste mittelst elastischer Ligatur abzubinden.

**Anthrax. Carbunkel.** Möglichst frühzeitig zahlreiche, tiefe Incisionen nach der Länge und Quere. Antiseptischer Verband. Chinin, reichlich Alcoholica.

**Canities. Ergrauen der Haare.** Künstliche Färbung der Haare: Vor der Application des Haarfärbemittels der Haarboden mit Seife gut zu waschen. Man nimmt dann zum Schwarzfärben:

Rp. 1689.

*Argent. nitric. 1·0,*

*Ammon carbon. 1·5,*

*Ungu. emoll. 30·0.*

*D. S. Die Haare damit zu bürsten; danach die umgebende Haut mit Kochsalzlösung zu waschen.*

Oder:

Rp. 1690.

*Argent. nitric. 1·25,*

*Aqu. dest. 60·0,*

*Liqu. Hydrarg. nitr. oxyd.,*

*Spir. Resedae aa 5·0,*

*D. S. Wie das Vorige.*

Rp. 1691.

*Argent. nitric. 5·0,*

*Plumb. acetic. 1·0,*

*Aqu. Rosar. 100·0,*

*Spir. Colon. 2·0.*

*D. S. Wie das Vorige.*

Zu combinirter Anwendung, wodurch verschiedene Farbennuancen hervorgebracht werden können, dienen:

Rp. 1692.

*Argent. nitric. 5·0,*

*Aqu. dest. 50·0.*

*S. No. 1.*

Rp. 1693.

*Acid. pyrogall. 3·0,*

*Aqu. dest. 40·0,*

*Spir. vin. rectific. 10·0.*

*S. No. 2.*

(Zuerst No. 1 einzubürsten nach dessen Eintrocknen No. 2.) Ebenso:

Rp. 1694

*Argent. nitric. fus. 8·0,*

*Aqu. dest. 70·0.*

*S. No. 1.*

## Rp. 1695.

*Hepat. sulfur.* 8·0,*Aqu. dest.* 70·0.*S. No.* 2.

Zur Braunfärbung  
verwendet man:

## Rp. 1696.

*Acid. pyrogall.* 1·0,*Aqu. Rosar.* 40·0,*Spir. Coloniens.* 2·0.*D. S. Einzubürsten.*

Die Anwendung all'  
dieser Haarfärbemittel er-

heischt jedoch Vorsicht und  
praktische Erfahrung. Uebri-  
gens wird durch alle fetten  
Oele das Haar dunkler ge-  
färbt; man kann dieselben  
also als Pomade benützen,  
z. B.:

## Rp. 1697.

*Vitell. Ovor.,**Medull. oss. bovinum ad* 20·0*Ferr. lactic.* 1·5,*Ol. Cassiae aeth.* 1·0.*D. S. Pomade.*

**Carcinoma epitheliale cutis. Hautkrebs.** Behand-  
lung ähnlich wie bei *Lupus vulgaris* (s. S. 515 ff.) Bei  
flachen, nicht zu tief reichenden Knoten Auskratzung  
mit scharfem Löffel oder Herausgrabung mit Lapisstift,  
Chlorzink- oder Kalistift; Auflegen der Cauquoia'schen  
Paste (Rp. 1801) oder der *Pasta viennensis*:

## Rp. 1698.

*Kal. caustic. pulv.* 5·0.*Da ad lagen.**S. Aetzkali.*

## Rp. 1700.

*Spir. vin. rectificat.* 10·0.*D. S. Alkohol.*

## Rp. 1699.

*Calcar. caustic. pulv.* 5·0.*Da ad lagen.**S. Aetzkalk.*

Die ersten 2 Substanzen werden in der Reibschale  
verrührt und unter Zusatz des Spiritus zu einer Paste  
angerührt. Dieselbe wird mittelst Spatels oder Löffels  
auf die erkrankte Stelle aufgelegt, nachdem die Um-  
gebung derselben mit Heftpflasterstreifen belegt worden,  
und 10 Minuten liegen gelassen, dann mit reichlichem  
Wasser abgewaschen. Ebenso auch Arsenik-Paste und  
10<sup>o</sup>ige Pyrogallussalbe (s. „*Lupus vulgaris*“, Rp. 1806—  
1808), die auf Leinwand gestrichen durch 3–6 Tage zu  
*appliciren* sind, sowie Aetzung mit Milchsäure.

Tiefgreifende Knoten am besten mit dem **Messer** zu exstirpiren oder durch Paquelin oder Galvanokaustik zu zerstören. Bei sehr ausgebreiteten, jauchenden Carcinomen Aetzmittel; die obengenannten oder auch, zur Anwendung auf beschränkte Stellen:

Rp. 1701.

*Creosot. 20·0,*

*Acid. arsenicos. 0·3,*

*Opii pur. 0·15,*

*Pulv. rad. Liqu. q. s. ut f. pasta consist. spissior.*

*D. S. Auf Leinwand aufgestrichen zu appliciren.*

**Chloasma. Pigmentflecke. Ephelides. Sommersprossen.** Am raschesten wirkend, aber ziemlich schmerzhaft ist die Sublimatbehandlung: Das Gesicht des horizontal lagernden Kranken mit genau anpassenden Leinwandflecken zu bedecken, dieselben mit einer wässerigen oder alkoholischen 1<sup>o</sup>/<sub>10</sub>igen Sublimatlösung zu betupfen und durch 4 Stunden damit feucht zu erhalten. Die entstandenen Blasen einzustechen. Danach durch 8 Tage bis zum Abfallen der Epidermiskruste Gebrauch eines Poudres. Aehnlich, aber ebenfalls stark Entzündung erregend wirken auch Bepinselungen mit Jodtinctur, Jodglycerin, Schwefelpasten in einem Cyclus von 6—12 Einpinselungen (s. „Acne vulgaris“, S. 486 ff.).

Langsamer wirken tägliche Waschungen mit Seifengeist, Einpinselung von verdünnter Salz- oder Essigsäure, oder:

Rp. 1702.

*Spir. sapon. Kalin. 50·0,*

*Naphtol. 2·0,*

*Glycerin. 1·0.*

*M. D. S. Täglich damit  
das Gesicht zu waschen.*

Für elegantere Praxis  
eignen sich:

Rp. 1703.

*Emuls. Amygdal. 100·0,*

*Tinct. Benzoës. 5·0,*

*Mercur. sublim. corrosiv.  
0·05,*

*(od. Veratrin. 0·1),*

*Aqu. Naphae 50·0.*

*D. S. Zum Waschen.*

Oder Salben, wie:

Rp. 1704.

*Mercur. praecip. alb.,*  
*Borac. venet. āā 5·0,*  
*Ungu. emoll. 50·0,*  
*Ol. Rosar.,*  
*Ol. Naphae āā gtts. 5.*  
*D. S. Abends auf Leinwand gestrichen auf-*  
*zulegen und über Nacht liegen zu lassen.*

Rp. 1705.

*Acid. salicylic. 2·0,*  
*Ungu. emoll. 40·0,*  
*Tinct. Benzoës 1·0.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

Rp. 1706.

*Acid. boric.,*  
*Cer. alb. āā 5·0,*  
*Paraffin. 10·0,*  
*Ol. Amygdal. 30·0.*  
*M. f. ungu. Adde:*  
*Ol. Rosar.,*  
*Ol. Resedae āā gtts. 3.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

Wenn die Haut roth und schuppig geworden, Schminksalben und Poudres (s. „Acne vulgar.“). Ein gutes Schminkpulver ist auch:

Rp. 1707.

*Bismuth. carbon. basic.*  
*10·0,*  
*Talc. venet. pulv. 20·0,*  
*Baryt. sulf. praecip. 30·0,*  
*Ol. Rosar. gtts. 2.*  
*D. S. Poudre.*

Als Schminksalbe neben den bereits (bei „Acne vulgaris“ Rp. 1674—1676) erwähnten empfehlenswerth:

Rp. 1708.

*Bismuth. chlor. praecip.*  
*5·0,*  
*Baryt. sulf. praecip. 10·0,*  
*Cerae alb. 3·0,*  
*Ol. Amygdalar. recent.*  
*press. 7·0.*  
*D. S. Salbe.*

## Clavus s. Tyloma.

**Combustio. Verbrennung.** Bei Verbrennungen ersten Grades genügen Umschläge mit kaltem Wasser, Liqu. Burowi (s. Rp. 1718) oder Aqu. Goulardi, Einstreuen von Amylum, bei geringer Ausdehnung Bepinseln mit Collodium. Beim zweiten Grade, bei Blasenbildung, Anstechen der Blasen an der Basis, sanftes Ausdrücken mit in Poudre getauchten Charpieballen, die Blasendecke zu erhalten.

Bei Verbrennung dritten Grades Einhüllung der Brandwunden in Leinwandflecke, die getränkt sind mit Olivenöl oder mit:

Rp. 1709.

*Aqu. Calcis,*  
*Ol. Lini aa 50·0.*  
*S. Aeusserlich.*

Dieser Verband wird einige Tage liegen gelassen und häufig durch Betupfen mit einem der erwähnten Oele befeuchtet. Sobald Eiterung eingetreten (nach 3—5 Tagen), der Verband zu wechseln und nunmehr täglich zu erneuern.

Bei ausgedehnten Verbrennungen am besten das Hebra'sche Wasserbett, in Privathäusern mittelst einer langen Wanne, die mit Wolldecken und Rosshaarkissen ausgekleidet wird, herzustellen. Das Wasser stets auf einer dem Kranken angenehmen Temperatur zu erhalten und täglich 2—3mal zu erneuern. Wo die Wasserbehandlung nicht durchzuführen, die Brandwunden nach Ablösung der Schorfe mittelst entsprechender Deckmittel zu behandeln und fleissig zu reinigen; solche Mittel sind Zinksalbe, Bleiweissalbe etc. Ebenso auch die Lister'sche Carbolpasta:

Rp. 1710. *Acid. carbolic. 10·0,*  
*Ol. Olivar. 80·0,*  
*Cret. alb. 20·0.*  
*D. S. Aeusserlich.*

Jodoformbehandlung durchaus entbehrlich.



Bei dem sehr häufig vorkommenden zu tippigen Wuchern der Granulationen Aetzung derselben mit Lapisstift oder mit:

Rp. 1711.

*Argent. nitric.*,  
*Aqu. dest. aa* 20·0.  
*Da in vitr. nigro.*  
*S. Zum Bepinseln.*

Vor der Anwendung dieser Aetzungen die Wunde immer

mit 5%iger Cocaïnlösung zu bestreichen. Nach der Aetzung die Wunde zu bedecken mit:

Rp. 1712.

*Argent. nitric.* 0·15 — 0·5,  
*Ungu. emoll.* 50·0.  
*D. S. Salbe.*

**Comedones. Mitesser.** Behandlung etwa vorhandener Anämie, Scrophulose etc. Die Comedonen durch Ausdrücken mittelst der Daumennägel, eines Uhrschlüssels oder des Hebra'schen oder Lang'schen Comedonenquetschers zu entfernen. Nebstdem Seifenwaschungen, Einpinselung mit Schwefelpasten (s. „Acne vulgaris“, S. 487).

**Condylomata s. Verrucae.**

**Congelatio. Erfrierung.** Frottiren der erfrorenen Theile mit Schnee, allmähliches Erwärmen derselben. Amputation erfrorener Extremitäten im Allgemeinen bis zur Begrenzung der Gangrän zu verschieben.

**Eczema. Nässende Flechte.** a) Beim acuten Ekzem Fernhaltung aller äusseren Reize, vor Allem des Wassers. Patient darf die ekzematösen Stellen nicht waschen, Bäder, Seifenapplication zu untersagen. Directe Sonnenbestrahlung, ebenso wie feuchte Luft zu meiden, Patient soll, wenn möglich, das Zimmer hüten. Auch Reizung durch die Kleider hintanzuhalten, daher darf kein gestärktes Hemd getragen werden. Die ekzematösen Stellen, namentlich die Hautfalten, mit einem Poudre zu bestreuen, wie Amylum Oryzae oder Tritici, Semen Lycopodii, Talcum venetum, Pulvis lapid. Baptistae etc.,

allenfalls mit Zusatz von Cerussa, Oxyd. Zinci, Magister. Bismuth. etc. Aetherische Oele dürfen dem Streupulver nicht zugesetzt werden, dasselbe nur mit Pulv. rad. Ireos florentin. zu parfumiren. Ein eleganter Poudre wäre z. B.:

**Rp. 1713.**

*Amyl. Oryzae* 100·0,  
*Pulv. Alumin. plumos.*  
 20·0,  
*Zinc. oxydat.,*  
*Pulv. rad. Ireos florent.*  
 aa 5·0.  
*D. S. Poudre.*

**Oder:**

**Rp. 1714.**

*Zinc. oxydat.,*  
*Magist. Bismuth. aa 5·0,*  
*Ceruss. 2·5,*  
*Talc. venet. pulveris.,*  
*Amyl. Oryzae aa 50·0.*  
*D. S.. Poudre.*

Diese Streupulver auf freie Hautstellen einfach mittelst eines Wattebausches (Poudrequaste) einzustreuen, in intertriginöse Hautfalten mit dem Poudre dicht bestreute Plumasseaux aus Watte einzuführen, und sobald sie warm und feucht werden, zu wechseln.

Bei acutem Eczema papulosum Betupfen mit einem alkoholischen Mittel, darüber sogleich Poudre.

**Rp. 1715.**

*Acid. carbolic. (od. salicylic., boric.) 1·0,*  
*Spir. vin. Gallic. 150·0,*  
*Spir. Lavandul.,*  
*Spir. Coloniens. āā 25·0.*  
*D. S. Zum Eintupfen.*

Bei zerstreutem, papulösem Ekzem ohne das geringste Nässen wirkt oft noch günstiger:

**Rp. 1716.**

*Tinct. Rusci 50·0.*  
*D. S. Mittelst Borstenpinsels dünn einzupin-*  
*seln, darüber Poudre.*

Kommt es bis zur Entwicklung von Bläschen und Krusten, bei universeller Ausbreitung der Kranke vollständig entkleidet, am ganzen Körper reichlich ein-

gepoudert ins Bett zu legen, nur mit einem ebenfalls mit Poudre bestreuten Leintuch zuzudecken. In die Achsel-, Genital-, Analfalten etc. Watte mit Streupulver bestreut einzulegen. Das Einpoudern fleissig zu erneuern; Krusten mit der trockenen Watte wegzuwischen.

Bei intensiver Entzündung der Haut mit starker Schmerzhaftigkeit Kaltwassereinhüllungen, Leiter'scher Kühlapparat, oder Umschläge mit:

Rp. 1717.

*Plumb. acetic. bas. solut.*  
10·0,

*Aqu. font. 500·0.*

*S. Zu Umschlägen.*

Oder der Liquor Bur-  
rowi:

Rp. 1718.

*Plumb. acet. 5·0,*

*Alum. crud 25·0,*

*Aqu. dest. 500·0.*

*D. S. Mit der 5—10-  
fachen Menge Wassers  
verdünnt zu Umschlä-  
gen.*

Gut wirkt auch oft:

Rp. 1719

*Acid. thymic. 1·0,*

*Aqu. dest. 1000·0.*

*S. Zu Umschlägen.*

Im Stadium der Decrustation entsprechende Salben,  
wie die Hebra'sche Diachylon-Salbe:

Rp 1720

*Lithargyr. 100·0,*

*Ol. Olivar. 400·0.*

*Sub leni igni et addendo pauxill. aqu.  
font coque ut. f. ungu. consistent.  
spissior.*

Adde:

*Ol. Lavandul. 10·0.*

*D. S. Salbe.*

Oder das weniger stark riechende Unguent. Vasolini  
plumbic. nach Kaposi:

Rp. 1721.

*Empl. Diachyl. simpl.,*

*Vaselin. aa 100·0.*

*Liquefact. misc. f. ungu.*

*D. S. Salbe.*

Manchmal wird besser  
vertragen Zinksalbe oder:

Rp. 1722.

*Acid. boric. 5·0,*

*Ungu. simpl. 50·0.*

*S. Salbe.*

Alle diese Salben dick auf Leinwand zu streichen, dieselbe in passender Form zugeschnitten aufzulegen und mittelst Flanellbinden oder mit Watte und darüber Calicotbinden (im Gesicht Flanelllarve) niederzubinden.

Wird Fett überhaupt nicht vertragen, so ist die Behandlung mit Umschlägen und Streupulvern weiterzuführen.

Bei *Eczema squamosum* täglich mehrmaliges Auflegen von Fett, Glycerin, Vaseline, Unguent. emolliens, Zink-Wismuth-Salbe und ähnlichen Mitteln, etwa auch das Unguent. Zinci Wilsonii zu verwenden:

Rp. 1723.

*Resin. Benzoës pulv. 5·0,*

*Axung. porc. 160·0.*

*Digere, cola, adde:*

*Zinc. oxydat. 25·0.*

*M. f. ungu.*

*D. S. Salbe.*

Wenn das Nässen gänzlich aufgehört, auch Pick's Gelatine-Präparate ganz gut, z. B.:

Rp. 1724.

*Zinc. oxydat. 10·0,*

*Gelatin. anglic.,*

*Glycerin. aa 20·0,*

*Aqu. dest. 40·0.*

*M. f. massa gelatinosa.*

*D. S. 1 Stück davon abzuschneiden, durch Erwärmen im Wasserbad zu schmelzen und im flüssigen Zustand einzupinseln.*

An bedeckten Stellen ist nach gänzlichem Aufhören des Nässens am besten Theer, derselbe ganz dünn mittelst Borstenpinsels einzureiben, darüber in den ersten Tagen noch eine der in früheren Stadien verwendeten Salben auf Leinwand. Im letzten Stadium auch hie und da mit Vorsicht Naphtol:

Rp. 1725.

*Naphtol. 1·0,*  
*Spir. vin. rectificat. 75·0,*  
*Aqu. dest. 25·0.*  
*D. S. Täglich 1 bis*  
*höchstens 2mal einzu-*  
*pinseln.*

Rp. 1726.

*Naphtol. 1·0,*  
*Ungu. simpl. 100·0.*  
*D. S. Salbe, 1—2mal*  
*täglich dünn einzu-*  
*reiben, darüber Poudre.*

Sobald die Haut sich röthet oder rissige Oberhaut zeigt, das Naphtol auszusetzen.

b) *Eczema chronicum*: Zunächst die auflagernden Krusten und Schuppen zu erweichen und zu entfernen (Maceration). Hiezu verwendet man Oele, wie Ol. Olivar. (mit Aqu. Calc. *ad*), Ol. iecoris Asselli etc., die mehrmals des Tages in grossen Mengen aufzugiessen und einzureiben sind, darüber wollene Decken oder Tricot- oder Flanellbinden; oder feste Fette, wie Ungu. Diachylon Hobn, Ungu. Vaseline, plumbic. Kaposi, oder etwa:

Rp. 1727.

*Acid. boric.,*  
*Glycerin. aa 5·0,*  
*Cerae alb.,*  
*Paraffin. aa 20·0,*  
*Ol. Olivar. q. s. ut f.*  
*ungu. consistent. moll.*  
*D. S. Salbe.*

Diese Salben auf Leinwand aufgestrichen zu appliciren, dieselbe mit Flanell niederzubinden.

Sehr gut ist auch in vielen Fällen die Lassar'sche Pasta:

Rp. 1728.

*Zink. oxydat.,*  
*Amyl. pur. aa 25·0,*  
*Vaseline. 50·0.*  
*M. f. pasta.*  
*D. S. In dicker Schichte*  
*auf die erkrankten*  
*Stellen aufzustreichen,*  
*darüber Poudre.*

Sehr empfehlenswerth ist das Pick'sche Salicyl-Seifenpflaster:

Rp. 1729.

*Emplastr. saponat. 100·0,*

*Leni igni fuso adde:*

*Acid. salicylic. 10·0.*

*M. f. emplastr.*

*D. S. Auf Leinwand messerrückendick aufzustreichen, dieselbe genau zu adaptiren und mit Calicot- oder Tricotstoffbinden niederzuhalten.*

(Wenig geeignet dagegen, weil leicht artificiellcs Ekzem hervorbringend, sind die vielfach empfohlenen Unna'schen Pflastermullverbände, sowie die Unna-Beiersdorf'schen Guttapercha-Mull-Pflaster.)

Bei sehr chronischen Ekzemen auch Maceration mit Wasser in Form von Umschlägen, Priessnitz'schen Einwicklungen, Bädern. Mit Vorsicht auch manchmal Maceration mittelst Kautschuk (s. „Psoriasis“, S. 524 f.).

Sehr zweckmässig sind zur Entfernung der durch Salben bereits erweichten Auflagerungen zeitweilige Waschungen mit Sapo viridis, Glycerinseife, Spir. sapon. Kalin., Naphtolseife etc.

Sehr stark schwielig verdickte Stellen mit concentrirter Essig- oder Salzsäure abzureiben oder durch mit Schmierseife bestrichene, 12—24 Stunden liegen bleibende Flanellflecke zu erweichen; noch besser oft Bepinselung mit:

Rp. 1730.

*Kal. caustic. 5·0,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*S. Zum Einpinseln.*

In den meisten Fällen von chronischem Ekzem wirkt sehr gut das Ungu. Wilkinsonii nach der Modification von Hebra:

Rp. 1731.

*Sulf. citrin.*

*Ol. Fag. aa 10·0,*

*Sapon. virid.,*

*Axung. porc. aa 20·0,*

*Cret. alb. 2·0.*

*D. S. Mittelst Borstenpinsels dünn einzureiben.*



Bei chronischem Eczema squamosum ohne Nässen Theerbehandlung, entweder in Form der eben erwähnten modificirten Wilkinson'schen Salbe, oder als tägliche Einpinselung einer Mischung von:

Rp. 1732.

*Ol. Rusci (od. Fagi) 20·0,*  
*Ol. Olivar. (od. iecor. Aselli) 20·0—40·0.*  
*D. S. Dünn einzupinseln.*

In jüngster Zeit viel verordnet:

Rp. 1733.

*Flor. Sulfur.,*  
*Ol. Rusc.,*  
*Zinc. oxydat.,*  
*Ol. Olivar. āā 5·0,*  
*Lanolin. 50·0.*  
*D. S. Salbe; mit Borstenpinsel dünn einzureiben.*

Auf geringfügig erkrankte Hautstellen wirken auch Einpinselungen von Tinct. Rusci oder Waschun-

gen mit fester oder flüssiger Theerseife:

Rp. 1734.

*Ol. Fagi 5·0,*  
*Sapon. medicinal. pulv. 100·0.*

*M. f. sapo.*

*D. S. Feste Theerseife.*

Rp. 1735.

*Olei Rusci 20·0,*  
*Spir. sapon. Kalin. 50·0,*  
*Glycerin. 10·0.*

*M. D. S. Flüssige Theerseife.*

Ebenso auch Theersalbe:

Rp. 1736.

*Ol. Fagi 10·0,*  
*Glycerin. 5·0,*  
*Ungu. emoll. 50·0,*  
*Balsam. peruvian. 2·5.*  
*M. f. ungu.*

*D. S. Salbe; täglich einmal einzuschmieren.*

Oder auch Carbonsalbe:

Rp. 1737.

*Acid. carbolic. 1·0,*  
*Ungu. emoll. 50·0.*  
*D. S. Salbe.*

Bei geringen Graden genügt auch Zinksalbe, eine schwache Präcipitat- oder Naphthosalbe (1—2%) oder Kali-Crême.

Rp. 1738.

*Glycerin. 40·0,*  
*Ol. Rosar.,*  
*Ol. flor Aurantior. āā gtts. 2,*  
*Kal. carbonic. solut. 2·5—5·0—10·0—20·0.*  
*D. S. Kali-Crême. (Nr. 1, 2, 3 od. 4).*

Bei Eczema capillitii die Krusten zu erweichen mit Olivenöl, Leberthran, oder:

Rp. 1739.

*Acid. carbolic. 1·0,*  
*Ol. Olivar. 100·0,*  
*Balsam. peruvian. 2·0.*  
*D. S. Aeusserlich.*

Rp. 1740.

*Naphtol. 1·0,*  
*Ol. Olivar. 100·0.*  
*D. S. Aeusserlich.*

Statt eines Oels kann auch eine Kautschukhaube, die mit Flanell niederzubinden ist, verwendet werden. Die erweichten Massen jeden 3. bis 4. Tag mit Spir. sapon. Kalin. abzuwaschen. Ist das Ekzem schuppig, Einpinselungen mit Tinct. Rusci,  $\frac{1}{2}$ igem Naphtol-Alkohol, Carbol-Alkohol, milden Salben; auch Ungu. Wilkinsonii von Anfang an eingepinselt oft sehr wirksam. Bei stark entzündeter Kopflaut kalte Douchen, Umschläge.

Bei Ekzem des Gesichts die mit Salben oder Pflaster bestrichenen Leinwandflecke genau zu adaptiren, in den Furchen mittelst Charpiewicken niederzuhalten und das Ganze mit Flanelllarve niederzubinden. In die Nasenlöcher Tampons, die in ein flüssiges Oel getaucht sind, oder in:

Rp. 1741.

*Aqu. font.,*  
*Glycerin. aa 10·0,*  
*Zinc. sulfuric. 0·15.*  
*D. S. Aeusserlich.*

Bei Ekzem der Lidränder:

Rp. 1742.

*Merc. praecip. flav. 0·15,*  
*Ungu. emoll. 10·0.*  
*D. S. Salbe.*

Rp. 1743.

*Acid. boracic.,*  
*Glycerin. aa 2·5,*  
*Ung. simpl. 25·0.*  
*D. S. Aeusserlich.*

Bei Ekzem der Lippen die zu applicirenden Salbenflecke durch einen Verband fest anzudrücken; bei starker Infiltration und Schwellung der Lippen Druckverband durch Auflegen von:

Rp. 1744.

*Empl. Minii adust. 20·0.*  
*D. S. Auf Leinwand gestrichen aufzulegen*  
*und niederzubinden.*

Bei chronischem Ekzem des Lippensaumes wiederholte Aetzung mit Kalilauge oft das einzige Heilmittel.

Chronisches Ekzem der Mamma und Brustwarze zu behandeln mit Schmierseifen-Umschlägen, Empl. sapon. salicyl. (10<sup>0</sup>/<sub>10</sub>) linteo extens. oder mit Einpinselung von:

Rp. 1745.

*Mercur. sublim. corrosiv. 0·2,*

*Collodii 20 0.*

*D. S. Täglich einmal einzupinseln.*

In späteren Stadien Theer, Ungu. Wilkinsonii. Aehnliche Behandlung auch beim *Eczema chronicum scroti*. Seifenwaschungen im Sitzbad, Auflegen erweichender Salbenflecke etc. Wenn starkes Jucken besteht, täglich Seifenwaschung, danach:

Rp. 1746.

*Cocain muriatic. 0·4—1·0,*

*Lanolin.*

*Vaselin. aa. 10·0.*

*D. S. Salbe, dünn einzureiben.*

Theer erst, wenn auf Seifenwaschung kein Nässen mehr erfolgt. Noch lange nach der Heilung das Scrotum und die Genitocruralfalte einzupoudern, ein Suspensorium zu tragen.

Bei *Eczema perinei et ani* milde Salben (Ungu. simplex, Borsalbe, Seifenpflaster) auf Leinwand gestrichen, mittelst Flanell- und Trikotbinde zu befestigen. Auch hier gegen das höchst lästige Jucken Cocainsalbe (s. Rp. 1746). Bei Rhagaden im Rectum Stuhlzäpfchen von:

Rp. 1747.

*Zinc. oxydat. 0·75,*

*Extr. Opii aquos.*

*(od Belladonn) 0·1,*

*But. Cacao q. s. ut f.*

*suppos. No. 5.*

*D. S. Täglich 1—2 Stück*

*zu gebrauchen.*

Oder:

Rp. 1748.

*Cocain. oleinic. 0·25,*

*But. Cacao q. s. ut f.*

*suppos. No. 5.*

*D. S. Täglich 1—2 Stück*

*zu verwenden.*

Bei chronischem Ekzem der Hände und Füße Kautschukhandschuhe oder -Fingerlinge, Einwicklungen mit Salicylpflaster (Rp. 1729), Seifenwaschungen, in hartnäckigen Fällen bei schwieliger Verdickung Aetzung mit concentrirter Kalilauge (Rp. 1730) zweckmässig. Oder Hand-, resp. Fussbäder mit:

Rp. 1749.

*Kal. caustic. 25·0,*  
*Aqu. font. 500·0.*  
*S. Zusatz zu 5 Hand-*  
*(oder Fuss-) bädern.*

Oder:

Rp. 1750.

*Merc. sublim. corros. 5·0,*  
*Aqu. dest. 500·0.*  
*S. Zu einem Bad.*

Jeden Tag ein Bad von 10 Minuten Dauer. Nach dem Bad die Haut mit reinem Wasser abzuspülen, abzutrocknen, dann sofort Application einer entsprechenden Salbe. In den Endstadien, wie bei anderen Ekzemen, Theer oder weiche Salben.

Sehr beschränkte Ekzemstellen des Stammes oder der Extremitäten heilen manchmal durch:

Rp. 1751.

*Merc. sublim. corrosiv. 1·0,*  
*Spir. vin. rectific. 100·0.*  
*D. S. Zum Betupfen.*

Wenn ein Ekzem häufig recidivirt und nachweislich eine ursächliche Allgemeinerkrankung besteht, entsprechende interne Behandlung, z. B. bei scrophulösen Individuen Leberthran, bei Chlorose und Dysmenorrhoe Eisen und Arsen, z. B.:

Rp. 1752.

*Solut. arsen. Fowleri 5·0,*  
*Tinct. Ferr. pomat.,*  
*Tinct. Rhei Darell.*  
*aa 20·0,*  
*Aqu. Menth. pip. 140·0,*  
*Syr. cort. Aurant. 15·0.*  
*D. S. Tägl. 1—2 Esslöffel.*

Rp. 1753.

*Ferr. citric. ammoniat.*  
*5·0,*  
*Acid. arsenicos. 0·04,*  
*Pulv. et extr. rad. Gen-*  
*tian. q. s. ut f. pill.*  
*No. 50.*  
*D. S. Täglich 2 Pillen.*

Rp. 1754.

*Solut. ars. Fowl.* 3·0,

*Tinct. Ferri album.* 30·0.

*D. S.* 3mal täglich nach der Mahlzeit 15—20 Tropfen.

Ferner Amaricantia, Milch- und Molkenkuren, Wasser von Franzensbad, Spaa, Pyrmont, Schwalbach; Roncegno- oder Levico-Wasser (täglich 2—3 Esslöffel voll in Zuckerwasser oder Wein), kräftige Diät. Ebenso andere interne Leiden entsprechend zu behandeln.

**Eczema marginatum.** Durch 6 Tage Früh und Abends Einpinselung mittelst Borstenpinsels von Unguent. Wilkinsonii sulfuratum, Naphtolschwefelseife oder:

Rp. 1755.

*Chrysarobin.* 5·0,

*Vaselin.* 50·0.

*S. Salbe.*

Rp. 1756.

*Naphtol.* 25,

*Vaselin.* 50·0.

*S. Salbe.*

Rp. 1757.

*Acid. pyrogall.* 5·0,

*Ungu. simpl.* 50·0.

*D. S. Salbe.*

Bei bedeutender Verdickung der Epidermis dieselbe durch Kali caustic. (1 : 2 Aqu.), Schmierseifen-Umschläge etc. abzulösen, nach erfolgter Ueberhäutung eines der obigen Mittel.

**Ephelides s. Chloasma.**

**Erysipelas. Rothlauf.** Isolirung des Kranken, Bettruhe, Fieberdiät, bei hohem Fieber und namentlich bei typisch wiederkehrenden Exacerbationen desselben Chinin, Antipyrin, bei starker Unruhe kalte Einwicklungen, Leiterseher Kühlapparat am Kopf. Ermittlung und Beseitigung der Ursache des Erysipels: bei Gesichtsrose Untersuchung auf etwa vorhandenen Zahnabscess und Eröffnung desselben, namentlich aber Inspection

der Nasenhöhle, bei Krusten und Eiterborden in derselben Einlegen von Borsalbentampons und Salicylseifenpflaster (10%). Ebenso bei Erysipel anderer Körperstellen Nachforschung nach Abscessen oder Ulcerationen und Behandlung derselben.

Die erysipelatösen Stellen mit Wasser, Aqu. Goulardi, Liqu. Burowi oder auch gar nicht zu bedecken. Viel gebraucht auch Auflegen von mit Unguent. einer bestrichener Leinwand. Im Stadium der Decrustation zur Verminderung der Spannung Auflegen von Salben, wie:

Rp. 1758.

*Oxyd. Zinc. 2·0,*  
*Mercur. praecip. alb. 1·0,*  
*Vaselin. 50·0.*  
*D. S. Salbe.*

Oder einfach:

Rp. 1759.

*Lanolin.,*  
*Vaselin. aa 25·0.*  
*S. Salbe.*

In schweren Fällen von Erysipel auch continuirliches Bad angezeigt.

(Bei Erysipelkranken gebrauchte Instrumente vor Wiederverwendung bei anderen Kranken sorgfältigst zu desinficiren. Ebenso die Hände zu desinficiren, ehe man andere Patienten untersucht.)

**Erythema.** In leichten Fällen keine besondere Therapie. Nur bei Gefühl von Jucken und Brennen kaltes Wasser oder Betupfen mit Alkohol oder:

Rp. 1760.

*Acid. carbolic. 1·0 2·0,*  
*Spir. vin. rectificat. 100·0,*  
*D. S. Zum Betupfen.*

Oder:

Rp. 1761.

*Acid. salicylic. 2·0.*  
*Spir. vin. Gallic. 100·0.*  
*S. Zum Betupfen.*

Nach dem Betupfen die juckenden Stellen mit Amylum einzustauben. Bei Erythema multiforme oder nodosum, wenn Fieber vorhanden, Betruhe, eventuell Chinin, Antipyrin; gegen Gelenkschmerzen Natrium salicylicum, Umschläge mit Eis, kaltem Wasser, Bleiwasser, Liqu. Burowi. Bei öfteren Recidiven Tonica, Eisen, Chinin, Hydrotherapie, Elektrizität.



**Favus. Erbgrind.** Zunächst Entfernung der Favus-Massen, durch Erweichen mit Oel, Leberthran oder Aehnlichem. Abheben mit dem Finger oder einem Spatel und Waschen mit Seifengeist. Hierauf täglich vorzunehmende Epilation: Die Haare werden zwischen dem Daumen und einem mit den übrigen Fingern gehaltenen Zungenspatel durchgezogen, wobei die erkrankten Haare ausfallen. Nebstdem tägliche Waschungen mit Spr. sapon. Kalin, nach Abtrocknen der Kopfhaut Einpinselung von parasinciden Mitteln, wie Theer, Ungu. Wilkinsonii sulfurat., Tinct. Rusci, oder:

Rp. 1762.

*Naphthol.* 1·0,  
*Ol. Olivar.* 100·0.  
S. Zum Einpinseln.

Rp. 1763.

*Benzin.* 1·0,  
*Spir. vin. rectificat.* 150·0.  
S. Einzupinseln.

Rp. 1764.

*Merc. sublim. corros.* 1·5,  
*Spir. vin. Gallic.* 100·0.  
S. Einzupinseln.

Rp. 1765.

*Ol. Caryophyllor.,*  
*Ol. Macidis* aa 1·0,  
*Spir. vin. Gallic.* 100·0.  
S. Aeusserlich.

Rp. 1766.

*Acid. salicylic.* 2·0,  
*Glycerin.* 1·5,  
*Balsam peruvian.* 3·0.  
*Spir. vin. Gallic.* 150·0.  
S. Einzupinseln.

Rp. 1767.

*Naphthol.* 5·0—10·0,  
*Arum. porc.* 10·0.  
*Lanolin* 80·0.  
D. S. Salbe.

Rp. 1768.

*Merc. praecip. alb.* 5·0,  
*Ungu. emoll.* 50·0.  
D. S. Damit täglich den  
Kopf einzureiben.

Diese und ähnliche Mittel abwechselnd zu gebrauchen.

Favus an nicht behaarten Stellen einfach durch Erweichung mit Oel und energische Seifenwaschung zu entfernen.

**Furunculus Blutschwär** Im Beginn Kälte; wenn bereits Eiterung besteht, warme Umschläge, Kataplasmen; Incision, die Wunde antiseptisch zu verbinden. Bei all-

gemeiner Furunculosis neben der chirurgischen Behandlung der einzelnen erkrankten Stellen Hebung der Ernährung durch passende Diät, Bittermittel, Eisen; Behandlung von Affectionen des Digestionstractes; Untersuchung auf Diabetes, resp. Behandlung desselben. Manchmal Bäder mit Alaun oder Soda wirksam (1000 Gr. pro balneo), ebenso auch mit Sublimat (10 Gr. auf ein Bad).

**Herpes tonsurans. Scheerende Flechte.** Herpes tonsur. des behaarten Kopfes ähnlich wie Favus zu behandeln: Erweichung, Ablösung und Abwaschen der Schuppenmassen (s. „Favus“), dann tägliche Epilation mittelst Cilienpincette und Einpinselung verschiedener abwechselnd zu gebrauchender parasiticider Mittel, am besten Tinct. Rusci oder:

Rp. 1769.

*Ol. Rusci* 15·0,  
*Spir. sapon. Kalin.* 20·0,  
*Lact. Sulfur.* 10·0,  
*Spir. Lavandul.* 50·0,  
*Balsam. peruvian.* 1·5,  
*Naphtol.* 0·5.  
*D. S. Einzupinseln.*

Herpes tonsur. vesiculosus des Stammes heilt unter Aufstreuen eines Poudres.

Bei vereinzelt en Kreisen von schuppendem Herpes tonsur. (Ring worm)

Aufpinselung von Theer, Schmierseife, Ungu. Wilkinsonii, Jodtinctur oder:

Rp. 1770.

*Jod. pur.,*  
*Kal. iodat. āā* 5·0,  
*Glycerin.* 10·0.  
*S. Täglich einzupinseln.*

Rp. 1771.

*Lact. Sulfur.* 10·0,  
*Spir. sapon. Kalin.,*  
*Spir. Lavandul. āā* 25·0,  
*Glycerin.* 2·0.  
*D. S. Einzupinseln.*

Rp. 1772.

*Chrysarobin.* 10·0,  
*Acid. acetic.* 5·0,  
*Ungu. simpl.* 50·0.  
*D. S. Salbe.*

Rp. 1773.

*Naphtol.* 0·5,  
*Spir. sapon Kalin.* 50·0,  
*Glycerin.* 2·0.  
*D. S. Einzupinseln.*

Bei Herpes tonsur. maculosus universalis  
Unguent. Wilkinsoni oder:

Rp. 1774.

*Naphtol.* 2·0,  
*Sapon. virid.* 100·0.  
*D. S. Durch 2—3 Tage täglich 2mal ein-  
zureiben.*

**Herpes Zoster. Gürtelausschlag.** Einstreuung von  
Anylum mit oder ohne etwas Opiumpulver. Keine nassen  
Umschläge. Wenn die Bläschen platzen und wunde  
Flächen vorliegen, Bedeckung mit Salben oder Pfla-  
stern, wie:

Rp. 1775.

*Extr. Opii aquos.* 0·5,  
*Cerat. simpl.* 50·0.  
*D. S. Salbe.*

Oder:

Rp. 1776.

*Cocain. muratic.* 0·2,  
*Ungu. simpl.* 20·0.  
*D. S. Salbe.*

Bei heftigen Neuralgien, Schlaflosigkeit etc. sub-  
cutane Morpholinjectionen, Chloralhydrat, Opiate inner-  
lich, oder local:

Rp. 1777.

*Empl. de Meliloto (od.  
Cicutae)* 25·0,  
*Supra lint. extend.,*  
*Insperge pulv. Laud.* 5·0.  
*D. S. Pflaster.*

Gegen zurückbleibende  
Neuralgie auch oft wirk-  
sam:

Rp. 1778.

*Sol. arsen. Fowl. gtts.* 6.  
*Aqu. Foenicul.* 25·0.  
*D. S. Auf 3mal des  
Tages zu verbrauchen  
(Jeden dritten Tag um  
2 Tropfen der Tinctur  
bis auf 25—30 Tropfen  
zu steigen.)*

# Hyperidrosis. Vermehrte Schweissabsonderung.

Bei universeller Hyperidrosis Vermeidung von Bädern, erhitzenen Getränken, zu warmer Bekleidung, starken Gemüthsbewegungen. Gegen das Jucken Betupfen mit Alkohol, Eau de Cologne etc., zur Aufsaugung des Schweisses Bestreuen mit Amylum.

Bei localer Hyperidrosis (der Achselhöhle, Genitalien, Flachhand, Fusssohle) Waschungen mit:

Rp. 1779.

*Acid. tannic. 1·0,*  
*Spir. vin. rectificat. 250·0.*  
*S. Zum Waschen.*

Oder:

Rp. 1780.

*Decoct. cort. Quercus*  
*e 20·0:200·0.*  
*S. Zum Waschen.*

Rp. 1781.

*Mercur. sublim. corr. 1·0,*  
*Aqu. dest. 400·0.*  
*S. Aeusserlich.*

Rp 1782.

*Extr. Aconit. 1·0,*  
*Spir. vin. Gallic. 200·0.*  
*S. Zum Betupfen.*

In manchen Fällen von Schweiss der Flachhand und Fusssohle sehr rasch wirksam:

Rp. 1783.

*Naphtol. 10·0,*  
*Spir. vin. Gallic. 175·0,*  
*Spir. Colon. 25·0.*  
*S. Zum Waschen.*

Ausser den Waschungen behufs Aufsaugung des Schweisses häufiges Einstreuen von Poudre, sowie Isolirung gegenüberstehender Hautfalten durch Einlegen von mit Poudre belegter Watte oder Charpie. Als Poudre verwendet man:

Rp. 1784.

*Oxyd. Zinc. 5·0,*  
*Amyl. Oryzae 50·0.*  
*S. Poudre.*

Rp. 1785.

*Acid. salicylic. 2·0,*  
*Amyl. pur. 50·0.*  
*S. Streupulver.*

Rp. 1786.

*Naphtol. pulv. 0·5,*  
*Amyl. pur. 50·0.*  
*S. Poudre.*

Bei Fusschweissen leichteren Grades die obigen Mittel genügend. Besonders wirksam Fussbäder mit:

Rp. 1787.

*Merc sublim. corrosiv* 0·5,

*Aqu. font* 200·0.

*Dent. tal. dos. Nr. 10.*

*Ein Fläschchen zu einem Fussbad zuzusetzen.*

Nach dem Bad Application eines der obengenannten Streupulver, (Rp. 1784—1786), zwischen die Zehen Watte-Bänschchen, die mit dem Poudre dick bestreut sind; die täglich zu wechselnden Strümpfe ebenfalls mit dem Poudre einzustreuen. Sehr zu empfehlen:

Rp. 1788. *Acid. chromic.* 1·0,

*Aq. destill.* 20·0

*D. Zum Einpinseln.*

Nach einem Fussbade mit einem Haarpinsel aufzutragen und eintrocknen zu lassen. Dabei etwa vorhandene Rhagaden zu meiden.

Bei stärkeren Graden am besten die Hebra'sche Diachylon-Salbe. Dieselbe auf einen genügend grossen Leinwandfleck messerrückendick aufzustreichen und damit der Fuss einzuwickeln. Zwischen die Zehen mit der Salbe bestrichene Plumasseaux. Darüber neue Strümpfe und Schuhe. Nach 24 Stunden der Fuss trocken mit Poudre und Charpie abzureiben und die Salbe frisch aufzulegen. Diese Proccedur durch 10—14 Tage fortzusetzen, dann noch lange Zeit hindurch der Fuss fleissig einzupoudern und Poudre in die Falten einzulegen. Erst nach Bildung einer neuen zarten Epidermis der Fuss zu waschen.

Von innerlichen Mitteln gegen Hyperidrosis oft sehr rasch, wenn auch meist vorübergehend wirksam:

Rp. 1789.

*Pulv. Agaric. alb.* 3·0,

*Sacch. alb.* 3·0.

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No 20.*

*D. S. 2—3 Pulver täglich.*

Oder:

Rp. 1790.

*Agaricin.* 0·02,

*Sacch. alb.* 2·0.

*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*

*D. S. 3stündl. 1 Pulver.*

Ebenso:

Rp. 1791.

*Atropin. sulfuric. 0·01,*  
*Gummi Tragacanth. 1·5,*  
*Glycerin.,*  
*Pulv. Liquirit. aa q. s. ut f. pill. No 20.*  
*D. S. Täglich 2 Pillen.*

**Ichthyosis. Fischschuppenkrankheit.** Methodische Einreibungen von Schmierseife, Ungu. Wilkinsonii oder:  
 Rp. 1792.

*Naphtol. 10·0,*  
*Ungu. simpl. 200·0.*  
*D. S. Täglich 1–2mal dünn einzureiben;*  
*jeden 2. Tag mit Naphtolseife abzuwaschen.*

Mächtiger Schwielen noch besonders mit Schmierseife-Umschlägen oder mit Kalilösung zu erweichen oder mit Schablöffel abzutragen. Wenn die Haut geschmeidig geworden, lange fortgesetzter Gebrauch von einfachen Salben.

**Lichen ruber. Rothe Knötchenflechte.**

Rp. 1793.

*Pilul. asiatic. No. 100.*  
*D. S. Anfangs täglich 3 Pillen vor dem Essen.*

Jeden vierten bis fünften Tag um 1 Pille zu steigern, bis auf 8–10 Pillen, bei dieser Dosis zu bleiben bis zur Involution des Processes, nach der Heilung durch 3–4 Monate täglich 6 Pillen. Im Ganzen durchschnittlich 800–1500 Pillen.

Rascher wirksam, aber weniger vor Recidiven schützend ist:

Rp. 1794.

*Sol. arsen. Foroler. 0·4,*  
*Aqu. dest. 20·0,*  
*Acid. carbol. 0·4.*  
*D. S. Täglich oder jeden*  
*2. Tag 1 Pravaz'sche*  
*Spritze zu injiciren.*

Oder:

Rp. 1795.

*Natr. arsenicos. 0 1,*  
*Acid. carbol. 0·2,*  
*Aqu. dest. 10·0.*  
*S. Wie das Vorige.*



Gegen das lästige Jucken Gebrauch von:  
Rp. 1796.

*Acid. carbolic. (od. salicylic.) 2·5,*  
*Spir. vin. Gallic. 200·0,*  
*Glycerin. 2·0.*  
*D. S. Zum Betupfen.*

Ebenso auch Bestreichen der juckenden Stellen mit indifferenten Salben, Einstreuen von Amylum etc. Event. auch nach Unna:

Rp. 1797.

*Acid. carbol. 5·0,*  
*Merc. bichlorat. corros. 1·0,*  
*Ungu. simpl 100·0.*  
*D. S. Salbe.*

Bisweilen bewirkt 10%ige Pyrogallusalbe rasche Abschülferung und Abflachung der Plaques.

**Lichen scrophulosorum. Knötchenflechte der Scrophulösen.** Hebung der Ernährung, fleissiger Aufenthalt im Freien, trockene Wohnung, Gebrauch von Leberthran innerlich:

Rp. 1798. *Jod. pur. 0·15,*  
*Ol. icoris Aselli 150·0.*  
*D. S. Früh und Abends 1 Esslöffel.*

Die Haut 2—3mal täglich mit Leberthran einzuölen; darüber Tricotanzug oder der Patient zwischen Wolldecken zu legen.

**Lupus erythematosus.** Waschungen mit Schmierseife oder Seifengeist, allein oder mit anderen Behandlungsmethoden abwechselnd. Bei derben Infiltrationen Schmierseife-Umschläge, Einseifen mit Naphtol-Schwefelseife, Aetzen mit Kalilösung (1 : 2 Aqu.) In anderen Fällen Einpinselung von Schwefelpasten, Jodglycerin, Jodtinctur wie bei Acne vulgaris. In sehr vielen Fällen ist von ausgezeichnetem Erfolg Auflegen von auf Leinwand gestrichenem Emplastrum Hydrargyri. Bei tiefer In-

filtration und zahlreichen Gefäsectasieen Scarification und Stichelung (s. „Acne rosacea,“ S. 485 f.), oder selbst Excochleation, wie bei Lupus vulgaris. Auch Cauterisation mit dem Paquelin, Galvanokaustik, oder mit:

Rp 1798.

*Argent. nitric.,*  
*Aqu. dest. aa 5·0.*  
*S. Lapislösung.*

Nach Abstossung des Schorfes mit Borsalbe, Empl. saponat. salicylic. etc. zu verbinden. Neben diesen localen Behandlungsmethoden natürlich Hebung der Ernährung, Behandlung etwaiger Grundkrankheiten.

**Lupus vulgaris. Fressende Flechte.** Durch innerliche Mittel die Gesamternährung günstig zu beeinflussen. Eigentliche Behandlung des Lupus nur local: Grosse, confluirende Knoten oder diffus infiltrirtes, schlappes Gewebe (namentlich, wenn bereits exulcorirt) mit scharfem Löffel auszukratzen Zerstreute kleine Knoten und oberflächliche diffuse Infiltrate durch Scarification und Stichelung mittelst Spitzbistouri's, Hebra'scher Stichelnadel oder Vidal'scher Stichellanze zu zerstören Das Instrument kann in eine dünne Jod- oder Carbollösung getaucht verwendet werden, so dass die Knoten zugleich geätzt werden.

In den meisten Fällen sehr angezeigt Aetzung mit Lapisstift, mit dem man tief in die Knoten einbohrt oder dieselben förmlich herauswühlt. Bei bereits bestehender Exulceration oder lockeren Granulationen auch Aetzung mit:

Rp. 1799.

*Argent. nitric.,*  
*Aqu. dest. aa 10·0.*  
*S. Einzupinseln.*

Wenn in einer bereits narbigen Fläche zahlreiche neue Knötchen erscheinen, zweckmässig Aetzung mit Kali. Die Hautfläche wird mit Seife gut abgewaschen, hierauf:

Rp. 1800.

*Kal. caustic. 5·0,*

*Aqu. dest 10·0.*

*S. Mit Charpiepinsel einzureiben, durch 2—3 Minuten darauf zu lassen, dann mit in Carbollösung getauchter Watte abzuwaschen.*

Hierauf kann man dann noch die Lapislösung einpinseln.

Die Cauquoin'sche Paste:

Rp. 1801.

*Zinc chlorat. 5·0,*

*Farin. Tritic. 15·0.*

*S. Mit Wasser zu einer Pasta anzurühren und auf Leinwand gestrichen aufzulegen.*

Man gibt zuerst Chlorzink in eine Schale, etwas Salzsäure dazu, bis es zerflossen ist, dann Chlorantimon, reibt es unter allmählichem Zusetzen des Pulvis Liquirit. zu einer PASTE an, die auf Leinwand aufgestrichen aufgelegt, niedergebunden und 24 Stunden liegen gelassen wird.

Mehr zu empfehlen, auch im Gesicht verwendbar, ist die von Hebra modificirte Pasta Cosmi:

Rp. 1806.

*Acid. arsenicos. 1·0,*

*Cinnabar. factit. 3·0,*

*Ungu. emoll. 24·0.*

*S. Auf Leinwand aufgestrichen aufzulegen, alle 24 Stunden zu wechseln; bis zur Verschorfung der Lupusknötchen.*

Dieselbe eignet sich nur für Stamm und Extremitäten. Dasselbe gilt von der modificirten Landolf'schen PASTE:

Rp. 1802.

*Zinc. chlorat. 10·0.*

*Da ad lagen.*

*S. Chlorzink.*

Rp. 1803

*Butyr. Antimon. 10·0.*

*Da ad lagen.*

*S. Chlorantimon.*

Rp. 1804.

*Acid. mur. conc. pur. 5·0.*

*D. S. Salzsäure.*

Rp. 1805.

*Pulv. rad. Liquirit. 5·0.*

*D. S. Pulver.*

Sehr gut verwendbar ist auch:

Rp. 1807.

*Acid. pyrogall. 5·0,*  
*Ungu. simpl. 50·0.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

Rp. 1808.

*Acid. pyrogall. 5·0—10·0,*  
*Cocain. mur. 0·5—1·0,*  
*Ung. simpl. 50·0.*  
*D. S. Salbe.*

Später werden die be-

handelten Stellen bedeckt  
mit Umschlägen von:

Rp. 1809.

*Kali caust. 1·0,*  
*Aqu. destill. 500·0.*  
*D. S. Zu Umschlägen.*

In neuerer Zeit von Mo-  
setig empfohlen:

Rp. 1810.

*Acid. lact. conc. pur. 10·0.*  
*S. Einzupinseln.*

Sehr geeignet zur Zerstörung der Lupusknötchen oder derberer Infiltrate ist auch der Paquelin oder die Galvanokaustik. Mit gutem Erfolg wird auch verwendet elektrolytische Flächenätzung nach der Methode von Lustgarten und Gärtner: Die negative Elektrode in Gestalt einer schwach gewölbten Silberplatte von 2 Millimeter Durchmesser durch 10 Minuten auf die erkrankte Stelle zu appliciren. Der Strom in der Stärke von 5—10 Milliampères zu erhalten (durch Regulirung mittelst des Gärtner'schen Graphit-Rheostaten).

Intereurrirend mit all' den erwähnten radicalen Behandlungsmethoden kommen behufs Verheilung bereits geätzter Stellen, zur Erzielung flacher Narben, Verminderung zurückbleibender Hyperämie etc. leichtere Mittel, wie Einpinselungen mit Jodglycerin, Jodtinctur, Jodoformeollodium, Auflegen von grauem Pflaster, nach Umständen auch milde Salben in Gebrauch.

**Milium. Hautgries.** Die Haut über jedem einzelnen Milium mit einem feinen Bistouri genügend tief einzuschneiden. Bei sehr acuter und massenhafter Entzündung Auflegen von Schmierseife. (Vorsicht acutem Eczem.).

**Molluscum verrucosum sive contagiosum.** Auskratzung der einzelnen Warzen mit dem scharfen Löffel; die blutenden Wundstellen einfach mit Bruns'scher Watte zu bedecken.

**Morbilli. Masern.** Ruhe, gut gelüftetes, auf gleichmässiger Temperatur (14 — 15° R.) zu erhaltendes Krankenzimmer; bei Lichtscheu dasselbe entsprechend zu verdunkeln. Fieberdiät. Bei Hyperpyrexie kalte Waschungen oder methodische nasse Einhüllungen. Den Anforderungen der Reinlichkeit entsprechend häufiges Wechseln der Leibwäsche. Bei starkem Jucken Fetteinreibungen. Nach vollendeter Desquamation (etwa am 14. Tag) lauwarme Bäder.

**Onychomycosis.** Beseitigung der erkrankten Nagelpartieen durch Abschneiden und Abkratzen, Eintupfen mit Essigsäure, Creosot oder:

Rp. 1811

*Merc. sublim. corrosiv. 1 0,*

*Chloroform. 50 0.*

*S. Zum Eintupfen.*

**Pediculosis capitis Kopfläuse.** Reines Petroleum oder besser:

Rp. 1812.

*Petrolei venal. 100 0,*

*Ol. Olivar. 50 0,*

*Bals peruvian. 20 0.*

*D. S. Nach Bericht.*

Oder:

Rp. 1813.

*Naphtol. 5 0,*

*Ol. Olivar. 100 0.*

*D S Nach Bericht.*

Eines dieser Oele wird am Abend reichlich auf die Kopfhaut geschüttet und verrieben, die Nacht über unter einer Flanellhaube darauf belassen und am Morgen mit Seife oder Seifengeist abgewaschen. Dieses Verfahren durch 2—3 Tage zu wiederholen. Das zurückbleibende Kopfkrenz entsprechend zu behandeln.

Die Nisse am besten durch Waschen der Haare mit Essig und Durchkämmen mit engem Kamm zu entfernen.

**Pediculi pubis. Morpiones. Filzläuse.** Weisse Präcipitatsalbe (10%ig), wässrige Sublimatlösungen oder:

Rp. 1814.	Oder:
<i>Naphtol.</i> 5·0,	Rp. 1815.
<i>Ol. Olivar.</i> 50·0.	<i>Petrolei venal.,</i>
<i>S. Nach Bericht.</i>	<i>Bals. peruvian. aa</i> 15·0,
	<i>Ol. Lauri</i> 1·0.
	<i>D. S. Nach Bericht.</i>

Diese Mittel in die Schamgegend einzureiben, darüber Amylum. Erst nach Verschwinden aller Ekzem-Erscheinungen ein Bad.

**Pemphigus. Blasenausschlag.** Umschläge mit Liquor Burowi, die Blasen anzustechen, mit Krusten belegte und der Epidermis beraubte Stellen mit indifferenten Salben zu bedecken. Bei stark entzündeter Haut und hohem Fieber kalte Umschläge, nasse Einwicklungen, innerlich Chinin. Bei *Pemphigus foliaceus* am besten continuirliches Bad. Bei *P. pruriginosus* protahirte Theerbäder. Oft auch bei *P. vulgaris* medicamentöse Bäder von guter Wirkung wie:

Rp. 1816.	Rp. 1817.
<i>Mercur. sublim. corros.</i>	<i>Cort. Querc.</i> 500·0.
5·0,	<i>D. S. Mit Wasser abzu-</i>
<i>Aqu. dest.</i> 200·0.	<i>kochen und das Decoct</i>
<i>S. Zusatz zum Bad.</i>	<i>dem Bade zuzusetzen.</i>

**Perniones. Frostbeulen.** Prophylaktisch bei anämischen Individuen Hebung der Ernährung, Gebrauch von Eisen; bei niedriger Temperatur der Luft Tragen warmer Handschuhe, warmer Strümpfe und bequemer, weiter Schuhe. Gegen bereits bestehende Perniones alle Mittel unzuverlässig, am meisten bewährt sich noch Baden



der betreffenden Körpertheile in möglichst heissem Wasser.  
ferner Anwendung von:

Rp. 1818.

*Collodii pur.* 20·0,  
*Ol. Ricini* 1·0,  
*Tinct. Jodin.* 0·2.  
S. Zum Bepinseln.

Rp. 1819.

*Acid. nitric. pur.* 10·0,  
*Aqu. dest.* 100 0.  
S. Zu Umschlägen.

Rp. 1820.

*Jodi pur.* 0·3,  
*Glycerin.* 30·0,  
*Kal. iodat.* 1·0.  
D. S. Zum Bepinseln.

Rp. 1821.

*Plumb. acetic. basic.* 5·0,  
*Ungu. emoll.* 40·0.  
D. S. Salbe.

Rp. 1822.

*Acid. boric.* 4·0,  
*Creosot. gtts.* 4,  
*Ungu. simpl.* 40·0.  
D. S. Salbe.

Rp. 1823.

*Camphor. ras.* 0·5,  
*Ceras alb.* 20·0,  
*Ol. Lini* 40·0,  
*Balsam. peruvian.* 0·75.  
*M. f. ungu.*  
D. S. Salbe.

Rp. 1824.

*Camphor. ras.* 0·4,  
*Creosot. gtts.* 4,  
*Lanolin.,*  
*Vaselin. ua* 20·0.  
D. S. Salbe.

In hartnäckigen Fällen Druckverband mittelst Emplastr.  
*Lithargyri adust.* oder Emplastr. saponat. salicylic. 10<sup>o</sup>/<sub>0</sub>  
(s. Rp. 1729). Bei Ulceration der Frostbeulen Bedecken  
mit Lapisalbe oder Borsalbe.

**Pityriasis versicolor Kleienflechte.** Therapie wie  
bei *Herpes tonsurans maculosus universalis*. (s. S. 510).

**Prurigo. Juckblattern.** Bei leichten Graden und im  
Beginn der Krankheit der Patient allabendlich mit  
Schwefelseife oder Schwefeltheerseife fest zu waschen  
und mit dem Seifenschaum bedeckt durch eine Stunde  
im Bad zu belassen; hierauf Application von Leberthran,  
Fett oder Oel.

Bei intensiver Prurigo Bäder mit Solut. Vlemingxx (s. „Psoriasis“, Rp. 1844). Einreibungen m. Ungu. Wilkinsonii sulfurat., am besten aber Naphthol-Behandlung:

Rp. 1825.

*Napthol. 5·0 (bei kleinen Kindern 2·0).*

*Ungu. emoll. 100·0.*

*D. S. Allabendlich die Extremitäten leicht einzureiben, darüber Poudre.*

Allenfalls daneben jeden 2. Tag Abwaschung im Bad mit Napthol-Schwefelseife. Wenn die Symptome nachgelassen, die Haut bereits geschmeidig, nur jeden 2. bis 3. Tag die Naphtolsalbe zu geben. In den Zwischenpausen der Naphtolkuren, wenn die Erscheinungen gering sind, Bäder mit Alaun, Soda (1000 Gr. auf ein Bad). Sublimat (5—10 Gr. auf ein Bad.)

In neuester Zeit wird mit sehr gutem Erfolge das von Spiegler eingeführte, nicht reizende thiophensulfosaure Natron angewendet, insbesondere bei complicirendem Ekzem:

Rp. 1826.

*Natr. sulfothiophenic. 5·0—10·0,*

*Lanolin.,*

*Vasclin. aa 50·0.*

*D. S. Wie das Vorige.*

Manchmal wirkt der innerliche Gebrauch von Carbol-säure günstig:

Rp. 1827.

*Acid. carbolic. 5·0,*

*Pulv. et extr. Acori q. s. ut f. pill. No. 50.*

*D. S. Täglich 10 - 15 Pillen.*

Der Allgemeinzustand des Kranken stets zu berücksichtigen; bei anämischen Kindern neben entsprechender Diät:

Rp. 1828.

*Jod. pur.* 0·1,  
*Ol. iecor. Aselli* 100·0.  
*D. S. Tägl.* 1—4 Kaffeel.

Bei Zeichen von *Rhachitis*:  
Rp. 1829.

*Phosphor.* 0·01,  
*Ol. iecor. Aselli* 30·0,  
*Gumm. Arab.*,  
*Sacch. alb. aa* 15·0,  
*Aqu. dest.* 40·0,  
*Syr. simpl.* 15·0.  
*D. S. Tägl.* 1 Kaffeelöffel.

**Pruritus cutaneus. Nervöses Hautjucken.** Behandlung etwaiger ursächlicher Krankheiten: bei chronischem Gastricismus oder Leberaffectionen Trinkkuren mit Marienbader oder Karlsbader Wässern, Soda, Magnesia, Rheum, entsprechende Diät; Affectionen der weiblichen Sexualorgane entsprechend zu behandeln. Gegen das Hautjucken selbst Eintupfen mit ätherischen oder alkoholischen Flüssigkeiten (*Spir. vin. Gallic.*, *Aether sulfuric. etc.*, mit oder ohne Zusatz von *Acid. carbolic.*, *salicylic.*, *boracic. etc.*

Sehr zweckmässig auch:

Rp. 1830.

*Menthol.* 2·5,  
*Glycerin.* 3·0,  
*Spir. vin. rectific.* 100·0.  
*S. Zum Eintupfen.*

Oft auch kalte Douchen, nasse Einwicklungen, medicamentöse Bäder mit Schwefel, Alaun, Soda, Sublimat wirksam. Bei *Pruritus vulvae et vaginae*, sowie bei *Prur. analis* Sitzbäder mit den eben genannten Zusätzen; Einlegen von in astringirende Flüssigkeiten (Zink-, Alaun-, Tannin-Lösungen) oder in Opiatsalben getauchten Tampons. Suppositorien wie:

Rp. 1831.

*Laudan. pur. (od. Extr.  
Belladonn.) 0·1—0·2,  
But. Cacao q. s. ut f.  
suppositoria No. 5.  
S. Täglich 1—2 Stück  
zu gebrauchen.*

Rp. 1832.

*Cocain. oleinic. 0·05-0·2,  
But Cacao q. s. ut f.  
suppositoria Nr. 5.  
D. S. Wie das Vorige.*

**Psoriasis. Schuppenflechte.** a) Innerliche Mittel:  
Dieselben sind namentlich angezeigt bei sehr ausgebreiteter frischer Psoriasis guttata oder nummulata.

Man verwendet:

Rp. 1833.

*Solut. arsenic. Fowleri,  
Aqu. Chamomill. aa 10·0.  
D. S. Täglich 3 mal 6 Tropfen.*

Man steigt jeden dritten bis vierten Tag um 1 Tropfen bis zu 12 Tropfen der Sol. Fowler. pro die, dann jede Woche um 1 Tropfen. Sobald eine Rückbildung der Psoriasis bemerkbar, bleibt man bei der Dosis stehen; wenn Heilung eintritt, geht man langsam wieder auf 6 Tropfen zurück.

Ferner gibt man mit gutem Erfolg *Pilulae asiaticae*:

Rp. 1834.

*Acid. arsenicos. 0·75,  
Pulv. Pip. nigr. 6·0,  
Gumm. Arabic. 1·5,  
Rad. Althaeae pulv. 2·0.  
M. Fiant cum Aqu. dest. q. s. pill. No. 100.  
Consp. pulv. Pip. nigr.  
S. 3 Pillen im Tag unmittelbar vor dem Mittagessen.*

Jeden vierten bis fünften Tag steigt man um 1 Pille, bis auf 8—10 Pillen, 5 Pillen und mehr gibt man in 2 Partien (Mittags und Abends). Bei der Dosis, bei der eine Wirkung zu bemerken, stehen zu bleiben. Bei Intoxicationerscheinungen (Schlaflosigkeit, Kratzen im Halse,

Magendrücken, Diarrhöe) mit der Dosis allmählich herabzugehen. Bei häufig eintretenden Kolikschmerzen verschreibt man statt des obigen Receipts besser:

Rp. 1835.

*Acid. arsenicos. 0·75,*

*Opii pur. 0·15,*

*Pulo. Pip. nigr. 6·0,*

*Gumm. Arabic. 15,*

*Rad. Althaeae 2·0.*

*M. f. c. Aqu. dest. q. s. pill. No. 100.*

*D. S. Wie das Vorige.*

Wirkung der Pillen gewöhnlich nach 5—6 Wochen. Wenn nach 400—600 Pillen kein Erfolg, das Mittel auszusetzen und eine andere Behandlung einzuleiten.

Vielfach gebraucht wird auch die *Solutio Pearsonii*:

Rp. 1836.

*Natr. arsenicos. 0·4,*

*Aqu. dest. 150·0.*

*D. S. 3mal täglich 15*

*Tropfen, steigend bis*  
*zu 30 Tropfen.*

Oder subcutan:

Rp. 1837.

*Natr. arsenicos. 0·1—0·2,*

*Acid. borac. 0·2,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*D. S. Tägl. 1 Pravaz'sche*  
*Spritze zu injiciren.*

(Bei Frauen ist zu beachten, dass nach Arsenbehandlung Pigmentationen zurückbleiben.)

b) Locale Mittel. Zunächst Beseitigung der Epidermisauflagerungen, z. B. durch Wasser in Form Priessnitz'scher Einhüllungen oder besser von Bädern, in welchen der Patient durch 3—6 Stunden täglich verbleiben muss und in denen die Haut noch mit Seife abgerieben werden kann. In ähnlicher Weise wirken auch die Bäder von Leuek und Baden bei Wien; auch Kaltwasserkuren von Erfolg. Zur Entfernung von Schuppen und Maceration der Epidermis zweckmässig auch Kautschukgewannener Haube, Jacke, Beinkleider, Handschuhe, die über Nacht oder auch continuirlich zu tragen, bei Entsetzen von Ekzem jedoch auszusetzen sind. Bei be-

schränkter Ausbreitung der Psoriasis, z. B. an den Ellenbogen und Knien Maceration durch Fette: Unguent. simpl., Ceratum simplex, am besten Ol. iecor. Asell. auf Leinwand aufgestrichen zu appliciren und mit Flanell niederzubinden; bei Entwicklung von Ekzem auszusetzen, Einstreuen von Amylum. Eigentliche äusserliche Heilmittel der Psoriasis sind:

Rp. 1838.

*Sapon. virid. 100·0.*

*S. Schmierseife*

Dieselbe ist anzuwenden in Form des Schmierseifencyclus: durch 7 Tage die Seife (mit Wasser etwas verdünnt) 2mal täglich auf die erkrankten Stellen (mit Ausnahme der Kopf- und Gesichtshaut) mittelst Borstenpinsels einzureiben, dann durch 6 Tage Pause, am 14. Tag ein Bad. Der Kranke muss während dieser Kur zwischen wollenen Decken liegen oder Hemd und Unterbeinkleider aus Wolle oder Tricot tragen. Bei dicken, harten Schuppenmassen Auflegen und Niederbinden von mit Schmierseife bestrichenen Flanelllappen, durch 12—36 Stunden liegen zu lassen. Wenn alle übrigen Macerationsmittel die Schuppen nicht zu beseitigen vermochten:

Rp. 1839.

*Kal. caustic. 20·0,*

*Aqu. dest. 40·0.*

*S. Die erkrankten Stellen damit zu bepinseln, dann mit Wasser abzuwaschen.*

In solchen Fällen auch Abschabung der Schuppen mit dem scharfen Löffel.

Gegen Psoriasis der Gesichts- und behaarten Kopfhaut statt der Schmierseife:

Rp. 1840.

*Spir. sapon. Kalin. 100·0.*

*S. Mittelst Flanelllappens mit warmem Wasser gemischt einzureiben.*



Sehr gut wirkt gegen Psoriasis, wenn dieselbe nicht sehr ausgebreitet ist, der Theer:

Rp. 1841.

*Ol. Rusci (od. Fagi, Cadin.),*

*Ol. Olivar. aa 50·0.*

*D. S. Aeusserlich.*

In neuerer Zeit auch:

Rp. 1842. *Ol. Rusc. 5·0,*

*Linim. exsicc. Pick 50·0.*

*S. Aeusserlich.*

Die Schuppen im Bade mit Seife zu entfernen, dann auf die erkrankten Stellen der Theer mittelst Borstpinsels in ganz dünner Schichte, aber energisch einzureiben; täglich 1—2mal zu wiederholen. Wenn der Urin dunkelgelb wird, ebenso bei Ausbruch von Theer-Acne der Theer auszusetzen.

Statt des Theers auch zweckmässig die weniger riechende Tinctura Rusci:

Rp. 1843.

*Ol. Rusci 50·0,*

*Aether. sulfuric.,*

*Spir. vin. rectificat. aa 75·0.*

Filtra et adde:

*Ol. Lavandul 20*

Bei universeller Psoriasis vielfach verwendet der Schwefel in Form von natürlichen Schwefelbädern oder der Solutio Vlemingx nach der Modification von Schneider:

Rp. 1844. *Calc. oxydat. 30·0,*

*Sulfur. sublimat. 60 0,*

*Aqu. dest. 600·0.*

*Coque ad remanent. 360·0.*

*D. S. Im Bad die Schuppen mittelst Seife abzureiben, dann die kranken Stellen mit der Lösung einzupinseln und der Kranke noch durch einige Stunden im Bad zu belassen.*

*(Im Gesicht die Lösung nicht zu verwenden.)*

Ausgezeichnet wirkt Unguent. Wilkinsonii nach der Modification von Hebra:

Rp. 1845.

*Ungu. Wilkinson. sulfurat. 100·0.*

*S. Durch 6 Tage täglich 2mal mittlöst Borstenpinsels einzureiben, am zehnten bis zwölften Tag ein Bad.*

Bei sehr ausgebreiteter oder universeller Psoriasis wird jetzt meistens und mit bestem Erfolge gegeben:

Rp. 1846.

*Acid. pyrogallic. 10·0,*

*Ungu. simpl. 100·0.*

*S. Salbe.*

Diese Salbe durch 6 Tage täglich 1—2mal mittelst Borstenpinsels einzureiben, an der Kopf- und Gesichtshaut jedoch nicht zu verwenden (sondern weisse Präcipitatsalbe, s. Rp. 1847 oder 1848). Der Kranke liegt während der Kur zwischen wollenen Decken oder trägt Tricotwäsche. Am 7. Tag bekommt er ein Bad, dann der Cyclus zu erneuern. Wenn starkes Jucken entsteht oder der Urin, der täglich inspicirt werden muss, dunkelgrün bis schwarz wird, das Mittel auszusetzen.

Bei Psoriasis des Gesichts und der behaarten Kopfhaut, sowie bei vereinzeltten Plaques am Körper:

Rp. 1847.

*Merc. praec. alb. 2·0—5·0,*

*Ungu. emoll. 40·0.*

*S. Auf die mit Seifengeist abgeriebenen Stellen mittelst Borstenpinsels dünn aufzutragen.*

Rascher wirkt noch:

Rp. 1848.

*Merc. praecip. alb.,*

*Magist. Bismuth. aa 4·0,*

*Ungu. emoll. 40·0*

*D. S. Wie das Vorige.*

Bei localisirter, namentlich nur auf Kniee und Ellenbogen beschränkter Psoriasis gut wirkend das Unguentum Rocharidi:

Rp. 1849.

*Jod. pur.* 0·5,

*Calomelan.* 1·5,

*Leni igni fusis adde:*

*Ungu. rosat.* 70 0.

*D. S.* Früh und Abends einzureiben; bei Entwicklung von Ekzem auszusetzen.

Bei am Körper zerstreuten, nicht allzu grossen Plaques das beste Mittel Chrysarobin (im Gesichte und an der Kopfhaut jedoch nicht anzuwenden):

Rp. 1850.

*Chrysarobin.* 10·0,

*Vaselin.* 40·0.

*D. S.* Salbe.

Rp. 1851.

*Chrysarobin.* 5·0,

*Vaselin.* 40·0.

*D. S.* Salbe.

Nach Ablösung der Schuppen durch ein Bad mit Seifenwaschung je nach Intensität des Processes die stärkere oder schwächere Salbe auf die Psoriasisstellen mittelst Borstenpinsels dünn einzureiben, mehrere Tage hintereinander 1- bis höchstens 2mal täglich. Am 10. 12. Tag ein Bad. Weniger leicht Erythem der Umgebung verursachend ist die Verschreibung nach Pick:

Rp. 1852.

*Gelatin. alb.* 50·0,

*Aqu. dest.* 100·0,

*Chrysarobin.* 10·0.

*D. S.* Im Wasserbad durch Erwärmen zu verflüssigen, dann einzupinseln.

Ebenso auch das von Auspitz angegebene:

Rp. 1853

*Chrysarobin.* 10·0,

*Traumaticin.* 100·0.

*S.* Dünn einzupinseln.

Als weniger irritirende Form der Application bewährt:

Rp. 1854.

*Chrysarobin.,*

*Ol. Olivar. aa* 5·0,

*Lanolin.* 50 0.

*S.* Salbe, mittelst Borstenpinsels dünn einzupinseln.

Ebenso auch in neuerer Zeit:

Rp. 1855.

*Chrysarobin. 5·0,*  
*Linim. exsicc. Pick 50·0.*  
*S. Dünn einzupinseln.*

Bei allen Chrysarobinpräparaten Vorsicht wegen Dermatitis.

Statt des Chrysarobin wurden versucht:

Rp. 1856.

*Anthrarobin. 10·0,*  
*Traumaticin. 100·0.*  
*S. Einzupinseln.*

Rp. 1857.

*Hydroxylamin. 0·5—2·5,*  
*Ungu. simpl. 50·0.*  
*S. Salbe.*

In neuerer Zeit wird das von Nencki und Rekowski empfohlene Galacetophenon, welches weniger reizt, mit gutem Erfolge angewendet:

Rp. 1858.

*Galacetophenon 10·0—15·0,*  
*Ungu. simpl. 100·0.*  
*D. S. Salbe.*

Bei localisirter Psoriasis, namentlich an Kopf, Gesicht und Händen, oft auch wirksam Naphтол:

Rp. 1859.

*Naphtol. 5·0,*  
*Ungu. emoll. 100·0.*  
*M. f. ungu.*  
*D. S. Durch 6 Tage täglich 2mal einzupinseln,*  
*am siebenten Tag Seifenwaschung; oder ab-*  
*wechselnd einen Tag Einpinselung, den an-*  
*deren Seifenwaschung.*



und Umgebung, Nabel und Umgebung, Hüfte, das Gesäss, Penis und Scrotum, Kniee, innere Seite des Fussrückens; dann noch die Salbe am ganzen Körper verschmiert. Nach der Einreibung Wollkleider auf dem blossen Leib zu tragen oder der Kranke zwischen Wolldecken zu legen. Am 3.—5. Tag ein Reinigungsbad. Danach die Haut fleissig einzupoudern und mindestens eine Woche lang nicht zu baden. Zurückbleibende Ekzeme nach den entsprechenden Regeln zu behandeln.

Für mässige Erkrankungsformen reicht auch Einreibung mit Balsam. peruvian. aus, oder:

Rp. 1865.

*Styrac. liquid.* 5·0,  
*Petrolei venal.*,  
*Ol. Olivar. āā* 15·0,  
*Balsam. peruvian.* 10·0,  
*Spir. sapon. Kalin.* 20·0.  
*S. Zum Einreiben.*

Für elegantere Praxis:

Rp. 1866.

*Flor. Sulfur.* 15·0,  
*Vaselin.*,  
*Lanolin. āā* 25·0,  
*Ol. Lavandul.*,  
*Ol. Menth.*,  
*Ol. Naphae āā* gtts. 5.  
*D. S. Salbe.*

Viel gebraucht ist auch die Weinberg'sche Salbe:

Rp. 1867.

*Styrac. liquid.*,  
*Flor. Sulfur.*,  
*Cretae alb. āā* 10·0,  
*Sapon. virid.*,  
*Axung. porci āā* 20·0.  
*D. S. Salbe.*



Sehr theuer, daher nur für Wohlhabendere die Bourguignon'sche Salbe:

Rp. 1868.

*Ol. Lavandul.,*  
*Ol. Menthae,*  
*Ol. Caryophyllor.,*  
*Ol. Cinnamomi aa* 1·5,  
*Gummi Tragacanth.* 5·0,  
*Kal. carbonic.* 35·0,  
*Flor. Sulfur.* 100 0,  
*Glycerin.* 200·0.  
*D. S. Salbe.*

Oder einfacher nach der Modification von Hebra:

Rp. 1869.

*Ol. Lavandul.,*  
*Ol. Caryophyllor. aa.* 1·5,  
*Kal. carbonic.* 35 0,  
*Lact. sulfur.* 100·0,  
*Azung. porc. q. s. ut f. unguent.*  
*D. S. Salbe.*

**Scarlatina. Scharlach.** Isolirung des Kranken. In normal verlaufenden Fällen rein expectative Behandlung. Krankenzimmer fleissig zu lüften, Temperatur 14 — 15° R. Reichlich kühlende Getränke zu geben, ferner Fleischbrühe, Milch, Compot, bei Angina Eispillen, Fruchteis, ein Gurgelwasser. Der Körper fleissig zu waschen, die Leib- und Bettwäsche entsprechend oft zu wechseln. Bei hoher Fiebertemperatur Hydrotherapie in Form von Bädern, Abwaschungen oder Einhüllungen; daneben eventuell Chinin, Digitalis. Complicationen nach den Regeln der internen Medicin und Chirurgie zu behandeln.

Nach Ablauf der Desquamation jeden 2. bis 3. Tag ein lauwarmes Bad.

Bei nach Ablauf des Scharlachs fortbestehender Parotitis Application von:

Rp. 1870.

*Empl. Hydrargyri cin.*,  
*Empl. Cicutae aa* 25·0.  
*M. f. empl.*  
*D. S. Pflaster, täglich*  
*frisch aufzulegen.*

Zu versuchen auch:

Rp. 1871.

*Jodoform. 1·0*,  
*Collodii 15·0*,  
*Ol. Ricini gtts. 3.*  
*D. S. Zum Einpinseln.*

**Seborrhoea. Schmeerfluss. Gneis.** Erweichung und Entfernung der Krusten durch Oel, Leberthran, Schweinefett etc., dem man etwas Zinkoxyd, Carbol- oder Salicylsäure zusetzen kann. Bei *Seborrhoea capillitii* das Oel Abends mittelst Borstenpinsels oder Schwamms unter Drücken und Frottiren recht reichlich aufzutragen, dann der Kopf über Nacht mit Flanell oder Wachseleinwandhaube zu bedecken. Dies 4—5mal zu wiederholen. Auf einfache Weise wird auch die Erweichung der Krusten erreicht durch eine Kautschukhaube ohne Gummizug, die mit Bindentouren befestigt wird. (Es entwickelt sich darunter jedoch ein sehr übler Geruch.) Die nun erweichten und bröckeligen Borken bei Kindern mit flüssiger Glycerinseife, bei Erwachsenen mit *Spiritus saponis Kalin.* abzuwaschen; Bereitung des letzteren nach Hebra:

Rp. 1872.

*Sapon. virid. 100·0.*  
*Solve leni calore in Alcohol. 50·0.*

Filtra et adde:

*Ol. Lavandul.*,  
*Ol. Bergamott. aa* 3·0.  
*D. S. Kali-Seifengeist.*

Die nun reingewaschene Haut gegen erneute Sebumauflagerungen und gegen Rissigwerden der Epidermis zu schützen durch:

Rp. 1873.

*Ol. Olivar. 50·0*,  
*Balsam. peruvian. 1·0.*  
*D. S. Pomade.*

Rp. 1874.

*Ol. Olivar. 50·0*,  
*Acid. carbolic. 0·5.*  
*S. Haaröl.*

Oder: Rp. 1875.

*Ungu emoll.* 25·0,  
*Zinc. oxydat.* 0·5,  
*Ol. baccar. Lauri* gtts. 5.  
*D. S. Salbe.*

Nach Heilung der Seborrhoe die Kopfhaut noch durch mehrere Wochen mit einem geeigneten Haarwasser zu waschen, z. B.:

Rp. 1876

*Acid. boric* 3·0,  
*Glycerin.* 1·5,  
*Spir. vin. Gallic* 100 0.  
*Tinct. Benzoës* 2·0.

*D. S. Damit täglich oder jeden zweiten Tag der Kopf durchzupinseln.*

Daneben zeitweilig eine beliebige Pomade einzuschmieren.

Bei Seborrhoe anderer Körperstellen ebenfalls Erweichung der Krusten mittelst eines Oels und Abwaschung mit Seife.

Bei Seborrhoe der Glans und des Präputiums und consecutiver Balanitis: Fleissiges Reinigen der betreffenden Stellen, Einlegen von Leinwandlappchen oder Wattebüschchen mit astringirenden Flüssigkeiten oder Salben:

Rp. 1877.

*Plumb. acetic. bas.* 0·5,  
*Aqu. font* 30·0.  
*D. S. Aeusserlich.*

Rp. 1878.

*Zinc. oxydat.* 0·25,  
*Ungu. emoll.* 20·0.  
*D. S. Salbe.*

Neben der localen Behandlung der Seborrhoe eventuell innerliche Behandlung gegen ursächliche Chlorose, Dyspepsie, Scrophulose durch Gentiana, Rheum, Eisen, alkalische und eisenhaltige Mineralwässer (in letzter Zeit namentlich auch die arsenhaltigen Wässer von Roncigno und Levico, 2 — 4 Essloffel pro die), Leberthran etc.

Ueber Complication mit Ekzem vide „Eczema chronicum“ S. 503.

**Sycosis. Bartfinne.** Der Bart zunächst kurz zu scheeren, dann die erkrankten Stellen mit Leinwandflecken, die mit Ungu. Diachylon, Ungu. Vaselini plumbic. oder Emplastr. saponat. salicylic. (s. Rp. 1729) belegt sind, zu bedecken und dieselben mit Flanell niederzubinden. Nach 24 Stunden der Verband zu entfernen, die Haut mit Seife zu waschen, dann der Bart zu rasiren.

Von nun an täglich Epilation: Die Hautstelle mit der linken Hand anzuspannen, mit der rechten, deren kleiner Finger aufgestützt ist, mittelst Cilienpincette die kranken Haare einzeln in ihrer natürlichen Richtung auszuziehen; die Epilation systematisch, von einer Stelle zur anderen vorschreitend, durchzuführen. Nach der Epilation die Stelle abzuwaschen, bei starker Entzündung mit kalten Umschlägen oder Umschlägen von Liquor Burowi zu belegen, danach wieder eine der oben erwähnten Salben zu appliciren; am nächsten Tage wieder Seifenwaschung und Epilation u. s. f., bis die Haut überall weich ist, keine Pusteln mehr kommen, die nachwachsenden Haare festsitzen. Derb infiltrirte Stellen zu scarificiren oder zu sticheln, gelockerte Hautstellen mit scharfem Löffel auszukratzen, Abscesse zu eröffnen. Bei hartnäckiger Wiederholung zahlreicher Pustelausbrüche oder wenn die Derbheit der Haut fortbesteht, Einpinselung mit Ungu. Wilkinsonii sulfurat. oder einer Schwefelpaste (s. Acne vulgaris Rp. 1667, 1668) oder selbst Auflegen von Schmierseife durch 12 Stunden, Einpinseln von Jodtinctur, Jodglycerin,  $\frac{1}{2}\%$ iger Sublimatlösung etc. Bisweilen entstehende papilläre drusige Auswüchse und derbe Knoten wegzuätzen mit:

Rp. 1879.

*Acid. acetic. 10·0,*  
*Lact. sulfur. 2·5.*  
*M. f. pasta.*  
*D. S. Einzupinseln.*

Oder:

Rp. 1880.

*Cupri acetic. 0·3,*  
*Ungu. simpl. 10·0.*  
*D. S. Salbe.*

Ebenso auch Aetzung mit concentrirter Salzsäure oder endlich Excochleation. Nach Heilung der Sycosis der Bart noch durch mindestens ein Jahr zu rasiren.

Bei *Sycosis capilliti* Behandlung wie beim chronischen Ekzem, eventuell auch hier Rasiren und Epilation.

Bei *Sycosis parasitaria* Einpinselung von 1° iger Sublimatlösung oder Auflegen von Essigsäure-Schwefelpaste (s. Rp. 1879).

**Syphilis cutanea. Syphilis der Haut.** Die Schankergeschwüre nach allgemeinen chirurgischen Grundsätzen zu behandeln. Sehr günstig auf die Rückbildung der Sclerose wirkt:

Rp. 1881.

*Emplastr. Hydrargyri ciner.,*

*Emplastr. saponat.*

*aa 10 0.*

*M. f. empl.*

*D. S. Auf Leinwand gestrichen aufzulegen, alle 2—4 Stunden zu wechseln.*

Excision des Primäraffects zur Verhütung des Ausbruchs allgemeiner Syphilis nicht wirksam, ebenso

Präventivkuren nicht anzurathen.

Nach Ausbruch der secundären Syphilis zunächst die am energischsten wirkenden Mittel, also wenn möglich Einreibungskur.

Rp. 1882.

*Ungu. ciner. 30 0.*

*Div. in dos. aequ.*

*No. 10 12.*

*Da in chart. cerat.*

*S. Jeden Abend ein Päckchen einzureiben.*

Die Einreibungen werden jeden Abend an einer anderen Körperregion nach einem bestimmten Turnus gemacht. Dabei sorgfältige Pflege des Mundes, die Zähne fleissig zu putzen, der Mund auszuwaschen mit:

Rp. 1883

*Kal. chloric 5 0,*

*Aqu. font 500 0.*

*S. Den Tag über zu verbrauchen.*

Wo Einreibungen aus äusseren Gründen nicht gut möglich, Injectionen mit:

Rp. 1884.

*Mercur. sublim. corros. 0 1,*

*Aqu. dest. 10 0.*

*D. S. Täglich 1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

Mit sehr gutem Erfolg von Łukasiewicz angewendet:  
Rp. 1885.

*Merc. subl. corr.,*

*Natr. chlorat. āā 2·5,*

*Aqu. destill. 50·0.*

*D. S. Wöchentlich 1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren, intramusculär in die Glutaei.*

Es genügen im Ganzen 6—8 Injectionen.

Ferner werden zu subcutanen Injectionen verwendet das Bamberger'sche:

Rp. 1886.

*Hydrargyr. bichlorat.*

*peptonat. solubil. 10·0.*

*D. S. Täglich 1 Pravaz'sche Spritze z. injiciren.*

In neuerer Zeit nach Neisser und Kopp:

Rp. 1887.

*Calomelan. vap. par. 5·0,*

*Natr. chlorat. 1·25,*

*Aqu. dest. 50·0.*

*S. Jede Woche 1 Spritze in die Glutaealgegend zu injiciren.*

Vielfach wurde in letzter Zeit auch gegeben das von

Lang empfohlene Hydrargyr. oleinic.

Rp. 1888.

*Hydrargyr. pur.,*

*Lanolin. āā 3 0,*

*Ol. Olivar. 4·0.*

*M. f. emulsio.*

*S. Einmal wöchentlich 1½—2 Theilstriche einer Pravaz'schen Spritze in die Glutaealgegend zu injiciren.*

(Gewöhnlich genügen von den beiden letztgenannten Mischungen 3—4—5 Injectionen zur Heilung. Bei Hydrargyr. oleinic. grosse Vorsicht wegen Intoxicationsgefahr).

Ebenso auch nach Lustgarten:

Rp. 1889.

*Hydrargyr. tannic. oxydulat. 2·0,*

*Ol. Vaseline. 20·0.*

*S. Jede Woche 1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

Bei all diesen Quecksilberkuren muss genaue und sorgfältige Pflege des Mundes, wie bei den Einreibungen, beobachtet werden.



Bei Recidiven, besonders der Frühperiode der Syphilis, wenn nicht Gefahr mit langsamer Behandlung verbunden ist, eignet sich auch der innerliche Gebrauch von Quecksilber.

Rp. 1890.

*Hydrarg. tann. oxydul* 3·0,  
*Acid. tannic.* 0·3,  
*Laudan. pur.* 0·2,  
*Sacch. lact.* 7·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aegu. No. 30.*  
*D. S. 3 Pulver täglich.*

Auch innerlicher Gebrauch von Calomel oft ziemlich prompt wirkend.

Rp. 1891.

*Calomelan. laerigat.* 0·5,  
*Opin pur* 0 1,  
*Sacch. alb.* 2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aegu. No. 10.*  
*D. S. 3 Pulver täglich.*

Bei ausgebreiteten gummos ulcerösen Formen Sublimatbäder sehr wirksam:

Rp. 1892.

*Merc. sublim. corrosiv.*  
*10·0,*  
*Aqu. dest.* 200 0.  
*D. S. Zusatz zu einem*  
*Bad.*

In späten Stadien, namentlich bei Knochen- und Gelenksaffectionen, Dolores

osteocopi. Jodbehandlung sehr wirksam.

Rp. 1893.

*Kal. (od. Natr.) iodat.* 2 0,  
*Aqu. dest.* 50·0,  
*Syr. cort. Aurant.* 10·0.  
*D. S. Tagsüber zu ver-*  
*brauchen.*

Rp. 1894

*Kal. (od. Natr.) iodat.* 10·0,  
*Pulv. et extr. Acori q. s.*  
*ut f. pill. No. 40.*  
*D S. Tägl. 4 8 Pillen.*

Bei mit Kachexie des Patienten einhergehenden Spätformen, namentlich bei ulcerösen Rachonaffectionen, zugleich mit Einreibungen:

Rp. 1895.

*Decoct. Zittmann. fort.*  
*300·0.*  
*S. Am Morgen warm zu*  
*trinken.*

Zugleich:

Rp. 1896

*Decoct Zittmann. mit.*  
*250·0 – 300·0.*  
*S. Am Nachmittag kalt*  
*zu trinken.*

Neben Allgemeinkuren in vielen Fällen auch gleichzeitige Localbehandlung einzelner Affectionen angezeigt; bei Psoriasis palmar. u. plantaris, breiten Condylomen und schmerzhaften Papeln, Gummaknoten etc. Belegen der erkrankten Stellen mit Empl. Hydrargyri sehr wirksam. Bei bedrohlichen Destructionsprocessen an der Nase oder im Rachen Aetzung mit Lapis. Gegen Plaques mouqueuses, sowie nässende Papeln und breite Condylome auch Bepinselung mit:

Rp. 1897.

*Mercur. sublim. corros.*  
1·0,  
*Spir. vin. rectific. (oder*  
*Collodii)* 50·0.  
*S. Einzupinseln.*

Oder:

Rp. 1898.

*Acid. lact. concentr.* 20·0.  
*D. S. Zum Einpinseln.*

Oder die Plenck'sche  
Solution:

Rp. 1899.

*Merc. sublim. corrosiv.,*  
*Alum. crud.,*  
*Champhor. ras.,*  
*Ceruss.,*  
*Spir. vin.,*  
*Acet. vin. aa* 5·0.  
*D. S. Einzupinseln.*

Oder:

Rp. 1900.

*Acid. chromic.* 5·0,  
*Aqu. destill.* 10·0.  
*D. S. Einzupinseln.*

Die Syphilisbehandlung so lange fortzusetzen, bis alle Erscheinungen der Lues geschwunden sind, und sobald dieselben wiederkehren, zu wiederholen; dagegen wenn keine Zeichen der Syphilis mehr bestehen, auch keine antisypilitischen Mittel zu nehmen. Als Nachkuren Schwefelbäder, Seebäder, Hydrotherapie neben kräftiger Diät sehr zu empfehlen.

**Teleangiectasia v. Angioma.**

**Tyloma. Schwielen. Clavus. Hühnerauge.** Erweichung durch warme Bäder, Kataplasmen, Einhüllung mit Guttapercha, Bepinseln mit Traumaticin, Umschläge mit Schmierseife, Aetzen mit 50%iger Kalilösung, Auflegen von 20%igem Salicylseifenpflaster, oder Einpinselung von:

Rp. 1901.

*Acid. salicylic. 1·0—2·0,**Collodii elastic. 20·0.**S. Zum Einpinseln.*

Die erweichten Schwielen mit Messer und Scheere auszulösen.

**Ulcus cruris. Fussgeschwür.** Bei Röthung und Schwellung horizontale oder erhöhte Lagerung der Extremität; Kälte, Umschläge mit Bleiwasser oder Liqu. Burowi. Behufs Erzielung guter Granulationen Jodoform- oder Carbolverband, bei tiefgehender Nekrose sehr wirksam:

Rp. 1902.

*Bitumin. Fagi 50·0,**Calcar. sulfuric. 200·0.**M. exactissim. F. pulv**D. S. Dick aufzustreuen,**darüber Watte und**Leinwandbinde. Tägl.**zu erneuern.*

Schlaffe Granulationen anzuregen durch Verband mit:

Rp. 1903.

*Kal. caustic. 1·0,**Aqu. dest. 500·0.**S Die Wunde mit in diese**Lösung eingetauchter**Gaze zu verbinden.*

Bei zu tippiger Granulation Aetzung mit Lapis, Lapisalbe oder Umschläge mit:

Rp. 1904.

*Cupr. acetic. 1·0,**Aqu. dest. 100·0.**S. Zum Verband.*

Sehr weit ausgebreitete Geschwüre heilen oft schnell durch continuirliches Wasserbad. In anderen Fällen Transplantation grösserer Hautlappen nach Thiersch.

Callose Ränder durch Heftpflasterverband einander zu nähern, oder (nach Nussbaum) jenseits der Ränder parallel zu denselben tiefe Einschnitte bis ins Unterhautzellgewebe.

**Urticaria. Nesselausschlag.** Ermittlung und womöglich Beseitigung der Ursache. Bei Urticaria in Folge von Bettwanzen Insectenpulver; bei Urticaria ab ingestis ist

ein Abführmittel wirksam. Bei chronischem Magen- oder Darmkatarrh entsprechende Behandlung durch passende Diät, Soda, Rheum, Bittermittel, Marienbader oder Karlsbader Kur etc. Bei Frauen Behandlung eventuell vorhandener Genitalleiden. Bei typisch auftretenden Anfällen Chinin. Manchmal Orstveränderung von grossem Erfolg. Gegen die einzelnen Ausbrüche Vermeidung von Hitze, von dicht mit Menschen gefüllten oder stark geheizten Räumen, beim Schlafen nur leichte Bedeckung. Bei heftigem Jucken Abwaschungen mit kaltem Wasser, kalte Douchen oder Einwicklungen; Eintupfen mit:

Oder:

Rp. 1905.

*Spir. vin. Gallic.* 200·0,  
*Aether. Petrol.* 5·0,  
*Glycerin.* 2·5.  
*D. S.* Zum Eintupfen.

Rp. 1906.

*Spir. Lavandul.* 100·0,  
*Spir. vin. Gallic.* 150·0,  
*Aether sulfur.* 2·5,  
*Aconitin.* 1·0.  
*D. S.* Wie das Vorige.

· Sehr wirksam gegen das Jucken auch Menthol:

Rp. 1907. *Menthol*,

*Glycerin.*  $\bar{a}\bar{a}$  5·0,  
*Spir. vin. Gallic.* 200·0,  
*Tinct. Benzoës* 3·0.  
*S.* Zum Eintupfen

Auf die benetzten Hautstellen Poudre zu streuen.

Gegen die Entwicklung von Quaddeln durch Insectenstiche Betupfen mit *Ammonia pura liquida*.

In protrahirten Fällen Bäder mit Soda ( $\frac{1}{2}$ —1 Kilogr.), Alaun ( $\frac{1}{2}$  Kilogr.), Sublimat (5—10 Gr). Auch innerlicher Gebrauch von Arsenik (*Pilul. asiaticae*) oder Atropin:

Rp. 1908. *Atropin. sulfuric.* 0·01,

*Aqu. dest.*,  
*Glycerin.*  $\bar{a}\bar{a}$  2·0,  
*Pulv. Tragacanth.* q. s. ut f. pill. No. 20.  
*D. S.* 2mal täglich 1—2 Pillen.

Bei Erwachsenen in chronischen Fällen:

Rp. 1909.

*β-Naphthol.* 5·0,

*Lanolin.*

*Vaselin.* aa 50·0.

*D. S.* Täglich einmal ganz dünn zu verstreichen.

**Variola. Blattern. Pocken.** Bei Erkrankungen mässigen Grades indifferente Behandlung. Mässige Zimmertemperatur, gute Lüftung des Zimmers, kühlende Getränke, am besten frisches Wasser. Bei *Angina variolosa* Gargarismen, wie:

Rp. 1910.

*Kal. chloric. (Alum. crud.)* 5·0,

*Inf. flor. Tiliae* 300·0,

*Tinct. Opii crocat.* 2·5,

*Mell. rosat.* 10·0.

*D. S.* Gurgelwasser.

In hochgradigen Fällen von *Angina* nur Eispillen und frisches Wasser.

In schweren Blatternfällen symptomatische Behandlung des Fiebers, der Ueblichkeit, des Collapses. Opiate und sonstige Narcotica nur bei höchster Unruhe, wenn Patient Selbstmordversuche macht oder seine Umgebung bedroht. In solchen Fällen Klysmen von:

Rp. 1911.

*Chloral. hydrat.* 6·0—8·0,

*Mucilag. gumm. Arab.*,

*Aqu. dest.* aa 25·0.

*D. S.* Zu 2 Klystieren.

Gegen die schmerzhaftige Spannung im Gesicht, an Händen und Füssen Auflegen von Salbenflecken, Einölen, Einschmieren mit Speck, Einhüllen mit kalten, nassen Compressen, Auflegen des Lister'schen Lini-ments (Rp. 1710), oder Bepinseln mit:

Rp. 1912.

*Mercur. sublim. corros. 0·2,*

*Aqu. dest. 100·0.*

*S. Zum Bepinseln.*

In sehr schweren Fällen bei *Variola confluens* am besten vom Beginn der Suppuration an täglich ein lauwarmes Bad von 2—4ständiger Dauer.

Die Narbenbildung kann bei tiefgehenden Pusteln auf keine Weise verhütet werden. Complicationen entsprechend zu behandeln; besondere Sorgfalt auch bei Augenaffectionen.

Nach Eintritt allgemeiner Decrustation täglich oder jeden 2. Tag ein warmes Bad und Seifenwaschung.

**Verrucae. Warzen. Condylomata acuminata. Spitzwarzen.** Abtragung mit Scheere oder Auskratzung mittelst scharfen Löffels. Aetzung der wunden Stelle mit:

Rp. 1913.

*Acid. nitric. fum. 10·0.*

*D. S. Mittelst Holzstäbchens aufzutragen.*

Sehr zweckmässig werden Warzen auch durch Elektrolyse zerstört.

Gegen spitze Warzen auch Einstreuen von:

Rp. 1914.

*Pulv. frond. Sabin.,*

*Alumin. ust. āā 10·0.*

*D. S. Aufzustreuen.*

Oder:

Rp. 1915.

*Resorcin. pur. 10·0—20·0,*

*Glycerin.,*

*Vaselin. āā 25·0.*

*M. f. pasta.*

*D. S. Täglich aufzustreichen.*

---





Aus

## Prof. Dr. Isidor Neumann's

Klinik und Ambulatorium für Syphilis und venerische Krankheiten.

---

### A. Der Tripper und seine Complicationen.

**Gonorrhoea acuta. Acuter Harnröhrentripper.** In den ersten Tagen, bei floriden Entzündungserscheinungen, womöglich Bettruhe oder wenigstens thunlichste Vermeidung von Bewegungen; leichte, reizlose Diät. Später, wenn die Schmerzen geringer, der Ausfluss reichlicher geworden, mässige Bewegung statthaft, grössere Anstrengungen (Laufen, Tanzen, Reiten etc.) jedoch zu verbieten. Kost noch immer reizlos, scharf gewürzte Speisen, kohlensäurehaltige Getränke zu meiden; leichter, gewässerter rother Wein in geringer Quantität allenfalls zu erlauben. Sorge für regelmässigen Stuhl, Vermeiden aller sexuellen Aufregung. Tragen eines passenden Suspensoriums. Einschärfung der nöthigen Vorsicht behufs Vermeidung von Augenblennorrhoe.

In der ersten Zeit die Anwendung aller eigentlichen Trippermittel (Balsame und Injectionen) noch zu unterlassen; local nur Umschläge mit kaltem Wasser oder mit Aqua plumbica auf das Glied, allenfalls auch Injectionen von kaltem Wasser in die Harnröhre. Gegen die schmerzhaften Erectionen:

Rp. 1916. *Kal. bromat.* 10·0,

*Lupulin.* 1·0,

*Morph mur.*

*Camphor. trit. aa* 0·1.

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*Da in chart. cerat.*

*S. Vor dem Schlafengehen 2 Pulver in*  
*<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—1stündigem Intervall.*

(Bei gleichzeitigen Magenbeschwerden, herabgekom-  
mener Ernährung der Kampher wegzulassen.)

Ferner:

Rp. 1917.

*Kal. bromat.* 10·0—20·0,

*Extr. Cannab. Indic.* 0·5—1·0.

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. Abends 1 Pulv. in Wasser oder Mandelmilch*

Bei schmerzhafter und erschwelter Urinentleerung oder  
gar Retentio urinae warme Wannen- oder Sitzbäder,  
Narcotica in Suppositorien (s. unter „Cystitis“, Rp. 1971  
und 1972), der Katheter nur im äussersten Falle.

Nach Ablauf der ersten 3—4 Tage, wenn die Schmerzen  
nachgelassen und reichlicherer Ausfluss erscheint, zunächst  
Balsamica, insbesondere Copaivbalsam, der jedoch beim  
Auftreten von Magenkatarrh oder Diarrhoe, sowie etwa  
eines Erythems auszusetzen ist. Man gibt am besten.

Rp. 1918. *Balsam. Copaiv.* 15·0.

*S. 3mal tägl. (nach den Mahlzeiten) 15 Tropfen*  
*auf gestoss. Zucker in einer Oblate zu nehmen.*

Oder:

Rp. 1919.

*Balsam. Copaiv. gtt.* 5.

*Da in capsul. gelatinos.*

*Dent. tal. dos. No. 50.*

*S. 3mal täglich (nach den*  
*Mahlz.) je 3 Kapseln;*  
*allmählich, wenn es ver-*  
*tragen wird, auf die dop-*  
*pelte Anzahl zu steigen.*

Zweckmässig wird der  
Balsam auch mit aromatischen  
Wässern gemengt:

Rp. 1920.

*Balsam. Copaiv.,*

*Aqu. Menth. pip.,*

*Aqu. Meliss. aa* 50·0.

*S. 3—Imal täglich 1*  
*Kaffelöffel.*

Seltener gibt man:  
Rp. 1921.

*Balsam. Copaiv. 40·0,*  
*Ol. Amygdalar. dulc.,*  
*Mucilag. gumm. Arabic.,*  
*Syr. simpl. oder cort.*  
*Aur. āā q. s. ut f. mixt.*  
*oleos. pond. 300·0.*  
*S. 2—3—6 Kaffeelöffel*  
*täglich.*

Früher war sehr beliebt  
die Chopart'sche Mixtur:  
Rp. 1922.

*Bals. Copaiv. rec.,*  
*Alcohol. pur.,*  
*Syrup. balsam. Tolutan.*  
*āā 50·0,*  
*Aqu. Menth. pip. 180·0,*  
*Acid. nitric. dil. 10·0.*  
*S. 3—6 Esslöffel täglich.*

Seltener, weil den Verdauungstract mehr reizend, wird  
Terpentin gegeben:

Rp. 1923.

*Ol. Terebinth. rect. 5·0.*

*D. S. 3mal täglich je 3 Tropfen auf gestossenem*  
*Zucker oder in einer Tasse Thee; allmählich zu*  
*steigen auf 25 Tropfen pro die.*

Ebenso auch Kapseln (Rp. 1977.)

Oder das leichter verdauliche:

Rp. 1924.

*Ol. lign. Santal. 15·0.*

*S. Wie das Vorige.*

Neben den Balsamicis:

Rp. 1925.

*Herb. Hern.,*

*Fol. Uv. urs. āā 25·0.*

*D. S. Thee; Früh und Abends 1 Löffel auf*  
*eine Tasse heissen Wassers.*

Nach Ablauf der ersten 2—3 Wochen, wenn die Reizerscheinungen geschwunden, das Secret dünnflüssig und weisslich geworden, die zweite Hälfte des in getheilten Portionen gelassenen Harnes anfängt, klar zu werden, Uebergang zu Einspritzungen. Als Unterstützungsmittel derselben, oder wenn Injectionen mit verschiedenen Medicamenten, durch längere Zeit gebraucht, wirkungslos bleiben, kann man Cubeben gebrauchen lassen.

Rp. 1926.

*Pulv. Cubeb. recent*  
*tus. 40·0,*

*Extr. Gentian. 2·0.*

*M. f. pulv.*

*D. S. 3mal täglich eine*  
*Messerspitze voll nach*  
*der Mahlzeit.*

Rp. 1927.

*Extr. Cubeb. alcohol. 20·0,*

*Tinct. aromat. acid. 5·0.*

*S. 4mal täglich je 15 bis*  
*20 Tropfen.*

Rp. 1930.

*Balsam. Copaiv.,*

*Pulv. Cubeb. rec. tus. aa 20,*

*Extr. Gentian q. s ut f. pill. No. 30.*

*Consp. semin Lycopod.*

*D. S. 3mal täglich je 2—3 Stück.*

Rp. 1928.

*Pulv. Cubeb. rec. tus.,*

*Extr. Cubeb. alcohol.*

*aa 5·0.*

*M. f. pill. No. 50.*

*D. S. 3mal täglich je*  
*3 Stück n. d. Mahlzeiten.*

Rp. 1929.

*Balsam. de Tolu,*

*Pulv. Cubeb. rec. tus.*

*aa 5·0.*

*M. f. pill. No. 50.*

*S 3mal täglich je 2—3*  
*Stück.*

**Die Einspritzungen** erst vorzunehmen, wenn die Reizerscheinungen geschwunden, das Secret reichlich, aber dünnflüssig und weisslich ist, also etwa 2—3 Wochen nach Beginn der Erkrankung. Dieselben in sitzender Stellung mittelst Zinn- oder Hartgummi-Spritze, die mit konischem Ende, aber nicht mit beinernem Ansatz versehen ist, auszuführen. Patient muss stets vor der Einspritzung Urin lassen, dann 1—2mal laues Wasser einspritzen und dann erst 1—1 Spritze von dem bei empfindlicher *hina vorle-* *rearmen* den Medicament; dieses *sch Znd* *Or* sicums in der ersten 7 *Secur* *bi* zu 3 Minuten in der *selbst* *de* nahme der Einspritzung die Luft ausgetrieben, *geführt, mit der linken H*

angedrückt und nun durch langsames, gleichmässiges Vorschieben des Stempels die Flüssigkeit in die Urethra injicirt. Diese Procedur anfangs 1mal, später 3mal täglich vorzunehmen. Man beginnt mit schwachen Astringentien in sehr verdünnter Lösung und geht allmählich zu stärkeren und concentrirteren Mitteln über; alle 8—14 Tage das Medicament zu wechseln, insbesondere wenn das bisher gebrauchte kein prickelndes Gefühl mehr in der Harnröhre hervorruft. Verursacht eine Einspritzungsflüssigkeit Brennen, so ist eine schwächere Lösung oder ein leichteres Mittel zu geben oder es sind Injectionen überhaupt noch nicht indicirt.

Die leichtesten, also anfänglich zu gebenden Einspritzungen sind:

Rp. 1931.  
*Kal. hypermanganic.*  
                     0·02—0·08,  
*Aqu. dest.* 200·0.  
*S. Einspritzung.*  
 Rp. 1932.  
*Zinc. sulfocarbol.*  
                     0·2—0·6—1·0,  
*Aqu. dest.* 200·0.  
*S. Einspritzung.*  
 Für die späteren  
 Stadien wird vielfach ver-

wendet die Ricord'sche  
 Lösung:

Rp. 1933.  
*Zinc. sulfuric.* 0·5,  
*Plumb. acetic. basic. so-*  
                     *lut.* 1·0,  
*Aqu. dest.* 200·0.  
*S. Injection; vor dem Ge-*  
                     *brauch gut umzuschüt-*  
                     *teln.*

Andere vielgebrauchte Injectionsflüssigkeiten sind:

Rp. 1934.  
*Zinc. sulfuric.* 0·2—1·0,  
*Aqu. dest.* 200·0.  
*S. Einspritzung.*

Rp. 1935.  
*Alum. crud.* 0·5—1·0,  
*Aqu. dest.* 200·0.  
*S. Injection.*

Rp. 1936.  
*Zinc. sulfuric.,*  
*Alum. crud. aa* 0·3—0·6,  
*Aqu. dest.* 200·0.  
*S. Injection.*



Rp. 1937.

*Plumb. acet. basic. sol.*  
1·0—2·0,

*Aqu. dest.* 200·0.

*S. Einspritzung.* (Vor dem Gebrauch umzuschütteln.)

Rp. 1938.

*Acid. boric.* 3·0—6·0,

*Aqu. dest.* 200·0.

*S. Einspritzung.*

Rp. 1939.

*Resorcin pur.* 3·0—5·0,

*Aqu. bidest.* 100·0.

*Da in vitr. nigr.*

*S. Einspritzung.*

Rp. 1940.

*Bismuth. subnitric.*

0·5—2·0,

*Aqu. dest.* 200·0.

*S. Injection.*

Rp. 1941.

*Cupr. sulfuric.* 0·02—0·06,

*Aqu. dest.* 200·0.

*S. Aeusserlich.*

Rp. 1942.

*Argent. nitric.* 0·02—0·1,

*Aqu. dest.* 200·0.

*S. Einspritzung.*

Seltener verwendet werden:

Rp. 1943.

*Acid. carbolic.* 0·2—1·0,

*Aqu. dest.* 200·0.

*S. Einspritzung.*

Rp. 1944.

*Zinc. acetic.* 0·2—0·6,

*Aqu. dest.* 200·0.

*S. Injection.*

Rp. 1945.

*Acid. tannic.* 0·2—1·0,

*Aqu. dest.* 200·0.

*S. Injection.*

Rp. 1946.

*Kaolin. pulv.* 0·5,

*Aqu. dest.* 200·0.

*S. Injection.*

Rp. 1947.

*Cadm. sulfuric.*

0·2—0·6,

*Aqu. dest.* 200·0.

*S. Injection.*

Rp. 1948.

*Alum. crud.,*

*Plumb. acetic. bas. solut.*

ad 1·0,

*Aqu. dest.* 200·0.

*S. Injection.* (Vor dem

Gebrauch gut umzu-

schütteln.)

Rp. 1949.

*Acid. boric.* 2·0,

*Natr. salicylic.* 0·5,

*Aqu. dest.* 200·0.

*S. Aeusserlich.*

Rp. 1950.

*Cupr. sulfuric.* 0·03,

*Alum. crud. ad*

Rp. 1951.

*Zinc. sulfuric. 0·4,  
Jodoform. 2·0,  
Aqu. dest. 200·0.*

*S. Einspritzung. (Vor  
dem Gebrauch gut um-  
zuschütteln.)*

Rp. 1952.

*Zinc. acetic. 0·5,  
Tinct. Catechu 2·0,  
Tinct. Opii simpl.*

*gtts. 10,  
Aqu. dest. 200·0.  
S. Injection.*

Die Behandlung des Trippers bis zum Verschwinden der Fäden aus dem Morgenharn fortzusetzen. Danach allmählicher Uebergang zur gewohnten Lebensweise.

**Gonorrhoea chronica. Chronischer Harnröhren-  
tripper.** Application von Astringentien oder Desinfi-  
cientien durch Bespülung mittelst Ultzmann'schen  
Irrigationskatheters oder mittelst eines Nélaton- oder  
Mercier-Katheters, den man bis in die Blase vorschiebt,  
dann etwas zurückzieht, so dass kein Urin mehr ab-  
fließt, um nun durch den Katheder die medicamentöse  
Lösung erwärmt einzuspritzen. Recepte siehe S. 418,  
No. 1504—1507.

In veralteten Fällen auch Anwendung concentrirter  
Lösungen mittelst des Ultzmann'schen Tropfapparates  
(s. S. 419). Man verordnet zu diesem Zweck:

Rp. 1953.

*Argent. nitric. 0·2—1·0,  
Aqu. dest. 20·0.*

*Da in lagenul. nigr.*

*S. 1—3 Tropfen jeden oder jeden 2. Tag zu  
injeciren.*

Ebenso auch:

Rp. 1954.

*Cupr. sulfuric. 0·2—1·0,  
Aqu. dest. 20·0.*

*S. Wie das Vorige.*

Oder:

Rp. 1955.

*Zinc. sulfuric. 0·5—2·0,  
Aqu. dest. 20·0.*

*S. Zur Injection.*

Wenn kein Ausfluss besteht, sondern nur Fäden im  
Urin nachweisbar sind, auch Gebrauch von Harnröhren-

Suppositorien zweckmässig, welche vom Patienten selbst mit der Hand oder vom Arzt mittelst des v. Dittol'schen Porte-remède eingeführt werden; dieselben jedoch bei Neigung zu Cystitis, besonders wenn Patient schon einmal Blasenkatarrh durchgemacht hat, nicht anzuwenden.

Rp. 1956.

*Jodoform. 1·0,*  
*Gelatin. alb. q. s. ut f.*  
*suppos. urethr. longi-*  
*tud. centim. 5, crassit.*  
*centim. 0·5 Nr. 10.*  
*D. S. 1—2 Stück täglich*  
*einzuführen..*

Rp. 1957.

*Acid. tannic. 0·2,*  
*Gelatin. alb. q. s. ut f.*  
*supp. urethral. etc.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

(Statt Acidum tannic.  
auch Zinc. sulfuric. oder  
Alum. crud. in derselben  
Dosis.)

Rp. 1960.

*Argent nit. 0·05,*  
*Gelatin. alb. q. s. ut f supp. urethral. No. 10.*  
*D. S. Früh und Abends 1 Stück einzuführen.*

Zur Application mittelst des v. Dittol'schen Porte-remède:

Rp. 1961.

*Zinc. sulfuric. 0·1,*  
*Solv. in Glycerin. q. s.,*  
*But. Cacao q. s. ut. f. supp. urethr. magnit.*  
*gran. hordei No. 10.*  
*D. S. Täglich 1 Stück einzuführen.*

Ebenso:

Rp. 1958.

*Acid. tannic.,*  
*Extr. Opii aquos.,*  
*Balsam. Copair. aa 0·35,*  
*Pulv. gumm. Arabic. 15.*  
*Misce exactissime.*  
*Fiant bac. urethral.*  
*No. 12.*

*D. S. 1—2 Stück täg-*  
*lich einzuführen.*

Rp. 1959.

*Cupr. sulfuric. 0·1,*  
*Gelat. alb. q. s. ut f.*  
*supp. urethral. No. 10.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

Rp. 1962.

*Argent. nitric. 0·03,*

*But. Cacao q. s. ut f. suppos. urethr. brevia*  
*No. 10.*

*D. S. Wie das Vorige.*

**Periurethritis. Cavernitis.** Ruhe, am besten Bettruhe; leichte Kost. Sistiren jeder localen Tripperbehandlung. Der Penis sammt dem Scrotum auf eine um die Oberschenkel herumgeführte Compresse zu lagern; um den Penis ein in Aqua plumbica oder Aqua Goulardi getauchtes, gut ausgedrücktes Tuch, darüber Eisumschläge. Wenn Fluctuation nachweisbar, frühzeitige Incision, antiseptischer Verband. Geht die Entzündung ohne Abscedirung zurück, behufs rascherer Resorption des restirenden Infiltrates Dunstumschläge, Einreibung mit:

Rp. 1963.

*Extr. Belladonn. 1·0,*

*Ungu. ciner. 10·0.*

*S. 3mal täglich ein erbsengrosses Stück einzureiben.*

Oder:

Rp. 1964.

*Jod. pur. 0·2,*

*Kal. iodat. 2·0,*

*Ungu simpl. 20·0.*

*S. Wie das Vorige.*

**Prostatitis. Entzündung der Vorsteherdrüse.** Bei acuter Entzündung Bettruhe, Fieberdiät, Sorge für flüssigen Stuhlgang. Aussetzen der Tripperbehandlung, sowohl der Injectionen als der Balsamica. Bei hochgradigen Schmerzen Morphinsuppositorien. Zur Verminderung der Entzündungserscheinungen Blutegel (10—12 Stück) am Perineum und um den Anus angesetzt, am wirksamsten; ferner Sitzbäder, Gebrauch des Arzberger'schen Apparates, der gut beölt in den Mastdarm eingeführt wird, nachdem die beiden Enden mit Kautschukschläuchen armirt worden, von denen der eine in ein höher gestelltes, mit je nach Bedarf temperirtem Wasser gefülltes Gefäss führt und bis auf den

Boden desselben reicht, der andere nach abwärts in ein auf dem Fussboden stehendes Gefäss geht; mittelst Wund spritze wird die Luft aus den Schläuchen angesogen und das nun nachfliessende Wasser in das am Boden stehende Gefäss geleitet. In ganz acuten Fällen lässt man frisches Brunnenwasser durchfliessen; ist jedoch Abscedirung und Durchbruch nicht mehr zu vermeiden, dann ist es besser, Wasser von 30 - 32° R zu verwenden. Man lässt den Apparat durch einige Stunden im Tag wirken. Bei Harn verhaltung äusserst vorsichtige Einführung eines dünnen, elastischen Katheters in die Blase. Bei Fluctuation, drohendem Durchbruch Incision vom Mastdarm her.

Bei chronischer Prostatitis, Prostatorrhoe kräftige, aber reizlose Kost, Vermeidung von sexuellen Erregungen, Sorge für regelmässigen Stuhl. Gegen Pollutionen Bromkali, Kampher (s. Rp. 1916, 1917). Entsprechende Behandlung der gleichzeitigen chronischen Gonorrhoe. Warme Sitzbäder, Anwendung des Arzberger'schen Apparates (s. oben), durch den man täglich 2mal  $\frac{1}{2}$  Stunde lang Wasser von 35—40° fliessen lässt. Daneben Jodkali-Suppositorien:

Rp. 1965.

*Jod. pur. 0·05,*

*Kal. iodat. 2 0,*

*Extr. Belladonn. 0·15,*

*But. Cacao q. s. ut f. suppos. No. 10.*

*D. S. Früh und Abends 1 Zäpfchen.*

Wenn die Prostata nicht druckempfindlich ist, zweckmässig auch Massage derselben mit dem in den Mastdarm eingeführten Zeigefinger, den man unter allmählich steigendem Druck in circulären und linearen Touren durch einige Minuten über der vergrösserten Drüse herumführt.

**Epididymitis. Nebenhodenentzündung.** Das sicherste Prophylacticum ein gut passendes Suspensorium. Nach Ausbruch der Krankheit jede Localbehand-

lung des Trippers oder einer etwa gleichzeitig vorhandenen Cystitis zu sistiren. Im Beginn Bettruhe, Fieberdiät, Sorge für regelmässigen Stuhl. Trinken von Biliner Wasser. Der Hodensack durch ein Keilkissen oder besser durch ein über die Oberschenkel gespanntes, unter denselben befestigtes Handtuch hochgelagert zu halten und mit kalten Umschlägen (Bleiwasser-Umschlag, darüber in Eiswasser getauchte Compressen) zu bedecken, bei starken Schmerzen auch Anwendung des Leiter'schen Kühlapparates. Gegen die Schmerzen ferner Einreibung von:

Rp. 1966.

*Extr. Opii aquos. 1·0,*  
*Ungu. simpl. 20·0.*  
*D. S. Salbe.*

Rp. 1967.

*Extr. Belladonn. 1·0,*  
*Ungu. simpl. 20·0.*  
*D. S. Salbe.*

Bei sehr starken Schmerzen, Gefühl von Drängen nach unten, auch Morphinsuppositorien (s. Rp. 1971.) Bei acuter Hydrocele und durch dieselbe bewirkter starker Spannung Punction mittelst Troiscarts.

Wenn die acuten Entzündungserscheinungen zurückgegangen, behufs Resorption des zurückgebliebenen Infiltrates Einpinselung von Jodtinctur (mit Tinct. Gallar.  $\overline{aa}$ ) oder von Jodkalisalbe, am häufigsten aber von:

Rp. 1968.

*Plumb. iodat. 3·0,*  
*Ungu. simpl. 30·0.*

*S. Messerrückendick aufzustreichen u. aufzulegen.*

In diesem Stadium kann Patient bereits aufstehen, muss aber zu diesem Behuf das Langlebert-Zeissl'sche Suspensorium tragen: Direct auf das Scrotum kommt ein mit Jodbleisalbe bestrichener Leinwandlappen (der, wenn die Schwellung schon zum Theil zurückgegangen, auch weggelassen werden kann), darüber eine Lage Bruns'scher Watte, hierauf ein Stück Kautschukleinwand, die vulcanisirte Seite nach innen, mit einem Ausschnitt für den Penis und nun das eigentliche Suspensorium aus Leinwand, das durch Bauch-



und Schenkelbänder befestigt wird, während zwei kurze Bändchen auf jeder Seite beim Zusammenbinden einen Einschnitt des Suspensoriums zusammenziehen und so eine Wölbung desselben hervorbringen. Dieses Suspensorium bei Tag fester, bei Nacht lockerer angezogen, fortwährend zu tragen.

Wenn die acuten Symptome vollkommen geschwunden sind und nur noch eine derbe Schwellung ohne Schmerzhaftigkeit zurückbleibt, Anlegung des Fricke'schen Verbandes: Mit der linken Hand wird oberhalb des kranken Hodens das Scrotum umfasst und der Hoden fest nach abwärts gedrückt, hierauf knapp ober der linken Hand eine Circulärtour, aus einem mit gut klebendem grauem Pflaster bestrichenen, 1 Cm breiten Leinwandstreifen fest angelegt, so dass der kranke Hode durch dieselbe von dem übrigen Scrotalinhalt ganz abgeschlossen erscheint. Mitteltst ebensolcher Streifen von grauem Pflaster werden nun einige auf der erwähnten Circulärtour senkrecht stehende comprimirende Meridional Touren angelegt, die durch noch eine oder mehrere, der ersten parallele Circulärtouren zusammengehalten werden. Nach einigen Tagen Verbandwechsel; wenn Ekzem auftritt, der Verband ganz wegzulassen. Nach Ablauf einer Epididymitis soll Patient noch durch lange Zeit ein Suspensorium tragen.

**Cystitis. Blasenkatarrh.** Bei acuter Cystitis Bett-ruhe, blande Diät; namentlich viel Milch, Regelung der Stuhlentleerungen; wenn nothig, Klystiere oder Bitterwasser. Aussetzen etwa bisher verwendeter Balsamica oder Injectionen. Gebrauch von Sitzbädern 2 3mal des Tages, warme Umschläge oder Kataplasmen auf die Blasengegend. Gegen starke Schmerzen und häufigen Harndrang ferner:

Rp. 1969. *Lupulin.* 2·0,  
*Morph. muriat.* 0·05,  
*Sacch. alb.* 5·0.  
*M. f. pulv. Div. in dr.*  
*D. S. 3—5 Pulver*

Oder:

Rp. 1970.

*Camphor. ras.* 1·0,  
*Ol. Amygdalar. dulc.* 20·0,  
*Pulv. gumm. Arabic.* 10·0,  
*Aqu. Cerasor. nigror.* 150·0,  
*Syr. simpl.* 50·0.  
*D. S.* 2stündl. 2 Esslöffel.

Energischer wirken Suppositorien, wie:

Rp. 1971.

*Morph. mur.* 0·1,  
*But. Cacao q. s. ut f.*  
*suppos. No. 10.*  
*D. S.* Früh und Abends  
 1 Zäpfchen.

Oder:

Rp. 1972.

*Extr. Belladonn.* 0·2,  
*But. Cacao q. s. ut f.*  
*supp. No. 10.*  
*D. S.* Wie das Vorige.

Innerlich schleimige Getränke, wie:

Rp. 1973.

*Herb. Herniar.,*  
*Herb. Chenopod. ambros.*  $\overline{aa}$  25·0.  
*S.* Wie das Vorige.

Oder:

Rp. 1974.

*Decoct. sem. Lini* 300·0,  
*Tct. Opii simpl. gtts.* 10—30.  
*D. S.* Tagsüber zu verbrauchen.

Bei Blasenblutung im Beginn der Cystitis:

Rp. 1975.

*Extr. Secal. cornut.* 1·0,  
*Aqu. dest.* 150·0,  
*Syr. rub. Idaei* 20·0.  
*S.* 2stündlich 1 Esslöffel.

Oder:

Rp. 1976.

*Extr. Secal. cornut.* 1·0,  
*Elaeos. Cinnamom.,*  
*Sacch. alb.  $\overline{aa}$*  2·0.  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*uequ. No. 10.*  
*D. S.* 2stündl. 1 Pulver.

Bei starker und hartnäckiger Blutung Einspritzung von kaltem Wasser in die Blase oder Einführung und Liegenlassen eines dicken Nélaton-Katheters (Horowitz). Wenn auch dies nicht von Erfolg, Einspritzung einer 2—3%igen Lösung von Argent. nitric. oder einer  $\frac{1}{2}$ —1%igen Eisenchloridlösung.

Haben einige Tage nach Beginn der Erkrankung die heftigen Reizerscheinungen nachgelassen, besteht kein

Fieber mehr, keine Hämaturie, so kann man Balsamica gebrauchen lassen, am besten Terpentin:

Rp. 1977.

*Ol. Tereb. rectificat. gtts. 5.*  
*Da in capsul. gelatinos.*  
*Dent. tal. dos. No. 20.*  
*S. Täglich 1—3 Kapseln.*

Oder:

Rp. 1978.

*Terebinthin. ven. pur.,*  
*Extr. Gentian. aa 3·0.*  
*M. f. pill. No. 30.*  
*D. S. 3mal tägl. 1 Pille*  
*nach der Mahlzeit.*

Neuerlich auch:

Rp. 1979.

*Ol. lign. Santal. gtts. 5.*  
*Da in caps. gelatinos.*  
*Dent. tal. dos. No. 2.*  
*D. S. Früh und Abends*  
*1 Kapsel. (Tägl. um*  
*1 Tropfen pro dos. zu*  
*steigen bis zu 10 Tropf.*  
*pro dos.)*

In neuerer Zeit empfohlen:

Rp. 1980.

*Extr. Kawae depurat. 0·2,*  
*Sacch. alb. 3·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 10.*  
*D. S. 3stündl. 1 Pulver.*

Von guter Wirkung sind in diesem Stadium auch:

Rp. 1981.

*Aqu. Calcis 100·0.*  
*S. Tagsüber in 3 Por-*  
*tionen, mit der doppelten*  
*Menge Milch gemischt,*  
*zu trinken.*

Rp. 1982.

*Kal. chloric. 3·0,*  
*Aqu. dest. 200·0,*  
*Aqu. Laurocer. 1·5.*  
*S. Esslöffelweise in einem*  
*Tag zu verbrauchen.*

Oder:

Rp. 1983.

*Acid. benzoic. 5·0,*  
*Glycerin. q. s. ut f. pill.*  
*No. 20.*  
*D. S. 5—10 Pillen tägl.*

Rp. 1984.

*Natr. benzoic. 5·0,*  
*Aqu. font. 300·0,*  
*Syr. cort. Aur. 20·0.*  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

~ Nach Aufhören aller Reizerscheinungen Mineralwässer von Bilin, Giesshübl, Preblau, Karlsbad etc. Ist die Cystitis chronisch geworden, neben dem Gebrauch der erwähnten Medicamente (Rp. 1977—1984), namentlich

der Balsamica, methodische, täglich 1—2mal vorzunehmende Ausspülungen der Blase: Die Blase wird mittelst eines Nélaton-Katheters entleert, der stets in 5%iger Carbolglycerinlösung aufzubewahren ist und vor der Einführung gut abgetrocknet und bestrichen wird mit:

Rp. 1985. *Acid. carbolic.* 0·5—1·0,  
*Ol. Olivar.* 100·0.  
*S. Carbolöl.*

Ist die Einführung des Katheters schwierig, so thut man gut, vor derselben mittelst einer kleinen Spritze (Tripperspritze) Carbolöl in die Harnröhre einzuspritzen. Nach Entleerung der Blase wird nun durch den Katheter laues Wasser oder ganz schwache ( $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{4}$ %ige) Carbolösung eingespritzt und wieder ausfliessen gelassen, so lange, bis die injicirte Flüssigkeit klar zurückfliesst. Hierauf wird eines der folgenden Medicamente ebenfalls lauwarm eingespritzt, im Anfang 1 Spritze voll, später  $1\frac{1}{2}$ —2; der Katheter wird nun herausgezogen und Patient angewiesen, nach 20—30 Minuten selbst das injicirte Medicament auszuuriniren. Man verwendet als Injectionsflüssigkeiten:

Rp. 1986.  
*Kal. hypermang.* 0·5—1·0,  
*Aqu. dest.* 500·0.  
*S. Injection.*

Rp. 1987.  
*Acid. boracic.* 10·0—25·0,  
*Aqu. dest.* 500·0.  
*S. Zur Einspritzung.*

Rp. 1988.  
*Acid. salicylic.* 1·0—2·0,  
*Aqu. dest.* 500·0.  
*S. Einspritzung.*

Rp. 1989.  
*Resorcin. bis resublimat.*  
                             25·0—50·0,  
*Aqu. dest.* 500·0,  
*Zur Einspritzung.*

Rp. 1990.  
*Zinc. sulfuric.* 1·0—2·5,  
*Aqu. dest.* 500·0.  
*S. Aeusserlich.*

Rp. 1991.  
*Natr. sulfuric.* 5·0—25·0,  
*Aqu. dest.* 500·0.  
*S. Zur Einspritzung.*

Rp. 1992.  
*Alum. crud.* 1·0—2·0,  
*Aqu. dest.* 500·0.  
*S. Zur Einspritzung.*

Rp. 1993.  
*Argent. nitric.* 0·25,  
*Aqu. dest.* 500·0.  
*Da in vitr. nigr.*  
*S. Aeusserlich.*

Bei sehr hartnäckiger Cystitis Untersuchung auf etwa vorhandene Stricture der Harnröhre oder Lithiasis. Berücksichtigung eventuell bestehender Anämie oder Kachexie; roborirende Diät, Landaufenthalt etc.

**Gonorrhoe bei Weibern.** Im acuten Stadium Ruhe, Sorge für regelmässigen Stuhl, kühle Sitzbäder, kalte Umschläge auf die Genitalien; wenn die Einführung eines Instrumentes möglich, Application des analog dem Arzberger'schen Apparat construirten Heitzmann-Leiter'schen Scheidenkühlers; zwischen die Labien, in die Genitocruralfalte, die Afterkerbe Watte oder hydrophile Gaze einzulegen. Bei subacuter oder chronischer Erkrankung neben entsprechenden diätetischen Massnahmen, namentlich absoluter Enthaltung vom Coitus, Behandlung etwa gleichzeitig vorhandener Anämie, local Irrigationen mit Astringentien mittelst Irrigateurs, der mit einem Scheidenansatz versehen ist, am besten sitzend (über einem Bidet) auszuführen. Man verwendet:

Rp. 1994.

*Album crud. 100·0.*  
S. 2—3 Esslöffel auf  
1 Lit. warmen Wassers.

Rp. 1995.

*Zinc. sulfuric. 100·0.*  
S. 1—2 Kaffelöffel auf 1  
Liter warmen Wassers.

Diese Irrigationen 3mal täglich vorzunehmen, nach denselben stets die Vagina mit an Fäden befestigten Wattetampons auszufüllen. Dieselben können bei chronischer Erkrankung auch mit Alaunpulver, Tannin, Jodoform bestreut eingeführt werden. In hartnäckigen Fällen Ausreiben der Vagina mit einem in 1<sup>0</sup>/<sub>100</sub> iger Sublimatlösung getränkten Wattetampon und hierauf Einlegen eines trockenen Tampons oder Auspinselung der Vaginalschleimhaut mit Jodtinctur (alle 3—4 Tage auszuführen.) Complicirender Cervicalkatarrh, Erosionen des Muttermundes entsprechend zu behandeln; namentlich Bepinselungen mit Jodtinctur.

(Die *Blennorrhoea urethrae* wird beim Weibe analog der Gonorrhoe des Mannes behandelt; im Beginn diätetische Massregeln, später Copaivbalsam, Einspritzung schwacher Lösungen von *Zinc. sulfocarboicum* oder *sulfuricum*, eventuell in chronischen Fällen auch Einführung von Urethral-suppositorien, s. R. 1956—1960).

## Anhang.

**Balanitis. Eicheltripper.** Behandlung etwaigen ursächlichen Trippers oder Schankers. Fleissige Reinigung der Glans und des inneren Präputialblattes mit in  $\frac{1}{2}$ —1%ige Carbollösung oder eine andere schwache antiseptische Lösung getauchter Bruns'scher Watte. Einstreuung von Amylum oder:

Rp. 1996.

*Acid. salicylic. 0·5,*

*Talc. venet. 50·0.*

*S. Streupulver.*

Auf balanitische Erosionen Jodoform, darüber in 2%ige Carbollösung getauchte und ausgedrückte Watte, die Vorhaut darüber zu ziehen. Bei veranlassender Seborrhoe nach Heilung der Balanitis Gebrauch von:

Rp. 1997.

*Acid. tannic.,*

*Amyl. pur. āā 10·0.*

*S. Streupulver; täglich mehrmals auf Glans und inneres Vorhautblatt einzustreuen und Watte einzulegen.*

**Phimosis. Vorhautverengerung.** Bei entzündlicher (namentlich bei durch Balanitis, Tripper oder Ulcus molle bedingter) Phimosis zunächst antiphlogistische Behandlung: Ruhe, Hochlagerung des Penis, Application von Umschlägen mit:



Rp. 1998.

*Plumb. acetic. bas. sol.*  
10·0,

*Aqu. dest.* 300·0.

S. Zu Umschlägen.

Darüber Eisumschläge.  
Ausspülen des Präputial-

sackes mit 2<sup>o</sup>iger Carbol-  
lösung oder mit:

Rp. 1999.

*Camphor. trit.* 3·0,

*Mucil. gumm. Arab.* 30 0,

*Aqu. dest.* 300·0.

S. Zur Ausspritzung.

Mechanische Erweiterung der Phimose durch Einlegen von Jodoformgaze oder von in 2<sup>o</sup>ige Carbolsäure getauchten Wattewicken.

Wenn die Phimosis auf diese Weise nicht behoben wird, oder wenn von Anfang an starke Entzündungserscheinungen bestehen oder gar Gangrän droht, operative Behandlung, und zwar meist Circumcision: Dorsalincision bis in den Sulcus coronarius, sodann circumläre Abtragung des Präputiums etwas vor dem Sulcus coronarius, Vernähung der beiden Lamellen, Jodoformverband. Bei langem Präputium auch Abkappung: Die Vorhaut so weit als möglich vorzuziehen, während ein Assistent den Penis zurückhält, und durch einen Schnitt mit einem grossen Scalpell abzukappen, dann Vernähung wie bei der Circumcision. Nach der Operation auftretende Erectionen durch Bromkali-Lapulinpulver (s. Rp. 1916) zu verhindern oder zu mindern.

Bei Phimosis in Folge von Syphilis zunächst anti-syphilitische Allgemeinbehandlung; wenn diese nicht zum Ziel führt oder in Folge zurückbleibender Narben die Phimosis noch fortbesteht, Operation.

Bei Phimosis in Folge von spitzen Warzen stets operativer Eingriff, ebenso bei der angeborenen Form.

**Condylomata acuminata. Spitze Warzen.** Grössere Condylome sind mit Scheere oder scharfem Löffel abzutragen oder durch den Thermocauter zu zerstören.

Bei kleineren Wucherungen genügt Aetzung mit Lapis, Acid. nitr. cum, Acid. lacticum, Eisenchlorid, bei flacher

Ausbreitung auch täglich ein- bis zweimalige Einpinselung von Jodtinctur, oder:

Rp. 2000.

*Pulv. frond. Sabin. 5·0,*  
*Ferr. sulfuric.,*  
*Alum. ust. āā 10·0.*  
*S. Täglich die erkrankten*  
*Stellen damit zu be-*  
*streuen u. einzureiben.*

Ebenso:

Rp. 2001.

*Pulv. frond. Sabin.,*  
*Alum. ust. āā 10·0,*  
*Cupr. sulfuric. 1·0.*  
*S. Wie das Vorige.*

Oder: Rp. 2004.

*Resorcin. 4·0,*  
*Collodii. 40·0.*  
*D. S. Zum Einpinseln.*

In ähnlicher Weise wirkt auch:

Rp. 2002.

*Resorcin. 3·0—6·0,*  
*Ungu. simpl. 6·0.*  
*D. S. Salbe; täglich ein-*  
*mal auf Leinwand*  
*aufgestrichen zu appli-*  
*ciren.*

Oder:

Rp. 2003.

*Resorcin. 8·0,*  
*Sacch. lact. 2·0.*  
*S. Streupulver.*

## B. Die venerische Helkose und Adenitis.

**Ulcus molle. Weicher Schanker.** Behandlung wie bei Geschwüren im Allgemeinen, rein antiseptisch. Der Penis wird durch 10 Minuten in 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>iger Carbolsäure gebadet; darauf wird auf das Geschwür Jodoform- oder Sublimatgaze applicirt oder Jodoform in Pulver mittelst Zerstäubers aufgestreut; darüber in Carbol getauchte, ausgedrückte Watte, die mit Calicotbinde, oder wenn das Geschwür an der Glans oder der Innenfläche des Präputiums sitzt, einfach durch Darüberschieben des letzteren fixirt wird. Der Verband täglich zu wechseln.

Bei multiplen Geschwüren sehr zweckmässig der Jodoform-Spray nach Mraček:

Rp. 2005.

*Jodoform.* 5·0,

*Aether. sulfuric.* 35·0.

*S. Mittelst Richardson'schen Zerstäubungsapparates auf die Geschwüre zu appliciren.*

Sitzt der Schanker am Frenulum, so ist dasselbe doppelt zu unterbinden und zu durchschneiden.

Bei schlechter Granulation, speckigem Belag, wenn das Jodoform nicht rasch eine Reinigung herbeiführt, Aetzung mit concentrirten Säuren oder:

Rp. 2006. *Cupr. sulfuric.* 5·0,

*Aqu. dest.* 15·0.

*S. Darin getränkte Watte auf das Geschwür aufzulegen, 2stündlich zu wechseln bis zur Entstehung eines blauen Atzschorfes.*

Die Anwendung von *Argentum nitricum* in Substanz oder Lösung bei unreinen, belegten Geschwüren zu meiden, höchstens bei zu üppiger Granulation gestattet.

Bei Complication des Geschwüres mit Phimosis entsprechende Behandlung der letzteren (s. „Phimosis“, S. 561 f.)

Ist das Geschwür bereits in eine schön granulirende Wunde verwandelt, auch Anwendung von Salben empfehlenswerth:

Rp. 2007.

*Merc. praecip. rubr.* 0·2,

*Ungu. simpl.* 20·0.

*S. Salbe.*

Rp. 2008.

*Argent. nitric.* 0·3,

*Vaselin.* 20·0.

*S. Salbe.*

Bei phagedänischen gangränösen Geschwüren neben Berücksichtigung des Allgemeinzustandes (event. Gebrauch von Fomentis) local auch das Geschwür dielt und darüber Watte zu legen und täglich 1–3mal zu wechseln, mit Carbollosung abgespült.

Rp. 2009.

*Butum. Emulsi.*

*Calcar. sulfuric.*

*S. Aether.*

Wenn Gypstheer nicht baldige Reinigung herbeiführt, am besten energisches Ausbrennen des Geschwürs mit Thermocauter oder permanentes Wasserbett.

### **Adenitis inguinalis. Bubo. Leistendrüsenentzündung.**

Bei acut entzündlicher Schwellung der Leistendrüsen Bettruhe; so lange keine Fluctuation nachweisbar, Umschläge mit Bleiwasser, oder mit verdünnter Burow'scher Lösung, darüber eventuell Eisumschläge, die sehr häufig gewechselt werden müssen.

Rp. 2010.

*Aqu. vegeto-min. Goulard. 15·0,*

*Aqu. dest. 500·0.*

*S. Zu Umschlägen. (S. auch Rp. 1998.)*

Im Beginne der Entzündung auch Einpinselung von Jodtinctur oft von Erfolg:

Rp. 2011.

*Tinct. Jodin.,*

*Tinct. Gallar. āā 10·0.*

*S. Zum Einpinseln.*

Ebenso auch Gebrauch von Jodsalben (s. Rp. 1964). Ferner das Auflegen und Befestigen von Schrotbeuteln oder Bleiplatten oft resorptionsbefördernd.

Bei Fluctuation Dunstumschläge; wenn Durchbruch droht, ausgiebige Incision parallel dem Poupart'schen Bande, Entleerung des Eiters, Jodoformverband. Bei strumösen Bubonen Ausschälung der erkrankten Drüsen mit dem (vorher peinlich desinficirten) Finger oder Abbindung des Stiels und Exstirpation der Drüsen mit der Scheere; kleinere Drüsenpartikel mit dem scharfen Löffel zu entfernen. Jodoformverband, welcher, wenn nicht Fieber oder starke Schmerzen die Besichtigung der Wunde erheischen, durch 4—5 Tage liegen bleibt. Bei schlechter oder zu üppiger Granulation Anwendung von Lapis in Substanz oder Bepinselung concentrirten Lösungen:

Rp. 2012.

*Argent. nitric.* 1·0 - 5·0,*Aqu. dest.* 10·0.*Da in vitr. nigr.**S. Zu Handen des Arztes.*

In anderen Fällen, bei schlaffen, blassen Granulationen, auch Anwendung von Kampherschleim, indem die Wunde mit in denselben getauchter hydrophiler Gaze bedeckt wird, darüber Watte und Calicotbunde; täglicher Verbandwechsel.

Rp. 2013.

*Camphor. trit.* 2·0,*Gumm. Tragacanth.,**Mucilag. gum. Arabic.**aa* 10·0, |*Aqu. dest.* 200·0.*S. Kampherschleim.*

Wenn Hohlgänge bestehen, zunächst in dieselben

Jodoformstäbchen einzuführen:

Rp. 2014.

*Jodoform.* 2·0,*Gumm. Tragacanth.,**Amyl.,**Glycerin. aa q. s ut f.**bacill. No. 10.**D. S. Jodoformstäbchen.*

Wenn hiedurch der Hohlgang sich nicht schliesst, Spaltung des darüber liegenden Gewebes auf der Hohlsonde und energische Excochleation.

Ist die Wunde schmierig belegt, gangränös, phagedanisch, serpiginös, so bewirkt Gypstheer (s. Rp. 2009), täglich dicht eingestreut, oft rasche Reinigung. Wo auch dies ohne Erfolg, Anwendung des Thermo-cauters.

## C. Syphilis.

**Ulcus durum. Sclerosis. Harter Schanker.** Prophylaktisch Zerstörung verdächtiger Excoriationen mittelst Thermo-cauters innerhalb der drei ersten Tage nach dem Contus. Ist der harte Schanker constatirt, so ist die Behandlung im Wesentlichen local. **Excision**

verhindert nicht den Ausbruch der Allgemeinerkrankung. Daher die Behandlung in den meisten Fällen einfach antiseptisch, der des weichen Schankers entsprechend (s. das. S. 563 ff.) Besonders empfehlenswerth die Anwendung des Jodoforms als Pulver, Jodoformgaze oder als Jodoformspray mit Aether (s. Rp. 2005), sowie auch:

Rp. 2015.

*Jodoform. pulv. 1·0,  
Aether. sulfuric.,  
Ol. Olivar. āā 5·0.  
S. Darin eingetauchte  
Watte aufzulegen.*

Bei hochgradigem Zerfall statt Jodoform hie und da auch:

Rp. 2016.

*Jod. pur. 0·1,  
Kal. iodat. 1·0,  
Aqu. dest. 50·0.  
S. Verbandwasser.*

Ist das Geschwür gereinigt, behufs Ueberhäutung und Erweichung der Sklerose Anwendung von Quecksilbermitteln:

Rp. 2017.

*Merc. sublim. corros. 0·1,  
Aqu. dest. 30·0.  
S. Verbandwasser.*

Ist die Sklerose überhäutet, aber noch sehr derb, so ist sie erst aufzuätzen, um dann die Quecksilbermittel leichter zur Wirkung zu bringen. Zu dieser Aufätzung am besten:

Rp. 2021. *Merc. sublim. corros. 2·0,  
Spir. vin. 20·0.  
S. Auf den Knoten einzupinseln.*

Besser:

Rp. 2018.

*Emplastr. Hydrarg.  
ciner.,  
Emplastr. Diachyl.  
simpl. liquef. āā 10·0,  
Ol. Olivar. q. s. ut f.  
emplastr. moll.  
S. Auf Leinwand messer-  
rückendick aufgestri-  
chen aufzulegen.*

Ebenso:

Rp. 2019.

*Emplastr. Hydrarg. ciner.,  
Emplastr. saponat.  
āā 10·0.  
S. Wie das Vorige.*

Rp. 2020.

*Merc. praecip. rubr. 0·1,  
Vaselin. 20·0.  
S. Salbe.*



Bei Phimosis in Folge der Sklerose operative Behandlung, wenn diese nicht zugegeben wird, neben fleissiger Ausspritzung des Präputialsackes mit antiseptischen Flüssigkeiten frühzeitige antisymphilitische Allgemeinbehandlung (Einreibungskur).

Neben der Localbehandlung ist für Kräftigung der Constitution, zweckmässige Lebensweise zu sorgen, damit Patient die zu erwartende secundäre Syphilis leichter überstehe, sowie eventuell vorlandene Ekzeme oder sonstige Hautkrankheiten, ferner Affectionen der Zähne und der Mundschleimhaut entsprechend zu behandeln. Antisyphilitische Allgemeinbehandlung in der primären Periode vermag den Ausbruch der secundären Syphilis nur hinauszuschieben, nicht zu verhindern; dieselbe ist aber angezeigt bei Phimosis, wenn die Operation nicht zugegeben wird (s. o), ferner bei Sklerose im Gesicht oder in der Urethra, sowie bei Schwangeren.

**Secundäre und tertiäre Syphilis.** a) Allgemeinbehandlung. Dieselbe in allen Fällen von secundärer und tertiärer Lues vorzunehmen, und zwar im Grossen und Ganzen nach folgenden Indicationen: In den meisten Fällen von secundärer Syphilis, namentlich bei der ersten Eruption, Einreibungskur; dieselbe ist nur bei zarten, schwachen, meist blonden Individuen, deren Haut durch die Einreibungen von heftigem acutem Ekzem befallen wird, contraindicirt. Wo die Einreibungskur wegen dieses Umstandes oder wegen besonderer privater Verhältnisse nicht durchzuführen ist, Injectionen oder interne Verabreichung quecksilberhaltiger Mittel. Bei leichten Recidiven des secundären Stadiums innerlicher Gebrauch von Quecksilber oder von Jod; bei schweren Formen der secundären Lues, namentlich bei Iritis, aber stets Einrei-

Bei tertiärer Syphilis  
brauch von Jodpräparaten, 1

Einreibungskur oder Injectionen. Bei ausgebreiteten Ulcerationen, zahlreichen zerfallenden Hautgummen Sublimatbäder von vorzüglicher Wirkung. Bei tertiären Affectionen des Periosts (*Dolores osteocopi*), der Gelenke, Muskeln oder Sehnenscheiden Anwendung von Jod, am besten Jodoforminjectionen. Bei schwerer tertiärer Syphilis kachektischer Individuen behufs Kräftigung des Kranken zunächst vegetabilische Tränke, insbesondere Decoct. Zittmann., eventuell mit Jod combinirt, oder andere Roborantia, nach deren Gebrauch man dann die Einreibungskur folgen lässt. Bei Tertiär Syphilis des Auges, der inneren Organe zweckmässig Einreibungskur mit Jod combinirt.

In der Latenzperiode, wenn keine manifesten Symptome von Lues mehr bestehen, ist es namentlich in den ersten zwei Jahren nach der Infection angezeigt, in Pausen von 2—4 Monaten leichte, etwa 4wöchentliche Kuren durchmachen zu lassen, wobei man innerlich zunehmende quecksilber- oder jodhaltige Mittel verwendet.

Die einzelnen Behandlungsmethoden werden in folgender Weise durchgeführt:

### I. Einreibungskur.

Vor Beginn der eigentlichen Kur ein oder mehrere Wannenbäder zu verordnen, in denen die Haut des Kranken gut eingeseift und abgewaschen werden soll. Ausserdem entsprechende Vorbereitung des Mundes (s. „Mundpflege“, S. 571 ff.).

Zur Einreibung verschreibt man.

Rp. 2022.

*Unguent. ciner. 3·0—5·0.*

*Dent. tal. dos. No. 10.*

*Da in chart. cerat.*

*S. Täglich 1 Päckchen zu gebrauchen.*

In leichteren Fällen, namentlich bei secundärer Lues, werden gewöhnlich 3·0 pro dos., bei schwerer tertiärer Syphilis, namentlich bei bedrohlichen Erscheinungen von

Seite des Gehirns oder Auges, 5·0 pro dos. und darüber verwendet.

Statt der grauen Salbe in neuerer Zeit empfohlen:  
Rp. 2023.

*Hydrargyr. oleinic. 2·0.*

*Dent. tal. dos. No. 10.*

*D. S. Täglich 1 Packchen zu gebrauchen.*

Die Einreibungen in einem bestimmten Turnus vorzunehmen; man reibt ein:

am 1. Tag: beide Waden;

am 2. Tag: Innen und Aussenfläche beider Oberschenkel mit Umgehung der Leistengegenden;

am 3. Tag: die Seitentheile von Brust und Bauch mit Vermeidung der Gegend der Spina ant sup und des Darmbeinkammes, sowie der Brustwarzen.

am 4. Tag: die Bogenflächen der Arme mit Ausnahme der Ellbogenbeuge:

am 5. Tag: den Rücken unterhalb der Scapularwinkel.

Stark behaarte Körperstellen sind zu vermeiden oder bei allgemeiner starker Behaarung vor Beginn der Kur zu rasiren:

am 6. Tag folgt ein Reinigungsbad, worauf am 7. Tag wieder mit den Waden begonnen wird.

Technik der Einreibung Die Friction entweder vom Patienten selbst mit Ausnahme des Rückens, der von einem Andern eingerieben werden muss, oder von einem geschulten Wärter vorzunehmen. Man trägt ein etwa erbsengrosses Stück Salbe auf den einzureibenden Theil auf und verreibt es mit dem Daumenballen (wenn Schwielen oder Rhagaden an der Hand vorhanden sind, soll die letztere durch einen Glacéhandschuh geschützt werden) in grossen Touren, ohne dabei stark aufzudrücken, bis zum Trockenwerden der Haut: hierauf wird ein zweites, ebenso grosses Stück auf die entsprechende Stelle der anderen Seite eingerieben und so fort, bis das für den Tag bestimmte Quantum verbraucht ist. Zeichen

einer gutgemachten Einreibung ist, dass die eingeriebene Stelle, mit einem Tuch abgewischt, ihre graue Farbe nicht ganz verliert und namentlich in den Follikeln noch graue Punkte sichtbar bleiben. Dauer der Einreibung: 20 Minuten bis  $\frac{1}{2}$  Stunde. Zeit der Einreibung: Am besten Vormittag, jedenfalls nicht vor dem Schlafengehen, weil durch das Schwitzen im Bett die Resorption beeinträchtigt wird. Zahl der Einreibungen verschieden, im Minimum (wenn nicht durch Stomatitis, Ekzem oder sonstige Erkrankung die Fortsetzung der Kur verhindert wird) 30, im Durchschnitt 35—40; als Regel gilt, die Einreibungskur nicht nur bis zum völligen Schwinden aller Krankheitssymptome durchzuführen, sondern dann noch einige Einreibungen ( $\frac{1}{3}$  der bereits vorgenommenen) vornehmen zu lassen.

Diätetisches Verhalten während der Einreibungskur. Bei gutem Wetter fleissiger Aufenthalt im Freien, bei schlechtem das Zimmer zu hüten; in den ersten Stunden nach der Einreibung nicht auszugehen. Die Bekleidung und das Bett nicht zu warm, starke körperliche und geistige Anstrengung zu meiden. Kost nahrhaft, aber nicht reizend; Alkoholica nur in mässiger Menge gestattet. Rauchen auf ein Minimum einzuschränken.

Von besonderer Wichtigkeit bei Gebrauch von Quecksilber in jeder Form ist die Mundpflege, da bei Vernachlässigung derselben leicht eine starke Gingivitis und Stomatitis bis zum Ausfallen der Zähne, Periostitis und Vereiterung der Halslymphdrüsen eintritt, während eine mit geringer Salivation verbundene leichte Röthung und Schwellung des Zahnfleisches bei längerem Gebrauch von Quecksilber allerdings unvermeidlich ist.

Die Mundpflege während einer Quecksilberkur besteht in Folgendem: Vor Beginn der Kur etwa vorhandene Stomatitis zu beseitigen, hervorragende Zahnschmelzspitzen abzuglätten, Wurzelreste zu entfernen, cariöse

Zähne zu plombiren oder zu extrahiren. Während der Kur wird auf Prof. Neumann's Klinik folgendes Verfahren eingeschlagen: Während der Einreibung spült Patient fortwährend den Mund aus mit:

Rp. 2024.

*Acid. carbolic. 3·0,*

*Aqu. dest. 200 0.*

*S. Mundwasser.*

Ausserdem muss der Kranke 2 3mal täglich den Mund erst mit Wasser gut ausspülen und hierauf das Zahnfleisch mit *Pix liquida* einpinseln. Diese wird dann mit Watte oder Charpie entfernt, danach noch die Zähne mittelst einer festen Zahnbürste gut abgebürstet, der Mund mit Carbollösung (s. o.) gut ausgewaschen, dann die Zähne nochmals geputzt mit:

Rp. 2025.

*Pulv. carbon. Til. praep. 50·0.*

*S. Zahnpulver.*

Für die Privatpraxis eignet sich besser folgendes Verfahren: Patient spült, wenn er zu Hause ist, jede Stunde das Zahnfleisch, die Wangen- und Rachenschleimhaut gut mit einem der folgenden Gurgelwässer aus:

Rp. 2026.

*Kal. chloric. 5·0,*

*Aqu. dest. 500·0.*

*S. Gurgelwasser.*

Rp. 2029.

*Acid. thymic. 0·5,*

*Aqu. font. 500·0.*

*S. Mundwasser.*

Rp. 2027.

*Alum. crud. 5 0—10·0,*

*Aqu. dest. 500 0.*

*S. Gurgelwasser.*

Rp. 2030.

*Creosot. 10·0,*

*Aqu. dest.,*

*Spir. vin. aa 100 0.*

*S. 1 Kaffeelöffel auf  
1 Glas Wasser zum  
Gurgeln*

Rp. 2028.

*Acid. salicylic. 2·5,*

*Spir. vin. q. s. ad sol.,*

*Aqu. dest. 500·0.*

*S. Gurgelwasser.*

*Nach jeder Mahlzeit, also*

*h, soll*

Patient mittelst nicht zu weicher Zahnbürste das Zahnfleisch und die Zähne an allen Flächen gut abputzen. Als Zahnpulver das oben erwähnte Kohlenpulver (s. Rp. 2025), auch in der Form des Pulvis dentifric. niger der österr. Pharmacopoe:

Rp. 2031.

*Pulv. carbon. Lign. dep.,  
Pulv. cort. Chin. Calisay.,  
Pulv. fol. Salv. āā 20·0.  
M. f. pulv. subtilissim.  
S. Zahnpulver.*

Oder:

Rp. 2032.

*Pulv. dentifr. alb. 50·0.  
S. Zahnpulver.*

Oder etwa:

Rp. 2033.

*Oss. Sep. praep. 40·0,  
Pulv. rad. Ir. flor. 10·0.  
M. f. pulv. subtilissim.  
S. Zahnpulver.*

Oder sonst eines der gebräuchlichen Zahnpulver.

Nach dem Bürsten ist das gesammte Zahnfleisch an der vorderen und hinteren Fläche mittelst weichen Haar- oder mittelst Charpiepinsels gut mit einer astringirenden Tinctur zu bestreichen. Man verwendet:

Rp. 2034.

*Tinct. Ratanh.,  
Tinct. Gallar. āā 20·0.  
S. Zahnfleischtinctur.*

Rp. 2035.

*Tinct. Spilanth. olerac.,  
Tinct. Opii simpl. āā 10·0,  
Aqu. dest. 20·0.  
S. Zum Einpinseln.*

Rp. 2036.

*Tinct. Tormentill.,  
Tinct. Gallar. āā 20·0,  
(Tinct. Myrrh. 10·0.)  
S. Zahntinctur.*

Ist es wegen Vernachlässigung der erwähnten Maassregeln zu Stomatitis mercurialis gekommen, so sind dieselben mit besonderer Genauigkeit durchzuführen, das Zahnfleisch sehr häufig mit einer der erwähnten Tincturen, eventuell auch täglich einmal mit Jodtinctur zu bepinseln, Geschwüre mit Lapislösung zu touchiren und die Quecksilberkur, wenn nöthig, zu unterbrechen, eventuell statt derselben innerlicher Gebrauch von Jod.



## 2. Quecksilber-Injectionen

**Ort:** Meistens die Glutäalgegend, seltener verschiedene Punkte des Thorax und Rückens, die man sich am besten in der Weise markirt, dass man jederseits vier Linien annimmt: Hintere und vordere Axillarlinie, Mamillar- und Scapularlinie, und in jeder derselben vier von einander um etwa 3 Cm entfernte Punkte festsetzt, an denen man die Injectionen vornimmt. Stets macht man dieselben abwechselnd auf der rechten und linken Seite und auch bei Wahl der Glutäalgegend an möglichst verschiedenen Punkten derselben.

**Technik der Injectionen:** Mittels Pravaz'scher Spritze mit scharf geschliffener Canüle wird die Lösung derart injicirt, dass man in der Glutäalgegend einfach die Nadel senkrecht bis in die Muskulatur einsticht, an Brust und Rücken eine Hautfalte aufhebt und an der Basis derselben einsticht, so dass die Flüssigkeit in das subcutane Zellgewebe gelangt. Nach der Injection die Einstichstelle gut zu massiren. Spritze und Nadel vor und nach dem Gebrauch gut zu desinficiren (mit antiseptischen Flüssigkeiten durchzuspritzen und zu waschen). Bei Injectionen in der Glutäalgegend ist darauf zu achten, dass dieselben nicht zu nahe dem Sitzknorren gemacht werden, damit etwa sich bildende Infiltrate den Kranken nicht beim Sitzen belästigen. Ueber die Wirkung der Injectionen (s. die Tabelle S. 577). Sorgfältigste Mundpflege wie bei der Einreibungskur (s. das. S. 571 ff.). Wenn nach der Injection starke Schmerzen an der betreffenden Stelle auftreten, kalte Umschläge zu appliciren.

Die am häufigsten zu Injectionen verwendeten löslichen Präparate sind:

Rp. 2037.

*Merc sublim corros. 0·1,*

*Aqu. dest. 1tr 0.*

*S. Täglich 1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*



Besser, weil schmerzloser zu vertragen:

Rp. 2038.

*Merc. sublim. corros. 0·1,*  
*Natr. chlorat. 0·5,*  
*Aqu. dest. 10·0,*  
*(Morph. muriat. 0·05.)*  
*S. Wie das Vorige.*

Sehr gut vertragen werden die beiden folgenden, von v. Bamberger angegebenen Präparate, die aber wenig haltbar, daher jeden 2. Tag frisch zu verschreiben sind.

Das Quecksilber-  
albuminat:

Rp. 2039.

*Album. ovar. 100·0,*  
*Sol. Merc. sublim. corr.*  
*5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> 60·0,*  
*Sol. Natr. chlor. 20<sup>0</sup>/<sub>0</sub> 60·0,*  
*Aqu. dest. 80·0.*  
*S. Täglich 1 Pravaz'sche*  
*Spritze (= 0·01 Sublimat)*  
*zu injiciren.*

Das Quecksilber-  
peptonat:

Rp. 2040.

*Pepton. 1·0,*  
*Solve in Aqu. dest. 50·0.*  
*Filtra, adde:*  
*Sol. Merc. sublim. corros.*  
*5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> 20·0,*  
*Sol. Natr. chlorat. 20<sup>0</sup>/<sub>0</sub>*  
*15·0,*  
*Aqu. dest. q. s. ad 100·0.*  
*S. Wie das Vorige.*

Von Liebreich eingeführt ist das Quecksilberformamid.

Rp. 2041.

*Hydr. formamidat. 0·1,*  
*Aqu. dest. 10·0.*  
*S. Täglich 1 Pravaz'sche*  
*Spritze zu injiciren.*

Cyanquecksilber macht local wenig Reaction, aber leicht Beschwerden von Seiten des Darmcanals, und ist ausserdem wegen des Cyangehaltes nicht durch längere Zeit anwendbar:

Rp. 2042.

*Hydrargyr. bicyanat. 0·1,*  
*Glycerin. 2·0,*  
*Aqu. dest. 18·0.*  
*S. Wie das Vorige.*

Quecksilberharnstoff:

Rp. 2043.

*Merc. sublim. corros. 0·2,*  
*Aqu. dest. fervid. 10·0.*  
*Filtra et adde:*

*Urae bis recrystallisat.*  
*0·05.*  
*D. S. Wie das Vorige.*

Hie und da wird auch gebraucht:

Rp. 2044.

*Hydrargyr. biiodat.*,  
*Kal. iodat. an* 0·2,  
*Nat phosphoric tribasic.* 0·4,  
*Aqu. dest.* 50·0.  
*S. Zur Injection.*

In neuester Zeit wird auch das von Hell in Troppau dargestellte Asparaginquicksilber (enthält 1<sup>o</sup> metallisches Quecksilber) verwendet.

Rp. 2045.

*Hydrargyr. asparagin.* 10·0.  
*D. S. Täglich 1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

In allerjüngster Zeit eingeführt und von vorzüglicher Wirkung.

Rp. 2046.

*Hydrarg. soziodol.* 0·8,  
*Kali. iodat.* 1·6,  
*Aqu. dest.* 10·0.  
*D. S. Jeden fünften Tag eine Injection.*

Bezüglich der unlöslichen Injectionsflüssigkeiten ist zu bemerken, dass die Injectionsflüssigkeit vor dem Gebrauche gut umzuschütteln ist und die Canüle der Spritze etwas stärker sein muss, als beim Gebrauch der löslichen Mittel. Injectionsstelle. Glutäalgegend oder Bauchgegend. Abscessbildung erfolgt leichter als bei den löslichen Präparaten; daher strenge Antisepsis. Die Injectionen werden in Zwischenräumen von 5—8 Tagen wiederholt. Ueber die Anzahl der nöthigen Injectionen s. tabellarische Uebersicht (S. 577.)

Von sehr guter Wirkung, aber schmerzhaft Reaction hervorrufend:

Rp. 2047.

*Calomel. rap. parat.* 1·0,  
*Glycerin.* 10·0.  
*D. S. Jeden 8. Tag eine Injection.*

Oder.

Rp. 2048.

*Calomel. rap. parat.* 1·0,  
*Paraffini liqu. sterilis.*  
*(oder Ol. oliv.)* 10·0.  
*D. S. Wie das Vorige.*

Oder:  
 Rp. 2049.  
*Calomel. vap. parat. 1·0,*  
*Ol. Vaseline. alb. 10·0.*  
*D. S. Wie das Vorige.*  
 Ebenfalls unlöslich ist  
 das Quecksilberoxyd:

Rp. 2050.  
*Hydrarg. oxydat. flav.*  
0·5,  
*Ol. Amygdal. dulc. 15·0.*  
*S. Jeden 5. Tag 1 Pra-*  
*vaz'sche Spritze zu in-*  
*jectiren.*

In neuerer Zeit werden mit gutem Erfolg gebraucht:

Rp. 2051.  
*Hydrargyr. salicylic. 1·0,*  
*Paraffin. liquid. 10·0.*  
*S. Jeden 5. Tag eine Pra-*  
*vaz'sche Spritze zu in-*  
*jectiren.*

Rp. 2052.  
*Hydrargyr. thymolic. (thy-*  
*molo-acet.) 1·0,*  
*Paraffin. liquid. 10·0.*  
*S. Wie das Vorige.*

## Tabellarische Übersicht

über die Wirkung der Quecksilberinjectionen im Vergleich  
 mit der Wirkung der Einreibungscur.

Es genügen im Durchschnitt zum Verschwinden eines	Anzahl der Einrei- bungen	Anzahl der Injectionen von unlöslichen Quecksilberpräparaten und dem löslichen Sozjodolquecksilber	Anzahl der Injectionen von den übrigen lösli- chen Quecksilber- präparaten
Maculösen Exanthems	20—25	5—6	20—25
Papulösen Exanthems	30—35	6—8—10	30—35

### 3. Interne Darreichung von Quecksilber.

Im Ganzen nur selten angewendet (s. „Indicationen“,  
 S. 568 f.), ist diese Methode bei schwachen Verdauungs-

organen contraindicirt. Zeit der Einnahme am besten nach den Mahlzeiten. Mundpflege wie bei der Einreibungskur (s. das. S. 571 ff.).

Rp. 2053.

*Calomelan. laevig.* 0·5,  
*Opü pur.* 0·1,  
*Sach. alb.* 5·0.  
*M. f. p. Div. in dos. aequ*  
*No. 12.*

*D. S.* 3 Pulver täglich.  
Rascher als Calomel,  
aber auch drastischer wirkt  
Sublimat:

Häufig gebraucht wird auch der *Liquor mercurialis*  
seu *Spiritus antivenereus* nach van Swieten:

Rp. 2056.

*Merc. sublim. corros.* 0·1,  
*Spir. vin.* 100·0.  
*S. Früh und Abends*  
*1 Kaffeel. in einem Glas*  
*Milch oder Rotherwein.*  
Aehnlich:

Rp. 2057.

*Merc. sublim. corros.* 0·1,  
*Rhum. optim.* 100·0.  
*S. Früh und Abends*  
*1 Kaffeelöffel in einer*  
*Tasse russischen Thees.*  
In Pillen:

Rp. 2058.

*Merc. sublim. corros.* 0·1,  
*Extr. Opü aquos.* 0·07,  
*Pulv. et extr. Acor.*  
*aa q. s. ut f. pill. No. 20.*  
*D. S.* 2 Pillen täglich  
allmählich steigend auf  
5 Pillen pro die.

Rp. 2054.

*Merc. sublim. corros.* 0·1,  
*Aqu. dest.* 150·0.  
*S. Tägl. 2—3 Kaffeelöffel.*

Rp. 2055.

*Merc. sublim. corros.* 0·1,  
*Natr. chlorat.* 2·5,  
*Aqu. dest.* 200·0.  
*S. Früh und Abends*  
*1 Esslöffel.*

Am häufigsten von den  
intern zu gebenden Queck-  
silberverbindungen wird ge-  
braucht das *Protoiodure-*  
*tum Hydrargyri*:

Rp. 2059.

*Hydrargyr. iodat.* 0·4,  
*Opü pur.* 0·3,  
*Pulv. et extr. Acor.*  
*aa q. s. ut f. pill. No. 20.*  
*S. Früh und Abends*  
*1—2 Pillen*

Auch in Form der Ri-  
cord'schen Pillen:

Rp. 2060.

*Hydrargyr. iodat.,*  
*Lactucar. Gallic. aa* 3·0,  
*Extr. Opü aquos.* 1·0,  
*Extr. Comu. 6·0*  
*M. f. pill. No. 60.*  
*D. S. Abends 1 Pille.*

Für Kinder:

Rp. 2061.

*Protojodur. Hydrarg. 0·07,*  
*Pulv. gumm.,*  
*Sacch. alb. āā 2·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 12.*  
*D. S. 2—3 Pulver täglich.*

Seltener gebraucht wird  
das Deuteroioduretum  
Hydrargyri:

Rp. 2062.

*Hydrargyr. biiodat. 0·1,*  
*Extr. Opii aquos. 0·3,*  
*Extr. Quass. q. s. ut f.*  
*pill. No. 20.*  
*S. 2mal tägl. 1—2 Pillen.*

Sehr gut vertragen wird  
das in neuerer Zeit von  
Lustgarten angegebene  
Hydrargyrum tannicum:

Rp. 2066.

*Hydrarg. thymolo-acetic. 1·0,*  
*Extr. Opii 0·4,*  
*Pulv. et extr. Liquir. q. s. ut f. pill. Nr. 30.*  
*S. Täglich 3 Pillen.*

Rp. 2063.

*Hydrarg. tannic. oxydul.,*  
*Sacch. alb. āā 3·0.*  
*M. f. pulv. Div. in dos.*  
*aequ. No. 30.*  
*D. S. 3mal täglich 1 Pulver.*

Dasselbe in Pillenform:

Rp. 2064.

*Hydrarg. tannic. oxydul.*  
*4·0,*  
*Landani pur. 0·15,*  
*Pulv. et Extr. Acori qu.*  
*s. ut f. pill. No. 100.*  
*D. S. 4 Stück täglich.*

In letzter Zeit wird mit  
gutem Erfolg gegeben:

Rp. 2065.

*Hydrargyr. salicylic. 0·35,*  
*Pulv. et extr. Quass. q. s.*  
*ut f. pill. No. 25.*  
*D. S. 2mal täglich je 2*  
*Pillen.*

#### 4. Sublimatbäder.

Das Sublimat wird in Lösung verschrieben, dieselbe  
in einem Topf heissen Wassers noch gut verrührt und  
dieses einem Bad von 28—29° R. (Porzellan- oder Holz-  
wanne, da Metall vom Sublimat angegriffen wird) zuge-  
setzt, in welchem Patient durch 1½—2 Stunden verbleibt;  
nach dem Bade soll Patient etwa 1 Stunde im Bett bleiben.

Diese Bäder täglich zu geben. Entsprechende Mundpflege natürlich auch hier geboten.

Man verschreibt:	Ulcerationen nur Hand- oder
Rp. 2067.	Fussbäder geben lassen und
<i>Mercur. sublim. corrosiv.</i>	verschreibt dann:
100—300,	Rp. 2068.
<i>Aqu. font. 4000.</i>	<i>Merc. sublim. corrosiv.</i>
S. Zusatz zum Bad.	50—100,
Man kann auch bei ent-	<i>Aqu. font. 2000.</i>
sprechender Localisation von	S. Zusatz zum Bad.

### 5. Jodbehandlung.

Bei Darreichung von jodhaltigen Mitteln ist zu beachten, dass dieselben leicht gewisse krankhafte Zustände, sog. Jodismus, erzeugen, bestehend in Acne, Coniunctivitis (oft mit starkem Oedem der Lider), Coryza, seltener auch Laryngitis und Bronchitis. Diese Symptome erfordern manchmal durch ihre Heftigkeit ein Aussetzen der Jodbehandlung, verschwinden aber damit auch von selbst. Manche Jodpräparate rufen auch öfters heftige gastrische Erscheinungen hervor und müssen dann ausgesetzt, resp. mit einer anderen, die Verdauungsorgane weniger angreifenden Jodverbindung vertauscht werden. Das am häufigsten verwendete der hierher gehörigen Mittel ist das Jodkalium, das man bei leichter secundärer Syphilis oder in der Latenzperiode zu 10—20 pro die, bei tertiärer Lues gewöhnlich in Dosen von 20—40 pro die verordnet.

Rp. 2069.	Rp. 2070.
<i>Kal. iodat. 10—20—40,</i>	<i>Kal. iodat. 50—100,</i>
<i>Aqu. dest. 800,</i>	<i>Aqu. dest. 2000,</i>
<i>Syr. Moror. 200.</i>	<i>Syr. cort. Aurant. 200.</i>
S. Abends in 3 Portionen,	et tu
in stündlichen Inter-	
allen zu nehmen.	

Rp. 2071.

*Kal. iodat. 5·0,  
Pulv. et extr. Acor.  
āā q.s. ut f. pill. No. 50.  
Consp. pulv. sem. Lycop.  
D. S. Tägl. 5—10 Pillen.*

Besser als Jodkalium, weil weniger leicht Jodismus erzeugend, ist das theurere Jodnatrium, das ganz in denselben Dosen und Formen wie jenes gegeben wird.

Stärker jodhaltig als die beiden genannten, aber schwer verdaulich ist Jodlithium, das stets nur in kleinen Dosen gereicht wird.

Rp. 2072.

*Lith. iodat. 1·5,  
Pulv. et extr. Gent. q. s.  
ut f. pill. No. 50.  
D. S. 3mal täglich je  
2 Pillen.*

Am reichsten an Jod, aber schwer verdaulich ist Jodoform:

Rp. 2073.

*Jodoform. pur. 2·0,  
Pulv. et extr. Quass. q. s.  
ut f. pill. No. 20.  
S. 3mal täglich 1 Pille.*

Häufiger wird es in Injectionen gegeben, wenn die innerlich zu gebenden Jodverbindungen nicht vertragen werden. Ort und

Technik der Injectionen wie bei den Quecksilberverbindungen (s. das S. 574).

Rp. 2074.

*Jodoform. pur. 1·0—2·0,  
Ol. Olivar. 20·0.  
S. Täglich 1 Pravaz'sche  
Spritze zu injiciren.*

Rp. 2075.

*Jodoform. 1·0,  
Ol. Ricin. 15·0.  
S. Wie das Vorige.*

Rp. 2076.

*Jodoform. pur. 3·0,  
Aether. sulfur. 15·0.  
S. Injection.*

Rp. 2077.

*Jodoform. pur. 1·0,  
Ol. Olivar.,  
Aether. sulfur. āā 5·0.  
S. Injection.*

Selten verwendet wird die billige, aber sehr schwer zu vertragende Jodtinctur:

Rp. 2078.

*Tinct. Jod. 2·0,  
Aqu. dest. 250·0,  
Syr. cort. Aur. 20·0.  
S. 2—4 Esslöffel täglich.*

Bei anämischen, herabgekommenen Personen ist es zweckmässig, das Jod mit anderen, entschieden tonisirend wirkenden Mitteln zu verbinden:



Rp. 2079.

*Ol. iecor. Asell. 50·0,*  
*Jod. pur. 0·07.*  
*S. Täglich 2—3 Esslöffel.*

Noch besser ist die Combination mit Eisen:

Rp. 2080.

*Ferr. pulv. 2·0,*  
*Jod. pur. 4·0,*  
*Sacch. alb. 3·5,*  
*Pulv. rad. Liquir. 7·0,*  
*Aqu. dest. 2·5.*  
*M. f. pill. No. 100.*  
*S. 3mal tägl. je 2—3 Pill.*

Rp. 2081.

*Ferr. iodat. sacch. 2·0,*  
*Pulv. et extr. Acor.*  
*aa q.s. ut f. pill. No. 30.*  
*D. S. 3mal täglich je*  
*2 Pillen.*

Rp. 2082.

*Syr. Ferr. iodat. 2·0,*  
*Syr. Moror. 20·0.*  
*S. Tagsüber zu ver-*  
*brauchen.*

Rp. 2083.

*Syr. Ferr. iodat.,*  
*Syr. simpl. aa 25·0,*  
*Aqu. dest. 150·0.*  
*S. 3mal tägl. 1 Esslöffel.*

Statt der jodhaltigen Medicamente auch Gebrauch von jodhaltigen Mineralwassern, namentlich der Wasser von Hall, Darkau in Schlesien, Lubatschowitz in Mähren, Lipik in Slavonien, von Kreuznach etc.

Im Sommer Gebrauch von Kuren in diesen Orten.

Auch Schwefelwasser zu Bädern und innerlich sind wegen der energischen Anregung des Stoffwechsels eine gute Unterstützung einer antisypilitischen Behandlung. (Baden bei Wien, Trencsin, Pystian, Mehadia, Aachen etc.)

Als Nachkur einer antisypilitischen Behandlung Kaltwasserkur oder Aufenthalt in einem Seebad empfehlenswerth.

## 6. Decocte.

Fast allein in Gebrauch ist das Decoctum Zittmanni, von dem es ein fortius und ein mitius gibt. Man gibt dasselbe gewöhnlich in der Weise, dass der Patient am Morgen nüchtern 200—300 Gr. des gewärmten Decoct. Zittm. fort. schluckweise im Lauf von  $\frac{1}{4}$ —1 Stunde

einnimmt; am Nachmittag trinkt er in derselben Weise eine ebenso grosse Dosis des Decoct. Zittm. mitius kalt. Die Kost reizlos, speciell der Genuss von sauren Speisen, frischem gekochtem Obst, sowie von Bier zu untersagen. Die Magistralformel des Decoct. Zittmanni fortius ist:

Rp. 2084.

*Rad. Sassaparill. 50·0,*  
*Infunde cum Aqu. fervid.*  
*3500·0,*  
*Digere per horas 24,*  
*Dein additis intra sac-*  
*cul. lint.:*  
*Sacch. alb.,*  
*Alum. crud. āā 3·0,*  
*Calomel. laevigat. 2·0,*  
*Cinnabar. factit. 0·5,*  
*Coque ad colatur. 1000·0.*  
*Sub finem coctionis adde:*  
*Semin. Anis. vulgar.,*  
*Semin. Foenicul. āā 2·0,*  
*Fol. Sennae,*  
*Rad. Liquirit. āā 6·0.*  
*Exprime per pannum.*  
*Cola.*

Die Magistralformel des Decoct. Zittmann. mit. ist:

Rp. 2085.

*Rad. Sassaparill. 25·0,*  
*Additis specieb. e Decoct.*  
*fortior. remanentib.*  
*coque cum*  
*Aqu. font. 6000·0*  
*ad reman. 1000·0.*  
*Sub finem coct. adde:*  
*Cortic. fruct. Citr.,*  
*Sem. Cardamom.,*  
*Cort. Cinnamom.,*  
*Rad. Liquirit. āā 1·5.*  
*Exprime per pannum.*  
*Cola.*

Man kann auch das Decoct. Zittm. mit dem Gebrauch von Jod verbinden; man setzt dann dieses dem Decoct. Zittm. mitius zu und lässt das fortius weg. Man verschreibt also etwa:

Rp. 2086.

*Decoct. Zittmann. mit. 200·0,*  
*Kal. iodat. 2·0.*  
*S. In 3 Portionen im Laufe des Tages zu nehmen.*

Aehnlich dem Decoct. Zittmann., aber weniger wirksam ist das in Italien viel gebrauchte Decoct. Pollini:

Rp. 2087. *Rad. Sassaparill.*,  
*Rad. Chin. nodos. aa* 25·0,  
*Lapid. Pumic*,  
*Stib. sulfurat. nigr. crud. aa* 10·0,  
*Putam. nuc. Jugland. 75·0.*  
*Coque cum*  
*Aqu. font. 1500·0*  
*ad col. 500·0.*  
*S. Tagsüber zu verbrauchen.*

Audere Decocte sind:

Rp. 2088.  
*Rad. Sassaparill.*,  
*Lign. Guajac.*,  
*Rad. Chin. nodos aa* 25·0,  
*Aqu. font. bullient. 500·0.*  
*Macera per horas 24,*  
*Dein coque ad colat.*  
*250·0.*  
*S. Am Vormittag in*  
*3 Portionen zu nehmen.*

Rp. 2089.  
*Rad. Sassapar. opt. 50·0,*  
*Aqu. font. 500·0,*  
*Macera per horas 24,*  
*Dein coque ad col. 300·0.*  
*Adde:*  
*Aqu. laxativ. Viennens.,*  
*Syr. Sassaparill. aa 40·0.*  
*S. Tagsüber zu ver-*  
*brauchen.*

Rp. 2090. *Decoct. rad. Bardan. e* 50·0 : 500·0,  
*Inf. fol. Senn. e* 10·0 : 100·0,  
*Sal. amar. 10·0.*  
*S. In einem Tag zu verbrauchen.*

Der sehr theuere Roob L'affecteur besteht nach  
v. Sigmund aus:

Rp. 2091. *Rad. Sassaparill. 50 0,*  
*Herb. Borragin.,*  
*Rad. Borragin.,*  
*Flor. Rosar.,*  
*Fol. Sennae elect,*  
*Sem. Anis. stellat. aa* 3·0,  
*Aqu. commun. q. s ut f. coqu. et coland. l. u.*  
*Syrup. gr. 500 0.*  
*S. 3—6 Esslöffel im Tag.*

b) Localbehandlung. Dieselbe stets mit entsprechender antisypilitischer Allgemeinbehandlung zu combiniren. Bei Papeln an den Genitalien und um den Anus im Allgemeinen dieselbe Behandlung wie beim Initialaffect (s. „Ulcus durum,“ S. 566 f.), behufs Reinigung Jodoform, zur Ueberhäutung und Resorption graues Pflaster (s. Rp. 2018 und 2019) oder graue Salbe; statt der letzteren auch:

Rp. 2092.

*Calomelan. laevigat.* 3·0,  
*Ungu. simpl.* 30·0.  
S. Salbe.

Bei luxurirenden Papeln (breiten Condylomen) sehr zweckmässig der sog. Labarraque'sche Verband:

Rp. 2093.

*Chlorin. liquid.* 10·0,  
*Aqu. dest.* 100·0.  
S. Zum Bepinseln.

Rp. 2094.

*Calomelan. laevigat.*  
10·0—25·0,  
*Amyl. pur.* 100·0.  
S. Streupulver.

Die Papeln werden erst mit dem Chlorwasser be-

pinselt, hierauf das Calomelpulver dicht aufgestreut.

Bei älteren, derben Infiltraten:

Rp. 2095.

*Merc. sublim. corrosiv.*  
1·0,

*Spir. vin.* 20·0.  
S. Zum Bepinseln.

Oder die Plenck'sche Solution:

Rp. 2096.

*Merc. sublim. corrosiv.,*  
*Alumin. crud.,*  
*Ceruss.,*  
*Camphor. ras.,*  
*Spir. vin.,*  
*Acet. vin. aa* 5·0.

S. Die Flüssigkeit abzugießen, der Bodensatz einzupinseln.

Bei Rhagaden um den After in Folge des Zerfalls von Papeln: scrupulöseste Reinlichkeit, sorgfältige Ausfüllung der Einrisse mit in antiseptische Lösungen getauchter Baumwolle oder mit Jodoformgaze, öftere Cauterisation mit Lapis oder mit Sublimatlösung.

Bei Psoriasis palmaris und plantaris Erweichung und Beseitigung der Schuppen durch Bähungen, Appli-

cation von Dunstumschlägen über Nacht oder sehr gut auch Anlegung von Handschuhen und Strümpfen aus Kautschukleinwand, eventuell auch die einzelnen Infiltrate jeden oder jeden 2. Tag zu bepinseln mit:

Rp. 2097.

*Merc. sublim. corrosiv. 0·2,*

*Colloid. elastic. 20·0.*

*S. Sublimatcollodium.*

Nach Abhebung der Schuppen Auflegen von grauem Pflaster oder Einreiben von kleinen Mengen grauer Salbe.

Bei schuppenden Papeln im Gesicht, pustulösem Syphilid der Kopfhaut nach Beseitigung der Borken mit Oel Einpinselung von:

Rp. 2098.

*Merc. praecip. alb. 2·0,*

*Vaselin. 20·0.*

*S. Salbe.*

Oder:

Rp. 2099.

*Merc. sublim. corros. 0·1.*

*Vaselin. 20·0.*

*S. Salbe.*

Bei Gummen und ulcerösen Syphiliden der Haut graues Pflaster, eventuell bei ausgebreiteten Ulcerationen Sublimatbäder (s. S. 579 f.) Bei rasch fortschreitendem Zerfall, insbesondere an Stellen, wo derselbe zu Entstellung oder zu Functionsuntüchtigkeit von Organen zu führen droht, energische Cauterisation der Ränder mit Kali causticum oder mit Lapis.

Bei Papeln und Rhagaden an den Lippen:

Rp. 2100

*Merc. praecip. alb. 0·5,*

*Ungu. Rosar. 10·0.*

*S. Lippensalbe.*

Bei Papeln an der Mund- und Rachenschleimhaut Gurgeln mit:

Rp. 2101.

*Merc. sublim. corros. 0·1,*

*Spir. vin.,*

*Aqu. dest. aa 150·0.*

*S. 1. Kaffeel. auf 1 Glas*

*Wasser zum Gurgeln.*

Ferner Bepinseln mit:

Rp. 2102.

*Acid. carbolic. 3·0,*

*Spir. vin. dil. 15·0.*

*S. Zum Einpinseln.*

Weniger zu empfehlen wegen der grossen Reizung der Mundschleimhaut ist:

Rp. 2103.

*Merc. sublim. corrosiv. 2·0,*

*Spir. vin. dil. 15·0.*

*S. Einpinselung.*

Bei sehr empfindlichen Personen oder Kindern auch:

Rp. 2104.

*Acid. tannic. 3·0,*

*Glycerin. 30·0.*

*S. Zum Einpinseln.*

Ulcerirte Papeln mit Lapis in Substanz oder in 10%iger Lösung zu touchiren.

Bei Angina luetica Gurgeln mit 2%iger Carbol- oder 1%iger Kal. chloricum-Lösung oder mit:

Rp. 2105.

*Kal. hypermangan. 0·02,*

*Aqu. dest. 200·0.*

*S. Gurgelwasser.*

Kalte oder feuchtwarme Umschläge um den Hals. Auftretende Papeln mit Lapis zu touchiren.

Bei syphilitischen Affectionen der Nasenhöhle Ausspritzung derselben mit:

Rp. 2106.

*Merc. sublim. corrosiv.*

*0·25 — 0·5,*

*Aqu. dest. 1000·0.*

*S. 3mal täglich die Nase  
damit auszuspritzen.*

Oder:

Rp. 2107.

*Jod. pur. 0·4,*

*Kal. iodat. 1·0,*

*Aqu. font. 1000·0.*

*S. Wie das Vorige.*

Ferner Einlegen von Wattewicken, die bestrichen sind mit:

Rp. 2108.

*Merc. praecip. rubr. 0·2,*

*Ungu. emoll. 20·0.*

*S. Salbe.*

Oder Einpinselung mit Jodglycerin, Cauterisation von Ulcerationen mit Lapis oder mit concentrirten Sublimatlösungen. Entfernung nekrotischer Knochenstücke.

Bei Syphilis des Kehlkopfs Inhalation mit:

Oder mit:

Rp. 2109.

*Jod. pur.* 0·02,  
*Kal. iodat.* 2·0,  
*Aqu. dest.* 100·0.  
*S. Inhalation.*

Rp. 2110.

*Merc. sublim. corros.* 0·02,  
*Aqu. Laurocer.* 10·0,  
*Aqu. dest.* 100·0.  
*S. Inhalation.*

Bei Ulcerationen im Kehlkopf neben den erwähnten Inhalationen Jodoform-Einstäubungen, Aetzung mit:

Rp. 2111.

*Argent. nitric.* 1·0 2·0,  
*Aqu. dest.* 20·0.  
*Da in ritr. nigr*  
*S. Zum Einpinseln*

Diese Manipulationen natürlich unter Leitung des Spiegels vorzunehmen. Bei Glottisödem Tracheotomie.

Bei syphilitischen Erkrankungen des Periosts, der Knochen, Gelenke, Sehnencheiden neben entsprechender Allgemeinbehandlung (grosse Dosen von Jodkali etc.) Einpinselung mit:

Rp. 2112.

*Tinct. Jodin.,*  
*Tinct. Ratanh. aa* 15·0.  
*S. Die erkrankte Partie*  
*3mal täglich damit ein-*  
*zupinseln.*

Oder:

Rp. 2113.

*Jod. pur.,*  
*Kal. iodat. aa* 5·0,  
*vin* 10·0.  
*S. das Versing.*

Ist es zum Durchbruch gekommen, so ist die Caries gekommen, rein chronisch.



Aus  
**Professor Dr. Ernst Fuchs'**

Klinik und Ambulatorium für Augenkrankheiten.

---

**Anästhesirung.** Chloroformnarkose (Billroth'sche Mischung) nur bei grösseren Operationen, wie Enucleation, Exenteratio orbitae, Blepharoplastik, oder bei Operationen an Kindern, die man anders nicht zum Stillhalten zwingen kann. Bei kurz dauernden, jedoch sehr schmerzhaften Operationen Bromäthylnarkose. Sonst bloss Localanästhesie mit Cocain und zwar in der Weise, dass man bei Bulbus-Operationen vorher 4—6mal einige Tropfen der 5%igen Lösung in den Conjunctivalsack einträufelt. Vom Beginn des Cocainisirens bis zur Operation muss der Patient das Auge gut geschlossen halten.

Bei Operationen an den Lidern wird die Cocainlösung mittelst Pravaz'scher Spritze unter die Lidhaut oder die Lidbindehaut injicirt. Man verschreibt:

Rp. 2114.

*Cocain. mur. 0·5,*  
*Acid. boracic. 0·3,*  
*Aqu. dest. 10·0.*  
*Misce et filtra.*  
*D. S. 5%ige Cocaïnlösung.*

(Ist die Lösung flockig geworden, so muss sie neuerlich filtrirt werden. Dieselbe lässt sich durch Kochen sterilisiren.)

Bei Glaucom wird vor dem Cocainisiren Eserin (s. 2139) eingeträufelt.

**Antiseptik.** Zur Desinfection des Operationsfeldes und zum Einlegen der Tupper wird Sublimatlösung gebraucht, die behufs Vermeidung von Verwechslungen mit einem Tropfen Fuchsinlösung roth gefärbt wird.

Rp. 2115.

*Merc. sublim. corrosiv. 0.2—0.25,*

*Aqu. dest. 1000.0.*

*S. Sublimatlösung. Gift.*

Die Instrumente werden bei Bulbus-Operationen unmittelbar vorher auf einem gitterartigen Gestell in einem dazu geeigneten Blechkessel in destillirtem Wasser ausgekocht, aus demselben auf eine mit 1 $\frac{0}{100}$ iger Sublimatlösung gereinigte Porzellanplatte gelegt und auf dieser gereicht. Instrumente zu den Operationen an den äusseren Augentheilen werden in 2 $\frac{1}{2}$ iger Carbollösung desinficirt. Für Kranke, die an Thränensackblennorrhoe, Trachom oder Conjunctivalblennorrhoe leiden, sind Instrumente sowie alle anderen Vorrichtungen gesondert zu verwenden.

**Verband nach der Operation** Nach Bulbusoperationen ein doppeltgelegter runder Fleck aus sterilisirter weisser Gaze, darüber sterilisirte Watte. Befestigung mit einem Pflasterstreifen (ein Leinwandstreifen, der an beiden Enden mit Empl. sapon. bestrichen ist) an Stirne und Wangen. Hierauf zum Schutze des Auges ein mit Flanell eingefasstes Drahtgitter, welches durch Bänder am Kopfe befestigt wird. In den ersten Tagen werden zumeist beide Augen verbunden.

Bei Lidoperationen antiseptischer Verband nach chirurgischen Regeln mit Rollbinde. Bei Kindern ist es vortheilhaft, diesen Verband noch durch eine Organbinde (sog. blaue Binde) zu fixiren.

**Blepharadenitis. Lidranddrüsenentzündung.** Berücksichtigung des Allgemeinzustandes, einer eventuell bestehenden Scrophulose oder Syphilis. Behandlung von

gleichzeitigem Ekzem, Pediculosis oder Seborrhoe des behaarten Kopfes. Sorgfältige Reinhaltung des Auges. Vorhandene Krusten mit warmem Wasser zu erweichen und abzulösen. Einreiben von:

Rp. 2116.

*Merc. praecip. alb. 0·05—0·1,*

*Vaselín. puriss. 5·0.*

*Misce exactissime. Fiat ungu.*

*S. Vor dem Schlafengehen ein erbsengrosses Stück an den Lidrändern zu verreiben.*

Bei hartnäckiger Blepharitis squamosa Einpinselung des Lides mit 5%iger alkoholischer Theerlösung:

Rp. 2117.

*Picis liqu. 0·5,*

*Alcohol. 95% 10·0.*

*D. S. Vom Arzte täglich vorsichtig einzupinseln.*

Bei der ulcerösen Form Eröffnen der kleinen Abscesse, Epilation der Cilien und Cauterisation der kleinen Geschwüre mit dem zugespitzten Lapisstifte. Danach Anwendung der oben erwähnten weissen Präcipitatsalbe (Rp. 2116). Gegen Tylosis Massage des Lides mit dieser Salbe.

**Hordeolum. Gerstenkorn.** Warme Umschläge; eventuell Eröffnung mit dem Messer. Gegen die gewöhnlich gleichzeitig vorhandene Blepharitis die oben angeführten Präcipitatsalbe.

**Dacryocystitis. Acute Thränensackentzündung.** Sorgfältige Reinlichkeit. Warme Umschläge, um den Durchbruch des Eiters zu beschleunigen, und wenn dieser an einer Stelle durchzubrechen droht, Punction des Thränensackes.

**Blennorrhoea sacci lacrimalis. Thränensackblennorrhoe.** Behandlung eines etwaigen ursächlichen Leidens (Ozaena, Nasenpolypen etc.). Spaltung des

Thränenröhrchens mit dem Weber'schen Messer und methodische Sondirung mit den Bowman'schen Sonden. In gewissen Fällen Exstirpation des Thränensackes.

### **Coniunctivitis catarrhalis. Bindehautkatarrh.**

Behandlung eines ursächlichen Leidens (Fremdkörper, Thränensackblennorrhoe). Vermeidung von Rauch, Staub, Hitze, greller Beleuchtung, Nachtwachen. Wegen Gefahr der Ansteckung Waschbecken, Wäsche etc. nicht gemeinsam mit Anderen zu gebrauchen.

Ist der Katarrh acut, Touchiren mit 2<sup>o</sup>/<sub>0</sub>iger Lapislösung.

Rp. 2118.

*Argent. nitric. 0·2,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*Da in vitr. nigr.*

*S. 2<sup>o</sup>/<sub>0</sub>ige Lapislösung.*

Das Touchiren geschieht in folgender Weise: die Lider werden umgestülpt und mit einem in die Lapislösung getauchten Haarpinsel die Coniunctiva leicht bestrichen. Nach dem Touchiren mit der Lapislösung die Coniunctiva noch mehrmals mit dem in Wasser oder schwache Kochsalzlösung getauchten Pinsel abzuwaschen, um überschüssige Lapislösung zu entfernen.

Findet man am nächsten Tag noch einen bläulich-weissen Flor über der Coniunctiva palpebrarum ausgebreitet, so ist zu stark touchirt worden und das Verfahren dementsprechend zu ändern, eventuell einen Tag auszusetzen.

Complication des Bindehautkatarrhs durch Ulcera corneae, Iritis etc. contraindicirt nicht das Touchiren mit Lapislösung.

Ist das Stadium der intensiven Reizung vorüber und hat der Katarrh einen mehr chronischen und torpiden Charakter angenommen, so sind die Collyrien am Platze. Dieselben nur Morgens und Mittags anzuwenden, weil sie Abends die um diese Tageszeit ohnehin eintretende Exacerbation des Katarrhs fördern wür-

den. Sie werden mittelst Tropfgläschens (sogenannten Tropfenzählers) in den Bindehautsack eingeträufelt.

Rp. 2119.

*Zinc. sulfuric. 0·3,*  
*Aqu. dest. 30·0,*  
*(Tint. Opii croc. gtts. 20.)*  
*S. Augentropfen.*

Rp. 2120.

*Collyr. adstring. lut. 10·0—20·0,*  
*Aqu. dest. 10·0.*  
*S. Augentropfen.*

Rp. 2121.

*Tinct. Opii crocat.,*  
*Aqu. dest. āā 5·0.*  
*S. Augentropfen.*

Rp. 2122.

*Acid. boric. 3·0,*  
*Aqu. dest. 100·0.*  
*S. Zum Waschen d. Augen.*

**Coniunctivitis scrophulosa.** Allgemeinbehandlung der Scrophulose. Bei Abwesenheit von Geschwüren täglich einmal mit einem feinen Pinsel etwas Calomel auf die Conjunctiva des abgezogenen unteren Lides zu streuen.

Rp. 2123.

*Calomelan. laevigat. 5·0.*  
*Da in scatul.*  
*S. Calomel.*

(N. B. Gleichzeitige innerliche Anwendung von Jodpräparaten zu meiden, weil sich dabei eine scharf-ätzende Verbindung des Jod mit dem Quecksilber bildet.)

Bei starken Reizerscheinungen und progressiven Geschwüren Calomel auszusetzen und Atropin einzuträufeln.

Rp. 2124.

*Atropin. sulf. 0·1,*  
*Aqu. dest. 10·0.*  
*D. S. 1<sup>0</sup>/<sub>0</sub>ige Atropinlösung. (Zu Handen des Arztes.)*

Photophobie und Blepharospasmus, sowie starke Schmerzen werden gemildert durch Cocain (s. Rp. 2114) oder durch Stirnsalben, wie:

Rp. 2125.

*Extr. Belladonn. 1·0,*  
*Ungu. ciner. 10·0.*  
*S. Täglich 1—2mal ein*  
*bohnergrosses Stück auf*  
*Stirne und Schläfe ein-*  
*zureiben.*

| Rp. 2126.

*Merc. praecip. alb. 1·0,*  
*Extr. Belladon 1·2,*  
*Ungu. simpl. 10·0.*  
*Wie das Vorige.*

Nach Abnahme der Reizerscheinungen, bei beginnender Reinigung der Geschwüre kann man wieder zu den Calomelinspersersionen übergehen.

Bei Pannus scrophulosus empfehlen sich bei Fehlen aller Reizerscheinungen weisse Präcipitatsalbe (s. Rp. 2116), welche letztere mittelst eines Glasstabes in den Bindehautsack gebracht und unter leichtem Andrücken des oberen Lides auf der Cornea verrieben wird.

Etwas mehr reizend wirkt:

Rp. 2127.

*Merc. praec. flari 0·05 — 0·1,*  
*Vaselin. puriss. 5·0*  
*Misce exactissime. Fiat ungu.*  
*D. S. Zum Verreiben in den Bindehautsack.*

**Frühjahrskatarrh.** Gegen das Jucken Einträufeln einer Essiglösung:

Rp. 2128.

*Acid. acet. dilut. 5·0,*  
*Aqu. dest. 100·0.*  
*D. S. Mit einem Tropfgläschen mehrere Male*  
*im Tage ins Auge zu träufeln*

Gegen die Krankheit selbst weisse Präcipitatsalbe (s. Rp. 2116) in den Bindehautsack zu streichen

**Blennorrhoea conjunctivae acuta. Acute Bindehautblennorrhoe.** In prophylaktischer Beziehung

bei Neugeborenen das Credé'sche Schutzverfahren, das darin besteht, dass dem neugeborenen Kinde sofort nach dem Abnabeln die Augen sorgfältig ausgewaschen und in jedes ein Tropfen einer 2<sup>o</sup>igen Lapislösung instillirt wird. Erwachsene, die an Blennorrhoe der Genitalien leiden, sind auf die Gefahr des blennorrhoeischen Secretes für die Augen aufmerksam zu machen. Wenn nur ein Auge ergriffen ist, das gesunde Auge unter einen Schutzverband zu bringen, welcher abertäglich zu erneuern ist, um das Auge zu reinigen und eine etwa sich entwickelnde Erkrankung desselben rechtzeitig zu constatiren. Derselbe wird in folgender Weise ausgeführt: Die Lidspalte wird durch 2–3 von oben nach abwärts angelegte Streifen englischen Pflasters verklebt, darüber ein Wattebausch gelegt, der durch einen runden, mit radiären Einschnitten versehenen Fleck Heftpflaster befestigt wird. Darüber abermals Watte und Rollbinde.

Gegen die Krankheit selbst im Beginne bei starken entzündlichen Reizerscheinungen fleissig zu wechselnde Eisumschläge; 6–10 Blutegel an die Schläfe, nicht zu nahe den Lidern; halbstündige Reinigung des Auges mit:

Rp. 2129.

*Kali. hypermang. 10·0,*

*Aqu. dest. 100·0.*

*S. In ein Glas Wasser so viel Tropfen, dass die Lösung eine weinrothe Farbe annimmt.*

Ist das Oedem der Lider sehr bedeutend, so dass das Auge nicht geöffnet werden kann und Nekrose der Coniunctiva zu befürchten ist, so kann man die Lidspalte operativ erweitern durch die Canthoplastik oder durch die schiefe Blepharotomie nach v. Stellwag: Das stumpfe Blatt einer geraden Scheere wird am äusseren Augenwinkel unter das Augenlid eingeführt und bei der ersten Operation die äussere Commissur in horizontaler Richtung mit einem Scheerenschlag ge-



spalten, bei der letzteren der Schnitt nach unten aussen gegen den unteren Orbitalrand geführt.

Die Coniunctiva 2—4mal im Tag mit 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>iger Lapislösung zu touchiren. (Näheres s. „Coniunctivitis catarrhalis“, S. 592.) Eventuelle Complicationen, (Ulcus, Abscessus corneae, Prolapsus iridis) nach den entsprechenden Regeln zu behandeln.

Bei Kindern sind die Eisumschläge wegzulassen, ebenso der Schutzverband als unausführbar. Die Pflegerin ist auf die Gefahr der Infection aufmerksam zu machen.

**Trachoma. Aegyptische Augenkrankheit.** Verhütung der Uebertragung auf andere Personen und auf das andere Auge, wenn dasselbe noch nicht von der Krankheit ergriffen ist. Der Patient muss sein eigenes Waschzeug, Handtuch haben und die äusserste Reinlichkeit beobachten.

Bei acuten Formen mit starker Secretion, sowie bei Gegenwart progressiver Hornhautgeschwüre 1—2mal täglich mit 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub>iger Lapislösung zu touchiren. Bei älteren Formen mit geringeren Reizerscheinungen und mehr hervortretender Hypertrophie der Bindehaut touchirt man mit dem Blaustein, wobei man mit dem zugeschliffenen Krystall leicht über die Coniunctiva der umgestülpten Lider streicht.

Rp. 2130.

*Cupr. sulfuric. crystallisat. in bacill. Nr. 1.*  
*S. Blaustein.*

Bei Narbenbildung Einstreichen von weisser Präcipitatsalbe (Rp. 2116).

Bei Xerophthalmus täglich einige Male Milch oder Mucilago semin. Cydoniorum in den Bindehautsack zu instilliren.

**Corpus alienum in oculo. Fremdkörper im Auge.**  
Die Fremdkörper können im Coniunctivalsack liegen

bleiben, besonders häufig stecken sie im Sulcus subtarsalis des oberen Lides, wesshalb man bei Verdacht auf einen Fremdkörper nie verstimme, dasselbe umzustülpen und zu besichtigen. Der Fremdkörper wird aus dem Coniunctivalsack leicht durch Wegwischen oder mit einer Pincette entfernt. Sitzt der Fremdkörper in der Cornea, so wird er nach Cocainisirung des Auges mittelst der Fremdkörperradel beseitigt, wobei die Cornea so wenig als möglich zerkratzt werden soll. Nach Entfernung des Corpus alienum aus der Cornea streut man Jodoformpulver auf die Stelle und lässt durch 1 Tag Verband tragen. Bei Ciliarinjection Atropin ins Auge zu träufeln.

Die häufigsten Fremdkörper sind Staub- und Kohlenpartikel, Metall-, Stein-, Glas- und Holzsplitter, kleine Insecten und deren Flügeldecken. „Krebsaugen“ (Lapides cancerorum) werden vom Volke zur Entfernung von Fremdkörpern benützt und dabei zuweilen im Coniunctivalsack vergessen, wo sie Entzündung erregen. Von weiteren Fremdkörpern, die im Auge öfter vorkommen, sind zu erwähnen Kalkpartikel, Mörtel, von geschmolzenem Metall herrührende Schlacken. Kommt man zeitig genug zu einer Verbrennung mit ungelöschtem Kalk, so instillire man eine concentrirte Zuckerlösung. In Folge von Pulverexplosionen gelangen Pulverkörner in's Auge, die in die Coniunctiva reactionslos einheilen und ohne Folgen vertragen werden, von der Cornea müssen sie abgeschabt werden.

**Keratitis parenchymatosa (e lue hereditaria).**  
**Hornhautentzündung auf hereditär-syphilitischer Grundlage** Behandlung des Grundleidens, neben guter Ernährung namentlich:

Rp. 2131.

*Syr. Ferr. iodat. 50·0.*  
*S. 1mal tägl. 1 Kaffee-*  
*löffel.*

| Statt dessen auch Haller  
Jodwasser, täglich ein Weinglas voll.

Rp. 2132.

*Kal. iodat.* 5·0,  
*Aqu. dest.* 150·0.  
*S. 3mal täglich 1 Ess-*  
*löffel.*

Rp. 2133.

*Chinin. bisulf.* 0·6,  
*Merc. subl. corr.* 0·3.  
*Mass. pillul. ut f. pill.*  
*No. 60.*  
*D. S. Steigend 3—9*  
*Pillen täglich.*

Bei torpiden Processen warme Umschläge: Ein in Wasser von 40° R. getauchtes, ausgedrücktes und mehrfach zusammengelegtes Leinwandläppchen wird auf die geschlossenen Lider gelegt. Diese Umschläge Vor- und Nachmittag durch je 2 Stunden zu machen und häufig zu weehseln. Im Endstadium auch Massage der Cornea mit gelber Präcipitatsalbe (s. Rp. 2127), von der man ein erbsengrosses Stück in den Coniunctivalsack bringt und durch leichtes Andrücken des oberen Lides auf dem Bulbus verreibt. Vaporisation (s. Ulcus corneae).

**Abscessus corneae. Hornhautabscess.** Atropin, Jodoform-Verband, Bettruhe, sehr warme Kataplasmen auf's Auge. Wenn das Hypopyum mehr als den 3. Theil der vorderen Kammer einnimmt, Punction der Cornea.

**Ulcus corneae. Hornhautgeschwür.** Behandlung des Grundleidens (Coniunctivitis catarrhalis, serophulosa, trachomatosa, blennorrhoea etc.). Bei progressiven Geschwüren Einträufelung von Atropin ins Auge, auf das Geschwür Jodoform aufzustreuen, darüber Verband. Ist das Geschwür dem Durchbruch nahe, Punction der vorderen Kammer. Bei regressiven Geschwüren Reizmittel in mässigem Grade anzuwenden: Einstreuen von Calomel, gelbe Präcipitatsalbe.

Restitrende Hornhauttrübungen versucht man durch Calomel Einstäubung oder Massage mit gelber Präcipitatsalbe s. „Keratitis parenchymatosa“), zur

Aufhellung zu bringen. Auch Vaporisation zu versuchen: Man leitet Wasserdämpfe durch einen Siegle'schen Inhalationsapparat auf das offengehaltene Auge, 2mal täglich durch je 10 Minuten.

**Fistula corneae. Hornhautfistel.** Bettruhe, Einträufelung von Atropin (Rp. 2124); bei randständigen Fisteln besser Eserin (Rp. 2139) oder Pilocarpin (Rp. 2138). Verband. Hilft dies nicht, so bleibt nur ein operativer Eingriff übrig.

**Skleritis. Entzündung der Lederhaut.** Behandlung des ursächlichen Leidens (Lues, Gelenkrheumatismus etc.). Insbesondere bei letzterem, aber auch bei nicht bekannter Ursache der Affection oft wirksam:

Rp. 2134.

*Natr. salicylic. 12·0.*

*Div. in dos. aequ. No. 12.*

*S. 3–6 Pulver im Tag.*

Local Atropin-Einträufelungen. Später Massage der skleritischen Knoten mit weisser Präcipitatsalbe.

**Iritis. Entzündung der Regenbogenhaut.** Feststellung und Behandlung des Grundleidens (Syphilis, Gonorrhoe, Rheumatismus etc.) Bei Syphilis energische Inunctionskur; bei Iritis gonorrhoeica neben der Behandlung des Trippers *Natr. salicyl.* (s. Rp. 2134 u. 2137.) Seltener:

Rp. 2135.

*Ol. Gaultheriae gtts. 5.*

*Da in caps. gelatin.*

*Dent. tal. dos. No. 10.*

*D. S. 3mal täglich 1 Kapsel*

Gegen die Iritis selbst Aufenthalt in mässig temperirtem, leicht verdunkeltem Zimmer; Tragen von grauen Schutzbrillen; Vermeidung von Anstrengungen des Auges

Einträufelung von Atropin (s. Rp. 2124). Kann man bestehende hintere Synechien damit nicht zur Zerreissung bringen, so empfiehlt sich ein Versuch mit Atropin in Substanz, indem man ein etwa stecknadelkopfgrosses Körnchen von Atropin. sulfuric. in den Bindehautsack bringt. Das untere Lid ist danach durch 1—2 Minuten abzuziehen, damit die atropinhältigen Thränen leicht abfliessen und nicht in die Nasenhöhle rinnen und verschluckt werden, was leicht zu Intoxicationserscheinungen führen könnte.

**Chorioiditis und Retinitis. Entzündung der Ader- und Netzhaut** Ermittlung und Behandlung des Grundleidens (hochgradige Myopie, Albuminurie, Luës). Wo die Ursache nicht nachzuweisen ist, ebenso wie bei der luëtischen Form Inunctionskur einzuleiten. Die eigentliche Behandlung beschränkt sich auf ein diätetisches Verfahren: Bottrube, leichte Kost, insbesondere keine Alcoholica; Vermeidung von Erhitzung. Sorge für leichten und regelmässigen Stuhl. Aeusserste Schonung der Augen; Tragen dunkler Schutzbrillen, eventuell Dunkelkur. Bei Drucksteigerung Iridektomie. Bei reichlichen Glaskörpertrübungen kann man eine Schwitzkur versuchen: Man macht durch 10—20 Tage täglich eine subcutane Injection von:

Rp. 2136.

*Pilocarpin. muriat. 0·1,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*S. Täglich 1 Pravaz'sche Spritze voll zu injiciren*

Oder man verordnet:

Rp. 2137.

*Natr. salicylic. 10·0.*

*Die in dos. aequ. No. 5.*

*S. Abends im Bett 1 Pulver in einer Tasse heissen Lindenblüthenthees zu nehmen, danach der Körper warm zuzudecken.*



**Panophthalmitis.** Feuchtwarme Umschläge, Narcotica. Bei prallem Oedem des Lides, starker Protrusion und Spannung des Bulbus macht man eine ausgiebige Incision in den letzteren.

**Ablatio retinae. Netzhautabhebung.** Sorge für leichten Stuhl. Bettruhe und Druckverband durch 3–4 Wochen; daneben Gebrauch von Natr. salicyl. (s. Rp. 2137). Eventuell Punction der Abhebung durch die Sklera. Bei gewissen einigermaßen umfänglicheren Abhebungen allerdings meist jede Therapie erfolglos.

**Glaucom Grüner Staar.** Das souveräne Heilmittel ist die Iridektomie, die man bei constatirtem Leiden nie zu früh machen kann. Im Prodromalstadium oder wenn die Operation aus irgendwelchen Gründen nicht sofort gemacht werden kann, strenge geistige und körperliche Ruhe, Sorge für regelmässigen Stuhl; 4–6mal täglich Einträufelung einiger Tropfen von:

Rp. 2138.

*Pilocarpin. mur. 0·1,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*S. Pilocarpinlösung.*

Oder:

Rp. 2139.

*Eserin. sulfuric. 0·05,*

*Aqu. dest. 5·0.*

*S. Eserinlösung.*

**Atrophia nervi optici. Sehnervenschwund.** Behandlung der ursächlichen Erkrankung, insbesondere bei Luës antisyphilitische Behandlung. Entsprechende Ernährung, fleissiger Aufenthalt im Freien; Sorge für regelmässigen Stuhl. Vermeidung von Alcoholicis und von Tabak, namentlich wenn das Leiden mit dem Missbrauch dieser Genußmittel im Zusammenhang steht. Strenge Augendiät, Vermeidung jeder Augenanstrengung sowie starker Beleuchtung. Gebrauch von Strychnin:

Rp. 2140. *Strychnin nitric. 0·1,*

*Aqu. dest. 20·0.*

*S. Täglich 1 Injection unter die Haut der Schläfe. (Abwechselnd rechts und links).*

Man beginnt mit 2—3 Theilstrichen einer Pravaz'schen Spritze und steigt allmählich bis auf eine ganze Spritze.

**Strabismus. Schielen.** Bei Kindern orthopädische Behandlung, um die Entwicklung der Amblyopie hintanzuhalten. Man verbindet von Zeit zu Zeit das gesunde Auge, um das strabirende zum Fixiren zu zwingen. Correction eines eventuell als Veranlassung dienenden Refractionsfehlers durch Brillen. Fleissiger Aufenthalt im Freien; Vermeidung von die Augen anstrengenden Beschäftigungen. Die Operation (Tenotomie) nicht vor dem 10. -12. Lebensjahre der Patienten auszuführen.

**Accommodationskrampf.** Durch mehrere Wochen tägliche Einträufelung von Atropin (Rp. 2124). Enthaltung von jeder die Augen anstrengenden Beschäftigung. Danach Tragen von entsprechenden Brillen

Anmerkung. Will man behufs genauerer ophthalmoskopischer Untersuchung ein Mydriaticum verwenden, so ist es angezeigt, statt des Atropins Homatropin zu geben, da dessen Wirkung und folglich auch die damit verbundene Sehstörung nur einige Stunden anhält.

Rp. 2141.

*Homatropin hydrobromat. 0·03,*

*Aqu. dest. 3·0*

*S. Homatropin-Lösung.*



Aus

**Prof. Dr. Josef Gruber's**

**Klinik und Ambulatorium für Krankheiten des Gehörorgans.**

---

**Othaematoma. Ohrblutgeschwulst.** Operative Entleerung des Blutes aus der Geschwulst, wenn es noch flüssig ist, mittelst Troiscarts, wenn bereits geronnen, durch Einschnitte mit dem Messer. Weiterhin Compression der Geschwulst durch einen antiseptischen Verband, der in Zirkeltouren um den Schädel läuft. Wenn Entzündungserscheinungen bestehen, kalte Umschläge oder:

Rp. 2142.

*Aqu. vegeto-mineral. Goulardi 300·0.*

*S. Zu Umschlägen.*

Bei nach abgelaufener Entzündung zurückgebliebener oder ohne Entzündungserscheinungen entstandener Verdickung der Muschel methodische Massage; wird diese nicht vertragen oder nicht von Erfolg begleitet, Einpinselung mit Jodtinctur.

**Eczema auriculae. Nässende Flechte am äusseren Ohrtheil.** Das sehr oft gleichzeitig bestehende Ekzem der Kopfhaut zugleich zu behandeln.

In manchen Fällen causale Behandlung möglich und indicirt (Pediculosis capitis, Scrophulose, Anämie etc.)

Local zunächst Aufweichung etwaiger Borken durch Glycerin oder Oel; bei starken entzündlichen Erscheinungen und Schmerzhaftigkeit Ueberschläge mit Aqu. Goulardi, eventuell mit Zusatz von Eis, oder Auflegen

von mit Ungu. Cerussae bestrichenen Leinwandlappchen, die mehrmals täglich zu wechseln sind. Bei leichteren Formen des acuten Ekzems einfach in Glycerin getränkte Charpiebäuschchen, genau den Vertiefungen und Erhabenheiten der Ohrmuschel anpassend aufzulegen und durch einen geeigneten Verband zu befestigen; 2mal täglich zu wechseln, dabei übermässiges Secret mit Leinwand abzutupfen. Statt der Glycerinbäuschchen auch mit milden Salben, wie Vaseline, Ungu. emolliens oder Althaeae etc. bestrichene Leinwandlappchen in derselben Weise zu verwenden. Ebenso auch Lappchen mit Glycerinsalbe:

Rp. 2143. *Glycerin. pur.* 25·0,  
*Amyl. pur.* 5·0.  
*M. calef. usque ad consist. ungu. moll.*  
*D. S. Salbe.*

Führen diese Mittel nicht zum Ziel, Anwendung leicht adstringirender Salben (Bor-, Zink-, Diachylon-Salbe etc.) in derselben Weise. Wenn auch dies ohne Erfolg, Gebrauch von Schmierseife, von der 2 mal täglich ein entsprechend grosses Stück an der afficirten Stelle mit Wasser bis zur Schaumentwicklung verwaschen wird; bei Schmerzen nach der Einreibung kalte Umschläge; über Nacht Auflegen von milden Salben oder von Oel.

Dieses Verfahren bis zum Aufhören des Nässens und der Bläschenbildung fortzusetzen.

Bei bereits eingetretener Abschuppung:

Rp. 2144. *Ol. cadin (od. Rusc.),*  
*Ol. Olivar. aa* 20·0.  
*S. Die erkrankten Stellen mehrmals täglich*  
*sehr dünn einzupinseln*

Werden diese Einpinselungen nicht vertragen, besser:

Rp. 2145. *Ol. Rusc.* 5·0,  
*Glycerin.* 20,  
*Ungu. emoll.* 20·0.  
*S. Salbe; 2m*

Bei gleichzeitigem Ekzem des äusseren Gehörgangs zunächst derselbe mittelst durch die Pincette gehaltener Charpiebäuschchen gut auszuwischen, oder, wenn starke Anhäufungen von Secret bestehen, mittelst Ohrspritze auszuspritzen (Ueber Technik der Ausspritzung s. S. 613.)

Fest anhaftende Epidermismassen vorher zu lockern durch Eingiessen von:

Rp. 2146.

*Kal. (od. Natr.) carbonic. 0·1—0·3,*

*Glycerin. 20·0.*

*S. Einzugiessen.*

Danach gelingt die Ausspritzung leicht. Hierauf Anwenden von:

Rp. 2147.

*Zinc. sulfuric. 0·1—0·5,*

*Glycerin. 50·0.*

*S. 3mal täglich \* 10—15 Tropfen erwärmt in den Gehörgang zu giessen.*

Erfolgt hierauf keine Heilung, Application von:

Rp. 2148.

*Argent. nitric. 0·1—0·5,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*S. Zu Handen des Arztes, zur Einpinselung.*

(Bei eintretender Schmerzhaftigkeit zu sistiren.)

Bei starker Infiltration der Haut des äusseren Gehörgangs und dadurch bewirkter Verengerung desselben Einführung von Bourdonnet's oder von kegelförmigen Laminaria-Stiften.

**Otitis externa. Entzündung in den Weichtheilen des äusseren Gehörgangs.** Bei circumscripter Entzündung im Beginn gegen die Schmerzhaftigkeit Narcotica, und zwar am besten in Form der von Prof. Gruber eingeführten medicamentösen Gelatine-Bougies, der sogen. *Amygdalae aurium* (vom Apotheker Grohs, Wien, Währingerstrasse angefertigt). Dieselben sind in den äusseren Gehörgang, nachdem derselbe

mit 4%iger lauwarmer Carbollösung gründlich gereinigt, einzuführen und ein kleines Wattebüschchen nachzuschieben. Die Application je nach dem Zustande des Patienten 1—3mal täglich vorzunehmen. Man verschreibt also etwa:

Rp. 2149.

*Amygdal. aurium gelatinos. quar. quael. continueat*

*Extr. Opii aquos. 0.01.*

*Dent. No. 10.*

*D. S. Ohrmandeln.*

Oder:

Rp. 2150.

*Amygdal. aurium gelatinos. No. 10, quar. quael. contin.*

*Morph. muriatic 0.005.*

*D. S. Aeusserlich.*

\* Seltener.

Rp. 2151.

*Amygdal. aur. gelatinos. No. 10, q. quael. contin.*

*Cocain. muriat. 0.01.*

*D. S. 3 Amal täglich 1 Stück einzuführen.*

(Nur in den seltensten Fällen im Stadium der Hyperämie behufs Schmerzstillung geboten die Scarification des äusseren Gehörganges durch an verschiedenen Stellen der Wandungen mittelst des Gruberschen Ohrbistouris ausgeführte, 1—2 Cm. lange, von innen nach aussen gerichtete Schnitte, die bis auf das Periost, resp. Perichondrium reichen. Nach der Scarification vorsichtiges Eingiessen von lauwarmem Wasser zur Entfernung der Blutgerinnsel, hierauf Einführung eines feuchten, nicht zu grossen Wattetaupons.)

Hält der Schmerz weiter an, Blutentziehung durch Blutegel, welche vor dem Tragus und in besonders hochgradigen Fällen auch unter dem Processus mastoideus angesetzt werden. Bei anämischen Kranken statt der Blutegel trockene Schropfköpfe. Wenn die Entzündungserscheinungen nicht zurückgehen, zur Beförderung der Reifung des Abscessus lauwarmer Flüssigkeiten in den Gehörgang zu giessen; am meisten verwendet wird:

Rp. 2152.

*Decoct. semin. papaveris e 10·0 : 100·0,*

*Tinct. Opii simpl. 1·0—1·5.*

*S. Jede halbe bis ganze Stunde in den Gehörgang zu giessen, einige Minuten darin zu belassen, dann der Gehörgang mit Baumwolle zu verstopfen.*

Bei Entzündung im knorpeligen Theil des Gehörgangs in warme Flüssigkeiten getauchte Baumwollpfröpfe in den Gehörgang einzuführen, ein trockener Wattebausch nachzuschieben; jede  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Stunde die Application zu erneuern. Am häufigsten gebraucht wird:

Rp. 2153.

*Plumb. acetic. bas.,*

*Morph. acetic. āā 1·0,*

*Aqu. dest. 50·0.*

*S. Erwärmt anzuwenden.*

Bei sehr heftigen Schmerzen auch Application von Narcoticis in der Umgebung des Ohres:

Rp. 2154.

*Morph. acetic. 0·1—0·2,*

*Vaselin. 10·0.*

*D. S. In der Umgebung des Ohres einzureiben.*

Ebenso:

Rp. 2155.

*Veratrin. 0·1,*

*Glycerin. 10·0.*

*D. S. In der Umgebung des Ohres mittelst Baumwolle einzureib.*

Oder:

Rp. 2156.

*Aether. sulfuric.,*

*Ol. Hyoscyami coct.*

*āā 10·0.*

*S. Einreibung.*

In besonders heftigen Fällen selbst subcutane Morphin-Injectionen.

In manchen Fällen, namentlich bei Otitis parasitica Eingiessung von Spir. vin. rectificatissimus, der 10—15 Minuten im Gehörgang belassen wird, von ausgezeichneter schmerzstillender Wirkung. Wenn alle genannten Mittel den Schmerz nicht mildern, ein Vesicans unter dem Warzenfortsatz zu appliciren, eventuell danach die Epidermis der Blase abzutragen und die blossliegende Cutis mit Morphin-Pulver zu bestreuen.

Bei profuser Eiterung Anwendung von Adstringentien.  
Auch hier die Gelatinepräparate gut zu benützen, z. B.:  
Rp. 2157.

*Amygdal. aurium gelati-*  
*nos. Nr 10, quar. quael.*  
*contin. Zinc. sulfuric.*  
*0·01—0·03 (od. Natr.*  
*boracis. 0·01—0·05 od.*  
*Cupr. sulfuric.*  
*0·01—0·02).*

S. In den Gehörgang  
einzuführen.

Statt der Ohrmandeln auch Eingiessungen von Flüssigkeiten in den äusseren Gehörgang: nach gründlicher Reinigung des letzteren durch Ausspritzen oder Auswischen wird, während der Kranke auf der entgegengesetzten Kopfseite mit etwas nach abwärts geneigtem Gesichte liegt, die Flüssigkeit mittelst eines Löffels oder kleinen Fläschchens erwärmt in den äusseren Gehörgang gegossen, dem man durch Anziehen der Muschel nach hinten, aussen und oben dabei eine möglichst gerade Richtung gibt. Am häufigsten verwendet Prof. Gruber jetzt:

Rp. 2159.

*Merc. sublim. corrosiv.*  
*0·01,*  
*Aqu. dest. 50·0.*

S. Zum Eingiessen in  
den äusseren Gehör-  
gang.

Oder:

Rp. 2160.

*Acid. salicylic. 0·05—0·1,*  
*Aqu. dest. (od. bei übel-*  
*riechendem Secret:*  
*Aqu. Naphae) 50·0.*  
S. Aeusserlich.

Bei fötidem Secret  
auch antiseptische Gelatine-  
Bougies, z. B.:

Rp. 2158.

*Amygdal. aur. gelatinos.*  
*quar. quael. cont.*  
*Jodoform. pur. 0·01*  
*No. 10.*

S. Täglich 1—2 Stück  
einzuführen.

Ferner auch:

Rp. 2161.

*Zinc. sulfuric. 0·15,*  
*Aqu. dest (od. Glycerin.)*  
*50·0.*

S. Ohrtropfen.

Bei spärlicherer Exsu-  
dation, aber starker Schwel-  
lung:

Rp. 2162.

*Plumb. acetic. 0·1—1·0,*  
*Aqu. dest (od. Cerasor.*  
*nigror.) 50·0.*

S. Wie das Vorige.



Bei reichlicher Granulationsbildung Eingiessungen von:

Rp. 2163.

*Argent. nitric. 0.1—0.5,*

*Aqu. dest. 50.0.*

*S. Zum Eingiessen in das Ohr.*

Oder Bepinselungen mit 5—10%igen Lapislösungen und wenn dies nicht ausreicht, selbst Aetzungen mit Lapis in Substanz.

Bei der diffusen Otitis externa ähnliche Behandlung, wie bei der circumscripten: Schädliche Momente, welche die Entzündung unterhalten, wie fremde Körper, Pilzmassen etc. zu entfernen. Im Stadium der Hyperämie Scarification (s. S. 606), oder wenn diese nicht zugegeben wird, dieselben Mittel, wie bei Otitis ext. circumscripta. Wenn bereits Eiterung in den tieferen Gebilden eingetreten, bei sich verzögerndem Durchbruch Incisionen. Bei durch die Schwellung der Weichtheile hervorgerufener Verengung des Gehörgangs ein Drainrohr in denselben einzuführen, oder, wo dies nicht möglich, Incisionen in die Weichgebilde. Abscesse am Trommelfell oder in der Nähe desselben baldmöglichst zu eröffnen. Bei profuser Otorrhoe und starker Granulationsbildung Application von Lapis in Substanz oder in concentrirten Lösungen.

Bei parasitärer Entzündung Ausspritzung mit 1%iger Carbolsäure; danach Eingiessen von erwärmtem Spirit. vin. rectificatissimus.

**Verletzungen des Trommelfells.** Bei frischen Verletzungen schädliche Substanzen, die sich etwa noch im Ohre befinden, zu entfernen, und zwar nicht durch Einspritzung, sondern mittelst Charpiewicken, oder bei guter Beleuchtung mit der Sonde, dann Einblasen von Jodoform, Verstopfung des Gehörgangs mittelst Jodoformgaze und Watte. Ruhe, Vermeidung von Congestionen nach dem Kopfe, salinische Abführmittel.

**Myringitis. Entzündung des Trommelfells.** a) Bei acuter Entzündung antiphlogistisches Verfahren, Ruhe, etwa vorhandene schädliche Stoffe aus dem Gehörgang in möglichst schonender Weise zu entfernen (fest anhaftende Epidermismassen nach der unter „Eczema auriculae“ [S. 605] geschilderten Methode zu lockern, dann auszuspritzen). Regelung der Diät, Abführmittel. Bei starker Hyperämie des Trommelfells und kräftiger Constitution des Kranken Blutegel vor dem Tragus, eventuell bogenförmig bis unter den Proc. mastoideus. Bei blutarmen Individuen trockene Schröpfköpfe, einer vor dem Tragus, ein zweiter am Warzenfortsatz. Weiter kalte Umschläge in der Umgebung des Ohres. Bei anhaltender Schmerzhaftigkeit Narcotica (s. „Otitis externa“, S. 606 f.), oder allenfalls:

Rp. 2164.

*Plumb. acet. basic. 0·1,  
Aqu. font. destillat 50·0,  
Morph. acetic. 0·05—0·1.  
S. Alle 2 Stunden einzuträufeln.*

Ebenso:

Rp. 2165.

*Plumb. acet. bas. 0·15,  
Aqu. destillat. 50·0,  
Tinct. Opii simpl. 1·0.  
S. 3—4mal des Tages einzuträufeln.*

Bei trotz Blutentziehung andauernder Hyperämie und Schmerzhaftigkeit des Trommelfells seichte Einschnitte in die Cutis des äusseren Gehörgangs in nächster Nähe des Trommelfells und parallel zu dessen peripherem Rande, mittelst des Gruber'schen Myringotoms auszuführen.

Bei bereits vorhandenem Exsudat an der freien Fläche Einträufelung eines der erwähnten Mittel (s. Rp. 2164, 2165) fortzusetzen

Rp. 2166

*Acid. boric. subtiliss.  
Aqu. dest.  
Glycerin an 20·0,  
Tinct. Opii simpl. 1·0  
S. 2st. einzuträufeln*

Weiterhin nach Aufhören der Schmerzen bei Granulationsbildung täglich Bepinselungen mit:

Rp. 2167.

*Zinc. sulfuric. 0·3,*  
*Alum. crud. 0·5,*  
*Aqu. destillat. 30·0.*  
*S. Zur Bepinselung.*

(Vor dem Bepinseln stets genaue Untersuchung, ob dasselbe noch durch die bestehende Exsudation erfordert wird, sowie sorgfältige Reinigung des Trommelfells mittelst Watte.)

Wenn der Patient nicht täglich zum Arzte kommen kann, gibt man ihm:

Rp. 2168.

*Zinc. sulfuric. 0·2,*  
*Alum. crud. 0·3,*  
*Glycerin. 30·0.*

*S. 3—4 Tropfen täglich ins Ohr zu träufeln, einige Minuten darin zu belassen, dann Charpie-Bourdonnet.*

Während der Exsudatbildung ist ferner zweckmässig:

Rp. 2169.

*Jodi pur. 0·5,*  
*Kal. iodat. 5·0,*  
*Ungu. simpl. 50·0.*  
*M. f. ungu.*

*D. S. In die Gegend des Warzenfortsatzes einzureiben.*

Bei Abscessbildung im Trommelfell baldige Incision mittelst Myringotoms.

Wenn Perforation des Trommelfells entstanden ist, Lufteintreibung nach dem Verfahren von Prof. Gruber (s. unter „Otitis media catarrhalis“. S. 614). Bei langsamer Ausheilung der Perforation nach gänzlichem Schwinden der Entzündungserscheinungen am Trommelfell:

Rp. 2170.

*Argent. nitric. 1·5—3·0,*  
*Aqu. destillat. 10·0.*  
*S. Zum Touchiren der Wundränder.*

b) Bei chronischer Entzündung Berücksichtigung der etwaigen constitutionellen Grundlage. Gegen kleine, ausgebreitete Granulationen am Trommelfell:

Rp. 2171.

*Tinct. Jodin.*,

*Tinct. Opii crocat.*

*aa* 10·0.

*S. Bepinselung.*

Bei Syphilis:

Rp. 2172.

*Mercur. sublim. corrosiv.*

*0 1—0 3,*

*Spir. vin. rectific. 20·0.*

*S. Einpinselung*

Grössere Granulationsmassen mittelst Galvanocauter's oder Polypenschlinge abzutragen und nachträglich Aetzung der Reste.

Bei in Folge von Myringitis, resp. von Otitis media entstandenen bleibenden Substanzverlusten des Trommelfells Anwendung des von Prof. Gruber angegebenen künstlichen Trommelfells; dasselbe aus Gummi anzufertigen oder aus Leinwand, die man zweckmässig bestreicht mit:

Rp. 2173.

*Kal. carbonic. 0·2,*

*Vaselin. 10·0.*

*S. Salbe.*

Oder:

Rp. 2174.

*Argent. nitric. 0·1,*

*Ungu. emoll. 10·0.*

*S. Salbe.*

Bei oberflächlichen Trübungen des Trommelfells Bepinselungen desselben mit:

Rp. 2175.

*Kal. iodat. 4·0,*

*Jod. pur. 0·2,*

*Glycerin. 25·0.*

*D. S. Zum Bepinseln.*

Oder mit:

Rp. 2176.

*Argent. nitric. 2·0,*

*Aqu. destillat. 25·0.*

*D. S. Zum Bepinseln.*

Ebenso:

Rp. 2177.

*Merc. sublim. corrosiv. 0 4,*

*Aqu. destillat. 25·0.*

*D. S. Zum Bepinseln.*

Bei Trübungen in den tieferen Schichten fortgesetzte Lufteintreibungen, ferner oberflächliche Incisionen ins Trommelfell, endlich unter Umständen Myringotomie.

**Corpora aliena in meatu auditorio externo.**

**Fremde Körper im äusseren Gehörgang.** Im Allgemeinen möglichst baldige Entfernung des Körpers aus dem Ohre, nur wenn derselbe keine bedrohlichen Erscheinungen hervorruft und die nach aussen von ihm liegenden Theile des Gehörgangs stark entzündlich geschwellt sind, Abwarten günstigerer Verhältnisse. In allen Fällen ist zunächst die Entfernung des Fremdkörpers durch kunstgerechtes Ausspritzen zu versuchen, das auch meistens zum Ziele führt.

(Zur Ausspritzung des Ohres werden aus Zinn oder Neusilber gefertigte Spritzen mit stumpf abgerundetem Ansatzstück verwendet, unter stumpfem Winkel gegen eine Wand des Gehörgangs gehalten und, während mit der linken Hand die Ohrmuschel an ihrem oberen Drittel gefasst und nach hinten, aussen, oben gezogen wird, unter mässigem Druck entleert. Das Wasser muss rein [aseptisch] sein und eine Temperatur von 28 – 30° R. haben. Nach der Ausspritzung genaue Abtrocknung mit Compresse und hierauf mittelst zwischen den Branchen der Pincette gehaltener Wattebäuschehen.)

Zuweilen gelingt die Entfernung besser bei Ausspritzung in der Rückenlage des Patienten mit etwas nach hinten überhängendem Kopfe.

Die Anwendung von Instrumenten so lange als möglich zu vermeiden und nur bei Erfolglosigkeit wiederholter Ausspritzungen vorzunehmen; die instrumentelle Extraction stets nur bei exacter Beherrschung der specialistischen Technik vorzunehmen; man benützt die Ohrpincette, ein curettenartiges Instrument, oder die Krückenpincette mit parallel zu einander verschiebbaren Branchen.

Harte Ceruminalpfropfe vor dem Ausspritzen durch öfteres Eingiessen von Wasser, Mandelöl oder Glycerin zu erweichen, noch besser durch:

Rp. 2178. *Kal. iodat.* 2·0,

*Glycerin.*,

*Aqu. destillat.* aa 15 0.

*M. D. S. Einzuträufeln.*



Mit dieser Lösung auch nach der Entfernung des Pfropfes die Gehörgangswände zu bepinseln.

Nach Entfernung eines Fremdkörpers stets der Gehörgang und das Trommelfell genau zu untersuchen und etwaige krankhafte Veränderungen entsprechend zu behandeln. Der Gehörgang durch einige Stunden mit Watte zu verstopfen.

**Otitis media catarrhalis. Katarrhalische Entzündung der Mittelohrschleimhaut.** Der allgemeine körperliche Zustand des Kranken sorgfältig zu prüfen, bei constitutioneller Grundlage Allgemeinbehandlung. Specielle Berücksichtigung der Gebilde des Nasenrachenraums. Adenoide Vegetationen desselben zu beseitigen. Hypertrophirte Tonsillen zu extirpiren, oder wenn die Operation von dem Patienten nicht gestattet wird, mit concentrirten Lapislösungen zu ätzen. Bei chronischem Nasenrachenkatarrh Einspritzungen medicamentöser Flüssigkeiten durch die Nase, am besten 2–4%iger Lösungen von Alaun, Borax oder Tannin, nebstdem Anwendung von Gurgelwässern.

Der Katarrh der Paukenschleimhaut selbst erfordert locale Behandlung.

Zunächst Luftdouche nach Gruber: Der mit einem Drainrohrchen versehene Ansatz eines Kautschukballons No. 10 wird in das Nasenloch eingeführt, dieses über dem Instrument mit der einen Hand comprimirt und mit der anderen Hand der Ballon zusammengepresst, während der Kranke die Silbe huck ausspricht. Dieses Verfahren je nach Bedarf zu wiederholen.

Man beginnt die Kur immer mit schwächeren Druckgrößen und steigt, wenn nöthig, allmählich damit.

Wenn die Nasenschleimhaut nicht mit afficirt ist und häufige Anwendung der Luftdouche geboten erscheint, Luft-eintreibungen durch den in die Tuba eingeführten Katheter.

Bei starker Hyperämie des Trommelfells und quälenden subjectiven Geräuschen wenn keine Con-



traindication, locale Blutentziehungen durch Blutegel. Sorge für regelmässige Stuhlentleerung wichtig, eventuell Anwendung der Wässer von Friedrichshall, Marienbad, Karlsbad, Kissingen etc.

Bei anhaltender, durch die bisherigen Maassregeln nicht zum Schwinden gebrachter Erkrankung, speciell bei starker Schwellung der Schleimhaut, Einspritzungen adstringirender Flüssigkeiten durch den Katheter, z B :

Rp. 2179.

*Acid. tannic. 2·0—4·0,*

*Glycerin. 10 0,*

*Aqu. dest. 100·0.*

*S. Zur Einspritzung.*

Oder:

Rp. 2180.

*Natr. boracic.,*

*Alum. crud. ad 2 0,*

*Aqu. dest. 100·0.*

*S. Aeusserlich.*

(Die Einspritzungen werden nach Einführung des Katheters in die Tuba derart ausgeführt, dass man die Flüssigkeit aus einer Pravaz'schen Spritze mit langem Ansatzrohr in den mit der linken Hand fixirten Katheter spritzt und von da mittelst Ballons in die Paukenhöhle treibt.)

Bei scrophulösen oder syphilitischen Individuen Einreibungen von jod- oder quecksilberhaltigen Salben in die Gegend des Warzenfortsatzes.

Im Sommer Gebrauch von Bädern sehr empfehlenswerth, bei zarten, empfindlichen Individuen Soolbäder, oder, namentlich bei anämischen Personen Eisen, bei Scrophulose und Syphilis Jodbäder. Auch einfache Thermen, wie Wiesbaden, oft von sehr guter Wirkung.

Ueber die Behandlung der in Folge Mittelohrkatarrhs und Perforation vorkommenden Otorrhöe, s. unter „Otitis media suppurativa.“

**Otitis media suppurativa.** Die eitrige Entzündung des mittleren Ohrtheils. Bei Fieber Betruhe, strenge Diät. Im ersten Stadium und bei heftigen Schmerzen auch nach Eintritt der Eiterung locale Blutentziehung, bei robusten Leuten, wenn Symptome von Hirndruck eintreten, selbst Venäsection. Anwendung von Kälte (Eis-

umschläge, Leiter'scher Kühlapparat) in der Ohrgegend; in anderen Fällen besser warme Umschläge auf die Gegend des Ohres und Warzenfortsatzes, die Wirksamkeit derselben wird oft durch gleichzeitige Eisumschläge auf den Vorderkopf noch erhöht. Wo Blutentziehungen wegen des Allgemeinzustandes contraindicirt sind oder wenn sie die Schmerzen nicht hinreichend gelindert haben, Narcotica (s. „Otitis externa,“ S. 552 f.): auch Antipyrin (0.5 1.0 pro dos.) als schmerzstillend und fieberherabsetzend oft von guter Wirkung.

Ableitung auf den Darmcanal, namentlich bei ohnehin zu Obstipation geneigten Kranken.

Bei hochgradigen, durch die bisher erwähnten Mittel nicht zu lindernden Schmerzen Anwendung der Luftdouche unter geringem Druck; wenn auch diese erfolglos, Myringotomie.

Ist es bereits zur Eiterung gekommen und fließt das Exsudat durch die Tuba Eustachii nicht hinreichend ab, Myringotomie an der unteren Hälfte des Trommelfells mittelst des Myringotoms, das unter deutlicher Beleuchtung des Trommelfells durch einen an der Stirne befestigten Reflector an der untersten Stelle des Trommelfells eingestochen und derartig herausgezogen wird, dass es den Schnitt hierbei nach oben verlängert. Gleich nach der Operation Anwendung der Luftdouche. Wenn die Wunde sich rasch schliesst, was man meist durch wiederholte Luftdouche oder durch öfteres Auseinanderdrücken der Wundränder mittelst einer Sonde verhindern kann, ist oft Wiederholung der Operation angezeigt.

Bei gleichzeitiger Entzündung der Rachengebilde adstringirende oder resorptionsbefördernde Gurgelwasser, eventuell Touchirungen mit Lapis. Das Lumen des äusseren Gehörgangs immer möglichst weit zu erhalten.

Bei im Anschluss an Otitis media suppurativa (oder auch catarrhalis) nach Perforation des Trommelfells sich einstellender chronischer Otorrhoe zunächst das Gehörorgan rein zu erhalten durch Ausspritzungen

durch den äusseren Gehörgang; eventuell vor und nach denselben Anwendung der Luftdouche. Wenn dies nicht hinreicht, Einspritzungen durch die Tuba Eust. Dieselben werden entweder durch den Katheter ausgeführt (s. „Otitis media catarrhalis,“ S. 614) oder bei beiderseitiger Erkrankung und namentlich bei gleichzeitigen Affectionen des Nasenrachenraumes nach dem von Prof. Gruber angegebenen Verfahren direct durch die Nase. In seltenen Fällen, wenn durch diese beiden Methoden wegen Stenose der Tuba die Flüssigkeit nicht in das Mittelohr getrieben werden kann, Einspritzung durch den Weber-Liel'schen Paukenhöhlen-Katheter. Zur Herausbeförderung flüssigen Exsudates aus dem Mittelohr auch die von Prof. Gruber angegebene Saugspritze mit einem durch den äusseren Gehörgang in die Paukenhöhle einzuführenden Ansatzrohr.

Zu den Ausspritzungen des Mittelohrs am häufigsten verwendet:

Rp. 2181. *Acid. boric. 20·0,*  
*Alcohol. absol. 100·0.*  
*S. 1 Kaffeelöffel auf  $\frac{1}{4}$  Liter warmen Wassers.*

Bei übelriechendem Exsudat 2—4 $\frac{0}{10}$ ige Carbollösung oder eine schwach violette Lösung von Kal. hypermanganic.

Nach diesen Reinigungsverfahren als sehr gutes anti-otorrhoisches Mittel zu verwenden feinpulverisirte Borsäure, von der nach sorgfältiger Reinigung des Gehörgangs und Mittelohrs durch Ausspritzung und Luftdouche und genauer Austrocknung eine Messerspitze voll in den Gehörgang eingeblasen wird; danach etwas Borsäure nachzuschütten und der Gehörgang mit Watte zu verstopfen. Die Application zu wiederholen, sobald das Pulver durch das Exsudat entfärbt oder gelb gefärbt wurde.

Zweckmässig wird mit der Anwendung der pulverisirten Borsäure die Injection einer 4 $\frac{0}{10}$ igen Borsäure-Lösung per tubam combinirt.

Bei tuberculöser Grundlage statt der pulverisirten Borsäure Jodoform möglichst desodorsirt in gleicher Weise zu verwenden. Von flüssigen Mitteln bei einfach katarrhalischem Exsudate.

Rp 2182

*Zinc sulfuric* 0.1—0.5.

*Aqu. dest.*

*Glycerin* ad 20.0.

S. Täglich 10 Tropfen lauwarm einzutropfen und einige Minuten im Gehörgang zu belassen.

Auch Gelatine-Bougies mit adstringirenden Mitteln

(s. Rp. 2157) von guter Wirkung. Bei hartnäckiger Otorrhöe am häufigsten:

Rp 2183.

*Acid. boric. subtilissime pulverisat.* 1.0,

*Aqu. dest.* 30.0,

*Spir. vin. rectificat.*

5.0—30.0.

S. Aeusserlich.

Bei durch die Anwendung dieses Mittels auftretendem heftigen Schmerz Ausspritzung des Gehörgangs mit lauem Wasser.

In sehr hartnäckigen Fällen, namentlich bei hochgradiger Wulstung der Mittelohrschleimhaut, nach genauer Reinigung des Gehörorgans Eingiessung einer 10<sup>0</sup>igen Lapislösung, die durch Bewegung des Kopfes nach verschiedenen Richtungen herumgeschwenkt, dann durch entsprechende Kopfneigung wieder herausgelassen wird: hierauf der Gehörgang mit Kochsalzlösung einige Male anzuspritzen

Bei Syphilitischen Eingiessungen von:

Rp 2184

*Mercur. sublim. corrosiv.* 0.05—0.1,

*Aqu. dest.* 50.0

S. Zu Eingiessen

Otitis media hypertrophica  
Entzündung der Mittelohrschleimhaut  
etwaigen ursächlichen Agentien  
zeitigen chronischen Nasenkatarrh  
von Gange nach der

istis  
Zunahme  
nach der

Höhenklima. In stadio hyperaemiae bei vollblütigen Individuen Milderung heftigen Sausens durch locale Blutentziehung. Methodische Luftverdünnung im äusseren Gehörgang. Bei fettleibigen Leuten Trinkkuren in Marienbad, Karlsbad, Kissingen etc. Ist die Schleimhaut der Tuba vorwiegend ergriffen, Luftdouche, Einlegen von Laminaria- oder anderen Bougies in die Tuba. Ist der Process auch auf die Schleimhaut der Trommelhöhle verbreitet, Einspritzungen mittelst Katheters per tubam von:

Rp. 2185.

*Kal. caustic. 0·03—0·1,*

*Aqu. dest. 20·0.*

*S. Täglich oder jeden 2. bis 3. Tag einzuspritzen.*

(Die Technik der Einspritzung siehe unter „Otitis media catarrhalis,“ S. 615).

Ebenso auch Einspritzungen einer 2—5%igen Jodkalium- oder einer 1%igen Natr. carbonicum-Lösung.

Alternirend damit Luftdouche. Oft auch Einblasungen von Jodäther- oder Essigäther-Dämpfen wirksam. Bei Syphilitischen:

Rp. 2186.

*Mercur. sublim. corrosiv. 0·01—0·02,*

*Aqu. destillat. 20·0.*

*S. Zu Einspritzungen per tubam.*

**Subjective Ohrengeräusche und nervöse Schwerhörigkeit.** Bei Allgemeinleiden entsprechende Behandlung derselben; verschiedene Trink- und Badekuren, bei Syphilis und Scrophulose Jodwässer, bei Congestionen nach dem Kopf salinische Abführmittel. In vielen Fällen auch indifferente Thermen oder Kaltwasserkuren von Nutzen. Bei Chlorotischen oder Anämischen Eisen. Bei Scrophulösen oder Syphilitischen:

Rp. 2187.

*Syr. Ferr. iodat.,*

*Syr. cort. Aurant. aa 40·0.*

*S. 3mal täglich 1 Kaffeelöffel.*



Aeusserlich in diesen Fällen:

Rp. 2188.

*Kal. iodat. (Ammon. iodat.) 5·0,*

*Camphor. ras. 0·3,*

*Unguent. emollient. 20·0,*

*Ol. Caryophyllor. gtts. 3.*

*S. Morgens und Abends erbsengross hinter dem Ohre durch 5 Minuten einzureiben.*

In symptomatischer Beziehung Luftverdünnung im äusseren Gehörgang mittelst des Luftverdünnungsapparates nach Grubor oder auch einfach durch Aufziehen der Ohrenspritze, während der Ansatz derselben oder ein an diesen angestecktes Otoskop möglichst luftdicht im Gehörgang steckt, oft von grosser Wirkung. Innerlich oft wirksam:

Rp. 2189

*Tinct. Arnicae 15·0*

*S. 3mal tägl. 5—10 Tropf.  
auf Zucker.*

Local:

Rp. 2190.

*Aether. sulfuric. (oder  
Chloroform.) 2·0—4·0,  
Glycerin. 10·0.*

*S. Mehrmals täglich oder  
nur am Abend 5—10  
Tropfen auf Baum  
wolle geträufelt in den  
Gehörgang einzuführ.*

Ebenso:

Rp. 2191

*Aether. acetic 2·0—4·0,*

*Tinct. Valerian. 10·0.*

*S. Wie das Vorige.*

Rp. 2192.

*Ol. Hyoscyam. coct. 10·0,*

*Tinct. Opii simpl. 1·0.*

*S. Mehrere Male des  
Tages einige Tropfen  
in den Gehörgang zu  
träufeln.*

Ferner auch Einleitung der Dämpfe von Aether oder Chloroform per tubam, indem einige Tropfen davon in einen Ballon getropft, dieser an den eingeführten Katheter angesetzt und comprimirt wird.

Recht gut wirkt auch oft ein Stückchen reinen Kamphers in ein Baumwollkugelnchen gewickelt und in den Gehörgang eingeführt oder:



Rp. 2193.

*Ol. Amygdal. dulc. 20·0,*

*Camphor. ras. 0·2.*

*S. 5—10 Tropfen auf Baumwolle ins Ohr.*

Bei sehr lästigen Geräuschen *Narcotica* (Morphium, Opium, Chloralhydrat) innerlich, respective subcutan. Auch Cocaïn in subcutaner Injection oder:

Rp. 2194.

*Cocain. muriatic. 0·1—0·25,*

*Sacch. alb. 3·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 5.*

*D. S. Abends ein Pulver in Oblate.*

Bromkalium und Bromnatrium (1—3 Gr. pro dos.) leisten wohl am meisten gegen die nervösen Ohrengeräusche.

---



Aus  
**Prof. Dr. Adam Politzer's**  
Klinik und Ambulatorium für Krankheiten des  
Gehörorgans.

---

**Ceruminalanhäufung im äusseren Gehörgang.** Wenn der Pfropf fettglänzend und weich ist, kräftige Ausspritzung mit warmem Wasser, wozu eine 100—150 Gr. haltende Spritze mit einem bis an den Pfropf einzuschiebenden Gummiröhrchen als Ansatz zu verwenden. Nach der Ausspritzung das Ohr auszutrocknen und mit Baumwolle zu verstopfen. Ist der Pfropf trocken und hart, Erweichung desselben durch lauwarmes Wasser oder Oel, oder besser durch:

Rp. 2195.

*Natr. carbonic. 0·5,*

*Aqu. destillat.,*

*Glycerin. aa 5·0.*

*M. D. S. 3mal täglich 10 Tropfen warm einzuträufeln.*

Nach genügender Erweichung der Pfropf durch Ausspritzen zu entfernen.

**Eczema auriculæ. Ekzem des äusseren Ohres.**

Bei acutem Ekzem das Waschen der erkrankten Stellen mit Wasser, das Ausspritzen des Ohres zu meiden, die nässenden oder entzündeten Stellen mit Unguentum emolliens oder Vaseline zu bedecken. Gegen Eczema intertrigo hinter dem Ohr Amylum-Einstäubungen. Bei ausgebreiteter, schmerzhafter Entzündung Umschläge mit dem Wasser oder mit Aqua Goulardi.

Im Stadium der Borkenbildung Entfernung der Krusten durch Auftragen einer reichlichen Menge von Tafelöl oder von Balsam. peruvian. Hierauf genaue Bepinselung der Ohrmuschel mit:

Rp. 2196.

*Ungu Diachylon Hebra*  
30·0.

S. Salbe.

Oder:

Rp. 2197.

*Ungu. emollient.*,  
*Ungu. Cerussae* aa 15·0.  
S. Salbe.

Ebenso:

Rp. 2198.

*Empl. Diachylon simpl.*,  
*Vaselin. pur.* aa 15 0.  
S. Salbe.

Oder:

Rp. 2199.

*Acid. boric.* 1·0,  
*Vaselin.* 15·0.  
S. Borsalbe.

(Diese Salben sind auf Leinwandlappen aufzustreichen, welche auf die erkrankten Ohrmuscheln aufgelegt, in alle Vertiefungen derselben sorgfältig hineingedrückt und mittelst aufgelegter Watte durch ein um den Kopf gebundenes Tuch fixirt werden.) Bei gleichzeitiger Affection des äusseren Gehörgangs mit der Salbe imprägnirte Bourdonnets einzuführen. Alle 24 Stunden Wecheln der Salbe. Nach Abstossung der Krusten die Haut noch mehrere Wochen hindurch mit Vaseline oder Crème céleste zu bepinseln, oder mit:

Rp. 2200.

*Merc. praecip. alb.* 0·4,  
*Ungu simpl.* 30 0.  
S. Zum Einpinseln.

Bei schuppigem Ekzom Einpinselungen mit Tinctura Rusci oder:

Rp. 2201.

*Acid. carbolic.* 1·0,  
*Spir. vin. rectificat.* 30 0  
S. Aeusserlich.

Oder mit:

Rp. 2202.

*Acid. boric.* 1·5,  
*Spir. vin. Gallic.* 30·0.  
S. Einpinselung.

Verdickte und schwielige Epidermis durch öfteres Bestreichen mit Olivenöl, Ol. jecoris Aselli oder Balsam. peruvian. zu erweichen; in hartnäckigen Fällen Waschungen mit Spir. saponat. kalinus. Danach dünne Einpinselung von Ol. Rusci, erst nach Abstossung des Schorfs zu wiederholen. Ist die Haut dann glatter und blässer geworden:

Rp. 2203.

*Ol. Fagi 10·0,*  
*Glycerin. 5·0,*  
*Ungu. emollient. 40·0.*  
*S. Salbe.*

Oder:

Rp. 2204.

*Ol. cadin. 1·0,*  
*Glycerin. 25·0.*  
*S. Aeusserlich.*

Ebenso:

Rp. 2205.

*Acid. carbolic. 1·0,*  
*Ungu. simpl. 40·0.*  
*S. Salbe.*

Oder die Wilson'sche  
Salbe:

Rp. 2206.

*Resin. Benzoës pulv. 5·0,*  
*Ungu. simpl. 150·0.*  
*Colat. adde:*  
*Oxyd. Zinc. 25·0.*  
*M. f. ungu.*  
*D. S. Salbe.*

Gegen schuppiges Ekzem im äusseren Gehörgang Abstreifung der Schuppen mittelst trockener Baumwolle, hierauf Touchirung mit einer concentrirten Höllensteinlösung, nach Abfallen des Schorfes zu wiederholen. Später zur Verhinderung von Recidiven die Cutis des knorpeligen Gehörgangs noch zweimal wöchentlich zu bepinseln mit:

Rp. 2207.

*Merc. praecip. alb. 0·3,*  
*Ungu. emollient. 30·0.*  
*S. Dünn einzupinseln.*

Oder:

Rp. 2208.

*Ol. cadin. 1·0,*  
*Vaselin. 40·0.*  
*S. Salbe.*

Intern bei anämischen und scrophulösen Individuen Eisenpräparate oder Jod.

**Othmaematoma. Ohrblutgeschwulst.** Kleinere, nicht schmerzhaft Geschwülste sich selbst zu überlassen. Bei Entzündungserscheinungen kalte Umschläge oder Leiter-

scher Apparat, bei Nachlass der Schmerzen Aqua Goulardi. Nach 4—5 Tagen, wenn die Schmerzen nicht geringer, die Geschwulst nicht kleiner geworden, Punction, bei grösserem Umfange der Geschwulst Spaltung derselben; danach Tamponade der Wunde mit Jodoformgaze.

**Dermatitis auriculae. Entzündung der Ohrmuschel.**

Kalte Ueberschläge, in schweren Fällen Eisbeutel oder Leiter'scher Apparat, bei leichteren Graden:

Rp. 2209.

*Aqu. vegeto-miner. Goulardi 200·0,*

*Tinct. Opii simpl. 10·0.*

*S. Zu Ueberschlägen.*

Der Epidermis beraubte Hautstellen mit entsprechenden Salben zu bepinseln.

**Otitis externa circumscripta. Follicularentzündung des äusseren Gehörgangs.** Bei schmerzhafter, tiefsitzender Entzündung Incision der Geschwulst, wenn es auch noch nicht zur Eiterung gekommen. Bei Fortsetzung der Entzündung auf den Warzenfortsatz Leiter'scher Kühlapparat. Narkotische Einreibungen in der Umgegend des Ohres, z. B.:

Rp. 2210.

*Chloroform.,*

*Ol. Olivar. aa 15 0.*

*M. D. S. Auf Watte geträufelt in der Ohrgegend aufzulegen.*

Ferner, namentlich bei operationsscheuen Individuen:

Rp. 2211.

*Aqu. Opii 4 0.*

*Aqu. destillat. 12·0*

*M D S. Watte*

*keit getaucht, in*



Ebenso:

Rp. 2212.

*Cocain.muriatic.* 0·3—0·5,  
*Aqu. destillat.* 10·0.  
*S.* 5—10 Tropfen auf  
Watte in den Gehör-  
gang einzulegen.

Rp. 2213.

*Acid. boric.* 1·0,  
*Morph. acetic.* 0·2,  
*Vaselin.* 20·0.  
*M. f. ungu.*  
*D. S.* Ein damit bestriche-  
nes, längliches Speck-  
stückchen in den Ge-  
hörgang einzuführen.

Bei gleichzeitiger starker Anschwellung vor dem Tragus oder in der Regio mastoidea, wenn trotz Incision die Schmerzen nicht nachgelassen, Blutegel.

Nach gemachter Incision oder nach Durchbruch des Abscesses:

Rp. 2214.

*Acid. carbolic.* 0·5,  
*Glycerin.* 15·0.  
*D. S.* Einpinselung.

Oder:

Rp. 2215.

*Acid. boric.* 1·0,  
*Spir. vin. rectificat.* 20·0.  
*M. D. S.* Zum Einträufeln.

Nach abgelaufener Entzündung, wenn Jucken im Gehörgang besteht, das Kratzen daselbst strengstens zu untersagen; zur Verhütung des Juckens:

Rp. 2216.

*Mercur. praecip. alb.* 0·3,  
*Ungu. emollient.* 12·0.  
*S.* Jeden 2. Tag einzu-  
pinseln.

Oder:

Rp. 2217.

*Acid. boric.* 1·0,  
*Vaselin.* 20·0.  
*S.* Wie das vorige Recept.

Auch bloße Alkoholeinpinselung oft wirksam.

**Otitis externa diffusa.** Diffuse Entzündung des äusseren Gehörgangs. Kalte Umschläge, bei grosser Schmerzhaftigkeit locale Blutentziehungen, narkotische Einträufelungen (s. „Otitis media acuta,“ S. 633); nach dem Eintritt der Secretion Einblasen von Borsäure oder Einträufelungen von 5%iger alkoholischer Borsäure-Lösung. hartnäckigen Fällen Aetzungen mit:

Rp. 2218.

*Argent. nitric. 0·8,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*S. Aetzmittel.*

Bei parasitärer Entzündung die Pilzmembranen durch Ausspritzen zu entfernen, dann mittelst eines gewärmten Löffels rectificirter Alkohol, eventuell wenn derselbe heftiges Brennen hervorruft, mit destillirtem Wasser verdünnt, einzugrassen und eine Viertelstunde darin zu belassen. Anfangs 2mal täglich anzuwenden, allmählich seltener.

**Otitis externa diphtheritica. Diphtheritische Entzündung des äusseren Gehörgangs.**

Rp. 2219.

*Aqu. Calcis 50·0.*

*S. Der Gehörgang damit zu füllen.*

Die Flüssigkeit wird 15—20 Minuten im Ohre gelassen, dann der Gehörgang ausgespült mit:

Rp. 2220.

*Acid. boric. 1·0,*

*Aqu. destillat. 50·0.*

*S. Ausserlich.*

Hierauf der Gehörgang mit fein pulverisirter Borsäure zu füllen. Bei trotzdem eintretenden wiederholten Nachschüben Betupfen der afficirten Stellen mit:

Rp. 2221.

*Acid. carbolic. 1·0,*

*Glycerin. 15·0.*

*S. Zum Betupfen.*

Ebenso auch 5<sup>o</sup>iger Carbol-Alkohol; ausserdem mehrere Male täglich der Gehörgang mit 5<sup>o</sup>iger alkoholischer Borsäure-Lösung zu

**Corpora aliena**  
im Ohre    Zu  
ein Fremdkörper

**Fremdkörper**  
wirklich  
Anwesenheit

er zeigt und wo er gelagert ist. Zuerst kräftige, lau-warme Einspritzungen mittelst einer grossen englischen Spritze, mit einem Gummiröhrchen als Ansatz. Besteht der Fremdkörper in dem Kopfe eines Notizbleistiftes, keine Einspritzungen; ebenso wenn Perforation des Trommelfelles besteht. Bei Glas- oder Stahlperlen ein befeuchtetes, feines Laminariastäbchen, in den Pericanal einzuführen und nach einer halben Stunde zu entfernen. Kommt man mit diesen Methoden nicht zum Ziele, so ist der Fremdkörper durch ein geeignetes Instrument zu entfernen, doch ist es oft nötig, diesen Eingriff zu verschieben, wenn der Körper tief sitzt und durch entzündliche Verengung des äusseren Gehörgangs unsichtbar geworden ist; in diesem Falle Kälte, Einblasung von Borspulver oder Einträufelung von Borspintus, bis die Schwellung zurückgegangen ist. Weichere Körper, wie Bohnen, Erbsen, Holzkügelchen, entfernt man mit einem gekrümmten starken Haken oder mittelst einer Nadel mit rechtwinkelig abgebogener Spitze, harte Fremdkörper, Kieselsteinchen, Glasperlen, Griffelstückchen, Kirschkerne mittelst einer gekrümmten Sonde oder besser mit einer gefensterten Curette. Gewöhnliche Pincetten stets zu meiden. Im äussersten Fall, wenn gefährdrohende Symptome bestehen, Ablösung der Ohrmuschel und der hinteren Wand des knorpeligen Gehörgangs. Lebende Insecten sind zunächst durch Eingiessen von Oel, dem man zweckmassig einige Tropfen Terpentin oder Petroleum zusetzt, zu tödten, dann durch Ausspritzen zu entfernen.

**Polypen des Ohres.** Operative Entfernung mittelst der Wilde'schen Drahtschlinge, des Blake'schen Polypenschnürers oder des Ringmessers von Politzer. Zur Nachbehandlung oder bei messerscheuen Individuen von vorneherein 2—3mal täglich vorzunehmende Einträufelungen von Spir. vin. rectificat. nach sorgfältiger Reinigung des Gehörgangs und Austrocknung durch

Watte, die Flüssigkeit  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  Stunde im Ol.re zu belassen. Wenn nach 4wöchentlicher Behandlung kein Erfolg, Aetzung des Polypen mit Argentum nitricum oder mit Eisenchlorid in Substanz oder in der officinellen Lösung, zu wiederholen, wenn sich der Schorf beim Ausspritzen ablöst. Namentlich angezeigt ist die Aetzung bei derben und ausgebreiteten, den Gehörgang ausfüllenden Wucherungen.

**Myringitis acuta. Acute Entzündung des Trommelfells.** Während des Stadiums der Reaction palliative, schmerzstillende Behandlung (s. „Otitis media acuta,“ S. 632 ff.) Bei Abscessbildung im Trommelfelle Eröffnung des Eiterherdes mittelst der Lanzennadel, eines 6 Cm. langen, knieförmig gebogenen, zweischneidigen Instruments. Die Technik der Operation ist dieselbe, wie bei der Paracentese der Trommelhöhle, nur dass nicht alle Schichten des Trommelfells durchtrennt werden. Der Kopf des Kranken zu fixiren, das Trommelfell mittelst Stirnbinden-Reflectors und kurzen, weiten Trichters in gute Beleuchtung zu bringen, die Spitze der Nadel durch die Schichten des Trommelfells einzusenken und beim Herausziehen die Stichöffnung zu erweitern. Bei Entzündung der tieferen Trommelfellschichten, wenn heftige Schmerzen bestehen, ebenfalls Einschnitte in die Geschwulst mit der Lanzennadel auszuführen. In beiden Fällen nicht mehr als die Hälfte der Lanze einzusenken, da nicht sämtliche Schichten des Trommelfells durchtrennt werden dürfen. Wenn nach dem Aufhören der Schmerzen rasche Hörverminderung eintritt, Lufteintreibungen in die Paukenhöhle nach dem Politzer'schen Verfahren: Der Kranke nimmt etwas Wasser in den Mund, von einem doppeltfaustgrossen Kautschukballon wird der leicht gekrümmte röhrenförmige, mit dem Ballon durch eine kurze elastische Gummiröhre verbundene Ansatz in ein Nasenloch eingeführt, dieses über dem Ansatzstück mit der Hand

luftdicht comprimirt, und während der Patient auf ein vorher verabredetes Zeichen das Wasser schluckt, mit der anderen Hand rasch der Kautschukballon zusammengedrückt.

**Myringitis chronica.** Das Secret durch Ausspritzen mit lauem Wasser zu entfernen, dann Einträufeln von:

Rp. 2222.

*Zinc. sulfuric. 0·2,*

*Aqu. destill. 20·0.*

*M. D. S. 10 Tropfen  
lauwarm ins Ohr zu  
giessen*

Wenn nach 8 — 10 Tagen  
die Secretion nicht aufhört:

Rp. 2223.

*Plumb. acetic. 0·2,*

*Aqu. destillat. 20·0.*

*S. Erwärmt 1- bis 2mal  
täglich einzuträufeln  
und 10 Minuten im  
Ohre zu belassen.*

Nach mehreren Wochen,  
wenn die Secretion nicht  
sistirt:

Rp. 2224.

*Argent. nitric. 0·8,*

*Aqu. destillat. 10·0.*

*M. D. S. Nach Entfer-  
nung des Secrets durch  
Ausspritzen das Trom-  
melfell damit zu be-  
pinseln oder 10—15  
Tropfen in das Ohr  
zu giessen und 10 Mi-  
nuten darin zu lassen,  
hierauf Ausspritzen  
des Ohrs mit Wasser.*

Nach Anwendung dieses Mittels:

Rp. 2225.

*Kal iodat. 1·0,*

*Aqu. font 50·0.*

*S. Zum Waschen der Umgebung der Ohr-  
öffnung.*

Die Touchirung erst nach Abstossung des Schorfs zu wiederholen.

Gegen Granulationsbildung an der Cutisschichte des Trommelfells jeden dritten Tag Betupfen mit Liquor Ferri sesquichlorati mittelst einer in die Flüssigkeit getauchten Sonde oder eines kleinen Pinsels; danach Einträufeln von Borspiritus (Rp. 2215.) Besser noch ist galvanokaustische Zerstörung der Wucherungen.



**Otitis media acuta. Acute Mittelohrentzündung.**

Im Beginne, während der Reizerscheinungen palliative Behandlung. Bei starker Hyperämie am Trommelfelle locale Blutentziehung durch unmittelbar vor dem Tragus, nur bei lebhaften Schmerzen hinter dem Ohre besser am Warzenfortsatz anzusetzende Blutegel (bei kräftigen Erwachsenen 3 - 5, bei schwächlichen, herabgekommenen Individuen 1 - 2, bei Kindern meist nur einer zu appliciren). Vor dem Ansetzen der Blutegel stets der Gehörgang mit Watte zu verstopfen. Wenn rasche Depletion erwünscht ist, statt der Blutegel besser die Heurteloup'sche Saugspritze. Bei andauernden, den Schlaf störenden Schmerzen innerlich:

Rp. 2226.

*Morph. acetic.* 0·03,

*Sacch. alb.* 3·0.

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. No. 6.*

*D. S. 2 - 3 Pulver am Abend in 1stündigen Pausen.*

Oder:

Rp. 2227.

*Chloral. hydrat.* 2·5,

*Aqu. font.,*

*Syr. rub. Idaei aa* 15·0.

*M. D. S. Die Hälfte am Abend zu nehmen, wenn nach 2 Stunden kein Schlaf erfolgt, die zweite Hälfte.*

Kalte Ueberschläge nur mit Vorsicht anzuwenden, bei Steigerung der Schmerzen sofort auszusetzen. Sehr wirksam dagegen feuchtwarme Ueberschläge mit:

Rp. 2228

*Tinct. Opii simpl.* 2·0,

*Aqu. destillat.* 200·0.

*S. Zu Umschlägen.*

(Ein Stück Leinwand in diese Flüssigkeit getaucht, mehrfach zusammengelegt auf die Ohrgegend zu appliciren, mit Wachstaffet und einem trockenen Tuche zu bedecken und 3 - 4mal im Tage zu wechseln.)

Oft auch das Einlegen eines in warmes Wasser getauchten Wattebüschels in den Gehörgang, stündlich gewechselt, von gute



Bei mässigeren Graden der Entzündung narkotische Einreibungen in der Umgebung des Ohres 2—3stündlich (s. „Otitis externa circumscripta“, S. 626 f.). Bei anfallsweise auftretenden Schmerzen:

Rp. 2229.

*Ol. Olivar. 10·0,*

*Morph. phtalic. 0·2.*

*M. D. S. Beim Anfall eine Wattekugel, mit 5—6 Tropfen der gewärmten Flüssigkeit beträufelt, ins Ohr einzuführen.*

Ganz ebenso zu verwenden:

Rp. 2230.

*Ol. Hyoscyam. press. 10·0,*

*Extr. Opii aquos. 0·8.*

*S. Wie das Vorige.*

Rp. 2231.

*Cocain. muriatic. 0·5,*

*Aqu. destillat. 10·0.*

*S. Wie das Vorige.*

Nebstdem zweckmässiges diätetisches Verhalten.

Bei schlechtem Wetter und in der kalten Jahreszeit das Zimmer zu hüten, bei Fieber Bettruhe; zur Beförderung der Transpiration:

Rp. 2232.

*Infus. flor. Tiliae*

*e 10·0 ad colat. 150·0,*

*Spir. Mindereri 5·0,*

*Syr. cort. Aurant. 40·0.*

*M. D. S. Stündl. 2 Esslöffel.*

Strenge Diät, Meidung der Alcoholica. Bei gleichzeitigem Rachenkatarrh:

Rp. 2233.

*Decoct. Althaeae 200·0,*

*Alum. crud. 5·0,*

*Tinct. Opii simpl. 1·0.*

*M. D. S. Gurgelwasser.*

Nach dem Aufhören der Schmerzen, bei rasch sich steigender Schwerhörigkeit Lufteintreibungen nach dem von Prof. Politzer angegebenen Verfahren (s. „Myringitis acuta“, S. 630 f.), Anfangs, besonders bei Kindern, nur mit dem Munde die Luft einzublasen oder der Kautschukballon nur mit geringer Kraft zu comprimiren; Anfangs jeden Tag, dann allmählich seltener bis zu einem Mal in der Woche zu wiederholen.

Bei starker Vorwölbung des Trommelfells und gelbgrüner Verfärbung der vorgewölbten Partie, insbesondere aber bei der eitrigen Form der Otitis media acuta mit

gefährdenden Symptomen der Eiteransammlung im Mittelohr Paracentese des Trommelfells. (Technick derselben siehe unter „Myringitis acuta“, S. 630. Alle Schichten des Trommelfells vollständig zu durchtrennen. Danach zur Verflüssigung des Secrets täglich mehrere Male Füllung des Gehörgangs mit warmem Wasser oder mit:

Rp. 2234.

*Aqu. Opii 5·0,*

*Aqu. destillat. 15·0.*

*M. D. S. Ins Ohr zu träufeln.*

In den ersten Tagen nach der Operation Ausspülung des Gehörgangs mit warmem Wasser (26—28°), in welchem ein wenig Borsäure gelöst wurde, mittelst einer kleinen, etwa 40 Grammes Flüssigkeit fassenden Hartkautschukspritze mit kurzem, abgerundetem Ansatz; je nach der Quantität des Secrets diese Einspritzungen stündlich bis 6stündlich zu wiederholen. Ferner Entfernung des Secrets aus der Paukenhöhle durch Politzer'sche Lufteintreibung, nur bei sehr starkem Widerstande in der Tuba Lufteintreibung durch den Tubenkatheter. Auch hier mit sehr schwachem Druck zu beginnen. Nach mehreren Tagen, wenn die Luft-eintreibungen erfolglos waren, Beginn medicamentöser Behandlung. Eine Messerspitze voll feinpulverisirter Borsäure wird mittelst einer Federspule oder eines Pulverbläfers in den Gehörgang bis an das Trommelfell geblasen, dann der Gehörgang mit Bruns'scher Watte verstopft und bis zum folgenden Tage die Borsäure darin gelassen. Dieses Verfahren so lange fortzusetzen, bis das Pulver selbst bei 2—3tägigem Verweilen im Ohre trocken bleibt. Wird durch dieses Verfahren die Secretion nicht herabgesetzt, zu adstringirenden Einträufelungen überzugehen, jede vollständigem Aufhören der Schmerzen stets Politzer'sche Lufteintreibung des Gehörgangs,

sorgfältige Abtrocknung mittelst Baumwolle oder Leinwand, hierauf Einträufelung von:

Rp. 2235.

*Zinc. sulfuric. 0·3,*

*Aqu. dest. 30·0.*

*M. D. S. Morgens und  
Abends 10—15 Tropf.  
lauwarm einzuträufeln  
und 10—15 Minuten  
im Ohre zu belassen.*

Nach einigen Tagen,  
wenn keine rasche Abnahme  
der Secretion eingetreten:

Rp. 2236.

*Plumb. acetic. 0·3,*

*Aqu. destillat. 30·0.*

*S. Wie das Vorige.*

Bei hartnäckigen acuten Mittelohreiterungen Injectionen von warmem Wasser durch den Katheter in das Mittelohr, namentlich bei lange andauernder Schmerzhaftigkeit.

Granulationen an den Perforationsrändern mit Liquor Ferri sesquichlorati zu touchiren.

Bei ihm Verlaufe der Krankheit auftretender Entzündung des Warzenfortsatzes im Beginn Blutegel oder Heurteloup'sche Saugspritze, kalte Umschläge auf die Gegend des Warzenfortsatzes, bei Beginn der Geschwulstbildung Einpinselung mit Jodtinctur oder Einreibung mit Ungu. einer. Wenn die Symptome nicht nachlassen, durch mehrere Tage Injectionen von warmem Wasser durch den Katheter in das Mittelohr; endlich, wenn auch dies resultatlos ist, der Wilde'sche Schnitt auszuführen: etwa  $1\frac{1}{2}$  Cm. hinter der Anheftungsstelle der Ohrmuschel wird die Bedeckung des Warzenfortsatzes bis auf den Knochen durchschnitten.

Im weiteren Verlauf, nach dem Aufhören der Secretion und Verschluss der Perforationsöffnung Politzer'sche Lufteintreibungen zur Verbesserung des Hörvermögens, Anfangs täglich, dann allmählich seltener. Bei reichlicher Epidermisbildung im Gehörgange nach Ablauf der Mittelohrerkrankung die Krusten von Zeit zu Zeit aufzuweichen durch:

Rp. 2237. *Natr. carbonic. 0·5,*

*Aqu. destillat. 8·0,*

*Glycerin. 4·0.*

*M. D. S. Einzuträufeln.*

Hierauf Entfernung der Krusten durch Ausspritzen.

Zur Vermeidung von Recidiven bei schlechtem oder kaltem Wetter der äussere Gehörgang stets mit Baumwolle zu verstopfen. Dampfbäder, Douchen des Kopfes, sowie Untertauchen im Bado zu vermeiden.

**Otitis media catarrhalis Mittelohrkatarrh.** Metho-

disch fortgesetzte Lufterreibungen nach dem von Prof. Politzer angegebenen Verfahren (s. „Myringitis acuta“, S. 630 f.), unter allmählich steigendem Druck. Bei zu grossem Widerstand in der Tuba oder im Mittelohr Lufterreibung durch den in die Tuba eingeführten Katheter; die Lufterreibungen Anfangs täglich, dann bei andauernderer Verbesserung des Hörvermögens allmählich seltener auszuführen. Wenn trotz längerer Behandlung durch Lufterreibung das Exsudat nicht zur Resorption gelangt, oder wenn die durch die Lufterreibung erzielte Hörverbesserung immer nach kurzer Zeit wieder schwindet, mechanische Entfernung des Exsudats. Bei vorwiegend serösem Exsudat folgendes, von Prof. Politzer angegebenes Verfahren: Der Kranke nimmt etwas Wasser in den Mund, neigt den Kopf nach vorne und etwas nach der entgegengesetzten Seite, so dass die Rachenmündung der Tuba vertical unter der Paukenhöhlenmündung steht; bleibt in dieser Stellung 1—2 Minuten, hierauf während des Schlingacts eine Lufterreibung. Führt dieses Verfahren nicht zum Ziele, besonders bei mehr zähem, gallertartigem, schleimigem Exsudat, behufs Abkürzung der Behandlungsdauer Paracentese (siehe „Myringitis acuta“, S. 630) Nach Ausführung derselben 3—4 kräftige Lufterreibungen nach Politzer, bei sehr grossen Widerständen im Mittelohr oder bei Parese der Gaumenmusculation Lufterreibungen durch den Katheter. In seltenen Fällen gelingt die Herausbeförderung des Secrets besser durch kräftiges Schnutzen oder durch den Valsalva'schen Versuch: Der Kranke macht bei geschlossenem Mund und während er sich mit der Hand

die Nase zuhält, eine kräftige Expirationsbewegung. Wird durch diese Methoden das Secret nicht in den äusseren Gehörgang getrieben, so ist Luftverdünnung im äusseren Gehörgang angezeigt: Der olivenförmige Ansatz des Auscultationsrohrs wird vom Kranken luftdicht in den äusseren Gehörgang eingeführt, an das andere Ende des Schlauchs eine kleine Ohrenspritze angesetzt und der Stempel derselben langsam zurückgezogen. Aus dem Gehörgang das Secret mittelst kleiner, in der Kniepincette gehaltener Wattekügelchen zu entfernen; zäher Schleim direct mit der Kniepincette zu fassen; Ausspritzung mit lauem Wasser nur, wenn das Secret auf andere Weise nicht herauszubefördern ist. Nach der Operation der Gehörgang mit Baumwolle zu verstopfen; schwere Arbeit, geistige Getränke, rascher Temperaturwechsel, Aufenthalt in rauchigen oder dunstigen Localen zu meiden. Zur Hintanhaltung von Recidiven noch durch mehrere Monate die Lufteintreibungen Anfangs 2—3mal wöchentlich, später alle 8—14 Tage fortzusetzen.

Wenn nach Beseitigung des Exsudates durch Paracentese die Schwellung im Tubencanale trotz der Lufteintreibungen nicht abnimmt, ist Einleitung von Salmiakdämpfen mittelst des Apparates von v. Tröltsch oder von G om p e r z, abwechselnd mit Lufteintreibungen, manchmal von guter Wirkung. Noch wirksamer ist oft Injection von entsprechenden Salzlösungen per tubam, z. B.:

Rp. 2238.

*Ammonii chlorat.* 1·0,

*Aqu. dest.* 10·0.

*S.* 3—6 Tropfen per tubam zu injiciren.

Oder:

Rp. 2239.

*Natr. bicarbon.* 3·0,

*Aqu. dest.* 10·0.

*S.* Wie das Vorige.

Häufiger wendet Prof Politzer zum gleichen Zweck Terpentindämpfe an oder die Dämpfe von:

Ref. 2240.

*Ol Pini æther 100.*

S. Arnsperlich.

(Die Dämpfe dieser Flüssigkeiten werden einfach mittelst des zu den Luftpumpen in Verwendung stehenden Ballons aspirirt, indem man die Spitze des zusammengedrückten Ballons in die Mündung des Fläschchens steckt und mit der Compression allmählich nachlässt.)

Bei excessiver Schwellung der Tubenschleimhaut, wo Lufteintreibung nicht oder schwer möglich, mit einer concentrirten Lapislösung imprägnirte und dann getrocknete Darmsaiten durch den Katheter bis in die Tuba einzuführen und 5—10 Minuten darin zu lassen.

Die Behandlung des Mittelohrkatarrhs ist nicht über 3—5 Wochen auszudehnen, danach eine 3—6wöchentliche Ruhepause. Zur Nachbehandlung 2—3mal wöchentlich Politzer'sche Luftentreibung durch 3—4 Wochen, dann Pause von 1—3 Monaten.

In diätetischer Beziehung gute Luft, möglichst häufige Bewegung im Freien, guter Witterung. Heißes Lüften der Wohnräume. Wein, Spirituosen, Geistige Getränke nur in äusserst geringen Gaben gestatten. Lauwarme Bäder, im Sommer. Aufenthalt in der Gegend, bei Scrophulösen, in der Gegend der Alpen. Bei anämischen Individuen Aufenthalt in der Gegend von Hall, bei Pyrenäen, in der Gegend von Spa, Pyrmont, in der Gegend von Syphacien, in der Gegend von Wien. Aufenthalt in der Gegend von Pustyn.



Gleichzeitig mit dem Mittelohrkatarrh bestehende Affectionen des Nasenrachenraums stets zu berücksichtigen. Bei acuter Schwellung der Nasenrachenschleimhaut genügt zweckmässiges diätetisches Verhalten, Vermeiden raschen Temperaturwechsels, rauchiger oder dumpfer Locale, alkoholischer Getränke. Bei chronischen Nasenkatarrhen Eingiessung medicamentöser Flüssigkeiten in die Nase aus einem kahnförmigen Gefässchen bei nach rückwärts gebeugtem Kopf des Patienten; sobald derselbe die Flüssigkeit im Rachen verspürt, soll er den Kopf vorbeugen, so dass dieselbe bei den Nasenlöchern herausrinnt; eine Viertelstunde lang nach der Eingiessung nicht schnenzen! Zu diesen Eingiessungen verwendet man concentrirte Kochsalzlösungen oder verdünnte Ischler oder Kreuznacher Soole, besonders bei scrophulösen Individuen. Bei vorwaltend eitrigem Secret:

Rp. 2242.

*Acid. tannic. 3·0,*  
*Chinin. sulfuric. 0 1,*  
*Aqu. dest. 30·0.*  
*M. D. S. Erwärmt ein-*  
*zugiessen.*

Oder:

Rp. 2243.

*Acid. tannic. 3·0,*  
*Acid. salicylic. 0·3,*  
*Aqu. dest. 30·0.*  
*S. Erwärmt einzugiessen.*

Wenn diese Mittel ohne Erfolg, bei Erwachsenen auch zu versuchen:

Rp. 2244.

*Zinc. sulfuric. 0·05,*  
*Aqu. dest. 30·0.*  
*S. Zur Eingiessung.*

In manchen Fällen auch wirksam:

Rp. 2245.

*Alum. crud, 1·0,*  
*Aqu. dest. 30·0.*  
*S. Zur Eingiessung in die Nase.*

Bei chronischer, schleimig-eitriger, mit Ozaena verbundener Absonderung Carbolsäure-Lösungen oder das von Störk empfohlene Mittel:

Rp. 2246.

*Natr. salicylic.,*  
*Natr. bicarbon.,*  
*Natr. chlorat. aa 5·0,*  
*Aqu. dest 100·0.*  
*S. Aeusserlich.*

Bei Ansammlung von Schleimmassen oder Krusten lauwarme Einspritzungen in die Nase, wobei das Ausatzstück der Spritze nicht luftdicht in die Nase eingefügt werden darf und bei normaler Kopfhaltung gerade nach hinten gerichtet sein muss.

Wenn nach mehrwöchentlicher Behandlung mit Eingiessungen und Einspritzungen keine wesentliche Besserung erreicht ist, Touchirungen der Nasenrachenschleimhaut mit 10<sup>0</sup>iger Lapislösung, entweder mittelst Pinsels oder Schwämmchens, oder indem 2 haselnussgrosse, mit der Lösung durchtränkte Baumwollkugeln bis gegen die Mitte der Nasenhöhle vorgeschoben und nach Verstopfung der Nasenöffnungen mit trockener Watte durch Comprimiren der Nase ausgedrückt werden; nach der Aetzung zur Linderung des Schmerzes Einspritzung lauer Kochsalzlösungen. Die Aetzungen 2—3mal wöchentlich zu wiederholen.

Bei gleichzeitigem Rachenkatarrh adstringierende Gargarismen, bei starken Auflockerungen Bestreichen mit Lapislösung, Jodtinctur oder Tinct. Opii crocata, Granulationen mit Lapis in Substanz oder mit Liquor Ferri sesquichlorat. oder mit Chromsäure zu touchiren.

**Otitis media sclerotica.** *Chronicus* -klero-  
**sirender Mittelohrkatarrh** *st.*  
 eintreibungen nach dem I  
 oder wo dieses durch Schwe

Tubencanals erschwert ist, Lufteintreibungen durch den Katheter. Beide Verfahren nur jeden 2. oder 3. Tag anzuwenden. Zur Lockerung und Erzielung grösserer Dehnbarkeit der Mittelohrauskleidung empfiehlt es sich, gelinde reizende Flüssigkeit zu injiciren, z. B.:

Rp. 2247.

*Natr. bicarbonic.* 0·5,

*Aqu. dest.* 10·0,

*Glycerin.* 2·0.

*M. D. S.* 6—8 Tropfen  
erwärmt zu injiciren.

(Ueber die Technik dieser Injection siehe die Bemerkungen zu Rp. 2241.)

Bei syphilitischen Ohr-  
affectionen ebenso zu ver-  
wenden.

Rp. 2248.

*Kal. iodat.* 0·5,

*Aqu. destillat.* 15·0.

*S. Zur Injection in die  
Paukenhöhle*

Die Injectionen immer abwechselnd mit Lufteintreibungen, und zwar nach je eintägiger, ohne Localbehandlung bleibender Zwischenpause auszuführen. Häufig wird durch direct nach dem Katheterismus oder der Politzer'schen Lufteintreibung angewendete Luftverdünnung im äusseren Gehörgang die Behandlung wesentlich unterstützt. Die Methode besteht darin, dass man das Ansatzrohr eines kleinen, runden Ballons, den man mit der Hand comprimirt hält, luftdicht in den äusseren Gehörgang einfügt und dann mit der Compression des Ballons allmählich nachlässt. Die Behandlung der Mittelohrsklerose nur so lange fortzusetzen, als die Hörweite stetig zunimmt; weiterhin zeitweilige Nachbehandlung durch Lufteintreibungen allein oder durch mit denselben abwechselnde Injectionen.

Lauwarme Vollbäder während der localen Behandlung oft von günstiger Wirkung, Untertauchen und Douchen hierbei zu vermeiden.

Gegen die subjectiven Geräusche: Lufteintreibungen nach Politzer oder durch den Katheter abwechselnd mit Luftverdünnungen; manchmal, wenn diese Behandlung erfolglos, Einleitung reizender Dämpfe wirksam, wie die Dämpfe von Aether, Chloroform, oder von:

Rp. 2249.

*Aether. sulfuric. 6·0,  
Liqu. anaesthetic. Hollan-  
dic. 4·0.*

*D. S. Die Dämpfe der  
Flüssigkeit in d. Mittel-  
ohr einzutreiben.*

Bei recent entstandenen  
Geräuschen, wenn dieselben  
sehr hochgradig und störend  
sind, Vesicantien am Warzen-  
fortsatz; bei langsamerer Zu-  
nahme der Geräusche:

Rp. 2250.

*Spir. aromat.,  
Spir. Sinapis aa 30·0.  
D. S. 20 Tropfen hinter  
dem Ohre einzureiben.*

Oder:

Rp. 2251.

*Spir. Formicar.,  
Balsam. vitae Hoffmanni  
aa 30·0.*

*D. S. Wie das Vorige*

Bei anfallsweiser, hefti-  
ger Steigerung des Sausens  
Application eines fliegenden  
Vesicans am Warzenfortsatz  
und Bestreichen des bloss-  
liegenden Coriums mit Ungu.  
Mezerei oder Ungu. Anten-  
riethii.

Oder: Rp. 2256.

*Tinct Valerian  
Aether. sulfur  
Glycerin. pur.  
D. S. Einpinseln*

Versuchsweise, wo die  
vorher erwähnten Mittel er-  
folglos waren, äusserliche  
Anwendung von Narcoticis:  
Rp. 2252.

*Glycerin. pur. 10·0.  
Extr. Opii aquos 0·4  
(od. Morph. acetic. 0·2).  
M. tere exactissime.*

*D. S. 8 10 Tropfen hinter  
dem Ohre einzureiben.*

Oder:

Rp. 2253.

*Ol. Olivar.,  
Chloroform. aa 8·0.  
D. S. Wie das Vorige.*

Rp. 2254.

*Glycerin. pur. 10·0,  
Tinct. Belladonnae 5·0.  
S. 8—10 Tropfen ein-  
zureiben.*

Bei sehr lästigen, an-  
fallsweise sich steigernden  
Geräuschen subcutane Mor-  
phium-Injectionen. Ferner  
Bepinselungen des äusseren  
Gehörgangs mit:

Rp. 2255.

*Tinct. Ambrae 2·0,  
Aether. sulfuric. 1·0,  
Glycerin. pur. 12·0.  
D. S. Einpinselung.*

Innerlich am ehesten Erfolg zu erwarten von:

Rp. 2257.

*Kal. bromat. 10 0.*

*Div. in dos. aequ. No. 10.*

*D. S. Früh und Abends je 1—2 Pulver in Wasser.*

Bei durch Syphilis bedingten Ohraffectionen gegen die subjectiven Geräusche innerlicher Gebrauch von Jodkalium,  $\frac{1}{2}$ —1 Gr pro die.

Die Wirkung desselben wird unterstützt durch Einreibungen jodhaltiger Salben am Warzenfortsatz, wie:

Rp. 2258.

*Kal. iodat. 2·0,*

*Jodi pur. 0·1,*

*Ungu. emoll. 20·0.*

*S. Täglich am Warzenfortsatz einzureiben*

Oder:

Rp. 2259.

*Jodoform. pur. (od. Jodol.) 0·8,*

*Ungu. emoll. 20·0,*

*Ol. Menth. pip. gtts. 10.*

*D S Salbe.*

Bei Verengerung der Tuba wiederholte Luftentreibungen; wo man damit nicht zum Ziele kommt, Einführung von Bougies, und zwar entweder der französischen Bougies oder bei stärkeren Stricturen der Fischbein- oder Celloidinbougies (von Leiter in Wien), bei mässigen Stricturen, die man rasch erweitern will, Anwendung von Darmsaiten. Diese Bougies werden durch den Tubenkatheter, welcher kurz und mit einem längeren, stark gekrümmten Schnabel versehen sein soll, eingeschoben und 5—10 Minuten liegen gelassen.

Bei der Mittelohrsklerose ebenso wie bei der secretorischen Form des Mittelohrkatarrhs Allgemeinleiden sowie etwaige Affectionen der Nasenrachenschleimhaut gleichzeitig zu behandeln. Bei rapider Verschlimmerung des Gehörs oder plotzlicher Taubheit Enthaltung von körperlicher und geistiger Arbeit, von Alcoholicis, sowie vom Tabakrauchen; innerlich grössere Gaben von Jodi, bis zu 1 Gr. pro die, bei Congestionen nach dem



Kopfe Abführmittel. Fliegendes Vesicans am Warzenfortsatze und Bestreichung des blossgelegten Coriums mit:

Rp. 2260.

*Veratrin.* 0·5,

*Ungu. simpl.* 30·0.

*S. Salbe.*

Ferner:

Rp. 2261.

*Aether. sulfuric.* 10,

*Glycerin.* 10·0.

*S. Der äussere Gehörgang damit einzupinseln  
oder ein damit durchtränkter Wattepfropf  
ins Ohr.*

Wenn nach 8 Tagen die frühere Hörweite nicht erreicht ist, Anwendung des galvanischen Stroms.

**Otitis media suppurativa sive perforativa chronica.** Chronische eitrige Mittelohrentzündung. In Bezug auf Allgemeinbehandlung, diätetisches Verhalten, Anwendung von Bädern etc., gilt auch hier das bei Besprechung der Otitis media catarrhalis Gesagte.

Behufs Entfernung der Secrete aus dem Mittelohr Lufteintreibungen nach Politzer, bei grossem Widerstand im Mittelohr Lufteintreibungen durch den Katheter. Liegt die Perforationsöffnung im vorderen unteren Quadranten des Trommelfells, oder ist aus anderen Gründen die Wirksamkeit der genannten Verfahren ungenügend, zeitweilige Einleitung eines Luftstroms durch die Perforationsöffnung auf das Mittelohr, indem ein am vorderen Ende abgerundetes glattes Gummiröhrchen, das den Ansatz eines Ballons bildet, bis in die Nähe der Perforationsöffnung vorgeschoben wird, oder indem ein kurzes, leicht gebogenes Röhrchen durch die Perforationsöffnung eingeführt und während man durch dasselbe Luft einbläst, nach hinten wird. Ausser den Lufteintreibungen des Gehörgangs bei stark nach vorn nur vor-



sichtig und mit geringer Druckstärke auszuführen; als Spülflüssigkeit reines warmes Wasser oder eine Lösung von einer Messerspitze voll Borsäure auf 0·2 Liter warmen Wassers. Bei üblem Geruch des Ausflusses:

Rp. 2262.

*Acid. salicylic. 10·0,*  
*Spir. vin. rectific. 100·0.*  
*D. S. Ein Theelöffel voll*  
*der Spülflüssigkeit zu-*  
*zusetzen.*

Ebenso:

Rp. 2263

*Kal. hypermangan. 10·0,*  
*Aqu. font. 200·0.*  
*S. Wie das Vorige.*

Ferner:

Rp. 2264.

*Creolin. pur. 10·0.*  
*S. 10 Tropfen auf  $\frac{1}{4}$  Liter warmen Wassers.*

Bei hartnäckig andauerndem üblen Geruch desinficirende Injection von 2—3<sup>o</sup>iger Carbollösung oder von Sublimatlösung (1 : 2000). Bei profuser, blennorrhöischer Secretion 4—5 Tropfen von Oleum Terebinthin. auf 0·2 Liter warmen Wassers zur Ausspritzung zu verwenden.

Nach dem Ausspritzen oder, wenn die Ausspritzungen nicht vertragen werden, statt derselben Reinigung mittelst Bruns'scher Watte, die mit der Kniepincette oder dem Burkhardt-Merian'schen Watteträger gefasst wird. Zähne Schleimpfröpfe sind vor der Ausspritzung durch Einträufelungen von warmem Wasser oder einer Soda-lösung zu erweichen und, wenn nöthig, mit einer Knopf-sonde von der Unterlage loszulösen. Zur Entfernung krümliger oder zu Krusten eingetrockneter Secrete ein 4 Mm. weites, an der vorderen Mündung abgerundetes, glattes Gummiröhrchen an den Spritzenansatz zu stecken und vor der Einspritzung etwa 2 Cm. tief in den Gehörgang einzuführen; bei starker Verengerung des Gehörgangs statt des Gummiansatzes ein kurzes elastisches Paukenröhrchen. Zur Durchspülung der Trommelhöhle Einspritzung vom äusseren Gehörgang aus mittelst eines Paukenröhrchens oder einer Hartkautschuk-Canüle; bei

Verengerungen des Gehörgangs oder wenn aus anderen Ursachen die Perforationsöffnung nicht deutlich zu sehen ist, Injectionen durch die Tuba.

In neuerer Zeit zur Beseitigung chronischer Mittelohr-eiterungen die locale Anwendung von Arznei-stoffen eingeführt. In erster Linie kommt die Anwen-dung der Borsäure in Substanz (nach der unter „Otitis media acuta“, S. 634 geschilderten Methode) in Betracht. Vor dem Einblasen der Borsäure stets das Secret zu entfernen. Anfangs das Pulver 1—2mal täg-lich, dann mit abnehmender Secretion seltener einzu-blasen: in den ersten Tagen nach Sistirung der Secre-tion das trockene Pulver nicht auszuspritzen.

Bei übelriechendem Ausfluss vor Anwendung der Borsäure mehrere Tage Ausspülung der Trommelhöhle mit 2—3%iger Carbollösung oder Sublimatlösung (1 : 2000—3000). Ist mehrwöchentliche Borbehandlung erfolglos, oder bei der granulösen Form der Mittelohr-erkrankung auch von Anfang an Alkoholbehandlung: Nach Entfernung des Secrets durch Ausspritzen und Abtrocknung des Gehörgangs mittelst Wattebäuschchen wird bei seithlicher Neigung des Kopfes ein Theelöffel voll erwärmten Alkohols, der, wenn er starkes Brennen bewirkt, mit der gleichen Menge destillirten Wassers zu verdünnen ist, in den Gehörgang gegossen und durch 10—15 Minuten darin belassen. Je nach Menge des Ausflusses 1—3mal täglich anzuwenden. Wenn die Bor- und Alkoholbehandlung wirkungslos, bei übel-riechendem Ausfluss Antiseptica, wie:

Rp. 2265. *Acid. carbolic.* 10.

*Spir. vin. rectificat.*

*Aqu. destillat.* aa 150

M. D. S. 15—20 Tropfen anzuträufeln.

Eventuell her gang zu stärkeren Con-  
centrationsgr

In man  
wirksam

Benzoesäure

Bei Erfolglosigkeit der antiseptischen und der Alkoholbehandlung die caustische Methode: Nach gründlicher Reinigung der Trommelhöhle werden 15–20 Tropfen einer schwach erwärmten, 6–10%igen Lapislösung mittelst eines Horn- oder Glaslöffels bei seitlicher Neigung des Kopfes in den äusseren Gehörgang gegossen und 1–2 Minuten darin belassen, danach Ausspritzen mit lauwarmem Wasser, Waschen der Umgebung der Ohröffnung mit einer schwachen Jodkalilösung, bei Brennen und Kratzen im Rachen Eingiessen von 2–3 Esslöffel warmen Salzwassers in die Nase.

Bei Erfolglosigkeit der bisher erwähnten Behandlungsweisen und bei kleiner Perforationsöffnung eine der folgenden Einträufelungen:

Rp. 2266.

*Zinc. sulfuric. 0·2–0·4*  
(oder *Plumb acetic.*  
0·2 0·4),

*Aqu. dest. 20·0.*

*S. Einträufelung.*

Rp. 2267.

*Cupr. sulfuric. 0·1,*  
*Aqu. destillat. 20·0.*  
*S. Einträufelung.*

Ferner auch:

Rp. 2268.

*Merc. sublim. corros. 0·05,*  
*Aqu. destillat. 50·0.*  
*S. Einträufelung.*

Rp. 2269.

*Jodol. pur. 1·0,*  
*Spir. vin. rectific. 20·0.*  
*S. 15 Tropfen einzu-*  
*träufeln.*

Rp. 2270. *Resorcin. 1·0,*

*Spir. vin. rectific. 20·0.*

*S. Wie das Vorige.*

Bei grosser Perforationsöffnung statt der erwähnten Einträufelungen Alaun in Pulverform: ein damit imprägnirter Tampon von Bruns'scher Watte wird mittelst Kniepincette bis zur inneren Trommelhöhlenwand vorgeschoben, nach 24 Stunden gewechselt. Bei hartnäckigen Mittelohreiterungen, namentlich bei profuser blennorrhöischer Secretion, oder wenn die wuchernde Mittelohrschleimhaut sich durch die Perforationsöffnung in den äusseren Gehörgang vordrängt, sowie bei Verengerung des äusseren Gehörgangs Durchspülung der Trommel-

höhle von der Tuba aus mittelst warmen Wassers mit einem geringen Zusatz von Borsäure.

Bei starken Granulationen am Promontorialüberzug die oben erwähnte Alkoholbehandlung, wobei die Eingiessungen täglich 3—4mal vorgenommen und der Alkohol mindestens eine halbe Stunde im Ohr belassen werden muss. Wenn diese Behandlung unwirksam, oder bei ganz beschränkter Granulationsbildung an leicht zugänglichen Stellen Cauterisation mit Galvanocautik, Lapis oder mit gelöstem oder krystallisirtem Eisenchlorid, erst nach Ablösung des Schorfs zu wiederholen.

Bei scrophulösen und syphilitischen Individuen neben Allgemeinbehandlung auch äussere Anwendung von Jodpräparaten rathsam. Bei schmerzhafter Entzündung des Warzenfortsatzes:

Rp. 2271.

*Jodoform.*,

*Ol. Foenicul. aa* 2·0,

*Vaselin.* 20·0.

*S. In der Gegend des Warzenfortsatzes einzureiben.*

Ebenso:

Rp. 2272.

*Jodol. pur.*,

*Ol. Origan. aa* 2·0,

*Ungu. emoll.* 20·0.

*S. Wie das Vorige.*

Gegen die bei der chronischen Mittelohreiterung auftretenden Hörstörungen: Lufteintreibungen, 2—3mal wöchentlich, nach 4—5wöchentlicher Anwendung eine Pause von 2—3 Wochen, wenn nicht starke Secretion öftere Lufteintreibung erheischt. Sehr wirksam auch, besonders wo Lufteintreibungen nicht ausgeführt werden können, Luftverdünnung im äusseren Gehörgang (s. „Otitis media catarrhalis.“ S. 637. Wenn durch die locale Behandlung keine Hörverbesserung erzielt wurde, namentlich aber bei abgelaufener Mittelohreiterung, bei hochgradiger Hörstörung Application eines künstlichen Trommelfells, am besten des Instruments von Hassenstein (bei Kindern nicht anzuwenden, ebenso wenn das Einführen des Instruments neue Eiterung erzeugt); eine halbe Stunde lang zu

nur  
n

nur eine halbe Stunde länger bis zum Maximum von 6—8 Stunden.

**Otalgia nervosa. Nervöser Ohrenschmerz.** Bei Zahncaries Extraction des erkrankten Zahnes. Bei recenten Otalgieen Chinin. sulfuric. 0·2—0·3, 3mal täglich oder:  
Rp. 2273.

*Chinin. sulfuric. 1·2,  
Kal. iodat. 2·4,  
Sacch. alb. 3·0.  
M. f. pulv. Div. in dos.  
aegu. No. 6.*

*D. S. 2mal tägl. 1 Pulv.*

Bei chronischen Formen Chinin, Jodkali, (bei Anämischen) Eisen; ferner die Meglin'schen Pillen:

Rp. 2274.

*Zinc. oxydat.,  
Rad. Valerian.,  
Extr. Hyoscyam. nigr.  
āā 10·0,  
Pulv. et extr. Liquir.  
āā q. s. ut fiant pill.  
No. 100.*

*D. S. Von 1 Pille, täglich um 1 steigend, bis zu 30 Pillen u. zurück.*

In neuerer Zeit wird bei Otalgie mit gutem Erfolg nach der Angabe von Gomperz verwendet:

Rp. 2275.

*Antipyrin. 1·5.*

*Div. in dos. aegu. No. 3.*

*D. S. 2 Pulver auf einmal, nach einer Stunde das 3. in Wasser zu nehmen.*

Aeusserlich Morphinsalben, Vesicantien. Galvanische Behandlung, der Kupferpol am Ohr, der Zinkpol am Nacken. Manchmal auch Massage von Nutzen.

**Hyperaemia Labyrinthi. Labyrinthhyperämie.** Bei Injection der Hammergriffgefäße und bei Abwesenheit der Erscheinungen von Hirncongestion Ableitung auf den Warzenfortsatz durch spirituöse Einreibungen, wie:

Rp. 2276.

*Spir. aromat.,*

*Spir. Formicar.,*

*Spir. Sinapis āā 30·0.*

*S. Stündlich 1 Kaffeelöffel voll einzureiben.*



In hartnäckigeren Fällen ein fliegendes Vesicans auf den Warzenfortsatz und nachträgliche Bestreichung des Coriums mit Unguent. Tartar. stibiat. Bei Erscheinungen von Hirncongestion kalte Ueberschläge oder Leiterscher Kühlapparat auf den Kopf, warme Fussbäder, Ableitungen auf den Darmcanal, eventuell locale Blutentziehungen am Warzenfortsatz. Zur Vermeidung von Recidiven bei zu Kopfcongestionem disponirten Individuen zweckmässiges diätetisches Verhalten, regelmässige Lebensweise, leicht-verdauliche Kost, bei Stuhlverstopfung Bitterwasser. Kalte Abreibungen oft sehr vortheilhaft.

**Syphilis Labyrinthi. Syphilitische Erkrankung des inneren Ohres.** Als erste Kur:

Rp. 2277.

*Filocarpin. muriat. 0 2,*

*Aqu. destillat. 10 0.*

*S. In steigender Dosis von 4—12 Tropfen pro die subcutan zu injiciren.*

Wenn nach 8—14 Tagen kein merkliches Resultat, allgemeine Jod- oder Quecksilberkur neben Injectionen einer Jodkalilösung in die Trommelhöhle und Einreibungen von Jodoform-, Jodol- oder Quecksilbersalbe hinter dem Ohre.

**Paresis et Paralysis nervi acustici. Lähmung des Gehörnerven, nervöse Schwerhörigkeit.**

Bei recenten Affectionen Aufenthalt in einem ruhigen, geräuschlosen Zimmer: Ableitungen auf den Darmcanal, reizende Fussbäder, Vesica am Warzenfortsatz mit darauffolgender endermat. Salbe, innerlich Jodl. mit Aether durchtrankt. Wenn die Affection bei ein Vesicans in die Gegend des entblösste Corium.



Rp. 2278.

*Strychnin. nitric. 0·1,*

*Glycerin. 10·0.*

*S. 4—6 Tropfen einzureiben.*

Innerlich Jodkali, bei Abwesenheit subjectiver Geräusche:

Rp. 2279.

*Strychnin. nitric. 0·07,*

*Aqu. destillat. 10·0.*

*D. S. 3mal täglich 3—5 Tropfen.*

Local:

Rp. 2280.

*Aether. sulfuric. 10·0,*

*(Ammon. pur. liquid. 1·0).*

*S. Die Dämpfe durch den Tubenkatheter in die Trommelhöhle zu leiten.*

Endlich galvanische Behandlung: die Kathode an eine indifferente Stelle, die Anode an das Ohrläppchen oder an den Rand der äusseren Ohröffnung.

---



.

.

.

# Therapeutisches aus dem Gebiete der Zahnheilkunde.

Nach Docent Dr. Julius Scheff jun.

**Zahnreinigungsmittel.** Bei gesunden Zähnen am besten die natürlichen Reinigungsmittel, Wasser und Zahnbürste. Letztere hart, bei Milchzähnen mittelhart; bei Erwachsenen 4reihig, bei Kindern 2—3reihig. Die Reinigung mindestens am Morgen und Abend, noch besser auch nach jeder Mahlzeit vorzunehmen. Man bürste nicht bloss horizontal, sondern die oberen Zähne auch von oben nach abwärts, die unteren von unten nach aufwärts; das Zahnfleisch ist stets mitzubürsten.

Die künstlichen Reinigungsmittel sollen, wenn überhaupt, nur ab und zu, etwa wöchentlich 2mal, bei Kindern aber gar nicht in Verwendung kommen. Sie werden zumeist in Pulverform verschrieben, wobei stets „Pulvis subtilissimus“ bemerkt werden soll. Die wirksamsten Putzmittel sind die Seifen, von denen nur harte (Natron-) Seifen verwendet werden sollen, wie Sapo albus und Sapo amygdalinus.

Rp. 2281.

*Sapon. amygdalin.*

*Mganes. carbon. āā 15·0,*

*Pulv. rad. Ir. flor. 5·0,*

*Carmin. pur. 0·2.*

*Misce exactissime.*

*Fiat pulv. subtilissim.*

*D. S. Zahnpulver.*

Das Pulvis den-  
tifricius albus der

österreichischen Pharmako-  
pöe ist:

Rp. 2282.

*Pulv. rad. Ir. flor.,*

*Magnes. carbon. āā 5·0,*

*Calc. carbonic. 40·0,*

*Ol. Menth. pip. in paux.*

*Spir. vin. solut. gtts. 4.*

*M. f. pulv. subtilissim.*

*D. S. Zahnpulver.*

Ebenfalls officinell ist  
Heider's Zahnpulver:  
Rp. 2283.

*Pulv. Oss. Sep.* 40·0,  
*Pulv. rad. Ir. flor.*,  
*Pulv. Magn. carbon*  
*aa* 5·0,  
*Ol. Menth. pip. gtts.* 5.  
*Misce, f. pulv. subtilissim.*  
*D. S. Zahnpulver.*

Ein weiteres Zahnpulver  
ist von Scheff jun. ausge-  
geben:

Rp. 2284.

*Pulv. Oss. Sepiae* 20·0,  
*Pulv. Ir. flor.* 5·0,  
*Chinolin. tartar.* 0·5,  
*Sapon. venet.* 2·0.  
*M. f. pulv. subtilissim*  
*D. S. Zahnpulver.*

Die Kohle (*Carbo ligni, tiliae, animalis, panis*) ist  
eines der schädlichsten Zahnreinigungsmittel; sie ist  
nicht nur für die Zähne, an welchen sie keilförmige De-  
fecte des Zahnhalses hervorbringt, sondern auch für das  
Zahnfleisch höchst nachtheilig. Dasselbe gilt von der  
gebrannten Brodrinde und von der Cigarren-  
asche.

Zahnreinigungsmittel in  
Form einer Pasta sind:

Rp. 2285.

*Pulv. Oss. Sepiae* 20·0,  
*Chinolin. tartar.* 0·5,  
*Sapon. venet.* 5·0,  
*Carmin. rubr.* 0·05,  
*Ol. Menth. pip. gtts.* 3.  
*D. S. Pasta (Scheff jun.).*

Rp. 2286

*Cret. alb.* 22·0,  
*Sapon. med.* 7·0,  
*Alum. crud.* 2·0,  
*Ol. Menth. pip.* 1·0,  
*Spir. vin. q. s. ut*  
*Massa saponiform.*  
*D. S. Zahnpasta (Be-*  
*mann).*

Als Mundwasser wer-  
den am zweckmässigsten  
Lösungen von Antiseptica  
oder Adstringentien verwen-  
det, z. B.:

Rp. 2287

*Kal. chloric.* 2·0,  
*Aqu. font.* 200·0,  
*Aqu. Menth. pip.* 20 0.  
*S. Mundwasser.*

Rp. 2288.

*Alcohol. absol.* 50·0,  
*Acid. carbolic.* 0·3,  
*O. Menth. pip.* 0·5.  
*D. S. Nach jeder Mahl-*  
*zeit 10 Tropfen auf*

zu  
die

Rp. 2289.

*Chinol. tartaric. 1·0,*  
*Aqu. dest. 150·0,*  
*Spir. vin. rectific. 30·0,*  
*Coccionell. alcoh. 0·5.*  
*Solut. filtr. adde:*  
*Ol. Menth. pip. gtts. 4.*  
*D. S. 1 Kaffeelöffel auf*  
*1/2 Glas Wasser zum*  
*Mundausspülen.*  
*(Scheff jun.)*

Rp. 2290.

*Alum. crud. 2·0,*  
*Tinct. Pyrethr. 1·0,*  
*Aqu. dest.,*  
*Aqu. Cochlear. āā 100·0.*  
*D. S. Mundwasser.*

Rp. 2291.

*Natr. boracic. 2·0,*  
*Aqu. dest.,*  
*Aqu. Salviae āā 100·0.*  
*D. S. Mundwasser.*

### **Pulpitis. Entzündung der Zahnnerven. Odontalgie.**

**Zahnschmerz.** Mit Ausnahme der Carbolsäure und der Arsenpasta gibt es wohl kaum Medicamente, welche den Zahnschmerz in Folge von Pulpitis zu beseitigen vermögen. Hie und da folgt Linderung der vehementen Schmerzen nach Anwendung eines der folgenden Medicamente, welche nach Trocknung der Höhle mittelst Watte genau auf die schmerzende Stelle, i. e. auf die blossliegende Pulpa gelegt werden müssen.

Rp. 2292.

*Tinct. Opii simpl. 8·0,*  
*Morph. muriat. 0·3.*  
*S. Auf Watte in den*  
*hohlen Zahn zu bringen.*

Rp. 2293.

*Morph. muriat. 0·3,*  
*Spir. vin. rectific. 4·0,*  
*Chloroform. 20·0.*  
*S. Wie das Vorige.*

Rp. 2294.

*Creosot. gtts. 4,*  
*Opii pur. 0·2,*  
*Gumm. Mimos. q. s. ut f. pill. No. 6.*  
*D. S. In die schmerzende Höhle eine Pille zu*  
*legen.*

Ausser diesen werden noch Tannin, Nelkenöl, Campher, Chloralhydrat, Rad. Pyrethr., Ol. Terebinth., Alcohol etc. verwendet.

Am gebräuchlichsten und wirksamsten sind die Carbolsäure und die arsenige Säure. Die Carbolsäure wird auf folgende Weise verwendet: Die Zahnhöhle wird mittelst kleiner Wattebäuschchen getrocknet und darauf ein in concentrirte Carbolsäure getauchtes und ausgedrücktes Baumwollbäuschchen auf die schmerzhafteste Stelle gelegt; darüber wird trockene Baumwolle bis zum Verschluss der Höhle eingebracht und mit etwas Zahnharz bestrichen. Zweckmässig, um den Speichelfluss zu verhindern, Anlegen des Cofferdam. Als Zahnharz verwendet man:

Rp. 2295.

*Sandaracc.* 5·0,  
*Alcohol.* 10·0.  
*S. Zahnharz.*

Oder:

Rp. 2296.

*Mastich.* 5·0,  
*Aether. sulf.* 10·0.  
*S. Zahnharz.*

Dieses Verfahren wird nach 24 Stunden, wenn der Schmerz nicht aufgehört hat, erneuert. Lässt der Schmerz nach wiederholtem Einlegen nicht nach, so wird zur Arsenpasta gegriffen (sogen. Nervtödten). Man verschreibt:

Rp. 2297.

*Acid. arsenicos.* 0·5,  
*Morph. mur.* 1·5,  
*Creosot. q. s. ut f. pasta.*  
*D, S. Arsenpasta.*

Oder:

Rp. 2298.

*Acid. arsenicos.* 0·5,  
*Morph. mur.* 1·5,  
*Ol. Caryophyll.,*  
*Tinn. glycer. aa* 0·5,  
*Creos. q. s. ut f. pasta.*  
*S. Pasta.*

Ein stecknadelkopfgrosses Stück einer dieser Pasten wird mit etwas Carbolsäure verührt und ein in diese verdünnte Paste getauchtes Baumwollbäuschchen auf die schmerzende Stelle gelegt. Nach 24 Stunden unter Anlegen des Cofferdam wird dann nochmals ein solches 24stündig eingelegt. Nach 48 Stunden wird durch



Einzspritzen von kaltem Wasser versucht, ob die Empfindlichkeit nachgelassen hat. Nützt die Arsenpasta nicht, so ist die Extraction des schmerzenden Zahnes angezeigt.

**Periodontitis. Zahnwurzelhautentzündung.** Im Beginn, so lange die Schmerzen nur mässig und hauptsächlich nur ein Gefühl des Längerwerdens des Zahnes besteht (erstes Stadium), Anwendung von Kälte in Form von häufig zu wechselnden Umschlägen und von Eispillen. Ferner Einpinselung von Jodtinctur auf das Zahnfleisch des erkrankten Zahnes und auf dessen Umgebung mittelst Malerpinsels, 1–2mal im Tag ausgeführt, oft von Erfolg (Nach der Einpinselung Baumwolle zwischen Zahnfleisch und Lippe einzulegen und bis zum spontanen Herausfallen dort zu belassen; Patient darf den Mund nicht ausspülen.)

Nützt diese Behandlung nicht, kommt es zu grossen Schmerzen, Fieber, Längerwerden und Lockerung des Zahnes (zweites Stadium), so versucht man Anwendung von Wärme u. zw. in Form von Bähungen und Kataplasmen, ferner in Mundwässern, schleimigerweichenden Decocten, von denen Patient jede Viertelstunde einen Schluck in den Mund nimmt und nach einigen Secunden ausspuckt. Die Temperatur, unter welcher das Decoct zu nehmen ist, richtet sich nach der Individualität. Man verschreibt z. B.:

Rp. 2299.

*Decoct. Althaeae* 200·0,  
*Tinct. Opii simpl.* 2·0,  
*Aqu. Menth. pip.* 10 0.  
*D. S. Mundwasser.*

Oder:

Rp. 2300.

*Fol. Hyoscyam,*  
*Herb. Malv. aa* 5·0.  
*Div. in dos. aequ. No 2.*  
*D. S. Thee.*

Ein beliebtes Hausmittel ist der Kaspappelthee, zu gleichen Theilen mit warmer Milch gemischt und mit einigen Tropfen Opiumtinctur versetzt, zum Ausspülen des Mundes zu verwenden.

Sowie Fluctuation nachzuweisen ist (drittes Stadium), ausgiebige Incision.

**Gingivitis. Zahnfleischentzündung.** Bei der acuten Form Anwendung von Kälte, Ausspülungen mit adstringirenden Mundwässern, wie:

Rp. 2301.

*Alum. crud.* 2·0,  
*Aqu. dest.*,  
*Aqu. Salviae aa* 100·0.  
*S. Mundwasser.*

Rp. 2302.

*Aqu. Salv.* 120·0,  
*Extr. Ratanh.* 4·0,  
*Syr. Moror* 30·0.  
*D. S. Mundwasser.*  
(Kleinmann).

In vielen Fällen nützen stellenweise Incisionen.

Bei chronischer Gingivitis Behandlung etwa bestehender ursächlicher Quecksilber- oder Blei-Intoxication, Kälte, adstringirende Mundwasser (Rp. 2290, 2301, 2302) oder Tincturen, die mittelst Pinsels 3—6mal täglich aufzutragen sind:

Rp. 2303.

*Tinct. Chin. simpl.*,  
*Tinct. Ratanh. aa* 15·0,  
*Ol. Caryophyll. gtts.* 5.  
*D. S. Zahntinctur.*

Rp. 2304.

*Tinct. Spilanth olerac.*,  
*Tinct. Catechu aa* 15·0.  
*D. S. Zum Bepinseln*  
*des Zahnfleisches.*

In hartnäckigen Fällen stellenweise Incisionen.

**Gingivitis ulcerosa. Verschwärung des Zahnfleisches.** Womöglich causale Behandlung, scrupulöse Reinlichkeit, Rücksicht auf etwaige constitutionelle Krankheiten, Anwendung von Adstringentien. (Rp. 2301 — 2304).

**Gingivitis crouposa s. diphtheritica. Croup des Zahnfleisches. Stomatocace. Mundfäule.** Vor Allem gänzliche und gründliche Reinigung des Mundes, namentlich der erkrankten Theile; Entfernung des Zahnsteins. Desinfection mit Kalichloricum, das sowohl innerlich als äusserlich genommen wird.

Rp. 2305.

*Kal. chloric. 6·0,*  
*Aqu. font 150·0,*  
*Syr Althaeae 10·0.*  
*S. 2stündlich 1 Esslöffel.*

Oertlich adstringirende und antiseptische Mundwasser,  
 Rp. 2287—2291, oder:

Rp. 2306.

*Kal. hypermanganic. 1·0,*  
*Aqu. dest. 500·0.*  
*S. 2 - 3 Kaffeelöffel voll*  
*auf 1 Glas Wasser*  
*zum Ausspülen des*  
*Mundes.*

Rp. 2307.

*Aqu. Chlor. 15·0,*  
*Inf. fol. Salv.*  
*e 15·0 : 180·0,*  
*Mell. despum. 30·0*  
*S. Zum Ausspülen des*  
*Mundes. (Berends.)*

Ferner Touchirung der Geschwürflächen mit Lapis.  
 Am raschesten und sichersten wirkt jedoch stets Kali  
 chloricum.

**Scorbut des Zahnfleisches.** Entfernung des Zahnsteins.  
 Gründliche, täglich oftmalige Reinigung der Zähne und  
 des Zahnfleisches, anfangs mittelst weicher, später mit-  
 telst härterer Zahnbürste. Zu dem Wasser, in das man  
 die Zahnbürste taucht, kann man allenfalls zusetzen:

Rp. 2308.

*Tinct. Ratanh.,*  
*Tinct. Catechu aa 10·0.*  
*S. 20—30 Tropfen auf 1 Glas Wasser.*

Ferner Gebrauch von adstringirenden Mundwässern.  
 Bei geschwürigem Zerfall Kali chloricum.

**Stomatitis. Entzündung der Mundschleimhaut.**

Beseitigung der Ursache, insbesondere Aussetzen einer  
 etwa im Gang befindlichen Quecksilberkur. Bei Soor  
 Alkalisierung der Mundschleimhaut durch:

Rp. 2309.

*Borac. venet.* 1·0,  
*Aqu. dest.* 100·0.  
*S. Mundwasser.*

Oder:

Rp. 2310.

*Kal. chloric.* 0·5,  
*Aqu. dest.* 100·0.  
*S. Mundwasser.*

Mittelst eines in das Mundwasser getauchten Leinwandlappchens, welches nach schon einmaligem Gebrauch zu wechseln ist, wird der Mund des Kindes fleissig gereinigt.

Bei *Stomatitis ulcerosa* Entfernung von Zahnstein, scharfen Ecken und Spitzen an Zähnen und Wurzelresten. Aussetzen etwa verordneter scharfer Medicamente, wie Carbol, sowie des Quecksilbers. Berücksichtigung von Constitutionskrankheiten. Oertlich milde, laue Mundwässer, hie und da auch der Lapisstift.

Bei *Aphthen* leichtes Betupfen mit dem Lapisstift, Gebrauch adstringirender Mundwässer, z. B. Rp. 2290, 2301, 2302, oder:

Rp. 2311.

*Decoct. cort. Chin.* e 20·0 : 200·0,  
*Tinct. Catechu,*  
*Tinct. Myrrh.* aa 20·0.  
*S. Mundwasser.*

**Syphilis oris. Syphilis des Mundes.** Neben der üblichen Allgemeinbehandlung oder auch ohne dieselbe local Aetzung mit Lapislösung oder mit:

Rp. 1312.

*Merc. sublim. corrosiv.*  
0·2—1·0,  
*Alcohol.* 10·0.  
*S. Zu Händen des Arztes.*

Seltener wohl das theuere:

Rp. 2313.

*Aur. chlorat.* 1·0,  
*Spir. vin. rectific.,*  
*Aqu. dest.* aa 2 0.  
*S. Zum Bepinseln.*

Spitze Zähne abzufilen. Vermeidung von Tabak und reizenden Speisen. Fleissiger oder adstringirender Mundwasser.

Rp. 2314.

*Alum. crud.* 5·0,  
*Aqu. dest.* 500·0,  
*Aqu. Menth. pip.* 30·0.  
*S. Mundwasser.*

Eventuell auch specifisch  
 wirkende Mundwässer, wie:  
 Rp. 2315.

*Merc. sublim. corros.*  
 0·25 — 0·5,  
*Aqu. dest.* 500·0.  
*S. Mundwasser.*

Oder:

Rp. 2316.

*Tinct. Jod.* 1·0,  
*Aqu. dest.* 500·0.  
*S. Mundwasser.*

**Fistula gingivae. Zahnfleischfistel.** Milchzähne oder deren Wurzeln sind, wenn sie durch Periostitis zu Fistelbildung geführt haben, so bald als möglich zu entfernen. Bei Erwachsenen kann der Zahn, von dem aus die Fistel entstanden ist, belassen werden, wenn keine anderweitigen Beschwerden durch denselben verursacht werden; kommt es aber zu starker Schwellung, namentlich im Unterkiefer, und zu heftiger Eiterung, so ist der Zahn, resp. dessen Wurzel zu entfernen. Dieselbe Therapie bei Backen- oder Wangenfisteln, die ebenfalls nur durch vorausgegangene Periostitiden hervorgerufen werden.

**Rheumatischer Zahnschmerz** kommt als solcher niemals vor, sondern ist stets nur die Folge eines erkrankten Zahnes, der manchmal schwer aufzufinden ist, nach dessen Beseitigung aber der Schmerz auch aufhört.





# Anhang.

---



# I. Behandlung der wichtigsten Vergiftungen.

## A. Allgemeines.

Wo es angeht, sucht man das Gift aus der Wunde, dem Magen, dem Darm etc. zu entfernen.

1. Aus Wunden entfernt man dasselbe durch Ausquetschen, Aussaugen, Auswaschen mit Wasser oder antiseptischen Mitteln, Ausbrennen.

2. Entfernung des Giftes aus dem Magen geschieht am zweckmässigsten durch den Heber (Magensonde mit nur einem Auge und darübergezogenem etwa 1 Meter langem Gummischlauch, an dessen anderes Ende ein Glastrichter eingefügt ist) oder durch Erregen von Erbrechen; dasselbe hervorzurufen durch Kitzeln des Schlundes, Trinken reichlicher Mengen lauen Wassers oder durch ein Brechmittel; am besten subcutane Injection von  $\frac{1}{2}$ —1 Pravaz'schen Spritze einer 1%igen Apomorphin-Lösung. Oder auch:

Rp. 2317.

*Pulv. rad. Ipecacuanh. 1·0,*

*Tartar. emetic. 0·1.*

*D. S. Auf einmal zu nehmen.*

Rp. 2318.

*Pulv. rad. Ipecacuanh. 2·0,*

*Tartar. emetic. 0·2,*

*Aqu. dest. 60·0,*

*Oxymell. Scill. 20·0.*

*D. S. Umgeschüttelt alle 10 Minuten 1 Esslöffel bis zur Wirkung.*

Rp. 2319.

*Cupri sulfuric. 1·0,*

*Aqu. dest. 60·0.*

*D. S. Theelöffelweise zu nehmen.*

Im Nothfalle kann auch Senfpulver, 1 Kaffeeelöffel auf 1 Glas warmen Wassers, angewendet werden.

Eine Entfernung des Giftes aus dem Magen darf aber dann nicht vorgenommen werden, wenn das Gift Anätzung des Magens bewirkt (z. B. Mineralsäuren, Atzkali etc.)

3. Entfernung des Giftes aus dem Darne durch Abführmittel, intern oder per Klysma.

### Behandlung der hauptsächlichsten Symptome

Bei Anätzung des Schlundes und Magens schleimige, einhüllende Getränke, z. B. Mucilago gummi Arabici, Mucilago Salep, Haferschleim oder etwa:

Rp. 2320.

*Tragacanth. 10·0,*

*Aqu. font. 500·0.*

*S. Zum Getränk.*

Ferner gegen die Entzündung des Schlundes und Oesophagus, sowie gegen übermässiges Erbrechen Eispillen, gegen die Schmerzen im Magen und Darm Opium oder Morphinum, letzteres intern oder subcutan.

Bei stark herabgesetzter Körpertemperatur nach Vergiftung mit Narcoticis Einhüllen in warme Tücher, Frottiren, Bürsten der Glieder, Massage, passive Bewegungen.

Bei Collaps, Bewusstlosigkeit, Ohnmacht, Tieflagerung des Kopfes, Messung des Kopfes. Senktege zu von Aether, Kampfer t Kranke schlucken kann Cognac oder schwerem We

Bei Schwächerwerden oder Sistiren der Athmung kalte Begiessungen im warmen Bade, Vorziehen der Zunge, künstliche Respiration nach der Methode von Silvester (s. S. 338), Faradisation des Nervus phrenicus; bei Larynxödem Tracheotomie.

### B. Behandlung der einzelnen Vergiftungen (nebst kurzer Angabe der Symptome.)

**Aconitin, Aconitum.** Symptome: Brennen im Munde, Speichelfluss, Cardialgie, Erbrechen, Durchfall; Unempfindlichkeit und Schwerbeweglichkeit der Zunge, Ameisenkriechen, Schmerzen in den Unterschenkeln, Frostgefühl, anfangs Verengung, dann Erweiterung der Pupille, Pulsverlangsamung, schwerer Athem, Kälte und Livor der Haut, Convulsionen

Therapie: Brechmittel, Thierkohle (in Wasser aufgeschwemmt) ferner:

Rp. 2321.

*Acid. tannic. 4·0,*

*Aqu. dest. 200·0,*

*Syr. simpl. 20·0.*

*D. S. Alle 5 Minuten ein Esslöffel voll.*

Eventuell auch:

Rp. 2322.

*Tinct. Jod. 10·0.*

*D. S. Alle 10 Minuten 5–10 Tropfen in einem Glas Wasser.*

**Aether** (Vergiftung durch Einathmung). Symptome: Livides Gesicht, Erniedrigung der Körpertemperatur, Myosis, Kleinerwerden des Pulses, Unregelmässigkeit und allmähliches Sistiren der Athmung, bisweilen plötzlich Syncope und Herzstillstand.

Therapie. Aussetzen der Einathmung von Aether, Öffnen der Fenster, Lüften etwa beengender Kleidungsstücke, die Brust mit kaltem Wasser zu bespritzen zu frottiren, Einleitung der künstlichen Respiration.

(s. S. 338), Paradoisation der Nervi phrenici; wenn sich die Athmung wieder einstellt:

Rp. 2323.

*Ammon. pur. liqu. 20·0.*

*S. Zum Riechen.*

Empfohlen wurde auch:

Rp. 2324.

*Strychnin. nitric. 0·02,*

*Aqu. dest. 10·0*

*S. 1 2 Pravaz'sche Spritzen zu injiciren.*

Falls sich die Athmung nicht bald einstellt, auch Katheterisirung des Kehlkopfs und eventuell Tracheotomie.

**Alkalien. (Kali- oder Natronlauge, Ammoniak, kohlensaure Alkalien)** Symptome. Schmerzen in Mund, Hals, Oesophagus, heftiges Würgen, Erbrechen von alkalischen, häufig mit Blut gemengten Massen, grosser Durst, Schlingbeschwerden, oft blutige Durchfälle, Auftreibung des Leibes, weiterhin Kälte der Haut, allgemeine Prostration. Bei Ammoniakvergiftung ausserdem starke Salivation, Aphonie, Husten, Erstickungsanfälle.

Therapie: (Brechmittel und Magenschlauch zu meiden). Zunächst Darreichung von Essigwasser, Limonade etc., dann überhaupt reichliche Zufuhr von Getränken, Milch, schleimigen Getränken, Oel.

Rp. 2325.

*Acid. tartaric. 5·0,*

*Aqu. font. 500·0.*

*S. Alle 5 Minuten 1 Esslöffel.*

Rp. 2326.

*Acet. Vin. 25 0,*

*Aqu. font. 300·0,*

*Syr. simpl. 30·0.*

*D. S. Wie das Vorige.*

Weiterhin symptomatisch ~~behandelt werden~~ die Schmerzen, den Brechreiz, (Seite 666 f.) Bei Ammoniakvergiftung von Wasserdampf



**Alkohol. a) Acute Vergiftung, Volltrunkenheit. Symptome.**

Tiefe Besinnungslosigkeit, Prominenz der Bulbi, Injection der Coniunctiva, Rothung des Gesichtes, langsames stertoröses Athmen, Geruch des Athems nach Alkohol, kleiner Puls, kalte klebrige Haut, unwillkürliche Koth- und Harnentleerung, Sinken der Körpertemperatur, Erweiterung der Pupille, Triasmus, Convulsionen.

**Therapie:** Magenpumpe oder Apomorphin-Injection. Zufuhr frischer Luft, kalte Begiessungen. Bei starken Congestionen nach dem Kopfe Hochlagerung desselben, Eisapplication, Hände und Füsse in heisses Wasser, Klystiere mit Essig (1 Theil Essig · 3 Theilen Wasser), oder mit Kochsalz (1 Essloeffel · 2 Tassen Wasser); bei kräftigen Individuen eventuell Aderlass. Bei Collaps starke Hautreize, Senfteige etc., innerlich.

Rp. 2327.

*Liqu. Ammon. caustic. (oder anisat.) glls. 10,*

*Aqu. font. 60·0,*

*Syr. simpl. 20·0.*

*S. Auf einmal zu nehmen.*

Ferner schwarzer Kaffee oder Thee. Wenn nöthig, künstliche Athmung, Faradisation der Phrenici.

- b) Chronische Vergiftung. Symptome** Chronischer Magen und Darmkatarrh, Vomitus matutinus, Appetitlosigkeit, Unregelmässigkeit des Stuhls; chronische Pharyngitis, Laryngitis, Bronchitis; häufig Lebererkrankungen, Fettleber oder Cirrhose, Hypertrophie, später Dilatation und Verfettung des Herzens, Atherose der Gefässe; Impotenz, ab und zu Harn-Incontinenz, Amblyopie, Neigung zu Apoplexien, Tremor, Anästhesien, Paralysen, epileptiforme Anfälle und verschiedene Psychosen, namentlich häufig das Delirium tremens, charakterisirt durch allgemeines Muskelzittern, anhaltende Schlaflosigkeit, Hallucinationen (Sehen von kleinen Thieren), Verfolgungswahn, Tobsucht.

**Therapie:** Allmälige gänzliche Entziehung des Alkohols, am ehesten in Anstalten (Trinkerasylen) durchführbar. Symptomatische Behandlung der Folgezustände, namentlich Anregung der Verdauung durch Amara und Tonica. Bei Delirium tremens sorgfältige Beobachtung des Kranken, Sorge für Schlaf durch grosse Dosen von Opium:

Rp. 2328.

*Opii pur.* 0·5,

*Sacch. alb.* 2·0.

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. Nr. 10.*

*D. S. Stündlich 1 Pulver, bis Schlaf erfolgt.*

Oder Paraldehyd:

Rp. 2329.

*Paraldehyd.* 4·0,

*Syr. cort. Aur.* 30·0.

*S. Auf einmal zu nehmen.*

Die Anwendung von Chloralhydrat ist gefährlich, weil leicht Herzlähmung bewirkend. Besser das in neuerer Zeit empfohlene:

Rp. 2330.

*Hyoscin. mur.* 0·01,

*Aqu. dest.* 10·0.

*D. S.  $\frac{1}{2}$ —1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren*

Bei Herzschwäche Digitalis, Coffein. (Siehe über Behandlung des Delirium tremens auch S. 182).

**Allantiasis** s. Wurstgift.

**Amylnitrit.** Symptome: Gefühl von Klopfen der Carotiden, Hitzegefühl, Kitzeln im Halse, Husten, Schwindel, Kopfschmerz, Beklemmung, Pupillenerweiterung, Herzklopfen, Ohnmacht

Therapie: Kalte Waschungen und Begiessungen. Zufuhr frischer Luft; eventuell künstliche Respiration. Empfohlen wurde Ergotin-Injection.

**Anilin.** Symptome: Cyanose der Haut, Lippen und Nägel, Erbrechen, Somnolenz, Krämpfe, Pupillenerweiterung, Dyspnoe, Coma.

Therapie: Brechmittel  
nicht bliger Natur, Vern  
Stimulantia (Aether, Kam  
Sorge für frische Luft.

~~schlauch~~, Abführmittel  
ige

**Antimonverbindungen. (Tartarus stibiatus, Brechweinstein).** Symptome: Schmerzen im Mund und Schlund, Anschwellung und bisweilen Bläschenbildung an Lippen und Gaumen, starke Salivation und Expectoration, heftiges Erbrechen und Magenschmerzen, wässerige, choleraartige Durchfälle. Keine Strangurie (zum Unterschied von Arsenvergiftung). Weiterhin in schweren Fällen klonische Krämpfe, Dyspnoe, Kleinerwerden des Pulses, Collaps.

Therapie: Magenpumpe, wenn nicht ohnehin reichliches Erbrechen eingetreten ist. Ferner Tannin (Rp. 2321), oder:

Rp. 2331.

*Decoct. cort. Chin. e 20·0 – 30·0*

*ad colat. 150·0.*

*D. S. Schluckweise möglichst rasch zu nehmen.*

(Das gebildete gerbsaure Antimonoxyd durch Magenausspülung zu entfernen.) Weiterhin gegen übermässiges Erbrechen Eispillen, Limonade, Morphin. Bei Herzschwäche Analeptica (Wein, Kampher).

**Argentum nitricum. Höllenstein.** Symptome: Gastroenteritis mit Erbrechen käsig, weisser, sich am Licht schwarz färbender Massen, und Durchfall; bald darauf Schwindel, Convulsionen, Paralyse.

Therapie: Magenpumpe oder Brechmittel, wenn nicht ohnehin Erbrechen besteht. Eiweiss, Milch, Kochsalz.

**Arsenverbindungen. a) Acute Vergiftung.** Symptome: Die Erscheinungen treten gewöhnlich erst nach  $\frac{1}{2}$ —1 Stunde auf. Erbrechen, Durst, Kratzen im Schlunde, Schlingbeschwerden, Leibschmerzen, blutige oder reiswasserähnliche Stühle, Strangurie, im Harn Blut und Cylinder; weiterhin Schwindel, Cyanose, klonische und tonische Krämpfe, erysipelartige Röthung der Haut, schwacher Puls, Kälte der Extremitäten, erschwertes Athmen, allgemeine Paralyse. In manchen Fällen fehlen die gastrischen Erscheinungen und es kommt sofort zu Krämpfen und Collaps.

Therapie: Zunächst, wenn nicht ohnehin starkes Erbrechen besteht, Brechmittel, Apomorphin-Injection oder Pulv. rad. Ipecac. (alle 10 Minuten 1·0 bis zur Wirkung), Brechweinstein dagegen zu meiden; ferner Dar-

reichung von Milch und Fetten bis zur Beschaffung eines der folgenden Medicamente; jedoch keine säuerlichen Getränke oder kohlensauren Alkalien. Als Antidot:

Rp. 2332

*Ferr. oxydat. hydric. in Aqu. 500·0.*

*D. S. Von dem erwärmten und umgeschüttelten Mittel alle 10 Minuten 2 - 4 Esslöffel zu nehmen.*

Oder:

Rp. 2333.

*Magnes hydro-oxydat. recenter parat. in Aqu. 200·0.*

*D. S. Der dritte Theil auf einmal, dann alle 10 Minuten 1 Esslöffel.*

Danach noch Abführmittel und Diuretica behufs racher Eliminirung des Arsens, sowie symptomatische Behandlung der Folgezustände.

✓ **Chronische Vergiftung.** Symptome: Röthung der Coniunctiva, Pharyngitis, Verdauungsbeschwerden, Cardialgien, Ausfall der Haare, zunehmende Kachexie mit erdfahler Verfärbung der Haut, Neuralgien, Lahmungen.

Therapie: Symptomatische Behandlung, Elektrisiren der gelähmten Muskeln; versuchsweise Jodkalium.

**Atropin** vide Belladonna.

**Barytverbindungen.** Symptome: Bei Barythydrat und kohlensaurem Baryt heftige Entzündung des Magens bis zur Perforation, bei den neutral reagirenden Barytsalzen geringe Localerscheinungen, dagegen profuse Durchfälle, Pulsverlangsamung, Convulsionen.

Therapie:

Rp. 2334. *Natr. sulfuric. 20·0,*

*Aqu font. 150 0.*

*S. Alle 5 Minuten 1 Esslöffel.*

Danach noch Brechmittel zur Entfernung des gelösten schwefelsauren Baryts. Bei Vergiftung mit Barythydrat und kohlensaurem Baryt keine Brechmittel, sondern Behandlung der Gastritis, wie bei Actzalkalien (s. das.).

**Belladonna.** Symptome: Trockenheit und Brennen im Munde und Schlunde, Heiserkeit, Schluckbeschwerden (nach Genuss von Tollkirschen häufig Uebelkeit und Erbrechen). Röthung des Gesichtes, Beschleunigung des Pulses, starkes Pulsiren der Carotiden, Erweiterung und Starrheit der Pupille mit hochgradigen Sehstörungen bis zu Blindheit, Schwindel, schwankender Gang, Kopfschmerz, Muskelzuckungen, Hallucinationen, Delirien, selbst Tobsuchtsanfälle, gesteigerter Bewegungstrieb, Convulsionen, Trismus, manchmal scharlachähnliches Exanthem.

Therapie: Magenpumpe oder Brechmittel, bei Vergiftung mit den Beeren auch ein Abführmittel. Ferner Tannin (Rp. 2321), eventuell eine Abkochung von Eichen- oder Chinarinde. Als Antidot:

Rp. 2335.

*Pilocarpin. muriat. 0·1,*

*Aqu. destill. 10·0.*

*D. S. Viertelstündlich eine Spritze zu injiciren,  
bis der Mund wieder feucht wird.*

Ferner wird als Gegengift empfohlen:

Rp. 2336.

*Jod. pur. 0·2,*

*Kal. iodat. 2·0,*

*Aqu. font. 300·0.*

*D. S. Alle 5 Minuten 1 Weinglas voll.*

Auch Chloralhydrat (3·0 p. dos. mehrmals) und Chloroforminhalation werden empfohlen, ebenso von vielen Seiten Morphin-Injectionen. Symptomatisch gegen die Sehstörungen Einträufelung von 1<sup>o</sup>/<sub>10</sub>iger Pilocarpin- oder Eserin-Lösung ins Auge. Gegen die Congestionen Eisumschläge auf den Kopf; Essigklystiere. Versucht auch gegen die Circulationsstörungen:

Rp. 2337.

*Physostigmin. salicylic. 0·01,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*S. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

**Bilsenkraut** wie bei Belladonna.



**Blausäure.** Symptome: Mühsame, sehr verlangsamte Respiration, Verlangsamung der Herzthätigkeit, Schwächerwerden des Pulses, Verlust des Bewusstseins, der Sensibilität, klonische und tonische Krämpfe, Protrusion der Bulbi, Pupillenerweiterung, Geruch des Athems nach Blausäure.

Therapie: Möglichst rasches Erregen von Erbrechen durch Reizung des Gaumens mittelst Fingers oder Federbartes, Magenschlauch, wenn derselbe rasch bei der Hand-Excitantia (Aether- Campher-Injection, Alkohol); kalte Begiessungen im warmen Bade, künstliche Respiration. Bei Vergiftung mit bitteren Mandeln Darreichung von Salzsäure:

Rp. 2338.

*Acid. muriatic. dilut. 2·0,*  
*Aqu. font. 100·0.*  
*S. Kaffeelöffelweise.*

**Bleiverbindungen.** a) **Acute Vergiftung:** Symptome: Metallgeschmack, Brennen im Schlund, Oesophagus und Magen, Erbrechen grauweisser Massen, mitunter Entleerung blutiger Stühle: weiterhin Kolik, Verstopfung, fötider Athem, Schmerzen in den Beinen, Schwindel, hochgradige Pulsverlangsamung, Mattigkeit, Kopfschmerz, Lähmungserscheinungen der Extremitäten, Bewusstlosigkeit.

Therapie: Magenschlauch, Brechmittel, Eiweiss, Milch, Abführmittel, am besten Natrium sulfuricum und Magnesium sulfuricum:

Rp. 2339.

*Magnes. sulfuric. 30·0,*  
*Aqu. font. 300·0.*  
*S. Auf 2mal innerhalb 10 Minuten.*

b) **Chronische Bleivergiftung,** die sich aus der acuten entwickelt oder durch längere Einwirkung kleiner Mengen des Giftes entsteht:

Symptome: Fahle Hautfarbe, Bleisaum des Zahnfleisches, Verdauungsstörung, langsamer, harter Puls, Abmagerung (Cachexia saturnina), Kolik, Verstopfung, selten Durchfall, Schmerzen in den Gelenken, Tremores, Contracturen der Beugemuskeln, Anästhesien, Lähmung der Extensoren, Nephritis, Delirien, Epilepsie, Amaurose.



Therapie. In prophylaktischer Beziehung entsprechende Fabrikshygiene, Sorge für ausreichende Ventilation, Abzugsschächte, Tragen von Respiratoren seitens der Arbeiter, häufige Waschungen und Bäder, besondere Arbeitskleider, Essen und Rauchen nur in vor Blei geschützten Räumen und nach vorheriger Reinigung des Gesichts und der Hände. Gegen die Krankheit selbst Aussetzen der Beschäftigung mit Blei geboten. Behufs rascherer Ausscheidung des Bleis Diaphoretica, Jodkalium.

Rp 2340.

*Kal. iodat.* 2·0—4·0,

*Aqu. font.* 100·0,

*Syr. simpl.* 20·0.

*S. In einem Tag zu verbrauchen.*

Gegen die Kolik Opium in grossen Dosen, Chloroform, auch Atropin empfohlen:

Rp. 2341.

*Extr. Opii aquos.* 0·3,

*Sacch. alb.* 3·0.

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ* Nr. 12.

*D. S. 3mal täglich 1 Pulver.*

Rp. 2342.

*Chloroform.* 2·0,

*Mucilag. gumm. Arabic.* 50·0,

*Aqu. dest.* 100·0,

*Syr. simpl.* 20·0.

*D. S. 1—2 stündlich 1 Esslöffel*

Rp 2343.

*Atropin. sulfuric.* 0·01,

*Aqu. dest.* 10·0.

*S. ½ -1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

Gegen die Verstopfung Abführmittel, Calomel, Magnes. sulfuric. selbst Crotonöl, (s Rp. 320); gegen die Arthralgie und Lähmungen Schwefelbäder, Elektrizität.

**Botulismus** vide Wurstgift.

**Brechweinstein** vide Antimonverbindungen.

**Brom und Bromverbindungen.** Symptome: Nach der Einnahme grösserer Mengen von Brom oder Bromwasser heftige Schmerzen in den ersten Wegen, Erbrechen, Durchfall, Schwindel, Collaps. Nach Einathmung von Bromdämpfen Conjunctivitis, Thränenfluss, Coryza, Salivation, Suffocationsgefühl, Husten, Bronchitis, hie und da selbst lobuläre Pneumonie. Nach längerem Gebrauch grösserer Dosen von Bromsalzen entsteht leicht Bromismus, bestehend in nervöser Depression, Neigung zu Schlaf, Kopfschmerz, Hustenanfällen, Geruch der Exhalationsluft nach Brom, Herabsetzung der geschlechtlichen Potenz, pustulösen Hautausschlägen, endlich allgemeiner Kachexie.

Therapie: Bei acuter Bromvergiftung Stärkekleister oder Eiweisslösungen, ferner:

Rp. 2344.

*Acid. carbolic. 0·5,*

*Aqu. dest. 100·0.*

*S. Alle 10 Minuten 1 Esslöffel in  $\frac{1}{2}$  Glas Eiweisswasser.*

Nach Einathmung von Bromdämpfen Inhalationen von Ammoniak. Bei Bromismus Aussetzen des Medicaments, roborirende Diät, warme Bäder.

**Brucin** vide Strychnin.

**Calabarbohnen. (Physostigmin.)** Symptome Unruhe, Taumeln, Erbrechen, mitunter Diarrhoe, Muskelschwäche und Steifigkeit, Trübung des Gesichts, Salivation, Thränenfluss, starke Schweisse, Schwäche und Unregelmässigkeit des Pulses, Dyspnoe, Collaps, selten Convulsionen (Pupillenverengung bei interner Einnahme selten)

Therapie: Brechmittel, wenn nicht ohnehin Erbrechen besteht; Injection von Atropin (Rp. 2343), Excitantia, künstliche Respiration.

**Canthariden.** Symptome: Brennende Schmerzen und Blasenbildung im Munde und an der Zunge, Schlingbeschwerden, grosser

Durst, Speichelfluss, Brennen im Magen, Erbrechen, bisweilen Durchfall mit Tenesmus; Schmerzen in der Nierengegend, vermehrter Harndrang mit Brennen in der Urethra, im Harn Eiweiss, Cylinder, Blut, bei Männern hie und da Priapismus, bei schwangeren Frauen öfter Abortus; ferner Kopfschmerz, Schwindel Temperaturherabsetzung, Verminderung des Pulses, Collaps, in sehr schweren Fällen auch Dyspnoe und Convulsionen. (Auch bei Application auf die Haut, Anwendung von Blasenpflastern, erfolgt Resorption des Giftes.)

Therapie: Magenpumpe oder Brechmittel; schleimige Getränke, (*Mixtura gummosa*, Leinsamenabkochung oder Rp 2320); ölige Mittel dagegen zu meiden. Senfteige oder Schröpfköpfe in Magen- und Nierengegend; gegen die Harnbeschwerden reichliches Trinken von warmem Thee, warme Sitz oder Vollbäder; Injectionen von warmem Wasser in die Blase, innerlich Opiate, z. B.:

Rp 2345.

*Mixtur. gummos. 150·0,*

*Tinct. Opii simpl. 20.*

*D. S. Alle Stunden 1 Esslöffel.*

**Carbolsäure.** Symptome: Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen, Blässe des Gesichts, Erbrechen, unregelmässige Athmung, Schwächerwerden des Pulses, in schweren Fällen Bewusstlosigkeit, manchmal Krämpfe, Temperaturherabsetzung, stertoröses Athmen, Verengung der Pupille, Herzschwäche. Der Harn meist dunkelgrün gefärbt, enthält fast stets Eiweiss und Cylinder, bisweilen freies Haemoglobin.

Therapie: Vorsichtige Einführung der Magensonde und reichliches Auswaschen des Magens; Zuckerkalk in concentrirter Lösung, ferner Natrium sulfuricum; Milch, schleimige Mittel; Excitantia, künstliche Respiration.

**Chinin.** Symptome: Magenschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Oedem des Gaumens, Ohrensausen, Schwerhörigkeit, Sehstörungen, Somnolenz, Hallucinationen, Cyanose, Abortus, Haemoglobininurie und Albuminurie.

Therapie: Tannin, (Rp. 2321), Analeptica.

**Chlor.** Symptome: Brustbeklemmung, Husten, Dyspnoe, Cyanose; nach Einnahme von Chlorwasser Erbrechen und Magenschmerzen; bei Inhalation von viel Chlorgas kann sofortiger Exitus erfolgen.

Therapie: Einathmen von Wasserdämpfen, Narcotica; bei vom Magen aus erfolgender Vergiftung Emetica, Eiweiss, Milch.

**Chloralhydrat.** a) Acute Vergiftung. Symptome: Rötlung der Coniunctiva, Schwellung der Epiglottis, Magenschmerzen, Icterus; Gesichtsfeldverdunkelung bis zu vollständiger Blindheit, Erythem oder bläschenförmiges Exanthem, Bronchitis, Dyspnoe, Schwindel, Schwäche des Pulses; in schweren Fällen Delirien, Herabsetzung der Temperatur, hochgradige Herzschwäche, Cyanose, Aussetzen der Respiration, manchmal auch sofortiger Collaps und Tod.

Therapie: Emetica oder Magenpumpe, künstliche Respiration, Faradisation des Phrenicus. Analeptica wie Aether oder Moschus; empfohlen auch:

Rp. 2346.

*Tinct. Capsic.,*

*Liqu. Ammon. anisat. aa 1·0,*

*Mucilag. gumm. Arabic. 30·0,*

*Aqu. font. 120·0.*

*S. Zum Klystier.*

Ferner:

Rp. 2347.

*Atropin. sulfuric. 0·01,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*S. 1/2—1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren.*

b) Chronische Vergiftung. Symptome. Verdauungsstörungen, Abmagerung; Anschwellung des Zahnfleisches, Bläschenbildung auf der Zunge, Icterus, Durchfälle, Ausfall der Haare, Geschwüre an der Haut, neuralgische und Muskelschmerzen, allgemeine Schwäche, Herzklopfen, Angstgefühl, Dyspnoe, Albuminurie, Schwachsinn.

Therapie: Entziehung des Mittels, zum Ersatz desselben, wenn nothwendig, Paraldehyd oder Amylenhydrat; symptomatische Behandlung, roborirende Diät, Arsen, warme Bäder.

(Prophylaxis: Bei Herzkranken, sowie bei Delirium tremens Chloralhydrat nicht zu verwenden.)

**Chloroform** vide Aether.

**Chromsaure Salze.** Symptome: Schmerzen, Gelbfärbung und entzündliche Schwellung in Mund und Schlund, Erbrechen von gelben, oft auch bluthaltigen Massen, Leibschmerzen, Durchfall, Harnverhaltung, Albuminurie und Haematurie, Schwindel, Dyspnoe, Bewusstlosigkeit, hie und da Convulsionen.

Therapie: Ausspülung des Magens. Hierauf:

Rp. 2348. *Magnes. carbonic.* 10·0,

*Aqu. font.* 300·0.

*D. S. In 3 Portionen im Laufe einer Viertelstunde zu nehmen.*

Oder noch besser:

Rp. 2349. *Plumb. acetic.* 0·2,

*Natr. bicarbon.* 2·0.

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. Nr. 4.*

*D. S. Alle 10 Minuten 1 Pulver.*

Danach nochmalige Ausspülung des Magens. Weiterhin symptomatische Behandlung der Entzündungen.

**Cocain.** a) **Acute Vergiftung:** Symptome: Aufregungszustände, Pupillenerweiterung, danach Collaps, kalter Schweiss, Pulsverminderung, häufig Convulsionen.

Therapie: Einathmung von Amylnitrit; Excitantia.

b) **Chronische Vergiftung.** Symptome: Schlaflosigkeit, Anästhesien und Parästhesien, Verdauungsstörungen, Energielosigkeit, Marasmus.

Therapie: Allmälige oder plötzliche Entziehung, nur bei Anstaltsbehandlung durchzuführen.

**Codein** vide Morphin.

**Coffein.** Symptome: Herzklopfen, Schwindel, Zittern und Steifheit der Muskeln, Tod durch Herzlähmung.

Therapie: Brechmittel, Einathmung von Amylnitrit, Hautreize, künstliche Athmung.



**Colchicin. Colchicum.** Symptome: Gewöhnlich erst nach einigen Stunden Brennen im Munde, Würgen, Durst, Kolik. Erbrechen, Entleerung reiswasserähnlicher, oft auch blutiger Stühle, Praecordialangst, Schwindel, Delirien, Collaps, kleiner, unregelmässiger Puls, Convulsionen, bisweilen ein scharlachähnliches Exanthem.

Therapie: Brechmittel, warme Milch, schleimige Getränke, gegen die Durchfälle Opium, gegen das Erbrechen Eis. Als Antidot allenfalls Tannin, z. B.

Rp. 2350.

*Acid. tannic. 5·0,*

*Extr. Opii aquos. 0·2,*

*Aqu. dest. 200·0.*

*S. Alle 5 Minuten 1 Esslöffel.*

Bei Collaps Analeptica.

**Coniin.** Symptome: Brennen im Halse, Erbrechen, Schmerz im Magen und Darm, Schwindel, Pupillenerweiterung, Convulsionen, Schlingbeschwerden, Sinken des Pulses und der Temperatur, Ohnmacht, mühsame Respiration, neuralgische Schmerzen, Tod durch Respirationslähmung.

Therapie: Brechmittel, Tannin, Excitantia, frische Luft, künstliche Athmung.

**Crotonöl.** Symptome. Brennen im Mund und Schlund, Erbrechen, heftige Diarrhöe mit Leibschmerzen, Benommenheit, Schwindel, kalter Schweiß, Cyanose, Collaps, Asphyxie.

Therapie: Eisstückchen, Milch, schleimige Getränke, Opium, warme Bäder.

Rp. 2351.

*Emuls. amygdalin. 100·0,*

*Tinct. Opii simpl. 2·0.*

*S.  $\frac{1}{2}$ stündlich 1 Esslöffel.*

Rp. 2352.

*Extr. Opii aquos. 0·2,*

*Mucilag. gumm. Arabic. 20·0,*

*Aqu. font. 150·0.*

*S. Zu 2 Klystieren.*

Bei Collaps Analeptica, Cognac, Aether, Kampher.



**Cuprum** vide Kupferverbindungen.

**Curare** Symptome: Lähmung aller willkürlichen Muskeln, Kreislauf ungestört, Tod durch Lähmung der Athmungsmuskeln.)

Therapie: Wenn das Gift in Wunden eingedrungen, Entfernung durch Ausschneiden, Ausspülen etc. Gegen die Athmungsbeschwerden künstliche Respiration, Strychnin-Injectionen empfohlen.

**Cyankali** vide Blausäure.

**Datura Stramonium** vide Belladonna.

**Digitalis.** Symptome Kopfschmerz und Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Durst, Schmerzen in der Magengegend, Singultus, Koliken, Durchfall, Herzklopfen, Pulsverlangsamung, Kälte der Extremitäten, Flimmern vor den Augen, Harnverhaltung, Hallucinationen, Delirien, später Pulsbeschleunigung, zeitweises Aussetzen der Herzthätigkeit.

Therapie: Wenn nicht ohnehin Erbrechen erfolgt ist, Magenschlauch oder ein Brechmittel; Tannin (Rp. 2321), starker schwarzer Kaffee mit Rum oder Cognac, bei hartnäckigem Erbrechen Eis, Morphinum, gegen die Magenschmerzen kalte Umschläge, Senfteige. Im Übrigen Excitantia, Aether, Campher, oder:

Rp. 2353.

*Mosch. opt.* 0·5,

*Aether sulfuric.* 15·0.

*S. Stündlich 5—10 Tropfen.*

**Duboisin** vide Belladonna.

**Eisenchlorid und Eisenvitriol.** Symptome. Erbrechen, Durchfall mit Entleerung schwarzer Massen, Schmerzen im Unterleibe, Prostration.

Therapie: Brechmittel, Magenschlauch, Milch, Eiweiss, schleimige Getränke, Abführmittel.

**Ergotin** vide *Secale cornutum*.

**Ferrum sesquichloratum et sulfuricum** vide Eisenchlorid.

**Fingerhut** vide Digitalis.

**Fischgift, Fleischgift** vide Wurstgift.

**Fliegenpilz** vide Pilze.

**Grubengas** vide Kloakengas und Kohlendunst.

**Grünspan** vide Kupferverbindungen.

**Herbstzeitlose** vide Colchicin.

**Höllenstein** vide Argentum nitricum.

**Hydrargyrum** vide Quecksilberverbindungen.

**Hyoscyamus** vide Belladonna.

**Jod und seine Salze.** Symptome: Nach Einathmung von Joddämpfen Schnupfen, Augenthränen, Husten, Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrensausen. Nach innerlicher Einnahme von Jodtinctur Brennen im Mund und Schlund, Erbrechen dunkelgelber oder bei gleichzeitiger Anwesenheit von Amylum im Magen blauer Massen, heftige Magenschmerzen, Diarrhöe, Kleinheit des Pulses, Anurie, Collaps. Bei größeren Dosen von Jodsalzen oder bei Idiosynkrasie gegen dieselben: Jodschnupfen, Dyspnoe, Husten, Speichelfluss, Anurie, Haematurie, Hautausschläge. Bei längerem Gebrauch der Jodsalze Jodismus, charakterisirt durch blasser, fahle Hautfarbe, Abmagerung, Verdauungsstörungen, Herzklopfen.

Therapie: Emetica (wenn nöthig); ferner Stärkeabkochungen, Eiweiss, Magnesia. In neuerer Zeit empfohlen:

Rp. 2354.

*Natr. subsulfuros. 15 0,*

*Aqu. dest. 200 0.*

*S. Der dritte Theil auf einmal, dann alle 10 Minuten 1 Esslöffel.*

Symptomatische Behandlung der Gastroenteritis: Eis, Opiate etc; bei Collaps Analeptica. Bei chronischer Vergiftung Aussetzen des Mittels; Hebung der Ernährung.

**Jodoform.** Symptome: Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, manchmal Erbrechen und Durchfall; Kleinheit und erhöhte Frequenz des Pulses, in schweren Fällen öfter *Psychosen*; bisweilen Tod unter Fiebererscheinungen

Therapie: Entfernung des Jodoforms aus Wunden.  
Zufuhr von Alkalien, namentlich empfohlen:

Rp. 2355.

*Kal. bicarbonic. 15·0,*

*Aqu. dest. 200·0.*

*S. Alle 10 Minuten 1 Esslöffel.*

**Juniperus Sabina.** Symptome. Breunen im Schlund und Magen, Erbrechen nach Sabina riechender Massen, blutiger Stuhl und Harn, Harnzwang, Krämpfe, Gefühls- und Bewusstlosigkeit. Erscheinungen von Peritonitis, Uterusblutungen, bei schwangeren Frauen Abortus.

Therapie: Möglichst schnelle Entfernung des Giftes; symptomatische Behandlung durch Emollientien, Excitantien etc. Siehe auch unter „Crotonöl.“

**Kali chloricum.** Symptome: Übelkeit, Erbrechen, von meist schwarzgrünlichen Massen, Schmerzen im Magen, Diarrhöe, Icterus, grauviolette Flecke auf der Haut, Schmerzen in der Nierengegend, Oligurie oder selbst Anurie, der Harn rothbraun bis schwarz, eiweiss- und methämoglobinhaltig; Kopfschmerzen, Benommenheit, Convulsionen, Herzschwäche; in sehr vielen Fällen schon wenige Stunden nach der Einnahme des Giftes neben Erbrechen und Diarrhöe hochgradige Dyspnoe, Cyanose, Collaps.

Therapie: Vorwiegend symptomatisch, gegen die Gasteroenteritis und den Collaps gerichtet. Ferner Diuretica, namentlich Liquor Kali acetici. Wenn kein Collaps besteht, auch:

Rp. 2356.

*Pilocarpin. muriatic. 0·15,*

*Aqu. dest. 10·0.*

*S. 1 2 Pravaz'sche Spritzen zu injiciren.*

Eventuell Infusion einer 0·6<sup>0</sup>/<sub>0</sub>igen Kochsalzlösung.

**Kalilauge** vide Alkalien.

**Kalk** vide Alkalien.

**Kleesäure** vide Oxalsäure.

**Kloakengas (Schwefelwasserstoff).** Symptome: Schwindel, ~~Kopfschmerz~~ Übelkeit, Ohnmacht, allgemeine Schwäche, Bewusstlosigkeit mit Cyanose, erhöhter Pulsfrequenz, dyspnoetischem, ~~stertorösem~~ Atmen, Albuminurie, Convulsionen; nicht selten ~~fortgesetztes~~ Coma mit baldigem Tod.

Therapie: Zufuhr frischer Luft; wenn Deiecte verschluckt wurden, ein Emeticum, aber kein metallisches. Einathmenlassen von Chlor durch Vorhalten eines mit Chlorwasser oder Chlorkalk getränkten Tuches, eventuell auch:

Rp. 2357.

*Hydrog. n. hyperoxydat. 2·0,*

*Aqu. dest. 100·0.*

*S Theelöffelweise.*

Ferner Analeptica, kalte Begiessungen, Aether-Campher-  
Injectionen: bei aussetzender Respiration künstliche Athmung, Kochsalz-Infusion.

**Kohlendunst, Kohlenoxyd.** Symptome: Kopfschmerz, Ohrensausen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Röthung des Gesichtes, rauschartige Benommenheit, Krämpfe, unwillkürlicher Abgang von Koth, Harn und Sperma, Lähmung, Puls anfangs beschleunigt, dann langsam, unregelmässig; Bewusstlosigkeit, Asphyxie.

Therapie: Frische Luft, erhöhte Lage des Kopfes, kalte Begiessungen, Essigklystiere, Frottiren; starker, schwarzer Kaffee, subcutane Injectionen von Aether und Kampher; Faradisation des Phrenicus, künstliche Athmung, Transfusion von defibrinirtem Blut oder Infusion einer 0·6<sup>o</sup>/<sub>10</sub>igen Kochsalzlösung.

**Kreosot** vide Carbolsäure.

**Kupferverbindungen.** Symptome: Erbrechen grünlich oder blau gefärbter Massen, Magenschmerzen, Kolik, Durchfall mit blutigen, grünlich gefärbten Stühlen; nach Grünspann-ergiftung: Schwellung der Augenlider; Schwindel, Anästhesie, bisweilen Haematurie, Delirien, Convulsionen, bisweilen Icterus.

Therapie: Entleerung des Magens und Darmes (Ricinöl zu meiden), Eiweiss, Milch, Magnesia usta, Limatura Ferri, Milchzucker, Thierkohle (10·0 in 100·0 Wasser aufgeschüttelt).

Rp. 2358.

*Ferr. pulverat. 15·0,*

*Sulf. sublimat. 8·0.*

*Misce exacte. Adde ad:*

*Aqu. font.,*

*Syr. simpl. āā 40·0.*

*D. S. Alle 5 Minuten 1 Kaffeelöffel. (Gut umzuschütteln.)*

**Lapis** vide Argentinum nitricum.

**Leuchtgas** vide Kohlendunst.

**Mercurialien** vide Quecksilberverbindungen.

**Morcheln** vide Pilze.

**Morphin (Opium).** a) **Acute Vergiftung.** Symptome Schwindel, Ohrensausen, Funkensehen, geröthete Haut, Hautjucken mit oder ohne Exanthem, Trockenheit im Munde, starke Schweisse, lebhafter Harndrang, hie und da Erbrechen, Pupillen sehr verengt; allmählich zunehmende Schlafsucht. Betäubung (oft nach vorhergehender rauschartiger Aufregung), hochgradige Verlangsamung und Schwäche des Pulses, Kälte und Cyanose des Gesichts und der Extremitäten, verlangsamte Respiration, bisweilen Convulsionen.

Therapie: Magenpumpe, (Brechmittel meist wirkungslos), Ausspülung des Magens mit Thee oder Kaffee, Tannin (Rp. 2321), oder gerbsäurehaltigen Abkochungen; Analeptica, Senfteige, kalte Begiessungen, Essigwaschungen, Herumführen des Kranken, innerlich Kaffee, Alcohol etc.

Rp. 2359.

*Ammon. pur. liquid. 10·0.*

*S. 2—3 Tropfen in 1 Gläschen Cognac.*

Bei Störungen der Athmung künstliche Respiration, Einathmenlassen von einigen Tropfen Amylnitrit, Inha-



lation von Sauerstoff, Faradisation der Phrenici. Als wirksamstes Antidot des Morphins gilt:

Rp. 2360.

*Atropin. sulfuric. 0.02,*

*Aqu. dest. 10.0.*

*S. Injection.*

- b) **Chronische Vergiftung.** Symptome: Appetitlosigkeit, Abmagerung, Myosis, Tremor, Verlust der Potenz, Schlaflosigkeit, Neuralgien, schleppender Gang, Angstgefühl, Geisteskrankheiten.

Therapie: Plötzliche oder allmähliche Entziehung unter strenger Überwachung des Kranken, fast nur bei Anstaltsbehandlung durchzuführen. Als Ersatzmittel und zur Linderung der Abstinenzerscheinungen zeitweilige Darreichung von Chloralhydrat, Bromsalzen, Cocain, aber auch die Angewöhnung an eines dieser Mittel strenge zu verhüten.

**Mutterkorn** vide *Secale cornutum*.

**Nicotin** vide *Tabak*.

**Nitrobenzol.** Symptome: Blässe, bleigraues oder livides Aussehen, Erbrechen, Benommenheit des Sensoriums, mit allmählichem Übergang in Coma, Pupillen anfangs eng, später erweitert, unregelmässiger Puls, verlangsamte Athmung, Sinken der Körpertemperatur, blauschwarz gefärbte Hypostasen.

Therapie: Brechmittel, Magenpumpe, Abführmittel (ölige und spirituöse Mittel dabei zu meiden); kalte Begiessungen, Frottiren der Haut, künstliche Respiration, eventuell Transfusion defibrinirten Blutes oder Infusion einer 0.6%igen Kochsalzlösung.

**Nitroglycerin.** Symptome Breunen im Hals, heftige Kopfschmerzen, Röthe des Gesichts, Schweisse, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhöe, Schwäche oder Lähmung der Muskeln, Athmung anfangs beschleunigt, später verlangsamt, stertorös, Pulsverlangsamung.

Therapie: Entfernung des Giftes aus Magen und Darmcanal, Analeptica, namentlich starker schwarzer Kaffee; Ergotin-Injectionen.

**Nux vomica** vide *Strychnin*.



**Oleum Crotonis** vide Crotonöl.

**Opium** vide Morphinum.

**Oxalsäure.** Symptome: Brennen in Mund und Schlund, Schlingbeschwerden, die Schleimhaut des Mundes und Rachens roth und theilweise weisslich verfärbt, Würgen, Erbrechen (das Erbrochene häufig blutbaltig), Schmerzen im Unterleib; Anurie oder Oligurie, der Harn eiweiss- und zuckerhaltig; Kriebeln und Gefühl von Taubheit in den Extremitäten, später Lähmung derselben, Sinken der Puls- und Athmungsfrequenz sowie der Körpertemperatur, Erweiterung der Pupille, Collaps, Trismus, Tetanus.

Therapie: Magenpumpe und Brechmittel zu meiden. Aqua Calcis, weinglasweise, Zuckerkalk oder:

Rp. 2361.

*Calcii carbonic. 30·0,*

*Aqu. dest. 250·0.*

*S. Der dritte Theil auf einmal zu nehmen, dann alle 10 Minuten 1 Esslöffel.*

Statt Kalk auch Magnesia, Magnes. usta in Aqu. oder:

Rp. 2362.

*Magnes. carbonic. 15·0,*

*Aqu. dest. 250·0.*

*S. Wie das Vorige.*

Symptomatische Behandlung der Gastroenteritis durch Eis, Narcotica, kalte Umschläge, Senfteige. Gegen die Anurie Diuretica und Diaphoretica. Bei Collaps Excitantia.

**Phosphor.** Symptome: Einige Zeit, meist mehrere Stunden nach Einnahme des Giftes Schmerzen in der Magengegend, Erbrechen nach Knoblauch riechender, im Dunkeln leuchtender Massen, starker Durst, Diarrhöe, häufig mit bluthaltigen, im Dunkeln leuchtenden Dejectionen, am 2 bis 3. Tage Icterus, Vergrösserung der Leber, häufig auch der Milz, Albumen und oft auch Blut im Harn. Hierauf in günstigen Fällen Remission der Erscheinungen, in schweren jedoch erneutes Erbrechen, Kopfschmerzen, zunehmende Schwäche, Blutung aus Nase und Uterus, Fieber, Beschleunigung und Unregelmässigkeit des Pulses, Tremores, Lähmungen der Muskeln, Ohrensausen, Flimmern vor den

Augen, Somnolenz, Coma. In manchen Fällen schon wenige Stunden nach stattgehabter Vergiftung neben der Gastroenteritis Convulsionen und Bewusstlosigkeit

Therapie: Magenpumpe oder ein Brechmittel, am besten Cuprum sulfuricum.

Rp. 2363.

*Cupr. sulfuric. 1·0,*

*Aqu. font. 60·0.*

*D. S.  $\frac{1}{4}$  stündlich 1 Esslöffel.*

Ist wiederholtes Erbrechen eingetreten, Cupr. sulfuric. noch in reducirter Dosis weiterzugeben oder:

Rp. 2364.

*Cupr. carbonic. 0·5,*

*Aqu. dest. 80·0,*

*Spr. simpl. 20·0.*

*S.  $\frac{1}{2}$  stündlich 1 Esslöffel.*

Nach einigen Stunden wieder Cupr. sulfuric. in voller Gabe oder ein anderes Brechmittel. Dazwischen Eis, schleimige, sowie auch alkalische Getränke und Excitantien. Zu meiden dagegen Milch, und alle öligen und fetten Mittel und Speisen. Sehr bewährt hat sich auch:

Rp. 2365.

*Ol. Terebinthin. crud. et rectif. 10·0,*

*Mixtur. gummos. 300·0,*

*Syr. cort. Aurant. 20·0.*

*D. S.  $\frac{1}{4}$  stündlich 1 Esslöffel.*

Weniger sicher wirkt.

Rp. 2366.

*Magnes. ust. in Aqu. 30·0,*

*Aqu. Chlor. 120·0.*

*D. S. Wie das Vorige.*

(Neuestens wurde empfohlen, den Magen mit einer rosarothten Lösung von Kali hypermanganicum auszuspülen und hernach diese Lösung esslöffelweise nehmen zu lassen.

Weiterhin symptomatische Behandlung.

**Physostigmin** vide Calabarbohnen.

**Pilocarpin.** Symptome: Speichelfluss, Schweisssecretion, Brechdurchfall, Pupillenverengung, Unregelmässigkeit des Pulses, Collaps, Lungenödem.

Therapie: Excitantia, Magenpumpe (wenn nöthig), Atropin-Injectionen (Rp. 2360.).

**Pilze.** Symptome: Erbrechen, Durchfall mit schleimigen und blutigen Stühlen, Leibschmerzen; rauschartige Betäubung, Kopfschmerz, Mydriasis, Sebstörungen, Delirien, Pulsverlangsamung, Convulsionen; bei Morchelvergiftung häufig Icterus und Haemoglobinurie.

Therapie: Entleerung des Magens, Abführmittel, Thee, Kaffee, Tannin (Rp. 2321), Excitantia. Bei Fliegenpilzvergiftung Atropin Injection (Rp. 2360), bei Morchelvergiftung Diuretica. Prophylaktisch gegen die letztere mehrmaliges Abbrühen der Morehlen mit heissem Wasser vor dem Genuss und Weggiessen des Kochwassers.

**Quecksilberverbindungen.** a) **Acute Vergiftung** (meistens durch **Sublimat**). Symptome: Herber Metallgeschmack, Anschwellung der Lippen, grauweisser Belag der Mundschleimhaut und Zunge, Brennen und Gefühl von Zusammengeschnürtsein des Schlundes, Erbrechen schleimigblutiger Massen, Kolik, schmerzhafte, blutige Durchfälle, Tenesmus; Anurie oder Oligurie, im Harn Eiweiss, häufig Blut; Pulsverminderung, kalter Schweiss, Ohnmachten, Anaesthesie, namentlich der unteren Extremitäten, Convulsionen; wenn nicht schon in den ersten Stunden Exitus erfolgt, nach 1–2 Tagen heftige Stomatitis mit Fieber, Ulceration des Zahnfleisches, Glossitis, häufig Glottisödem

Therapie: Wenn nicht Erbrechen besteht, Hervorrufung desselben durch Kitzeln des Gaumens oder durch Apomorphin-Injection; Magenpumpe nur mit Vorsicht wegen der Anätzung des Oesophagus und Magens. Hauptsächliches Antidot Eiweiss; ferner Milch, Magnes. ust. (Rp. 2333), Kohle (in Wasser aufgeschweimt), Schwefel-eisen (Rp. 2358). Ferner Behandlung der Gastroenteritis, Eis, Narcotica, milde Abführmittel (Ol. Ricini), gegen den

Tenesmus Wasserklystiere, Eisumschläge, Opium-Suppositorien. Gegen die nachfolgende Stomatitis Kali chloricum als Mund- und Gurgelwasser. Bei Collaps Analeptica

- b) **Chronische Vergiftung.** Symptome Blässe des Gesichts, andauernde Stomatitis mit Ulcerationen der Schleimhaut und selbst Kiefernekrose, Verdauungsstörungen, Durchfälle, nervöse Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Arthralgien, An- und Hyperästhesien, Tremor und Zuckungen der verschiedensten Muskelgruppen, namentlich bei intendirten Bewegungen, Nephritis, Ausbleiben der Menstruation, Herzschwäche, Athmungsbeschwerden.

**Therapie:** In prophylactischer Beziehung strengste Reinlichkeit, namentlich fleissiges Reinigen des Mundes, häufige Lüftung der Arbeitsräume, sofortiges Aussetzen der Arbeit mit Quecksilberverbindungen bei den ersten Anzeichen von Intoxication. Bei ausgebrochener Krankheit Entfernung aus der Quecksilberatmosphäre, resp. Aussetzen der Arbeit, warme Bäder, Schwefelbäder, innerlich Jodkalium (Rp. 2340), in neuerer Zeit auch Bromkalium empfohlen; roborirende Kost, sorgfältige Behandlung der Stomatitis, gegen die Tremores Elektricität.

**Sabina, Sadebaum** vide Juniperus Sabina.

**Salpetersäure.** Symptome: Schmerzen im Mund, Schlund, Magen, Erbrechen von meist gelblichen, oft mit Blut untermengten Massen, Schlingbeschwerden, gelbe Verfärbung der Mund- und Rachenschleimhaut, Schmerzhaftigkeit und Auftreibung des Abdomens, Stuhlverstopfung, seltener Durchfall, Verminderung der Harnsecretion, Collaps, oft auch Glottisödem

**Therapie:** Brechmittel und Magenschlauch zu meiden. Reichliche Zufuhr von Getränk, zunächst Wasser, Eiweisswasser, Seifenwasser. Ferner Antacida, im Nothfall, bis andere Mittel herbeigeschafft sind, geschabte Kreide, Asche, Eierschalen. Dann Sodalösungen oder noch besser Magnesia usta in Aqua (Rp. 2333), sowie einhüllende Mittel, Haferschleim, Gummilösung (eventuell Rp. 2320) oder.

Rp. 2367.

*Ol. Amygdalar. dulc. 20·0,*

*Pulv. Gumm. Arabic. 10·0.*

*Fiat emulsio cum*

*Aqu. font. 250·0,*

*Syr. simpl. 20 0.*

*S. Alle 5 Minuten 1 Esslöffel.*

Behandlung der Gastroenteritis, Eispillen, eiskalte Getränke; bei hochgradigen Schlingbeschwerden Ernährung durch Klysmen, gegen die Schmerzen Narcotica, gegen die Schlingbeschwerden Cocain-Einpinselungen; bei Collaps Analeptica subcutan oder per Klyσμα. Gegen Glottisödem Tracheotomie.

**Salzsäure.** Symptome: Gastroenteritis, wie bei Salpetersäure, das Erbrochene meist blutig, manchmal gelblich bis gelblichgrün, die Mundschleimhaut meist angeätzt; Dysurie oder Harnverhaltung; häufig Nephritis, Albuminurie, Haematurie; Puls klein, frequent, Collaps.

Therapie: Wie bei Salpetersäure.

**Santonin.** Symptome: Gelbschen, Flimmern vor den Augen, Pupillenerweiterung, Geruchs- und Geschmackshallucinationen, Kopfschmerz, Schwindel, rauschartige Verworrenheit, Erbrechen, Taumeln, Zuckungen, Dyspnoe, Convulsionen, selbst Trismus und tetanische Krämpfe.

Therapie: Brechmittel, Magenausspülung, Abführmittel. Gegen die Krämpfe Chloroform-Inhalationen, Chloralhydrat.

**Scheidewasser** vide Salpetersäure.

**Schierling** vide Coniin.

**Schlangengift.** Symptome: Local je nach der Species manchmal ausser 2 punktförmigen Wunden gar keine Veränderungen, bei anderen Arten Anschwellung und Röthung der Bissstelle, Ödem der Umgebung, Lymphangioitis, Drüsenanschwellung, Blasenbildung an der Bissstelle, Phlegmone. Allgemeinerscheinungen: Angstgefühl, Zittern, Ohnmacht, später Kopfschmerz, Schwindel, Erbrechen, Dysphagie, Durchfall, Collaps mit kleinem, sehr frequentem



Puls, Kälte der Haut, Respirationsschwerden; in ungünstig verlaufenden Fällen häufig Blutungen aus den Körperöffnungen, Petechien, Convulsionen.

Therapie: Feste Ligatur oberhalb der Bisswunde, Aussaugen, Ausschneiden der Wunde, Auswaschung, Canterisation mit dem Glüheisen oder Aetzkali, empfohlen auch Injection einer 1<sup>0</sup>/<sub>6</sub> igen Lösung von hypermangan-saurem Kali in die nächste Umgebung der Wunde. Weiterhin Excitantia, Alcohol, Aether, Campher, Liqu. Ammon. caustic. (Rp. 2327); bei Erbrechen Eispillen, Leiter'scher Kühlapparat in die Magengegend; Diaphoretica behufs rascher Elimination des Giftes. Die Localerscheinungen nach allgemeinen chirurgischen Regeln zu behandeln.

**Schwämme** vide Pilze.

**Schwefelkohlenstoff.** Symptome Nach dem Verschlucken Kopfschmerz, Schwindel, Cyanose, Herzschwäche, Convulsionen. Nach dem Einathmen rauschartige Excitation, Sehstörungen, in schweren Fällen (bei mehr chronischer Vergiftung), Kopfschmerzen, Erbrechen, Schwäche, Ataxie und Anästhesie der Extremitäten, Sprach- und Sehstörungen, Schlaflosigkeit, Entwicklung von Psychosen.

Therapie: Bei Vergiftung durch Verschlucken Brechmittel; bei Vergiftung durch Einathmen dauernde Entfernung des Kranken aus der schädlichen Atmosphäre, warme Bäder, roborirende Diät. Empfohlen Strychnin.

Rp. 2268.

*Strychnin. nitric. 0·1,*

*Sacch. alb. 40.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. Nr. 20.*

*D. S. 3mal täglich 1 Pulver.*

Von Delpsch empfohlen Phosphor.

Rp. 2369.

*Phosphor. 0·03,*

*Extr. Gentian. 30.*

*M. f. pill. No. 30*

*D. S. 3mal täglich 1 Pille*



**Schwefelsäure.** Symptome: Verätzung der ersten Nahrungswege, bräunliche Verfärbung der Lippen und Mundwinkel, weisse an der Mundschleimhaut. Erbrechen chokoladebrauner oder schwarzer, häufig mit Schleimhautfetzen gemischter Massen. Schlingbeschwerden, heftige Schmerzen vom Mund bis Magen, häufig Heiserkeit und Dyspnoe, Prostration, Benommenheit des Sensoriums, Dyspnoe; der Harn blut- und eiweisshaltig.

Therapie: Wie bei Salpetersäure.

**Schwefelwasserstoff** vide Kloakengas.

**Secale cornutum.** Symptome: Bei acuter Vergiftung Erbrechen, Durst, Leibschmerzen, Schwindel, Kriebeln und Ameisenlaufen in den Extremitäten, Sehstörungen, allmählich sich ausbreitende Anästhesie, Muskelzuckungen, bei schwangeren Frauen Abortus, Dyspnoe, Sinken der Temperatur und des Pulses. Bei chronischer Vergiftung Kopfschmerzen, Mattigkeit, Schlaflosigkeit, Heiss hunger, grosser Durst, Durchfall, Gefühl von Taubsein und Kriebeln in den Extremitäten, Urindrang und Harnretention, schmerzhaft Contracturen der Muskeln, epileptiforme, oft Stunden lang andauernde Convulsionen, Schwachsinn, Melancholie, manchmal Delirien und Hallucinationen; in anderen Fällen Gangrän der Extremitäten sowie oft auch einzelner Partien des Rumpfes mit pyämischen Erscheinungen.

Therapie: In acuten Fällen Entleerung des Giftes durch Magenpumpe, Brech- und Abführmittel; danach Tannin (Rp. 2321) oder gerbsäurehaltige Decocte. Vielfach empfohlen:

Rp. 2370.

*Pulv. rad. Ipecac.,*

*Opii pur. āā 0·5,*

*Sacch. alb. 2·0.*

*M. f. pulv. Div. in dos. aequ. Nr. 5.*

*D. S. Stündlich 1 Pulver.*

Als symptomatisches Mittel gegen die Convulsionen:

Rp. 2371.

*Amylaether. nitros. gtts. 15,*

*Aether. sulfuric. 20·0.*

*D. S. Zum Riechen.*

Weiterhin Analeptica, Frottiren der Glieder mit aromatischen spirituellen Flüssigkeiten. In chronischen Fällen symptomatisches Verfahren; Narcotica, roborirende Diät, bei Gangrän entsprechende chirurgische Behandlung.

**Stramonium, Stechapfel** vide *Belladonna*.

**Strychnin.** Symptome: Zuerst Brennen im Magen, selten Erbrechen; Ziehen und Steifigkeit in den Muskeln, namentlich des Nackens, lechte Zuckungen, nach einiger Zeit dann Auftreten tetanischer Anfälle, alle 10—15 Minuten, meist durch einen äusseren Reiz hervorgerufen, dabei Opisthotonus, Contraction aller Extremitätenmuskeln, häufig Trismus und Krampf der Athmungsmuskeln, zwischen den Anfällen Erschlaffung der Muskeln, Durst, Beklemmung, bei ungetrübtem Bewusstsein.

Therapie: Brechmittel, am besten Apomorphin (Magenpumpe löst leicht tetanische Anfälle aus), Tannin (Rp. 2321) oder Jod (Rp. 2322, 2335). Gegen den Tetanus Chloralhydrat innerlich (3 gr. pr. dos.) oder subcutan (1—2 Pravaz'sche Spritzen einer 50%igen Lösung), Chloroforminhalationen oder Morphin-Injectionen. Empfohlen auch:

Rp. 2371. *Curar.* 0·06,

*Aqu. dest.* 10·0.

*S.*  $\frac{1}{2}$ —1 Pravaz'sche Spritze zu injiciren

Ferner auch Inhalation von Amylnitrit, eventuell künstliche Respiration.

**Sublimat** vide Quecksilberverbindungen.

**Tabak.** a) **Acute Vergiftung.** Symptome. Brennen im Schlund, Uebelkeit, Schwindel, Kopfschmerz, Zittern, Erbrechen, Durchfall, kalter Schweiss, Verengung der Pupillen, grosse Gesichtsblässe, Angstgefühl, Herzklopfen, unregelmässige Respiration, Kleinheit des Pulses, heftige Unterleibsschmerzen, Delirien, Convulsionen.

Therapie: Tannin (Rp. 2321), schwarzer Kaffee, Jodwasser (Rp. 2322), Excitantia, kalte Begiessungen des Kopfes, Hautreize, eventuell Inhalation von Amylnitrit zu versuchen, auch künstliche Respiration öfters nothwendig.

b) **Chronische Vergiftung.** Symptome Bräunung der Zähne, chronischer Rachen- und Kehlkopfkatarrh, Verdauungsstörungen, Herzklopfen, Arythmie des Pulses, stenocardische Anfälle, Amblyopie, selbst Amaurose Muskelzittern, Convulsionen, Schwinden der Potenz, psychische Störungen.

**Therapie:** Völliges Aussetzen des Rauchens, roborendes Verfahren, Landaufenthalt, Kaltwasserkur, Jodkalium (v. Rp. 2340) empfohlen. Gegen die Sehstörungen Pilocarpin-Injectionen.

**Tartarus emeticus** vide Antimonpräparate.

**Tollkirsche** vide Belladonna.

**Vanilleeis.** Symptome: Erbrechen, Magenschmerzen, schmerzhafte, oft blutige Diarrhöe, Wadenkrämpfe, allgemeine Schwäche.

**Therapie:** Eisstückchen, Mixtura oleosa (oder Rp. 2367), Opium, Analeptica. Siehe auch unter „Crotonöl.“

**Veratrin.** Symptome: Kratzen und Brennen im Halse und bis zum Magen, Durst, Erbrechen, Leibschmerzen, Durchfälle, Verlangsamung der Respiration und des Pulses, Schwindel, Gesichtsblassheit, Zittern, Muskelsteifigkeit und Schwäche, Collaps.

**Therapie:** Tannin, (Rp. 2321), Jodwasser, gegen das Erbrechen Morphin, Eis, bei Collaps Analeptica.

**Weingeist** vide Alkohol.

**Wurstgift (Fleisch-, Fisch-, Käse-Gift).** Symptome: Trockenheit im Mund und Schlund, Durst, Erbrechen, seltener (bei Fleischvergiftung) Verstopfung, Aphthen im Munde, schmieriger Belag und Ulcerationen der Tonsillen und Gaumenbögen, Heiserkeit, bellender Husten, Mydriasis mit Sehstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel, allgemeine Körperschwäche, Trockenheit der Haut, Kältegefühl, Dyspnoe, Schwäche des Pulses.

**Therapie:** Brech- und Abführmittel, unter letzteren namentlich Calomel; ölige Mixturen und schleimige Getränke, Narcotica behufs Schmerzstillung, Wein und andere Excitantia, etwa:

Rp. 2372.

*Aether. sulfuric. 2·0,*

*Aqu. dest. 150·0,*

*Tinct. Opii. simpl. gtts. 10,*

*Syr. capillor. Vener. 20·0.*

*S.  $\frac{1}{2}$  stündlich 1 Esslöffel.*

(Schlosser).



## II. Maximaldosen,

welche der Arzt für den innerlichen Gebrauch nicht überschreiten darf, ohne dass er ein Ausrufungszeichen (!) hinzufügt.

	Pharmacopoea			
	austriac. *)		germanic.	
	Pro dosi	Pro die	Pro dosi	Pro die
Acetum Digitalis . . . . .	—	—	2·0	10·0
Acidum arsenicosum . . . . .	0·005	0·02	0·005	0·02
Acidum carbolicum crystalli- satum . . . . .	0·1	0·5	0·1	0·5
Aconiti radix . . . . .	0·1	0·5	—	—
Apomorphinum hydrochloricum (qua emeticum injectione subcutanea adhibendum) .	0·01	0·05	0·01	0·05
Aqua Amygdalarum amarar. concentr. . . . .	1·5	5·0	2·0	8·0
Aqua Laurocerasi . . . . .	1·5	5·0	—	—
Argentum nitricum . . . . .	0·03	0·2	0·03	0·2
Atropinum sulfuricum . . . . .	0·001	0·003	0·001	0·003
Auro-Natrium chloratum . .	—	—	0·05	0·2
Belladonnae folia . . . . .	0·2	0·6	0·2	0·6
Belladonnae radix . . . . .	0·07	0·3	—	—
Cantharides . . . . .	0·05	0·2	0·05	0·15
Chloralum hydratum . . . . .	3·0	6·0	3·0	6·0
Cocainum hydrochloricum . .	0·1	0·3	—	—
Codeinum . . . . .	—	—	0·05	0·2
Coffeinum . . . . .	0·2	0·6	0·2	0·6

\*) Editio septima 1889.

	Pharmacopoea			
	austriac.		germanic.	
	Pro dosi	Pro die	Pro dosi	Pro die
Colocyntidis fructus . . . . .	0·3	1·0	0·3	1·0
Conii maculati herba . . . . .	0·3	2·0	0·3	2·0
Cuprum sulfuricum (qua eme- ticum) . . . . .	0·4	—	1·0	—
Digitalis folia . . . . .	0·2	0·6	0·2	1·0
Extractum Aconiti radice . . . . .	0·03	0·12	0·02	0·1
Extractum Belladonnae foliorum . . . . .	0·05	0·2	0·05	0·2
Extractum Cannabis Indicae . . . . .	0·1	0·3	0·1	0·4
Extractum Colocyntidis . . . . .	0·05	0·2	0·05	0·2
Extractum Conii herbae . . . . .	0·2	0·6	—	—
Extractum Digitalis . . . . .	—	—	0·2	1·0
Extractum Hyoscyami foliorum . . . . .	0·1	0·5	0·2	1·0
Extractum Nucis vomicae v. Extractum Strychni . . . . .	—	—	—	—
Extractum Opii . . . . .	0·1	0·4	0·15	0·5
Extractum Scillae . . . . .	0·2	1·0	0·2	1·0
Extractum Secalis cornuti . . . . .	0·5	1·5	—	—
Extractum Strychni (Nucis vomicae) . . . . .	0·05	0·15	0·05	0·15
Gutti . . . . .	—	—	0·3	1·0
Hydrargyrum bichloratum cor- rosivum . . . . .	0·03	0·1	0·03	0·1
Hydrargyrum biiodatum ru- brum . . . . .	0·03	0·1	0·03	0·1
Hydrargyrum cyanatum . . . . .	—	—	0·03	0·1
Hydrargyrum iodatum flavum . . . . .	0·05	0·2	0·05	0·2
Hydrargyrum oxydatum fla- vum . . . . .	0·03	0·1	0·03	0·1
via humida paratum . . . . .	—	—	0·03	0·1
Hyoscyami folia . . . . .	0·3	1·0	—	—
Hyoscyami herba . . . . .	—	—	0·3	1·5
Jodoformium . . . . .	0·2	1·0	0·2	1·0
Jodum . . . . .	0·03	0·1	0·05	0·2



	Pharmacopoea			
	austriac.		germanic.	
	Pro dosi	Pro die	Pro dosi	Pro die
Kalium stibio-tartaricum (Tar- tarus stibiatus) . . . . .	0·2	0·5	0·2	0·5
Kreosotum . . . . .	0·1	0·5	0·1	0·5
Lactucarium . . . . .	0·3	1·0	0·3	1·0
Morphinum hydrochloricum .	0·03	0·12	0·03	0·1
Morphinum sulfuricum . . .	—	—	0·03	0·1
Nux vomica v. Strychni semina				
Oleum Crotonis . . . . .	0·05	0·1	0·05	0·1
Opium . . . . .	0·15	0·5	0·15	0·5
Phosphorus . . . . .	—	—	0·001	0·005
Physostigminum salicylicum .	0·001	0·003	0·001	0·003
Pilocarpinum hydrochloricum	0·03	0·06	0·03	0·06
Plumbum aeticum . . . . .	0·1	0·5	0·1	0·5
Sabinae summitates . . . . .	—	—	1·0	2·0
Santoninum . . . . .	0·1	0·3	0·1	0·3
Secale cornutum . . . . .	1·0	5·0	1·0	5·0
Solutio arsenicalis Fowleri (Ph. austr.) = Liquor Kalii arsenicosi (Pharm. germ.) .	0·5	2·0	0·5	2·0
Stramonii folia . . . . .	0·3	1·0	0·2	1·0
Strychni semina (Nux vomica)	0·12	0·5	0·1	0·2
Strychninum nitricum . . .	0·007	0·02	0·01	0·02
Tinctura Aconiti radialis . .	0·5	1·5	0·5	2·0
Tinctura Belladonnae foliorum	1·0	4·0	—	—
Tinctura Cantharidum . . .	0·5	1·0	0·5	1·5
Tinctura Colchici . . . . .	1·5	5·0	2·0	6·0
Tinctura Colocynthis . . .	—	—	1·0	3·0
Tinctura Digitalis . . . . .	1·5	5·0	1·5	5·0
Tinctura Jodi . . . . .	0·3	1·0	0·2	1·0
Tinctura Lobeliae . . . . .	1·0	5·0	1·0	5·0
Tinctura Nucis vomicae v. Tinctura Strychni				
Tinctura Opii crocata . . .	1·5	5·0	1·5	5·0

	Pharmacopoea			
	austriac.		germanic.	
	Pro dosi	Pro die	Pro dosi	Pro die
Tinctura Opii simplex . . .	1·5	5·0	1·5	5·0
Tinctura Strophanti . . . .	1·0	3·0	—	—
Tinctura Strychni (Nucis vomicae) . . . . .	1·0	3·0	1·0	2·0
Veratrinum . . . . .	0·005	0·02	0·005	0·02
Vinum Colchici seminis . .	1·5	5·0	2·0	6·0
Zincum sulfuricum qua emeticum . . . .	0·8	—	1·0	—

### III. Tropfen-Tabelle.

Es enthält ein Gramm:

Acetum concentratum . . . . .	16	Tropfen
Acidum aceticum . . . . .	16	"
Acidum hydrochloric. conc. (1·12 sp. Gew.) . . . . .	13	"
Acidum hydrochloric. dilut. (1·06 sp. Gew.) . . . . .	16	"
Acidum nitricum conc. (1·185 sp. Gew.) . . . . .	12	"
Acidum nitricum dilut. (1·13 sp. Gew.) . . . . .	16	"
Acidum phosphoricum (1·117 sp. Gew.) . . . . .	16	"
Acidum sulfuricum concentrat. . . . .	12	"
Acidum sulfuricum dilut. . . . .	16	"
Aether . . . . .	50	"
Aether aceticus . . . . .	25	"
Alcohol . . . . .	25	"
Amylenum nitrosum . . . . .	30	"
Aqua destillata . . . . .	16	"
Aqua Amygdalar. amar. . . . .	20	"
Aquae spirituosae . . . . .	25	"
Balsamum Copaivae . . . . .	25	"
Balsamum peruvianum . . . . .	16	"
Benzinum . . . . .	16	"
Chloroformium . . . . .	25	"
Elixir. acidum Halleri . . . . .	25	"
Kreosotum . . . . .	25	"
Liquor anodynus Hoffmanni . . . . .	25	"
Liquor Ferri sesquichlorati . . . . .	12	"
Liquor Hydrargyri nitric. . . . .	12	"
Liquor Kali carbonici . . . . .	16	"
Liquor Kali caustici . . . . .	16	"
Mixtura sulfurica acida . . . . .	25	"
Mucilago Gummi arabici . . . . .	12	"
Oleum Amygdalar. aether. . . . .	20	"
Oleum Amygdalar. dulc. . . . .	20	"
Oleum Anisi . . . . .	25	"
Oleum Aurantii flor. . . . .	25	"
Oleum Bergamottae . . . . .	25	"
Oleum Cajeputi . . . . .	25	"
Oleum Carvi . . . . .	25	"
Oleum Caryophyllorum . . . . .	20	"

Oleum Chamomillae . . . . .	25	Tropfen
Oleum Cinnamomi . . . . .	20	"
Oleum Citri . . . . .	25	"
Oleum Crotonis . . . . .	25	"
Oleum Foeniculi . . . . .	25	"
Oleum Juniperi . . . . .	25	"
Oleum Lavandulae . . . . .	25	"
Oleum Menthae . . . . .	25	"
Oleum Olivarum . . . . .	20	"
Oleum Origani . . . . .	25	"
Oleum Ricini . . . . .	20	"
Oleum Rosmarini . . . . .	25	"
Oleum Rosarum . . . . .	25	"
Oleum Sabinae . . . . .	25	"
Oleum Sinapis . . . . .	20	"
Oleum Terebinthinae . . . . .	25	"
Petroleum . . . . .	25	"
Plumbum aceticum basicum solutum . . . . .	14	"
Solutio arsenicalis Fowleri . . . . .	16	"
Solutiones extractor. narcotic. (1 : 2) . . . . .	16	"
Spiritus aethereus . . . . .	25	"
Spiritus Ferri chlorati aether. . . . .	25	"
Spiritus muriatico-aethereus . . . . .	30	"
Spiritus nitrico-aethereus . . . . .	30	"
Spiritus vini absolutus . . . . .	40	"
Spiritus vini . . . . .	30	"
Spiritus vini dilutus . . . . .	25	"
Stibium chloratum solutum . . . . .	12	"
Syrupi . . . . .	12	"
Tincturae spirituosae . . . . .	25	"
Tincturae e spiritu et aethere . . . . .	25	"
Vinum Malacense . . . . .	20	"
Vina medicamentosa . . . . .	20	"

---

Ein Thee- oder Kaffeelöffel Flüssigkeit . . . . . = 3.75 Gr.  
 Ein Esslöffel Flüssigkeit . . . . . = 15 "

**IV. Tabelle zur Vergleichung des österreichischen Medicinalgewichtes mit dem metrischen Gewichte und Eintheilung des ersteren.**

Pfund (Libra)	Unzen	Loth	Drachmen	Scrupel	Gran	Grammes
1	12	24	96	288	5760	420 014
	1	2	8	24	480	35 001
	—	1	4	12	240	17 500
	—	—	1	3	60	4 375
	—	—	—	1	20	1 458
	—	—	—	—	1	0 0729188
1000	162 837 1	0 057141	0 228565	0 685694	13 71358	1

1



# Verzeichniss

## der

### in den Receptformeln vorkommenden Medicamente.

(Die Zahlen bedeuten die Nummern der Recepte.)

**Abführmittel** 16, 17, 112, 113, 226, 267, 286—310, 317, 320, 370—372, 382—384, 501, 502, 626—636, 1387, 1388, 1471, 1472, 1609, 1610; pro infant 826, 827, 833, 861, 960, 962, 964, 991, 992, 999, 1007, 1023, 1044, 1067, 1180, 1223, 1224, 1264—1273, 1303.

**Acetophenon.** Trpf. 814.

**Acetum plumbi** vid. **Plumbum aceticum.**

**Acetum pyrolignosum. crudum** 1643.

**Acetum Vini.** Int. 2326; Ext. 1673, 1899, 2096.

**Acidum aceticum.** Int. 1589; Ungu. 1772; Pasta 1879; Augtrpf. 2128.

**Acidum arsenicosum.** Int. Mixt. 668; Trpf. 792, Pill. 65, 203, 394, 420, 443, 468, 535, 1763, 1834, 1835; Ext. Pasta 1701, 1806; Zahnpasta 2297, 2298.

**Acidum benzoicum.** Int. Trpf. (pro infant.) 1251; Pill. 1983; Plv. 87, 41, 43, 46, 107, 363, 391, 657, 658, 1573; pro infant. 1181, 1253, 1296.

**Acidum boracicum sive boricum.** Ini subc. 1837; z. Betupfen u. Einseln. 1715, 2202; Haargeist 1876; Ungu. 1318, 1380, 1706, 1722, 1727, 1822, 2199, 2213, 2217; Nasenaussplg. 1186; Mundw. 1104; Ini.

urethral. 1938, 1949; Ini vesical. 393, 1580, 1633, 1987; Augentrf. 2114; Augewasser 2122; Augensalbe 1743; Aussplg. d. Ohres 2181, 2220; Ohrtrpf. 2166, 2183, 2215.

**Acidum camphoricum.** Plv. 587.

**Acidum carboicum.** Int. Mixt. 127, 2344; pro infant. 1248; Pill. 126, 1827; Ini subc. 96, 267, 701, 1794, 1796; zur Desinfection u. Wundbehandlg. 1361—1363, 1369, 1450; Bepslg. d. Haut 1621, 1623; z. Betupfen 1716, 1760, 1796, 2201; z. Einseln 1985; Haargel 1328, 1739, 1874; Liniment. 1013, 1015; Ungu. 1737, 1797, 2205; Pasta 1710; Nasenaussplg. 711, 847; Mund- u. Gurgelw. 866, 2024, 2288; Bepslg. d. Mund- u. Rachenschleimh. 871, 2102; Inhal. 64, 130, 131, 603, 737, 1110, 1154; Ini. urethral. 1492, 1493, 1495, 1497, 1943; Ini. vesic. 1504, 1506, 1524, 1526, 1574; Ini. vaginal 1594; Einsplg. d. Gehörgangs 2214, 2221; Ohrtrpf. 2265.

**Acidum chromicum.** Einsplg. 1788, 1900

**Acidum chrysophanicum** v. **Chrysarobinum.**

**Acidum hydrochloricum** v. **Ac. muriaticum.**

*Acidum hyperosmicum*, Pill. 400.  
*Acidum lacticum*, Int. 1572; *Cauteris*. 1810, 1898; *Bepsig. d. Nasenschlmh.* 706, 849, *d. Pharynx* 870, *des Kehlkopfs* 738; *Inhal.* 893, 1128.

*Acidum muriaticum concentratum*. Zu Bädern 1399; *Aetzpasta* 1804; *Bepsig. d. Zahnfleisch.* 1434; *Ini. vesical.* 1574.

*Acidum muriaticum dilutum*, Int. 34, 216, 235, 236, 239, 246, 258, 463, 489, 512, 541, 542, 635, 694, 1555, 2338; *pro infant.* 952, 953, 1150, 1219, 1222, 1232, 1571.

*Acidum nitricum concentratum*. *Umschlg.* 1397, 1819. *Ac. n. dilutum*. Int. 1922. *Ac. nitr. fumans. Cauteris.* 1415, 1913.

*Acidum oxalicum*. *Z. Waschen* 1367.

*Acidum phosphoricum*, 100, 683, 1555, 1570.

*Acidum pyrogallicum*. *Ungu.* 1757, 1807, 1808, 1816; *Haarfärbemittel* 1696.

*Acidum salicylicum*. Int. *Plv.* 390, 471; *Klysm* 1649, 1652; *z. Desinfect.* 1360, 1452; *z. Betupfen* 1715, 1761, 1796; *Einsplg.* 1901; *Streuplv.* 154, 1061, 1290, 1394, 1785, 1996; *Haargeist* 1681, 1682, 1766; *Ungu.* 1055, 1056, 1705; *Emplastr.* 1729; *Nasenaussplg.* 2243; *Gargar.* 868, 2028; *Bepsig. d. Mundschlmh.* 1195; *Darmirrig.* 989; *Ini. vesical.* 1557, 1575, 1988; *Ini. vagin.* 1651; *Aussplg. d. Ohres* 2262; *Ohrtrpf.* 2160.

*Acidum sulfuricum dilutum*. Int. 834, 875, 891, 938, 946, 963, 1014, 1070, 1074, 1334; *Klysm.* 892.

*Acidum tannicum* Int. *Mixt.* 2321, *pro infant.* 1293, *Plv.* 274, 1484, 1544, 1549, 1613, 1890, 2350, *pro infant.* 971, 1017, 1235; *Tannin-Jodoformdocht* 1375; *Streup.* 1997; *Waschw.* 1779; *Haarpomade* 1684; *Nasenaussplg.* 842, 1187, 2242, 2243; *Nasenbougies* 704; *Gargar.* 719, 722; *Bepsig. d. Rachenschlmh.* 2104; *Inhal.* 13, 653, 732, 1142; *Insuffl. d. Larynx* 15, 734; *Klysm.* 1259; *Darmirrig.* 1257; *Sappos.* 510; *Ini. urethral.* 1496, 1945; *Suppos. urethral.* 1502, 1586, 1957, 1958; *Vaginaltampons* 1631, 1633, 1635; *Ohrtrpf. p. tub. Eust.* 2179.

*Acidum tartaricum*, Int. 161, 485, 949, 1086, 1181, 1226, 1232, 1238, 2325; *Desinfect.* 1364, 1365, 1593.

*Acidum thymicum*. *Desinfect.* 1371; *Umschlg.* 1719; *Mund u. Gurgelw.* 2029; *Ausspritzg. d. Pharynx* 1204; *Magenaussplg.* 606; *Ini. vaginal.* 1032, 1657; *Aussplg. d. Uterushöhle* 1614, 1615.

*Aconitinum*. *Z. Eintupfen* 1906. *Ungu.* 479.

*Acorus Calamus, radix* *Plv.* 214  
*Adonis vernalis, herba*. *Inf.* 174. *Plv.* 620.

*Aether aceticus*. Int. 89, 121; *pro infant.* 977, 1218, 1253. *Ohrtrpf.* 2191.

*Aether Fragarum* 1440.

*Aether Petrolei*. *Z. Eintupfen* 1905.

*Aether sulfuricus*. Int. 191, 346, 349, 350, 1603, 1604, 2353, 2373; *pro infant.* 851, 895, 985, 1250; *Ini. subc.* 84, 106, 409, 1376, 2076, 2077; *n. Narkose*

- 1358, 1597; Zersthulg. 2005; Riechmittel 2371; Waschw. 1368; z. Eintupfen 1906; Einreibg. 428, 2156; Einpslg. 1843; z. Verband 2015; z. Bereitg. v. Jodoformgaze 1372; Bepslg. d. Larynx 742; Bepslg. d. Gehörgangs 2255, 2256, 2261; Ohrtrpf. 2190, per tub. Eust. 2249, 2280; Zahnharz 2296.
- Aetapasta**, Canquoin'sche 1801, Cosmi'sche 1806, Landolf'sche 1802—1804, Wiener 1698—1700.
- Agaricium**. Pill. 157; Plv. 586, 1790.
- Agaricus albus**. Plv. 1789.
- Alaunmolke** 1551.
- Alkohol**. Int. 143, 1589, 1922; z. Narkose 1358, 1597; Desinfect. 1451, 1615; z. Bereitg. v. Jodoformgaze 1372—1374, v. Tannin-Jodoformdecht 1375, v. Seifengeist 1872; Einreibg. 407; Bepslg. 2116; Mundw. 2288; Zahnharz 2295; Aussplg. d. Ohres 2181.
- Althaea**, folia et radix. Int. Dec. 1, Pill. 126, 203, 537, 1647, 1834, 1835; Mundw. (Dec.) 2299; Gargar. (Dec.) 716, 2233.
- Alumen crudum** Int. Mixt. 1551, pro infant. 1234, 1292; Plv. 272, 493, 676, 1565; Dec. Zittm. 2084; Klysm. 1259; zu Umschl. 1013, Sol. Burow. 162, 1379, 1453, 1454, 1718; z. Betupfen 153; Einpslg. 1899, 2096; Nasenaussplg. 841, 1187, 2245; Mundw. 2290, 2301, 2314; Zahnpasta 2286; Gargar. 614, 720, 722, 865, 1910, 2027, 2233; Inhal. 13, 852, 731, 1107, 1125, 1127, Insuffl. d. Larynx 14, 788, 784; Ini. urethral. 1493, 1495, 1497, 1935, 1936, 1948, 1950; Ini. vesical. 1505, 1532, 1992; Ini. vaginal. 1031, 1626, 1627, 1994; Suppos. urethral. 1501; Vaginaltampons 1634; Bepslg. d. Frommelfells 2167; Ohrtrpf. 2168; z. Ini. per tub. Eust. 2180.
- Alumen plumosum**. Streup. 1713.
- Alumen ustum**. Streup. 1914, 2000, 2001.
- Aluminium aceto-tartaricum** Bepslg. d. Nasenschlmh. 709.
- Ammonia pura liquida**. Int. 2327, 2359; Riechmittl. 2323; Ohrtrpf. zur Ini. p. tub. Eust. 2280.
- Ammonium bromatum**. Plv. 448—451, pro infant. 924.
- Ammonium carbonicum**. Mixt. pro infant. 1134; Plv. pro inf. 917; Haarfärbemittl. 1689.
- Ammonium chloratum**. Int. Mixt. 850, pro inf. 886, 910, 1119; Plv. 651, pro infant. 887; Bäder 1079, 1345; Inhal. 12; Ini. p. tub. Eust. 2238.
- Ammonium iodatum**. Ungu. 2188.
- Ammoniumsulfoichthyolicum**. Int. Mixt. (pro infant.) 1321; Ungu. 513, 600, 1058; Empl. 1059; Vaginaltampons 1632.
- Amygdalae aurium** v. Ohrmandeln.
- Amygdalinum**. Waschw. 341.
- Amylaether nitrosus**, Amylnitrit. Inh. 195, 673, 794, 2371; Ini. vesical. 1535.
- Amylenum hydratum**. Int. 461, 664, 774, 797, 798; Klysm. 465.
- Analeptica** v. Excitantia.
- Anisum stellatum**, semina. Dec. 2091.
- Anisum vulgare**, semina. Dec. 2084.
- Anthrarobinum**. Einpslg. 1656.
- Antifebrinum**. Plv. 486, 551, 592; pro infant. 874.

- Antipyrinum. Int. Plv. 139, 373, 403, 416, 559, 591, 598, 2275; pro infant. 69, 873, 890, 926, 1172; Ini. subc. 404, 429, 435, 560.  
 Apomorphinum muriaticum Emetic. Ini. subc. 19, 90, 643, pro infant. 9, 898; Expect. Mixt. 34, 50, 118, 655, pro infant. 904; Plv. 151.  
 Aqua Amygdalarum amararum. Waschw. 341.  
 Aqua Calcis. Int. 1552, 1981; pro infant. 955, 1220; Waschw. 1672; Linim. 1057, 1326, 1396, 1709; Nasenaussplg. 1186; Gargar. 215, 613, 867; Inhal. 217, 724, 902, 1126; Darmirrig. 1262; Ohrtrpf. 2219.  
 Aqua carminativa 248.  
 Aqua Carvi 217.  
 Aqua Cerasorum nignorum Int. 371, 964, 980, 1023, 1970. Ohrtrpf. 2162.  
 Aqua Chlori. Int. 2366; Bepalg. 2093; Mundw. 2307; Ausspritzg. d. Pharynx 1203.  
 Aqua Cinnamomi 98, 756, 987, 997, 1019, 1046, 1173, 1247, 1250, 1486, 1559, 1566.  
 Aqua Cochleariae Mundw. 2290.  
 Aqua Coloniensis 219.  
 Aqua Foeniculi 283, 916, 1778.  
 Aqua Goulardi vegeto-mineralis. Umschl. 2010, 2142, 2209.  
 Aqua Laurocerasi. Int. 113, 295, 538, 1515, 1982; pro infant. 911, 933, 940, 1179, 1181, 1226, 1267, 1331; mit Cocain 261; mit Extr. Belladonn. 344; mit Morphinum 4, 45, 145, 178, 194, 223, 259, 261, 336, 343; mit Solut. Fowler. 159; mit Tinct. Belladonn. 159, 432; mit Tinct. Castor. 455; mit Tot. Nuc. vom. 224, 455; mit Tinct. Strophant. 194, 200; Schnupfw. 703; Inhal. 62, 727, 746, 750, 751, 1142, 2110.  
 Aqua laxativa Viennensis. Int. 113, 294, 295, 371, 384, 2089, pro infant. 964, 1023, 1267, 1303; Darmirrig. pro infant. 1271.  
 Aqua Melissae 185, 496, 1920.  
 Aqua Menthae piperitae. Int. 283, 445, 623, 708, 1213, 1215, 1246, 1248, 1249, 1572, 1752, 1920, 1922; Mundw. 1197, 2287, 2299, 2314; Gurgelw. 1201; Inhal. 603.  
 Aqua Naphae. Int. 487, 520; Waschw. 1703; Pasta 1668; Ohrtrpf. 2160.  
 Aqua Opii. Ohrtrpf. 2211, 2234.  
 Aqua Picis. Inhal. 602.  
 Aqua Plumbi. Umschl. 1385, 1430, 1480.  
 Aqua Rosarum 1672, 1678, 1691, 1696.  
 Aqua Salviae. Mundw. 22, 91, 2301, 2302.  
 Aqua Tiliae 57.  
 Arbutinum. Plv. 365.  
 Argentum nitricum Int. Mixt. (pro infant.) 957; Pill. 399, 402, 671; Klysin 313, 508, pro infant. 994; Emsplg. 1408, 1622, 1711, 1798, 1799, 2011, Ungu. 1383, 1403, 1437, 1490, 1712, 2008, 2174; Haarfarbemitl. 1689—1692, 1694; Bepalg. d. Pharynx 615, 723, d. Larynx 735, 2111; d. Harnröhrenschluck. 1499, 1500; d. Vaginalport. 1591, 1636; d. Uterusschlauch. 1645, (in Stäbchen) 1646, d. Coniunctiva 1596, 2118; d. äusseren Gehörgangs 2148, 2218, d. Trommelfells 2170, 2176; Ohrtrpf. 2163, 2224; Ini. urethral. 1942, 1953; Sup-



- pos. urethral. 1508, 1587, 1960, 1962; Ini. vesical. 1485, 1487, 1507, 1534, 1568.
- Arrac** 1425.
- Arsenicum v. Acidum arsenicosum.**
- Arsenpasta** 1701, 1806; (Zahnpasta) 2297, 2298
- Asa foetida.** Klysm. 22, pro infant. 1003.
- Atropinum sulfuricum.** Int. Pill 156, 585, 1791, 1908, pro infant. 1584; Trpf. pro infant. 992, 1028; Ini. subc. 582, 702, 2343, 2347, 2360; Augtrpf 2124.
- Augensalbe** 1742, 1743, 2116, 2127
- Augentropfen** 1596, 2114, 2118 — 2121, 2124, 2128, 2138, 2139, 2141
- Augenwasser** 2122, 2129.
- Aurantium, cortex fructus.** Spec. 184, 228.
- Aurantium, flores.** Spec. 454.
- Aurum chloratum.** Bepslg d. Mundschlüh. 2313.
- Balsamum Copaivae** 1918, 1920 — 1922; Pill. 1930, Caps. gelat. 1553, 1919; Suppos. urethr. 1958.
- Balsamum Opodeldoc** 434.
- Balsamum peruvianum** Int. Mixt 56, 129; Einrbg. u. Einsplg. 1313, 1815, 1829, 1669, 1815, 1865; Ungu. 1064, 1383, 1437, 1736, 1828; Haargeist 1683, 1766, 1769, Haaröl 1739, 1812, Haarpomade 1686, 1873.
- Balsamum de Tolu** 1030, 1929.
- Balsamum vitae Hoffmanni** Einrbg. 249, 2251
- Bardana, radix.** Dec. 2090.
- Barytum sulfuricum praecipitatum.** Streup. 1707; Ungu. 1708.
- Belladonna, radix et folia.** Plv. (pro infant.) 920, 1157, Inhal. (Tabak, 62.
- Benzinum.** Haargeist 1763; Inhal. nach 928
- Benzoë, resina.** Ungu. 1723, 2206.
- Billroth'sche Narkose-Mischung** 1358, 1597.
- Bismuthum carbonicum basicum.** Schminkwasser 1678, Schminkpoudre 1707.
- Bismuthum chloratum** Ungu. 1708
- Bismuthum salicylicum.** Pulv. 251, 270, 312.
- Bismuthum subnitricum.** Int. Plv. 115, 241, 269, 311, 434, 506, 679, 680; pro infant. 956, 976, 983, 1238; Streup. 1714; Ungu. 1053, 1675, 1848; Ini. urethr. 1940.
- Bitumen Fagi v. Oleum Fagi.**
- Blatta orientalis.** Pulv. 359.
- Borago, herba et radix.** Dec. 2091.
- Borax veneta v. Natrium boracicum.**
- Borapiritus** Aussplg d. Ohres 2181; Ohrtrpf 2183, 2215.
- Bourguignon'sche Salbe** 1868, modificiert v. Hebra 1869.
- Brayera, flores v. Kouasso, flores.**
- Brechmittel v. Emetica**
- Bromoformium.** Mixt. (pro infant.) 928.
- Bromum purum** 792.
- Burow'sche Lösung v. Liquor Burowi.**
- Butyrum Antimonii v. Stibium chloratum.**
- Cadmium sulfuricum.** Ini. urethr 1947.
- Calcaria chlorata.** Umschlß. 1411; Ini. vaginal 1658.
- Calcium carbonicum.** Int. Mixt. 2361; Zahnplv. 2282.
- Calcium oxydatum, Calcaria caustica.** Baln. 1844; Cantheria. 1699.

- Calcium phosphoricum Plv. 1099, 1439.  
 Calciumsulfuricum. Streup. (Gypstheer) 1410, 1902, 2009.  
 Calomel. Int. Plv. 190, 226, 267, 370, 397, 502, 506, 628, 629, 641, 1474, 1891, 2063; pro infant. 837, 901, 981, 1044, 1077, 1180, 1339, 1426; Dec. Zittm. 2084; Ini. subc. 1897, 2047—2049, Streup. 2094; Ungu. 1849, 2092; Inspers. conjunctiv. 1123.  
 Campechia, lignum. Dec. 280, 975.  
 Camphora monobromata, Int. Pill. 810, 816; Plv. 776; Suppos 817.  
 Camphora rasa. Int. Mixt. 1482, 1970; pro infant. 879, 986, 1169, 1252; Ini. subc. 106, 499, 550; pro infant. 1217, 1254; Klysm. 378, 498; Waschw. 1672; Einsplg. 1899, 2096; Ungu. 1823, 1824, 2188; Ohrtrpf. 2193.  
 Camphora trita. Int. Pulv. 107, 658, 1413, 1416, 1916; Ini. subc. 802; Klysm. 347; Verbd. 1016, 2013, Ausspritzg. 1999.  
 Cannabissativa, flores. Spec. 1522.  
 Carbo Ligni Zahnplv. 2031.  
 Carbo Tiliae. Z. Einetauben 1656; Zahnpulv. 2025.  
 Carbolglycerin 1369, 1450.  
 Carbolliniment 1012, 1016.  
 Carbolpasta 1710.  
 Cardamomum, semina. Dec. 2085.  
 Carminum Zahnplv. 2231, Zahn-pasta 285.  
 Cauquoin'sche Pasta 1801.  
 Centaureum, herba. Spec. 184, 227, 228.  
 Cera alba. Ungu. 1380, 1382, 1428, 1706, 1708, 1727, 1823; Supp. 345.  
 Ceratum simplex. Ungu. 1775.  
 Cerussa. Einsplg. 1899, 2096; Streup. 1714.  
 Cetaceum 1056, 1619.  
 Chamomilla, flores. Inf. 927, 1249.  
 Chenopodium ambrosioides, herba. Spec. 1521, 1973.  
 China nodosa, radix. Dec. 2087, 2088.  
 China regia sive Calisaya, cortex. Int. Spec. 240; Macerat. 243; Dec. 242, 517, 542, 859, 1068, 2331; Mundw. (Dec.) 2311; Zahnplv. 2031.  
 Chininum (purum.) Haarpom. 1684.  
 Chininum ammoniatum. Pulv. 244.  
 Chininum bisulfuricum. Mixt. 516, 589; Pill. (pro infant.) 2183; Plv. (pro infant.) 1336.  
 Chininum bromatum Plv. 205.  
 Chininum ferrociticum. Mixt. (pro infant.) 1211; Pill. 818, 819; Plv. (pro infant.) 831, 1133, 1351.  
 Chininum muriaticum. Mixt. 216, 488, 512, 523; Pill. 516; Plv. 141, 168, 514, 521, 536, 609—611, 618, 692, 1349, 1418, pro infant. 67, 925, 1161, 1210; Klysm. 489, 509.  
 Chininum sulfuricum Int. Mixt. (pro infant.) 834, 875, 891, 934, 946, 963, 1014, 1070, 1074, 1150, 1834; Pill. 763; Plv. 99, 180, 412, 588, 609, 2273; pro infant. 828, 830, 872, 881, 889, 939, 945, 948, 1047, 1077, 1075, 1124, 1166, 1210, 1337; Klysm. (pro infant.) 892; Nasenansplg. 2242.  
 Chininum tannicum. Mixt. (pro infant.) 994; Plv. 46, 271, 492, 1550; pro infant. 68, 970, 984, 993, 1008, 1073, 1132, 1153, 1161, 1256, 1260, 1294, 1335.



- Chinolinum tartaricum.** Mundw. 1197, 2289; Zahnplv. 2284; Zahnpasta 2285; Gargar. 1201.
- Chloralamid** 463.
- Chlorale hydratum.** Int. 21, 57, 60, 110, 266, 353, 376, 440, 447, 458, 459, 660, 769—771, 786, 1424, 2227; pro infant. 906, 1049; 1140, 1143, 1159; Plv. (pro infant.) 1041; Ini. subc 470, Klysm. 111, 661, 1421, 1607, 1660, 1911; pro infant. 72, 839, 1022, 1043, 1069, 1295; Bepslg. d. Phar. 725.
- Chlorina liquida v. Aqua Chlori.**
- Chloroformium.** Int. 263, 439, 1588, 1589, 2342; pro infant. 907; Einreibg. 182, 403, 407, 425, 482, 552, 2210, 2253; z. Betupfen 1811; Narkose 1858, 1597; Ohrtrpf 2190; Zahntrpf 2289.
- Chopart'sche Mixtur** 1922.
- Chrysarobinum.** Einpslg. 1853; Linim. 1855; Ungu. 1755, 1772, 1850, 1851, 1854, Gelatine 1852.
- Cina, semina.** Plv. 1285; Elect. 1286.
- Cinnabaris.** Dec. Zittm. 2084; Aetzpasta 1806.
- Cinnamomum, cortex.** Dec. 2085.
- Citrus, fructus.** Dec. 2085.
- Cocainum muriaticum.** Int. Trpf 261; Plv. 262, 1590, 2194; Ini. subc. 1360; Ungu. 1624, 1746, 1776, 1808; Inhal. 762, 929; Bepslg. d. Nasenschlmh. 707; des Pharynx 718; des Larynx 740; Augentrpf. 2114; Ohrbougies 2151; Ohrtrpf. 2212, 2231; Suppos. 557, 1619; Ini. urethral. 1576; Ini. vesical. 1525.
- Cocainum oleinicum.** Suppos. 1748, 1832.
- Coccionella.** Mundw. 2289.
- Codeinum.** Mixt. 143; Plv. 6, 26, 142, 546, 573, 648; pro infant. 1116.
- Coffea, semina tosta.** Inf. 1216.
- Coffeinum citricum.** Plv. 622.
- Coffeinum natrobenzoicum.** Mixt. 176, 777; Plv. 177, 192, 199, 360.
- Coffeinum natrosalicylicum.** Plv. 175, 202, 414, 622, 640.
- Cognac** 98, 487, 796, 812, 937.
- Colchicum.** Pill. 549.
- Collodim.** 1806, 1877, 1401, 1745, 1818, 1871, 1897, 1901, 2004, 2097.
- Collyrium adstringens luteum** 2120.
- Colombo, radix.** Dec. 279, 974, 996, 1236.
- Colophonum.** Bertg. v. klebender Jodoformgaze 1374, von Tannin-Jodoformdocht 1375; Ungu. 1382.
- Condurango, cortex.** Macerat. 258; Macerat. Dec. 697.
- Convallaria, herba.** Macerat. 173.
- Copaiva v. Balsamum Copaivae.**
- Cosmi'sche Pasta** 1806.
- Cotoinum.** Plv. (pro infant.) 1240.
- Cremor Tartari.** Mixt. 16, 289, pro infant. 1021; Plv. 232, 303.
- Creolinum.** Ini. vesical. 1538; Ini. vaginal. 1033, 1628; Aussplg. d. Ohres 2264.
- Creosotum.** Int. Mixt. (pro infant.) 937, 1173—1175, 1247; Pill. 250; Plv. 607; Caps. gelat. 47, 132, 608; Pasta 1701; Ungu. 1822, 1824; Gurgelw. 2030; Zahnpille 2294; Zahnpasta 2297, 2298; Darmirrig. 1245.
- Creta alba.** Ungu. 1731, 1864, 1867; Pasta 1710; Zahnplv. 1105.

Cubebae, fructus. Pill. 1928 — 1930; Plv. 1926.

Cuprum aceticum. Verbandw. 1904; Ungu. 1880

Cuprum carbonicum. Int. Mixt. 2364.

Cuprum sulfuricum. Int. Mixt. 218, 644, 2319, 2363; Streup. 2001; Verbd. 2006, Nasenbougies 705; Ini urethral. 1941, 1950, 1954; Suppos urethral. 1959; Bepsig der Vaginalport. 1637; d. Coniunctiva 2130; Ohrbougies 2157; Ohrtrpf. 2267.

Curare. Ini. subc. 1422, 2372.

Damenpulver 1677.

Darm-Irrigation 323, 324, 989, 1257, 1258, 1261—1263, 1271—1273, 1284.

Decoctum Althaeae v. Althaea, radix.

Decoctum Malti 1088.

Decoctum Pollini 2087.

Decoctum Salep v. Salep, tubera

Decoctum Zittmanni fortius 1895, 2084; D. Z. mitius 1896, 2085, 2086.

Dermatolum. Vaginaltampons 1635.

Digitalis, folia. Inf. 87, 102, 169, 179, 181, 352, 475, 617, 639, 799, pro infant. 829, 932, 940, 947, 1024, 1166, 1178, 1179, 1182; Pill. 767, 784; Plv. 170, 177, 180, 618.

Diuretinum. Mixt. 82, 189, 469, 623; Plv. pro infant. 943.

Dover'sche Pulver vid. Pulvis Doveri.

Drastica v. Abführmittel.

Duboisium sulfuricum. Ini subc. 808

Dupuytren'sche Pomade 1687.

Durand'sches Mittel 349.

Eau de Princesse 1678.

Electuarium lenitivum 291, 1275, 1286

Elixirium acidum Halleri 91, 540, 1601.

Elixirium roborans Whyttii v. Tinct. Chinae compos.

Emetica 18, 19, 38, 39, 90, 218—220, 222, 642—644, 2317, 2319, 2363; pro infant. 8, 9, 883, 884, 896—898, 913, 1112, 1113.

Emplastrum Cantharidum perpetuum 424, 555

Emplastrum Cerussae 1378, 1409

Emplastrum Cicutae 1777, 1870.

Emplastrum Diachylon simplex 1054, 1317, 1325, 1378, 1721, 2018, 2198; E. D. compos. 1059

Emplastrum Euphorbii 457.

Emplastrum Hydrargyri 1870, 1881, 2018, 2019.

Emplastrum de Meliloto 1777.

Emplastrum Minii adustum 1744

Emplastrum saponatum 431, 1055, 1729, 1861, 1881, 2018. E. s. salicylicum 1729.

Emulsio amygdalina s. oleosa. Int. 2, 29, 113, 933, 934, 1141, 1158, 1331, 1482, 1515, 2351, Waschw 340, 341, 1703

Equisetum Dec. 942, 1021.

Ergotinum v. Extractum Secalis cornuti

Ergotinum de Bombelon 1st. (pro inf.) 1018, 1020, Ini subc. 1564, 1599, 1654.

Ergotinum de Bonjean 1561.

Eserinum sulfuricum Augentrpf. 2139

Espie-Cigarretten 62.

Essigsäure Pasta 1673.

Excitantia 38, 39, 83, 84, 104—106, 120, 122, 346, 347, 378, 487, 496—500, 550, 551, 775, 776, 802, 1376, 1396, 1413,

- 1416, 1417, 1425, 1602—1604, 2323, 2327, 2346, 2353, 2359, 2371, 2373; pro infant. 851, 891, 895, 977, 985—988, 1169, 1215—1218, 1250—1254.
- Expectorantia** 3, 28, 35—37, 41—44, 49—51, 88, 89, 107, 108, 116—119, 150—152, 649—651, 654—658; pro infant. 885—888, 894, 895, 908—910, 914—917, 935, 936, 1117—1120, 1131, 1134—1136, 1147, 1148, 1151, 1152, 1167, 1168.
- Extractum Aconiti** Z. Eintupfen 1782.
- Extractum Aloes** Mixt. 804, Pill. 306, 307, 310, 634, 635, 753; Plv. 318, 729, 1544.
- Extractum Belladonnae** Int. Trpf. 344; pro infant. 980, Pill. 326, 635, 793; Plv. 31, 43, 73, 146, 325, 572, 583, 647, 1514; pro infant. 70, 925, 1027, 1583, Ungu. 315, 824, 1963, 1967, 2125, 2126; Empl. 431; Insuff. d. Larynx 14; Suppos. 611, 556, 821, 1520, 1747, 1831, 1965, 1972.
- Extractum Cannabis Indicae** Plv. 147, 667, 1512, 1917; pro infant. 887.
- Extractum Cascarae Sagradae** 627; pro infant. 1270.
- Extractum Cinae** Int. Mixt. 380, 520; pro infant. 1216, 1217, Pill. 1467; Haarpomade 1686, 1687.
- Extractum Colocynthis** Pill. 307, 634; Plv. 226.
- Extractum Colombo** Plv. 277, 278; pro infant. 1237.
- Extractum Conii** Pill. 809, 2060.
- Extractum Cubebae** 1927, 1928.
- Extractum Fabae Calabaricae** Plv. 636; pro infant. 1042.
- Extractum Filicis maris aether** 327, 567; pro infant. 1000, 1001, 1277—1280.
- Extractum Gossypii** 782, 1655.
- Extractum Hydrastis canadensis** 783, 1650; pro infant. 1091.
- Extractum Hyoseyami** Mixt. 5, pro infant. 888; Pill. 74, 2274; Plv. 7, 23, 44, 147, 1512; pro infant. 912; Ungu. 483.
- Extractum Kawae** Plv. 1980.
- Extractum Laudani** v. **Extractum Opii**.
- Extractum ligni Campechiani** 283.
- Extractum Nucis vomicae** Pill. 819, 820.
- Extractum Opii** Int. Mixt. 29, 268, 490, 804; Pill. 95, 803, 2058, 2060, 2062, 2066; Plv. 149, 312, 321, 504, 572, 680, 772, 777, 789, 1469, 1514, 2341, 2350, pro infant. 993, 1006; Ini. subc. 780, 806; Klyst. 508, 677, 2352; Einreibg. 427, 2252; Ungu. 314, 432, 478, 1775, 1860, 1966; Empl. 1861; Suppos. 316, 556, 817, 831, 1479, 1517, 1747; Suppos. urethral. 1958; Inhal. 61, 62; Ohrbougies 2149, Ohrtrpf. 2230.
- Extractum Piscidia** 813.
- Extractum Punicae Granati** 1275, 1276.
- Extractum Quassiae** Pill. 1467, 2062, 2065.
- Extractum Ratanhiae** Mundw. 2302.
- Extractum Rhus aromatica** 1585.
- Extractum Secalis cornuti** Int. Mixt. 410, 495, 538, 765, 1486, 1559, 1975; pro infant. 1029, 1093; Trpf. 758; Pill. 95, 759, 784, 816, 818, 1647, 1862; Plv. 93, 94, 544, 1560, 1579, 1976, pro infant. 1350, 1351, Ini. subc. 96, 257, 701, 760, 768,

1563, 1598, 1653, 1863; Klysm.  
1649, 1652; Suppos. 1562, 1618.  
Extractum Scillae 81.

Extractum Stigmatis Maidis 1613.  
Extractum Valerianae. Pill. 810.

**Ferrum albuminatum saccharatum.** Plv. (pro infant.) 1214.

**Ferrum arsenicosum cum Ammonio citrico.** Pill. (pro infant.) 1311; Plv. 446, pro infant. 1171, 1319, 1337, 1350.

**Ferrum carbonicum.** Plv. 755; **F. c. saccharatum** Plv. 529, 536, 689, 692; pro infant. 830, 881, 946, 973, 1977, 1098, 1099, 1242, 1357.

**Ferrum citricum** Plv. 1351; **F. c. ammoniatum.** Pill. 1763.

**Ferrum Hydrogenio reductum** Plv. 532.

**Ferrum hydrooxydatum in Aqua** 2332.

**Ferrum hydrooxydatum dialysatum.** Mixt. 445, 756; pro infant. 1213, 1347; Pill. 753.

**Ferrum iodatum saccharatum.** Int. Mixt. 398, 788; pro infant. 1145; Pill. 2081; Plv. 361, 396, 477; pro infant. 1144, 1302, 1314, 1437.

**Ferrum lacticum.** Pill. 688; Plv. 136, 168, 202, 521, 527, 544, 1439; pro infant. 939, 1339; **Haarpomade** 1697.

**Ferrum peptonatum.** Plv. (pro infant.) 1242, 1348.

**Ferrum pulveratum** Mixt. agit. 2358; Pill. 2080.

**Ferrum pyrophosphoricum cum Ammonio citrico** Plv. 530, pro infant. 1349; **F. p. c. Natrio citrico.** Plv. 1356; **F. p. c. Natrio pyrophosphorico.** Plv. 531; pro infant. 1355.

**Ferrum sesquichloratum solutum.**

Int. 254, 1566; pro infant. 878, 997, 1019, 1089, 1092; Nasenausspülg. 848; Inj. vesic. 1569.  
**Ferrum sulfuricum** Pill. 754, 1567; pro infant. 1030; **Baln.** 1352; Streup. 2000.

**Filix mas, rhizoma.** Pill. 1278.  
**Flores Benzoës v. Acid. benzoic.**  
**Flores Sulfuris v. Sulfur sublimatum.**

**Flores Zinci v. Zincum oxydatum.**  
**Foeniculum, semina.** Spec. 227; Dec. 2084; Plv. 633.

**Galacetophenon.** Ungu. 1858.

**Gargarisma v. Gurgelwasser**

**Glycerinum.** Int. 526, 759, 907; **Bereitg. v. Jodoformgaze** 1373, 1374; **v. Tannin-Jodoformdocht** 1375; **v. Jodoformstäbchen** 1392; Ungu. 1327, 1676, 1746, 1743, 2143, 2145; **Pasta** 1667—1671, 1673; **Seife** 1735; **Kah-Crème** 1738; **Inhal.** 131, 1109; **Nasentampons** 1741; **Ohrtropf.** 2196, p. tub. 2247.

**Granatum v. Ponia Granatum.**  
**Guajacolum carbonicum.** Caps. gelat. 48, 133.

**Guajacum, lignum.** Dec. 2088.

**Guarana, Pasta.** Plv. 415

**Gummi Tragacantha** 2320

**Gurgelwasser** 211—213, 215, 613, 614, 616, 715—717, 719—722, 862—869, 1201, 1414, 1457, 1910, 2026—2030, 2101, 2103.

**Gypstheer** 1410, 1902, 2009.

**Haararhemittel** 1689—1696.

**Haargeist** 1681—1683, 1763—1766, 1769, 1876.

**Haaröl** 1328, 1739, 1740, 1762, 1812, 1813, 1874.

**Haarpomade** 1684—1687, 1697, 1873, 1875.



- Haller'sche Säure v. Elixirium acidum Halleri.  
Harnröhrenstäbchen v. Suppos. urethral.  
Heider'sches Zahnpulver 2283.  
Hepar sulfuris kalinum v. Kalium sulfuratum.  
Herniaria, herba. Spec. 1639, 1925, 1973.  
Homatropinum hydrobromatum. Augtrpf. 2141.  
Hydramylaether 1359.  
Hydrargyrum (purum). Ini. subc. 1888  
Hydrargyrum albuminatum. Ini. subc. 2039  
Hydrargyrum asparaginicum. Ini. subc. 2045.  
Hydrargyrum bichloratum corrosivum Int. Mixt. 2054—2057; pro infant. 900, 1121, 1340; Pill. 2058; pro infant. 2133; Ini. subc. 1360, 1406, 1884, 1885, 2037—2040, 2043; pro infant. 1122, 1346; Desinfect. 1364, 1365, 1447—1449, 1451, 1592, 1593; des Auges 2115; Baln. 1750, 1787, 1816, 1892, 2067, 2068; pro infant. 1079, 1345; Bepslg. d. Haut 1083, 1745, 1897, 1899, 1912, 2021, 2095—2097; z. Betupfen 1751, 1811; Waschw. 1703, 1781, Verbandw. 2017; Haargeist 1764; Ungu. 1797, 2099; Schnupfwasser 703, Nasenausplg. 1188, 2106; Mundw. 2315; Gargar. 2101; Bepslg. d. Mundschlhm. 1194, 2103, 2312, d. Rachens 214; Ausspritzg. des Rachens 1207; Inhal. 1111, 1129, 2110; Ini. vesical. 1539; Ini. vaginal. 1630; Bepslg. d. Trommelfelle 2172, 2177; Ohrtrpf. 2159, 2184, 2268; per tub. Eust. 2185.  
Hydrargyrum bicianatum. Ini. subc. 2042  
Hydrargyrum biiodatum rubrum Int. Pill. 2062; Ini. subc. 2044; Streuplv. auf Wunden 1384, 1431; Ungu. 2007, 2020; Nasensalbe 844, 1084, 1183, 2108; Nasenbougies 1191.  
Hydrargyrum chloratum mite v. Calomel.  
Hydrargyrum formamidatum. Ini. subc. 2041.  
Hydrargyrum iodatum flavum. Pill. 2059, 2060; Plv. (pro infant.) 1342, 2061.  
Hydrargyrum oleinicum Einsbg 2023; Ini. subc. 1888.  
Hydrargyrum oxydatum flavum. Ini. subc. 2050; Ungu. 1085; Augensalbe 1742, 2127.  
Hydrargyrum peptonatum. Ini. subc. 1886, 2040; pro infant. 1081.  
Hydrargyrum praecipitatum album. Ungu. 1300, 1400, 1666, 1704, 1758, 1847, 1848, 2098, 2100, 2126, 2200, 2207, 2216; Haarpomade 1685, 1768; Augensalbe 2116; Nasenbougies 1191.  
Hydrargyrum praecipitatum flavum v. Hydrargyrum oxydat.; H. p. rubrum v. Hydrarg. biiodat.  
Hydrargyrum salicylicum. Pill. 2065; Ini. subc. 2051.  
Hydrargyrum sozodolicum. Ini. subc. 2046.  
Hydrargyrum sublimatum v. Hydrarg. bichlorat.  
Hydrargyrum tannicum oxydatum. Pill. 2064; Plv. 1890, 2063; pro infant. 1078, 1341; Ini. subc. 1889.  
Hydrargyrum thymelicum (thymolo-aceticum). Pill. 2066; Ini. subc. 2052.

- Hydrogenium hyperoxydatum.** Int 2357; pro infant. 1212.  
**Hydromel infantum** 292, 293, 961, 1264, 1610.  
**Hydroxylaminum.** Ungu. 1857.  
**Hyoscinum hydrojodicum** Pill. 467; Ini. subc. 466.  
**Hyoscinum muriaticum.** Ini. subc. 807; 2380.  
**Hyoscyaminum.** Pill. 168.  
**Hyoscyamus, folia.** Spec. s. Mundw. 2000, Inh (Tabak) 62.  
**Hypnon.** Trpf 814.  
**Hypodermoklyse** 1255, 1605.  
**Jaborandi, folia.** Inf. 354.  
**Jalapa, radix** Plv. 300, 370, 629.  
**Ichthyolum v. Ammon sulf.** Ichthyolicum.  
**Infusion, intravenöse** 551.  
**Inhalation** 10—13, 52—55, 61, 62, 130, 181, 195, 217, 575, 601, 603, 652, 653, 673, 721, 727, 730—732, 735, 737, 746, 750—752, 893, 902, 903, 929, 1107—1111, 1125, 1129, 1142, 1154, 2109, 2110.  
**Insufflationen für die Nase** 1189, 1190, für den Rachen 1204, 1206; für den Kehlkopf 14, 15, 733, 734, 739, 741, 755, 1130.  
**Jodcollodium** 1401, 1818.  
**Jodglycerin.** Bepslg. u. Einreibg d. Haut 719, 1095, 1433, 1460, 1662, 1679, 1770, 1820, 2113; Nasenaussplg 714; Bepslg. d. Nasenschlmb 708, 713; des Pharynx 726; Bepslg. des Trommelfells 2175.  
**Jodoformium.** Int Pill. 2073; Plv. (pro infant.) 1307; Ini. subc. 1438, 1470, 2074—2077, Bereitg v. Jodoformgaze 1372—1374, v. Tannin-Jodoformdecht 1375; v. Jodoformstäbchen 1392, 1616, 2014; Verband 2005, 2015; z. Bepslg. d. Haut 1306, 1377, 1871; Ungu. 163, 167, 314, 337, 369, 478, 1663, 2259, 2271; Nasenbougies 712, 1191; Insufflation f. die Nase 1189, für Rachen 1206; f. d. Larynx 741, 745, 1100; Bepslg. d. Zahnfleisch 1198; d. Larynx 742; Ohrbougies 2158, Intr. urethral 1951; Suppos. urethr. 1509, 1956; Vaginaltampons 1633.  
**Jodoformäther** 742, 2005; Jodoformcollodium 1306, 1377, 1871. Jodoformgaze 1372, 1373, klebende 1374; Jodoform Glycerin 1438, 1470; Jodoformspray 2005; Jodoformstäbchen 1392, 1616, 2014.  
**Jodolum.** Int. Plv. (pro infant.) 1309, 1323, Ungu. 1308, 1322, 2250, 2272, Ohrtrpf. 2269.  
**Jodum purum.** Int. Mixt. 2079, 2136; pro infant. 1304, 1798, 1828. Pill. 2080, Ini. subc. 1401, Einreibg u. Bepslg. d. Haut 749, 1095, 1401, 1433, 1460, 1662, 1679, 1770, 1820, 2113; Verbandw. 2006, Ungu. 831, 1435, 1460, 1473, 1849, 1914, 2169, 2258; Suppos. 1905; Nasenaussplg 714, 2107, Bepslg. d. Nasenschlmb 708, 714, d. Pharynx 726, Inhal. 2109; Intr. urethral 1489. Bepslg. d. Trommelf. 2175.  
**Jodum tribromatum.** Nasenaussplg 1184.  
**Ipecacuanha, radix.** Emetic. Inf. 18, 220, 2318, pro infant. 8, 884, 897, Plv. 219, 222, 642, 2317, Expector. Inf. 38, 35, 39, 42, 88, 108, 116, 122, 150, 152, 181, 651, pro infant. 835, 888, 895, 909, 910, 914, 935, 1120, 1151; Plv. 44, 73,



**Obstruens** Inf. 503, 2370; Plv. 504.  
**Iris florentina**, radix. Streupulv. 1713; Zahnplv. 825, 2033, 2281—2284  
**Juniperus**, baccæ. Spec 357, Inf. 81, 164, 188.

**Kali-Crème** 1738.

**Kalium aceticum solutum** 80, 81, 164, 187, 352, 358, 638; pro infant. 829, 836, 932, 941, 947, 1020.

**Kalium bicarbonicum**. Int. Mixt 2355.

**Kalium bromatum**. Int. Mixt. 377; pro infant. 1039; Plv 448—451, 1464, 1620, 1916, 1917, 2257; pro infant 1045; Bepslg d. Phar. 580

**Kalium carbonicum**. Int. Mixt. 792; Pill. 754, 1030; Bereitg d. Liebig'schen Suppe 102; Baln. 1352; Ungu. 1868, 1869, 2173; Kali-Crème 1738; Ohrtrpf. 2146.

**Kalium causticum**. Baln. 1749; Verbandw. 1903; Umschlß. 1809; Einsplß. 1730, 1800, 1839; Aetzpasta 1698; Ohrtrpf. z. Int. per tub. Eust. 2185.

**Kalium chloricum** Int. Mixt. 1546, 1982; pro infant. 857, 876, 877, 1193, 1208, 2305; Pill. 1608; Nasenaussplß. 846; Mundw. 208, 852, 855, 1192, 1196, 1883, 2287, 2310; Gurgelw. 211, 212, 862, 864, 1414, 1457, 1910, 2036; Insuffl. für d. Rachen 1204

**Kalium hydrotartaricum** v. **Cremer Tartari**.

**Kalium hypermanganicum**. Desinfect 1366; Wundw 1412; Nasenaussplß 710; Mundw. 207, 1200, 2306; Gurgelw. 717,

869, 2105; Inhal. 736; Magenaussplß. 605; Ini. urethral. 1494, 1498, 1931; Ini. vesic. 1506, 1540, 1986; Ini vaginal. 1625; Augenw 2120; Aussplß des Ohres 2253.

**Kalium hyperosmicum**. Pill. 401.

**Kalium iodatum**. Int. Mixt. 40, 59, 60, 379, 886, 436, 786, 1458, 1893, 2069, 2070, 2086, 2336, 2340; pro infant. 835, 838, 918, 1040, 1118, 1123, 1147, 1304, 2132; Pill. 747, 1894, 2071; Plv. 488, 1468, 2273, Ini. subc. 1461, 2044, 2046; Einreibg. und Einsplß. 749, 1095, 1433, 1460, 1662, 1679, 1770, 1820, 2113; Verbandw. 2016; Waschw. 2225; Ungu. 832, 1435, 1459, 1473, 1964, 2169, 2188, 2258; Nasenaussplß. 714, 848; Bepslg. d. Nasenschleimh. 708, 713, d. Phar. 726; Inhal. 2109; Suppos. 1664, 1965; Ini. urethral. 1489; Ohrtrpf. 2178, Ini. per tub. Eust 2248. [639.

**Kalium nitricum**. Int. Mixt. 165,

**Kalium stibiotartaricum** v. **Tartarus emeticus**.

**Kalium sulfuratum**. Haarfärbemittel 1695; pro baln. 1316.

**Kalium sulfuricum**. Plv. 632.

**Kamala** 330, 568; pro inf. 1001, 1279.

**Kampferschleim**. Verbd. 1016, 2013; Aussplß. 1999; Klysm. 347, 498.

**Kaolinum**. Pasta 673; Ini. urethr. 1946.

**Kouessou**, flores 329, 569; pro infant. 1281.

**Kummerfeld'sches Wasser** 1672.

**Labarracque'scher Verband** 2093, 2094.

- Lac Sulfuris** v. **Sulfur praecipitatum**  
**Lactnecarium.** Plv. 148; Pill. 2060.  
**Laffecteur** v. **Roob Laffecteur**  
**Landolfsche Aetzpasta** 1802—1805  
**Lanolinum.** Ungu. 1052 -1054, 1056, 1059, 1825, 1733, 1746, 1759, 1767, 1821, 1826, 1854, 1866, 1909; Pasta 1680; Ini. subc. 1888  
**Lapis** v. **Argentum nitricum**  
**Lapis Baptistae** 1677.  
**Lapides Cancrorum.** Plv. 958, 1231.  
**Lapides Pumicis** 2087.  
**Lassar'sche Schäl pasta** 1680.  
**Lassar'sche Zinkpasta** 1728.  
**Latschenöl** v. **Ol pumilion. aether.**  
**Laudanum** v. **Opium**  
**Levisticum, radix.** Spec. 357.  
**Lignum Campechianum** v. **Campechia.**  
**Linimentum exsiccans** 1842, 1855.  
**Linimentum saponato-camphoratum** v. **Opodeldoc.**  
**Linum, semina.** Dec. 1481, 1510, 1974.  
**Liparinum** 1354.  
**Lippensalbe** 2100  
**Liquiritia, radix.** Dec. 2084, 2085; Pill. 443, 2080; Pulv. 633; Ext. Past. 1701, 1805.  
**Liquor acidus Halleri** v. **Elixir. acid. Halleri.**  
**Liquor Ammonii acetici** v. **Spiritus Mindereri.**  
**Liquor Ammonii caustici** v. **Ammonia pura liquida.**  
**Liquor Ammonii anisatus** 38, 89, 49, 88, 104, 108, 119, 120, 496, 497, 656, 1396, 2327; pro infant. 894, 904, 914—916, 931, 977, 987, 1120, 1136; Klysm. 2346.  
**Liquor Burowi** 182, 1379, 1453, 1454, 1718; Inhal. 1127.  
**Liquor Ferri sesquichlorati** v. **Ferrum sesquichloratum solutum.**  
**Liquor Hoffmanni** v. **Bals vit. Hoffmanni.**  
**Liquor Hollandicus anaestheticus.** Ohrtrpf. 2249  
**Liquor Hydrargyri nitrici oxydati.** Haarfärbemittl. 1690  
**Liquor Kali acetici** s. **Liquor Terrae foliatae Tartari** v. **Kalium aceticum solutum.**  
**Lister'sche Pasta** 1710.  
**Lithargyrum** Ungu. 1720.  
**Lithium carbonicum.** Mixt. 366; Plv. 356, 367, 1557, 1558.  
**Lithium iodatum.** Pill. 2072.  
**Lugol'sche Lösung** v. **Solut. Lugoh.**  
**Lupulinum.** Pill. 816; Plv. 1514, 1916, 1969.  
**Lycopodium, semina.** Streup. 1060.  
**Lysolum** Ini. vaginal. 1595, 1629  
**Magenausapfllung** 605, 606, 1243, 1244.  
**Magisterium Bismuthi** v. **Bismuth subnitric.**  
**Magnesium carbonicum.** Int. Mixt. 565, 2348, 2362; pro infant. 1221; Plv. 243, 303, 991, 992, 1010, 1269, 1615, Zahnpulv. 826, 1105, 1106, 2281—2283, Insuffl. f. d. Nase 1189.  
**Magnesium citricum.** Mixt. 290, 826.  
**Magnesium oxydatum, Magnesia usta.** Int. Mixt. 565, 1472, 2333, 2366; Plv. 225, 281; pro infant. 1007.  
**Magnesium sulfuricum.** Int. 296, 319, 2090, 2349; pro infant. 1268, 1283, 1291; Klysm. 383; Darmirrig. 324.

**Maltum.** Dec. 1088.  
**Malva folia.** Spec. zu Mundw. 2300; Garg. (Dec.) 715.  
**Mannit** 960, 1265.  
**Mastiche.** Zahnharz 2296.  
**Medulla ossis bovis.** Haarpom 1687.  
**Meglin'sche Pillen** 2274.  
**Mel rosatum.** Gurgelw. 1910; Pinselsaft 209, 1434.  
**Melissa, herba.** Spec. 454; Inf. 678.  
**Mentha, piperita, folia.** Spec. 227.  
**Mentholum.** Int. 578; Einreibg. 411; z. Eintupfen 1830, 1907; Ini. in d. Larynx 743.  
**Mercurius praecipitatus albus, flavus, ruber** v. Hydrarg. praecipit. alb., flav., rubr.  
**Mercurius sublimatus corrosivus** v. Hydrargyr. bichlorat. corros.  
**Methylal.** Ini. subc. 815.  
**Mixtura Choparti** 1922.  
**Mixtura oleosa** v. Emulsio oleosa.  
**Morphium aceticum.** Int. Plv. 2276; Einreibg. 2252; Ungu 2154, 2213; Ohrtrpf. 2153, 2164.  
**Morphium muriaticum.** Int. Mixt. 2, 6, 25, 28, 34, 179, 283, 353, 459, 646, 785, 1515; pro infant. 1049; Trpf. 4, 45, 145, 178, 194, 223, 259, 261, 336, 343, 1589; Plv. 24, 32, 43, 77, 92, 94, 99, 144, 161, 183, 253, 285, 322, 334, 375, 438, 645, 700, 728, 729, 1390, 1516, 1641, 1916, 1969; Ini. subc. 20, 58, 96, 160, 256, 257, 342, 558, 701, 702, 805, 1406, 1606, 2038; Ungu. 433; Zahntrpf. 2292, 2293; Zahnpasta 2297, 2298; Insuffl. in d. Larynx. 15, 784, 789, 743; Suppos. 345, 408, 511, 1488, 1618, 1620, 1971; Suppos. vaginal. 1642; Ohrtrpf. 2150.

**Morphium phtalicum.** Ohrtrpf. 2229.  
**Moschus orientalis.** Trpf. 2358; Plv. 1417; pro infant. 880, 988.  
**Mucilago Salep.** Klysm. 660, 677.  
**Mundwasser** 207, 208, 616, 852, 853, 855—858, 1104, 1192, 1196, 1197, 1199, 1200, 1883, 2026—2030, 2287—2291, 2299—2302, 2306—2311, 2314—2316.  
**Myrtolum.** Caps. gel. 128, 604.  
**Naphthalinum.** Plv. 681, 1547; Inh. nach 928.  
**Naphtolum.** Streup. 1786, Waschw. 1702, 1783; Einpslg. 1725, 1773; Einreibg. 1814, Haargeist 1769; Haaröl 1740, 1762, 1813; Haarpomade 1767; Pasta 1671, 1680; Ungu. 1066, 1320, 1726, 1756, 1792, 1825; Seife 1774.  
**Nasenausspülung** 710, 711, 714, 840—843, 846—848, 1184—1188, 2106, 2107, 2242—2246.  
**Nasenbougies** 704, 705, 712, 1191.  
**Nasensalbe** 844, 1084, 1183, 2108.  
**Natrium arsenicosum.** Int. Mixt. 757, 1886; Ini. subc. 1795, 1837.  
**Natrium benzoicum.** Int. Mixt. 1984; pro infant. 982, 1155, 1230, 1246; Plv. 596; Streup. 1301; Bepslg. d. Zahnfleisch. 1198; Inhal. 1108; Magenausspülg. 1244; Darmirrig. 1261.  
**Natrium bicarbonicum.** Int. Mixt. 338, 356, 385, 909, 954, 1117, 1148, 1230; Plv. 3, 6, 7, 31, 43, 46, 70, 183, 225, 231—234, 241, 262, 259, 302, 304, 339, 348, 367, 528, 531, 545, 546, 563, 564, 572, 632, 728, 756, 920, 925, 1103, 1157, 1389,

- 1391, 1558, 1577, 1665, 2349;  
Streup 1301; Infusion 551;  
Nasenausspülg. 2246; Mundw.  
358; Inhal 11; Insuff. f. d.  
Nase 1190; f. d. Phar. 1206;  
Darmirrig 989; Ohrtrpf. z. Ini.  
p. tub. Eust. 2239, 2247.
- Natrium boracicum.** Int. Mixt.  
452; Plv. 454; Ungu. 704;  
Mundw. 853, 856, 857, 1199,  
2291, 2309; Gargelw. 863;  
Bepülg. d. Zahnfleisch 209, 1434;  
Insuffl. f. d. Phar. 1205; Inhal.  
746; Ohrenbougies 2157; Ohrtrpf.  
z. Ini. per tub. Eust. 2180.
- Natrium bromatum.** Int. Mixt.  
196, 388, 419, 442, 666, 771,  
787; pro infant. 923, 1138,  
1297; Plv. 448—451, 461, 546,  
681, 667, 762, 790, 1577, 1578,  
1620.
- Natrium carbonicum.** Hypoder-  
m. klyse 1255; Ohrtrpf. 2146,  
2195, 2237.
- Natrium causticum solutum.** Inhal.  
1126.
- Natrium chloratum.** Int. Mixt.  
2055; pro infant. 1177, Plv.  
252, 302, 632; Ini. subc. 1122,  
1885, 1887, 2038. Hypodermo-  
klyse 1255, 1605, Infusion 551;  
Nasenausspülg. 2246; Inhal.  
11, 12; Darmirrig. 343; Ini.  
vesical. 1529.
- Natrium iodatum.** Int. Mixt. 51,  
64, 197, 246, 379, 387, 388, 396,  
476, 576, 599, 761, 787, 1893;  
pro infant. 1139, 1163, 1297,  
1305; Plv. 1694, Plv. 351,  
362, 748; Ungu. 480.
- Natrium nitricum.** Plv. 801.
- Natrium nitrosum.** Plv. 625.
- Natrium phosphoricum.** Mixt. pro  
infant. 827; Plv. 1558, 1577,  
1665; Ini. subc. 2044.
- Natrium salicylicum.** Int. Mixt.  
221, 364, 392, 409, 422, 473,  
507, 524, 590, 595; pro infant.  
944, 975, 1149, 1163, 1168,  
1178, 1209, 1333; Plv. 339,  
348, 413, 472, 546, 594, 686,  
1407, 1545, 1678, 2134, 2137;  
Streup. 1312; Nasenausspülg.  
2246; Mundw. 1104; Zahn-  
pulv. 1105; Inhal. 903; Ini. ure-  
thral 1949; Ini. vesical. 1528.
- Natrium silicicum.** Verbl. 1491.
- Natrium subsulfurosum.** 2354.
- Natrium sulfichthyolicum.** Ungu.  
1846.
- Natrium sulfuricum.** Int. Mixt.  
2344; Plv. 234, 252, 303,  
339, 348, 632; Klysm. 299,  
372, 384; Ini. vesical. 1529,  
1991.
- Natrium tannicum.** Plv. 204.
- Natrium telluricum.** Int. nach  
587.
- Nicotiana, folia.** Klysm. (Inf.)  
1476.
- Nitroglycerinum.** Pill. 624; Pastill.  
198.
- Nux iuglandis, putamen.** 2057.
- Ohrenbougies.** Ohrmandeln, 2149  
— 2151, 2157, 2158.
- Ohrentropfen.** 2146, 2147, 2152,  
2153, 2159—2166, 2176, 2182—  
2184, 2190—2193, 2195, 2211,  
2212, 2215, 2221—2224, 2229  
— 2231, 2234—2237, 2265—  
2270, z. Ini. per tub. Eust.  
2179, 2180, 2185, 2186, 2238,  
2239, 2241, 2247—2249, 2280.
- Oleum Amygdalarum.** Int. 124,  
129, 570, 1100, 1440, 1441,  
1921, 1970, 2367; Ini. subc.  
2050; Ungu. 1706, Ohrtrpf.  
2193.
- Oleum Aurantiorum florum.** 1734.
- Oleum Bergamottae.** 163, 478,  
1669, 1673, 1687, 1872.



- Oleum cadinum 1841, 2144, 2204;  
Ungu. 824, 1063, 1317, 2205.  
Oleum camphoratum. Ini subc  
83, 500, 550, 802.  
Oleum Caryophyllorum 1670,  
1765, 1868, 1869, 2188, 2298,  
2303  
Oleum Cassiae 1697.  
Oleum de Cedro 1687.  
Oleum Chamomillae 979.  
Oleum Cinae aethereum 570, 571.  
Oleum Cinnamomi. Int. 1218,  
1233, 1603; Ungu 1868.  
Oleum Crotonis 17, 301, 320,  
631.  
Oleum Eucalypti. Pill. 537.  
Oleum Fagi 1732, 1841; Ungu  
1327, 1731, 1736, 2203, Sapo  
1734, zu Gypsather 1410, 1902,  
2009  
Oleum Foeniculi 979, 2271.  
Oleum Gaultheriae. Caps. gelatin.  
2135.  
Oleum Hyoscyami coctum. Ein-  
rbg. 425, 2155; Ohrtrpf. 2192;  
Ol. H. pressam Ohrtrpf. 2230.  
Oleum iecoris Aselli. Int. Mixt.  
134, 1096, 1097, 1101, 1137,  
1145, 1146, 1353, 1442, 1798,  
1828, 1829, 2079; Caps. gela-  
tinos 182, 608; Einsalg. 1732.  
Oleum Juniperi Inhal. 10, 730.  
Oleum Lauri 1815, 1875.  
Oleum Lavandulae 685, 1720,  
1843, 1866, 1868, 1869, 1872.  
Oleum Lini 102, 1015, 1395,  
1709; Ungu. 1823.  
Oleum Macidis 1765.  
Oleum Menthae piperitae 825,  
1106, 1106, 1670, 1866, 1868,  
2259, 2282, 2283, 2285, 2286,  
2288, 2286.  
Oleum Naphae 1675, 1684, 1704,  
1866.  
Oleum Neroli 1677.  
Oleum Origani 2272.  
Oleum Petrae 1315, 1812, 1815  
1865.  
Oleum Pini aethereum Inh. 52;  
Ini. per. tub. Eust. 2240.  
Oleum Rosedae 1674, 1684, 1706.  
Oleum Ricini. Int. 286, 247, 301,  
317, 501, 570, 571, 626, 631,  
1387; pro infant. 1004, 1291;  
Klysm 112, 288, 342, 833; Darm-  
irrig 1273; Ini subc 1470,  
2075; Einsalg. 1818, 1871.  
Oleum Rosarum 844, 1674, 1677,  
1885, 1704, 1706, 1738.  
Oleum Rosmarini 1670.  
Oleum Rusci 1732, 1841, 1843,  
2144; Ungu 1793, 2145; Linim.  
1842, Seife 1735; Haargeist  
1769.  
Oleum Santali ligni 1924; Caps.  
gelatin. 1543, 1979.  
Oleum Sinapis. Einrbg 482, 554.  
Oleum Terebenthinae. Int. Mixt  
124, 2365; Trpf. 55, 123, 349,  
1923; Pil. 672; Caps. gelat.  
97, 125, 350, 1541, 1554, 1977;  
Ungu 1382; Inhal. 10, 52, 601,  
730.  
Oleum Vaselini. Ini. subc. 1889,  
2049.  
Ononis spinosa, radix. Spec. 357;  
Inf. 638; Dec. 80; pro infant.  
941, 1021, 1176.  
Opium. Int. Pill. 1835, 2059,  
2064; Pulv. 109, 114, 115, 269,  
271, 272, 274, 277, 284, 311,  
325, 335, 492—494, 505, 506,  
546, 611, 676, 1391, 1419, 1423,  
1425, 1612, 1613, 1890, 1891,  
2053, 2328, 2370; pro infant.  
983; Klysm 255; Suppos  
510, 1831; Pasta 1701; Em-  
plastr 1777; Zahnpillen 2294.  
Opodeldoo v. Balsam Opodeldoo.  
Oxydum Zinci v. Zinc. oxydat.  
Oxymel Scillae 80, 164, 188, 639,  
2318; pro infant. 942, 1176.

- Pancreatinum** Plv. 1103.  
**Papaver, semina.** Dec. Ohrtrpf. 2152.  
**Paraffinum.** Ini. subc. 2048, 2051, 2052; Ungu. 1706, 1721.  
**Paraldehydum** 460, 663, 773, 796, 812, 2329.  
**Pasta Cosmi** 1806.  
**Pasta dentifricia** 2285, 2286.  
**Pasta Guarana** 415.  
**Pasta Landolfi caustica** 1802—1805.  
**Pasta Viennensis caustica** 1698—1700.  
**Paullinia sorbilis** Plv. (pro infant.) 968, 995, 1229.  
**Pelletierinum tannicum.** Plv. 1282.  
**Pepsinum Germanicum** Mixt. 1219; Plv. 237, 951.  
**Pepton** Ini. subc. 2040.  
**Peptonquecksilber v. Hydrargyrum peptonatum**  
**Petroleum v. Oleum Petrae.**  
**Petroselinum, radix.** Spec. 357.  
**Phenacetinum.** Pulv. 140, 360, 374, 389, 572, 562.  
**Phenol v. Acid. carbolie.**  
**Physostigminum salicylicum.** Ini. subc. 2337.  
**Phosphorus.** Pill. 693, 2369, Mixt. (pro infant.) 1100, 1101, 1440—1442, 1829.  
**Pilocarpinum muriaticum.** Ini. subc. 355, 637, 2136, 2277, 2335, 2356; Augtrpf. 2138.  
**Pilulae asiaticae** 1793, 1834; cum Opio 1835.  
**Pilulae Blandii** 754, 1465.  
**Pinus, turiones** 1058.  
**Piper nigrum.** Pill. 1834, 1835.  
**Piperazinum.** Mixt. 368.  
**Piperinum.** Pill. 637.  
**Pix liquida.** Bepalg. d. Augentlider 211, d. Zahnflsch. nach 2024.  
**Plenck'sche Solution.** 1699, 2096.  
**Plumbum aceticum.** Ini. Plv. 85, 494, 659, 700, 2349; pro infant. 972; Umschlg. 1062; Sol. Burrowi 1453, 1454, 1718; Haarfarbemittl. 1691; Inhal. 1127. Darmirrig. 1258; Suppos. 316; Ohrtrpf. 2162, 2223, 2236, 2266.  
**Plumbum aceticum basicum** Umschlg. 162, 1071, 1379, 1717, 1877, 1998; Ungu. 1821; Ini. urethral. 1933, 1937, 1948. Ini. vagin. 1299; Ohrtrpf. 2153, 2164, 2165.  
**Plumbum carbonicum v. Cerussa.**  
**Plumbum iodatum** Ungu. 1968.  
**Plumbum oxydatum v. Lithargyrum.**  
**Podophyllum.** Mixt. (pro infant.) 1266; Pill. 310, 635; Plv. 309.  
**Polygala Senega, radix.** Inf. 86, 49, 117; pro infant. 894, 915, 936, 1131, 1135, 1136, 1143, 1152, 1167—1169, Dec. 656.  
**Poudre v. Streupulver**  
**Protoioduretum Hydrargyri v. Hydrargyrum iodatum.**  
**Pulvis dentifricus albus** 2032, 2282; P. d. niger 2631.  
**Pulvis Doveri** 3, 75, 76, 275, 278, 491, 675, 1612; pro infant. 968, 970, 973, 976, 984, 996, 1008, 1114, 1115, 1229, 1231, 1235, 1237, 1238, 1240, 1242, 1260; Pill. 157.  
**Pulvis Liquiritiae compositus** 630.  
**Punica Granatum, cortex radiceis** 328, 566, pro infant. 1002, Pill. 1276, 1280.  
**Pyridinum.** Inhal. 375.  
**Quassia, lignum.** Inf. 239.  
**Quebracho, cortex.** Macerat. 79.  
**Quecksilber-Albuminat.** Ini. subc. 2039.  
**Quecksilber-Formamid.** Ini. subc. 2041.



Quecksilber-Harnstoff. Inj. subc. 2043.

Quecksilber-Pepton. Inj. subc. 1886, 2040; pro infant. 1081

Quercus, cortex. Zu Bädern 1817; Waschw. (Dec.) 1780.

Ratanhia, radix. Dec. 281.

Resina Jalapae. Plv 318.

Resorcinum. Int. Mixt. (pro inf.) 927, 1249; Einslg. 2004; Streup 2003, Ungu. 2002; Pasta 1915; Bepsig. d. Larynx 744, 930; Magenaußspltg. 1243; Darmirrig. 1263; Inj. urethral 1939; Inj. vesic. 1527, 1536, 1989; Ohrtrpf 2270.

Rheum chinense, radix. Inf. (pro inf.) 1067; Pill. 305, 306, 307, 310, 326, 691; Pulv. 233, 234, 282, 288, 304, 333, 529, 564, 634, 755, pro infant. 991, 992, 1007, 1010, 1224, 1269, 1349, 1356, Klysm. (Inf.) 382.

Rhum 2057.

Ricinus v. Oleum Ricini

Ricord'sche Harnröhren-Injection 1933.

Ricord'sche Pillen 2060.

Roob Juniperi 165, 941, 1021, 1162.

Roob Laffecteur 2091.

Rosa, flores. Dec. 2091.

Sabina, frondes. Streup. 1914, 2000, 2001.

Saccharinum, vor 545.

Saccharum Saturni v. Plumbum aceticum.

Sal amarus v. Magnesium sulfuricum.

Sal ammoniacus v. Ammonium chloratum

Sal Carolinensis 252, 302, 632.

Salap, tubera. Int. Dec. 268, 1611;

Klysm Dec. 276, 839, 990 998, 1069.

Salicyl Collodium 1901.

Salicyl Seifenpflaster 1729.

Salipyrinum. Mixt. 526; Pulv. 525.

Salolum. Plv 474, 597, 1548, 1646.

Salvia, folia. Inf. 555; Mundw. (Inf) 2407; Garg. (Inf.) 213, 614, Zahnplv. 2031.

Sambucus, flores. Inhal Inf. 727.

Sandaracca. Zahnharz 2296.

Santoninum. Mixt. 570, 1004; Plv. 331, 338, 1287; Pasta 571; Trochisc. 332.

Sapo amygdalinus Zahnplv. 2281.

Sapo medicinalis Int Pill. 306; Darmirrig 1284; z Waschen 1734, Zahnpasta 2286.

Sapo venetus Zahnplv. 2284; Zahnpasta 2285.

Sapo viridis 685, 1774, 1838, 1872; Pasta 1680; Ungu. 1063, 1066, 1731, 1864, 1867; Zahnpasta 1106.

Sassaparilla, radix. Dec. 2084, 2085, 2087 2089, 2091.

Schminkpoudre 1677, 1707.

Schminksalbe 1674—1676, 1708.

Schminkwasser 1678.

Schnupfwasser 703.

Schwefel v. Sulfur.

Sebum ovillum. Ungu. 1382.

Secale cornutum. Inf. 1601; Pill. 767, Pulv. 766, 1600, 1617, 1648

Senega v. Polygala Senega.

Senna, folia. Int. Inf. 16, 297, 319, 633, 1388, 1609, 2090, pro infant. 1268, 1283, 1471; Dec. 2084, 2091; Plv. 633; Klysm. (Inf) 112, 298, 299, 372, 383; Darmirrig. (Inf.) 1272.

- Sepia*, os. Zahnplv. 825, 1106, 2033, 2283, 2284.  
*Serum lactis aluminatum* 1551.  
*Solutio arsenicalis Fowleri*. Int. 66, 137, 157, 260, 418, 444, 518, 519, 612, 668, 781, 791, 1444, 1462, 1752, 1778, 1833; pro infant 1036, 1037, 1046, 1076, 1164, 1170, 1510; Ini. subc. 670, 1445, 1463, 1794, pro infant 1034, 1035.  
*Solutio Burowi v. Liquor Burowi*.  
*Solutio Lugoli*. Ini. subc 1461; Bepslg d Phar. 726.  
*Solutio Pearsonii*. Int. 757, 1836, Ini. subc. 1837.  
*Solutio Plenckii* 1899, 2096  
*Solutio Vlemingks* Baln. 1844.  
*Somnal Mixt* 764.  
*Sparteinum sulfuricum*. Plv. 621.  
*Species laxantes St. Germain* 308.  
*Species pectorales* 27.  
*Spiritus Aetheris nitrici* 108, 185, 1175.  
*Spiritus antivenereus van Swieten* 2056  
*Spiritus aromaticus*. Einreibg 427, 553, 2250, 2276.  
*Spiritus camphoratus* Einreibg. 481, 554, 1669.  
*Spiritus Coloniensis* 1678, 1715, 1783; Haargeist 1681, 1691, 1696.  
*Spiritus Formicarum* 2251, 2276.  
*Spiritus Frumenti*. Garg. 719, 722.  
*Spiritus Lavandulae* 153, 1607, 1669, 1684, 1715, 1769, 1771, 1906.  
*Spiritus Mindereri* 186, 2232.  
*Spiritus Resedae* 1690.  
*Spiritus saponis Kalni*. Einreibg u. Emplsg. 385, 553, 1669—1671, 1702, 1735, 1769, 1771, 1773, 1840, 1865.  
*Spiritus Sinapis* 385, 2250 2276.  
*Spiritus Vini rectificatus* Ini. subc 1254; Emplsg 1499, 2096; Pasta 1671. Aetzipasta 1700; Ungu. 1065; Inhal 750.  
*Spiritus Vini Gallici* Int. 775; z. Betupfen 153, 1715, 1761, 1782, 1796, 1905—1907, Einreibg. 411, 822. Waschw 1783; Haargeist 1764—1766, 1876; Pasta 1667, 1668; Gargar. 721; Inhal 732.  
*St. Germain-Thee* 308.  
*Stibium chloratum*. Aetzipasta 1803.  
*Stibium sulfuratum aurantiatum v. Sulfur auratum Antimonii*.  
*Stibium sulfuratum nigrum* 2087.  
*Stimulantia v. Excitantia*.  
*Stokes'sche Mischung* 98.  
*Stramonium, folia*. Inh. (Tabak) 61, 62.  
*Streupulver* 154, 1060, 1061, 1290, 1301, 1312, 1324, 1394, 1677, 1708, 1713, 1714, 1784—1786, 1914, 1996, 1997, 2000, 2001, 2003.  
*Strychninum nitricum*. Int. Tipf. 2279; Plv. 1580; Ini. subc. 441, 811, 1479, 1582, 2140, 2324, 2368; pro infant. 882; Einreibg. 2278; Streup. 1581.  
*Styrax liquidus*. Einreibg. 1865; Ungu. 1867; pro infant 1065, 1330.  
*Sublimat v. Mercurius sublimatus corrosivus*.  
*Sublimat-Alkohol* 1451.  
*Sublimat-Collodium* 1745, 1807, 2097.  
*Succus Citri* 338, 569, 682, 1087; Haarpomade 1687.  
*Sulfonal*. Plv. 462, 665, 763, 796; pro infant. 1160.

Sulfur praecipitatum sive Lac Sulfuris Int. Plv. 633; Einslg. 1769, 1771; Waschw. 1672; Ungu. 1869; Pasta 1667, 1668, 1670, 1680, 1879

Sulfur sublimatum s. citrinum sive Flores Sulfuris. Int. Mixt. agit. 2358; Bahu. 1844; Ungu. 1781, 1733, 1866—1868; Pasta 1669, 1671.

Sulfur auratum Antimonii. Plv. (pro inf.) 1115.

Suppositoria 316, 345, 408, 510, 511, 556, 557, 817, 821, 1480, 1488, 1517—1520, 1562, 1664, 1747, 1748, 1831, 1832, 1965, 1971, 1972.

Suppositoria urethralia 1501—1503, 1508, 1509, 1586, 1587, 1958—1962.

Suppositoria vaginalia 1642.  
van Swieten's Liqueur 2055.

Syrupus acetositatis Citri 101, 155, 354, 1088, 1292.

Syrupus Althaeae 1, 910, 933, 936, 2305.

Syrupus Amygdalarum 2, 28, 29, 34, 116.

Syrupus Diacodii 273, 280, 503, 507, 1481, 1510; Gargar. 715, 719, 722

Syrupus emulsivus v. Syrup. Amygdal.

Syrupus Ferri iodati 2082, 2083, 2187; pro infant. 919, 1082, 1094, 1146, 2131. [908.

Syrupus Ipecacuanhae 8, 33, 897, Syrupus mannatus 630, 962, 1067, 1162, 1268, 1283.

Syrupus Rhei 283

Syrupus Sassaparillae 2089.

Syrupus Senegao 36, 89, 915, 1118, 1148, 1163.

Syrupus balsami Tolutani 1922.

Talcum venetum. Streup. 154, 1394, 1677, 1714, 1996.  
Schminkw. 1678.

Tamarindus, pulpa. Dec. 289, 290; Elect. 568.

Tanacetum, herba. Inf. 1283.

Tanninum v. Acidum tannicum.

Tannin-Jodofermdocht 1375.

Tanno-Glycerin. Zahnpasta 2298.

Tartarus emeticus sive stibiatus Emet. Mixt. 18, 2318; pro infant 883, 896, 913, 1112, 1113; Plv. 219, 222, 642, 2317; Expect. Mixt. 649.

Terebinthina. Pill. 1978.

Terpinum hydratum. Plv. 1542.

Thallinum sulfuricum. Plv. 593.

Theerseife 1754, 1755.

Theobrominum natrosalicylicum v. Diureticum

Thymolum v. Acidum thymicum.  
Tilia, flores. Inf. 2232; Garg. Inf. 1910.

Tinctura Absynthii composita 230, 444, 687, 1036, 1037.

Tinctura Aconiti. Haargeist 1683.

Tinctura amara 185, 187, 230, 242, 1036, 1076, 1420.

Tinctura Ambrae. Bepslg. d. Ge-  
höriggs 2255.

Tinctura Arnicae 2189.

Tinctura aromatica 696, 1927.

Tinctura Aurantiorum corticis 239, 246, 804, 812.

Tinctura Belladonnae 159, 432; pro infant. 71, 921, 1141, 1158; Einslg. 2254.

Tinctura Benzoës. Z Eintupfen 1907; Waschw. 1703; Haargeist 1682, 1876; Ungu. 1676, 1705; Haarpomade 1685.

Tinctura Bestuscheffii nervino-  
tonica 381, 543; pro infant. 850, 946, 965, 1097, 1136  
1182, 1241.

- Tinctura Cannabis Indicae* 1511.  
*Tinctura Cantharidum*. Bepslg. 1398; Haarpomade 1687.  
*Tinctura Capsici*. Klysm. 2346; Haargeist 1683.  
*Tinctura Cascarillae* 246, 958, 965, 967, 969, 1233.  
*Tinctura Castorei* 264, 455, 456.  
*Tinctura Catechu*. Int. 1233; Mundw. 2308, 2311; Bepslg. d. Zahnflsch. 2304; Ini. urethr. 1952.  
*Tinctura Chinae simplex* 935; Zahntinct. 2303; T. Ch. composita 71, 138, 238, 518, 533, 534, 860.  
*Tinctura Cinnamomi* 245, 460, 1682.  
*Tinctura Colchici* 548.  
*Tinctura Ferri acetici aetherea* v. Tinct. Bestuscheff. nervinotonica [1754].  
*Tinctura Ferri albuminati* 690.  
*Tinctura Ferri pomati* 135, 418, 533, 687, 936, 1037, 1046, 1076, 1444, 1466, 1752.  
*Tinctura Gallarum*. Bepslg. d. Haut 684, 822, 1661, 2011; Bepslg. d. Zahnflsch. 210, 539, 2034, 2036; Mundw. 616.  
*Tinctura Jodina*. Int. 579, 2078, 2322, Einreibg. u. Bepslg. 684, 1386, 1661, 1818, 2011, 2112; Ini. subc. 1405, 1443; Mundw. 2316; Bepslg. d. Trommelf. 2171.  
*Tinctura Lobeliae* 63, 193.  
*Tinctura Malatis Ferri* v. Tinct. Ferri pomat.  
*Tinctura Myrrhae*. Mund- u. Gurgelw. 614, 1192, 1196, 2311; Bepslg. d. Zahnflsch. 2036.  
*Tinctura Nucis vomicae* 138, 224, 238, 246, 264, 455, 534, 1420; pro infant. 959.  
*Tinctura Opii benzoica* 63.  
*Tinctura Opii crocata*. Int. 265, 281, 548; Einreibg. 434; Schnupfw. 704; Gurgelw. 1910; Augtrpf. 2119, 2121; Bepslg. d. Trommelf. 2171.  
*Tinctura Opii simplex*. Int. 1, 152, 173, 273, 279, 280, 503, 674, 678, 779, 1481, 1482, 1604, 1611, 1974, 2345, 2351, 2373; pro infant. 934, 953, 967, 969, 974, 975, 979, 994, 996, 997, 1005, 1025, 1089, 1090, 1151, 1230, 1232—1234, 1236, 1239, 1241, 1246, 1249, 1288, 1332, 1333; Klysm. 276, 1659; pro infant. 930, 998, 1026, 1259, Einreibg. 482; Umschl. 1480, 2209, 2228; Bepslg. d. Zahnflsch. 210, 2035; Zahnrpf. 2292; Mundw. 2299; Gurgelw. 212, 213, 715, 716, 722, 2233; Inhal. 751. Ini. urethr. 1952. Ini. vesical. 1523; Ohrtrpf. 2152, 2165, 2166, 2182.  
*Tinctura Pyrethri*. Mundw. 2290.  
*Tinctura Quaesiae* 245.  
*Tinctura Quebracho* 78.  
*Tinctura Ratanhiae*. Int. 958, 967, 969, 1225, 1233, Bepslg. d. Haut 2112, Bepslg. d. Zahnflsch. 210, 539, 2034, 2303; Mundw. 616, 2308.  
*Tinctura Rhei aquosa* 203, 1610; pro infant. 861, 1009, 1259.  
*Tinctura Rhei vinosa* s. Darelli 229, 243, 696, 699, 860, 959, 966, 999, 1223, 1289, 1466, 1762.  
*Tinctura Rusci* 1716, 1843.



**Tinctura Spilanthis oleraceae.**  
Bepsig. d. Zahnflsch. 2035,  
2304.

**Tinctura Strophanti** 86, 108, 166,  
171, 172, 194, 200, 619, 800;  
pro infant. 950.

**Tinctura Tormentillae** Bepsig.  
d. Zahnflsch. 2036.

**Tinctura Valerianae** 193, 265,  
456; pro infant. 1189; Bepsig.  
d. Gehörgangs 2256; Ohrtropf.  
2191.

**Tinctura Veratri** 201.

**Tolubalsam v. Balsamum de Tolu.**

**Traumaticinum** 1853, 1856.

**Trifolium fibrinum, folia.** Spec.  
227.

**Unguentum Althaeae** 315.

**Unguentum aromaticum** 978.

**Unguentum basilicum** 1382.

**Unguentum Cerussae** 1050, 2197.

**Unguentum cinereum v. Ungu.**  
**Hydrargyr.**

**Unguentum Diachylon Hebra**  
845, 1051, 1720, 2196.

**Unguentum Glycerini** 2143.

**Unguentum Hydrargyri cinereum**  
899, 1080, 1338, 1404, 1436,  
1882, 1963, 2022, 2125; Suppos.  
1480.

**Unguentum Naphtoli compositum**  
1864.

**Unguentum Rochardi** 1849.

**Unguentum Rosarum** 2100.

**Unguentum Vaselini plumbicum**  
1619, 1721.

**Unguentum Wilkinsonii** 1731,  
1845.

**Unguentum Wilsonii** 1723, 2206.

**Unna'sche Essigsäure-Pasta** 1673.

**Urea, Ini.** sube 2043

**Urethanum.** Plv. 662.

**Urtica dioica, herba.** Spec. 1522.

**Uva ursi, folia.** Spec. 1521, 1639,  
1925; Inf. 1483.

**Vaginalkugeln v. Suppositoria**  
**vaginalia.**

**Valeriana, radix.** Int. Inf. 89,  
104, 120—122, 191, 497; Pill.  
2274; Pulv. 583; Klysm. (Inf.)  
22, 378.

**Veratrinum.** Einreibg 407, 2155;  
Waschw 1703; Ungu 406,  
426, 433, 480, 484, 2260.

**Vinum Condurango** 698, 699.

**Vinum Pepsini** 695.

**Vlemingkx. v. Solutio Vlemingkx.**

**Waschwasser** 340, 341, 1702,  
1708, 1779—1783.

**Weinberg's Salbe** 1867.

**Wiener Aetzpasta** 1698—1700.

**Wilkinson-Salbe** 1731, 1845.

**Wilson-Salbe** 1723, 2206.

**Zahnharz** 2295, 2296.

**Zahnpasta** 2285, 2286, 2297,  
2298.

**Zahnpulver** 825, 1105, 1106,  
2031—2033, 2281—2284.

**Zahntinctur** 2034—2036, 2303,  
2304

**Zahntropfen** 2292, 2293.

**Zincum aceticum.** Ini urethral.  
1944, 1952.

**Zincum chloratum.** Desinf. 1455;  
Cauter. 1482, 1446, 1456, 1644,  
1801, 1802.

**Zincum oxydatum.** Int. Pill. 793,  
2274; Plv. 583; Streup 1060,  
1324, 1713, 1714, 1784; Ungu.  
1050, 1052, 1381, 1402, 1429,  
1619, 1674—1676, 1723, 1733,  
1758, 1875, 1878, 2206; Pasta  
1728, Gelatine 1724; Emplastr  
1059; Suppos 1747.

**Zincum sulfoearbolicum** Ini.  
urethral. 1932.

**Zincum sulfuricum.** Int. Plv. (pro infant.) 1228; Umschl. 1011; Nasenaussplg. 840, 2244; Nasentampons 1741; Augentrf. 2119; Bepslg. d. Trommelfells 2167; Ohrbougies 2157; Ohrtrpf. 2147, 2161, 2168, 2182, 2222, 2235, 2266; z. Ini. per tub. Eust. 2241; Ini. urethral.

1491, 1493, 1495, 1497, 1933, 1934, 1936, 1951, 1955; Suppos. urethral. 1503, 1961; Ini. vesic. 1505, 1533, 1990; Ini. vaginal. 1298, 1626, 1995.

**Zincum valerianicum.** Plv. (pro infant.) 1038, 1048.

**Zittmann'sches Decoct v. Decoct. Zittmann.**

---



# Sach-Register.

(Die Zahlen bedeuten die Nummern der Seiten)

- Abdominaltyphus 104, 129, 260.
- Abdominalverletzungen 398.
- Abführen v. Diarrhöe.
- Abkappung des Präputiums 562.
- Ablactation 204, 269.
- Ablactations-Diarrhöe 240, 306.
- Ablatio retinae 601
- Abnabeln 444.
- Abortus 452.
- Abrasio mucosae uteri 470.
- Abscessus corneae 698.
- frigidus 368
- — thoracis 389.
- membranae tympani 611.
- retromammaris 390.
- subperiostalis maxillae 380.
- Accommodationskrampf 602
- Acne rosacea 485.
- varioliformis 486.
- vulgaris 486.
- Aconitvergiftung 667.
- Acusticus Lähmung 650.
- Adelmann's forcirte Beugung zur Blutstillung 396.
- Adenitis inguinalis 565.
- Aderhautentzündung 600.
- Aderlass 389.
- Aegyptische Augenkrankheit 596.
- Aetzmittelträger von Chiari 468.
- Agrypnie 98, 145, 178, 180, 196.
- Alcoholismus acutus 18, 182, 669
- chronicus 182, 364, 669.
- Allantiasis 670, 693.
- Allgemeinbehandlung der Syphilis 536, 568; bei Kindern 261, 326.
- Alopecia 489.
- Amenorrhoea 482.
- Amentia 179.
- Amme, Erkrankung der 203.
- Ernährung der 203, 269
- Wahl der 203.
- Ammoniakvergiftung 668.
- Amygdalitis 41, 135, 162, 216, 293, 382, 532
- Amyloid Degeneration der Niere 75.
- Anaemia 25, 32, 94, 113, 115, 153, 175, 179, 183, 280, 281, 290, 297, 305, 318, 327, 328, 329, 347, 451, 505, 560.
- Anaesthesirung, allgemeine 337, 373.
- locale 339, 373.
- des Auges 589.
- des Kehlkopfs 169, 170.
- der Nase 160.
- des Rachens 162.
- von Wunden 496.
- Anchyloglossen 215.
- Aneurysma aortae 40.
- Aneurysma arteriae femoralis 411.
- Aneurysma-Operation nach Antyllus 411.
- Angeborene Syphilis 261, 326-597.
- Angewachsene Zunge 215.
- Angina catarrhalis 41, 135, 162, 216, 293, 382, 532.
- crouposa et diphtheritica 41, 163, 217, 294.
- pectoris 37, 126, 137, 147.
- phlegmonosa 41, 162.
- syphilitica 164, 539, 587.

- Angina tonsillaris 41, 135, 162, 216, 293, 382, 532.  
 — variolosa 542.  
 Angioma 371, 490; faciei 378.  
 Angstzustände 179, 183.  
 Anilinvergiftung 670.  
 Anxia v. Dementia.  
 Antelexio et Anteversio uteri 472.  
 Anthrax 358, 491.  
 Antimonvergiftung 671.  
 Antisepsis 340, 373, bei Augenoperationen 590; in der Geburtshilfe 443.  
 Antiseptische Wundbehandlung 340, 373.  
 Antyllus' Operation von Aneurysmen 411.  
 Aphthen 214, 292, 660.  
 Apoplexia cerebri 79.  
 Apostoli's Myombehandlung 476.  
 Appetitlosigkeit 25, 26, 44, 155, 156.  
 Arsenvergiftung 671, 672.  
 Arthritis 119, 360.  
 — difformans vertebrarum 387.  
   fungosa 369; cubiti 394; genu 410; pedis 410; vertebrarum 387.  
 Arthritis urica 119, 370.  
 Arythmie des Pulses 32, 33, 36.  
 Arzberger'scher Apparat 427, 553.  
 Ascaris lumbricoides 65, 125, 245, 315.  
 Ascites 14, 67, 70, 141.  
 Asphyxie 4, 5, 338, 684; von Neugeborenen 444.  
 Asthma bronchiale seu nervosum 10, 126, 286.  
 — uraemicum 74, 126.  
 Atelectasia pulmonum 230.  
 Atheroma capitis 378.  
 Athemnoth v. Dyspnoe.  
 Atonia uteri 450.  
 Atonische Verdauungsschwäche 46, 155, 312.  
 Atresia hymenalis 478, 482.  
 Atrophie nervi optici 601.  
 Atropinvergiftung 672, 673.  
 Aufregungszustände 180, 181.  
 Aufstossen 44, 46, 47, 62, 124, 426.  
 Augen-Blennorrhoe 444, 594.  
 Augenkatarrh 592.  
 Augenkrankheit, Ägyptische 596.  
 Augenverband 590, 595.  
 Aura bei Epilepsie 188.  
 Auskratzung der Gebärmutter-schleimhaut 456, 470.  
 Ausspritzung und Ausspülung der Blase 82, 403, 404, 417, 422, 423, 424, 559; der Gebärmutterhöhle 444, 451, 455, 456, 467, 466, 468; des Gehörganges 613, 623; der Harnröhre 413, 414, 415, 548, 551; des Magens 46, 51, 63, 133, 301, 306, 665, 677, 679, 685; der Nase 159, 161, 162, 212, 213, 290, 639; der Paukenhöhle (per tub. Eust.) 615, 617; der Scheide 443, 462, 463, 467, 560.  
 Ausstellung von Parere's für Geisteskranke 173—175.  
 Ausübung der Einspritzung bei acutem Tripper 413, 548.  
 Bacteriurie 424, 425.  
 Balanitis 561.  
 Balggeschwulst 378.  
 Bandwurm 64, 125, 244, 313.  
 Bartfinne 535.  
 Barytvergiftung 672.  
 Basedow'sche Krankheit 38.  
 Bauchfellentzündung 66, 153, 245, 396, 480; tuberculöse 67, 246.  
 Bauchtyphus 104, 129, 260.  
 Bauchwunden 398.  
 Beckenendlage 448.  
 Beckenenge, Geburt bei 445.  
 Beckenmaasse 458.  
 Beckenbauchfellentzündung 480.

- Beckenzellgewebsentzündung 478.  
 Beef tea 243.  
 Beinfrass 368; des Ellbogen-  
 gelenkes 394; des Fussgelen-  
 kes 410; des Kniegelenkes 410;  
 der Rippen 389; der Wirbel-  
 säule 81, 386.  
 Beinhautentzündung 368; am Kie-  
 fer 380; syphilitische 569, 588.  
 Belladonnavergiftung 673.  
 Belloc'sche Röhre 346, 380.  
 Bett des Säuglings 201.  
 Bettpissen 250, 319, 435.  
 Betttuchspanner v. v. Hacker 361.  
 Biedert'sches Rahmgemenge 200,  
 235, 270, 330.  
 Bilsenkrautvergiftung 673.  
 Bindehaut-Blennorrhöe 444, 594.  
 Bindehaut-Entzündung, serophu-  
 löse 593.  
 Bindehautkatarrh 592.  
 Blasenanspülung 32, 403, 404,  
 417, 422, 423, 424, 559.  
 Blasenausschlag 519.  
 Blasenblutung 404, 427, 557.  
 Blasengeschwulst 429. [434  
 Blasen Excitator von Ultmann  
 Blasenhalsskatarrh 417.  
 - bei Frauen 419  
 Blasenkatarrh 32, 402, 419, 556  
 Blasen-Krampf 250, 431.  
 — Lähmung 32, 185, 433.  
 Blattern 268, 542.  
 Blaue Binden-Verband 363.  
 Blausäurevergiftung 674.  
 Bleichsucht 25, 32, 94, 113, 115,  
 153, 505.  
 Blei-Intoxication 90, 182, 188, 674  
 Blennorrhoea conjunctivae 444,  
 594.  
 — recti 400.  
 — sacci lacrimalis 591.  
 — umbilici 247.  
 — urethrae acuta 413, 464, 545,  
 561; chronica 415, 464, 551;  
 in muliere 464, 561.  
 Blennorrhoea vaginae 462, 560  
 — vulvae 250, 462.  
 Blepharotomie 595.  
 Blepharitis, Blepharadenitis 590.  
 Blepharospasmus 594.  
 Blinddarmentzündung 56, 316.  
 Blödsinn 187; paralytischer 186;  
 secundärer 186.  
 Blutarmuth v. Anaemie.  
 Bluterbrechen 50, 121, 157.  
 Blutfleckenkrankheit 117, 329.  
 Blutharnen 71, 248, 317, 404,  
 427, 557.  
 Bluthusten 16, 156.  
 Blutschwär 358, 508.  
 Blutstillung 345, 396.  
 Blutungen 117.  
 Blutung aus Arterien 345.  
 Blutung der Blase 404, 427, 557.  
 — der Bronchien 16, 156.  
 — capillare 346  
 Blutung der Gebärmutter 449, 450,  
 457, 469—470, 474, 476, 477.  
 - der Gedärme 106, 110, 264.  
 — des Gehirns 79.  
 — von Hämorrhoidalknöten 62.  
 — der Lunge 16, 156, 388.  
 — des Mastdarms 346.  
 — der Nase 346, 380.  
 — parenchymatöse 346.  
 — der Scheide 346.  
 — aus Thoraxwunden 388  
 — aus Venen 346.  
 — während der Geburt 449.  
 — während der Nachgeburt 450.  
 — im Wochenbett 457.  
 Botulismus 676, 695.  
 Bozeman-Fritsch'scher Uterus-  
 katheter 468.  
 Blutvergiftung 363.  
 Brand 360.  
 — des Darmes 398.  
 — der Lunge 20, 132.  
 — des Nabels 247.  
 — des Zahnfleisches 214, 292,  
 362, 658.

- Brandwunden 355, 495.  
 Bräune des Kehlkopfs 4, 41, 166, 221, 277.  
   des Rachens 41, 163, 217, 294.  
 Brechdurchfall 110.  
   — der Kinder 240, 306.  
 Brechweinsteinvergiftung 671.  
 Breite Condylome 263, 539, 595, 586.  
 Bright'sche Nierenkrankheit 71, 72, 140; bei Kindern 248, 249, 317.  
 Bromäethylnarkose 338, 373.  
 Bromismus 96, 195, 676.  
 Bronchial-Asthma 10, 126, 286.  
 Bronchialdrüsen, Vergrößerung der 227, 282.  
 Bronchiectasie 132.  
 Bronchitis acuta 5, 132, 143, 225, 283.  
   — capillaris 8, 227, 284.  
   — chronica 8, 132, 227.  
   — crouposa, fibrinosa 8, 233.  
   — suffocativa 230.  
 Bronchoblennorrhoe 9, 143.  
 Bronchokatarrh 227.  
 Bruch 398, eingeklemmter 398.  
 Brustbräune 37, 126, 137, 147.  
 Brustdrüsen Schmerz 91.  
 Brustdrüsenentzündung 389.  
 Brustfellentzündung 29, 153, 232, 289.  
 Brustumfang im Kindesalter 335.  
 Bubo 565.  
 Calculi renales 76, 122, 426.  
 Callusbildung, verzögerte 354, 408.  
 Canities 491.  
 Cantharidenvergiftung 403, 676.  
 Canthoplastik 595.  
 Carbonsäurevergiftung 677.  
 Carbunkel 352, 491.  
 Carcinoma 372, epitheliale cutis 379, 492.  
 Carcinoma recti 401.  
 Carcinoma uteri 477.  
   — ventriculi 50, 155.  
 Cardialgia 49, 52.  
 Cardiopalmus 32, 38.  
 Caries 368.  
   — costarum 389.  
   — cubiti 394.  
   — genu 410.  
   — pedis 410.  
   — vertebrarum 81, 386.  
 Castration beim Weibe 476, 480.  
 Catarrhus bronchialis acutus 5, 132, 143, 225, 283; chronicus 8, 132, 227.  
 Catarrhus cervicis uteri 466.  
   colli vesicae 417; bei Frauen 419.  
   — conjunctivae 592.  
   — intestinorum 19, 53, 55, 150 bis 152, 237, 242, 302, 309.  
   — laryngis acutus 1, 164, 220, 274; chronicus 3, 165, 166.  
   narium 159, 161, 212, 290, 639.  
   oris 135, 214, 658.  
   pharyngis 41, 135, 162, 163, 640.  
   — pulmonum v. Cat. bronchialis.  
   — recti 400.  
   tracheae 170—171.  
   — urethrae 413.  
   — uteri 466.  
   — vaginae 250, 318, 461, 462 bis 464, 560.  
   — vesicae 82, 402, 419, 556.  
   — ventriculi acutus 43, 235, 300; chronicus 45, 237, 300.  
   — vulvae 250, 318, 459.  
 Catgut 375.  
 Cavernen der Lunge 24.  
 Cavernitis 553.  
 Cephalaea 87, 122, 147.  
 Cerebrospinalmeningitis 77, 211.  
 Cerumenalpfropfe im Ohre 613, 623.  
 Cervicalkatarrh 466.

- Chininvergiftung 677.  
 Chloasma 493.  
 Chloralhydratvergiftung 678.  
 Chloroformvergiftung 679.  
 Chlorosis 25, 32, 94, 113, 115, 153, 505.  
 Chlorvergiftung 678.  
 Cholelithiasis 68, 122.  
 Cholera infantum 240, 306.  
 Cholera nostras 110, 240.  
 Chorda 413.  
 Chorea maior v. Hysteria.  
 — minor s. St. Viti 94, 146, 251, 321.  
 Chorioiditis 600. .  
 Chromvergiftung 679.  
 Circuläres Irresein 179.  
 Circumcision 406, 562.  
 Cirrhosis hepatis 70.  
 Clavicularfractur 391.  
 Clavus 495, 539.  
 Cocain-Anaesthese 339, 373.  
 Cocain-Apparat 431.  
 Cocainvergiftung 373, 679.  
 Coffeinvergiftung 679.  
 Cofferdam 656.  
 Colchicinvergiftung 680.  
 Colica 122, 235, 239, 300; ex cholelithiasi 70; ex nephrolithiasi 76.  
 Colica saturnina 675.  
 Collaps 7, 15, 18, 36, 50, 67, 69, 78, 107, 121, 213, 219, 239, 241, 246, 248, 287, 290, 297, 307, 451, 666, 678, 679, 681, 685, 695.  
 Colpeurynter 346.  
 Colporrhaphia 473.  
 Combustio 355, 495.  
 Comedones 496.  
 Commotio cerebri 377.  
 Compensations-Stadium bei Herzfehlern 31.  
 Compensations-Störungen bei Herzfehlern 32—36, 135—137.  
 Compression des Rückenmarks bei tuberkulöser Wirbelkaries 81.  
 Condensirte Milch 207.  
 Condylomata acuminata 496, 543, 562.  
 — lata 263, 539, 585, 586.  
 Congelatio 356, 496.  
 Coniinvergiftung 680.  
 Coniunctivitis blennorrhoeica 444, 594.  
 Coniunctivitis catarrhalis 592.  
 — scrophulosa 593.  
 — trachomatosa 596.  
 Contentivverband 352.  
 Contractur von Narben 356.  
 Contusio 349.  
 Convulsiones 211, 253, 320, 693.  
 Cooper'sches Kissen 408.  
 Cor adiposum 36, 135.  
 Cornealabscess 598.  
 Cornealfistel 599.  
 Cornealgeschwür 598. [381.  
 Corpus alienum in cavo narium  
 — — in cranio 378.  
 — — in intestinis 399.  
 — — in larynge 170.  
 — — in meatu auditor. externo 613, 628.  
 — — in oculo 596.  
 — — in oesophago 385.  
 — — in recto 399.  
 — — in tractu respiratorio 385.  
 Coryza 159—161, 212, 290, 639.  
 Coxitis 407.  
 Craniotomie 446.  
 Crédé'scher Handgriff 450.  
 Crédé'sches Schutzverfahren 444, 595.  
 Crotonölvergiftung 680.  
 Crosby's Extensionsverband 407.  
 Croup des Kehlkopfs 4, 41, 166, 221, 277.  
 — der Nase, 213, 290.  
 — des Rachens 41, 163, 217, 294.  
 — des Zahnfleisches 214, 292, 658.



Cyankalivergiftung 674, 681.

Cystitis 402, 419, 556.

Cystocollitis 417, 419.

Cystospasmus 250, 431.

Dacryocystitis 591.

Dampf der Lungen 13, 141, 286.

Darm-Blutungen 106, 110, 264.

— -Brand 398.

— -Erschlaffung 59, 60, 64, 155, 312.

— -Geschwüre 60, 151, 152.

— -Irrigation 56, 59, 63, 242, 300, 307, 311, 316.

— -Katarrh 19, 53, 55, 150—152, 237, 242, 302, 309.

— -Stenose 64.

— -Trägheit 59, 60, 64, 155, 312.

— -Verschluss 62, 138, 397.

— -Vorfal 398.

— -Wunden 398.

Decapitation 447.

Decubitus 81, 82, 186.

Degeneration des Herzeisches 36.

Delirium tremens 18, 146, 182, 364, 669.

Dementia 187; paralytica 184; senilis 186.

Demme's Gemenge 207.

Dentition 207, 273.

Dermatitis auriculæ 626.

Desinfection des Auges 590.

— der Hände 340, 374, 443.

— der Instrumente 341, 374, 590.

— des Operationsfeldes 340, 374, 590.

— des weibl. Genitalapparates 442, 455.

— der Wohnräume nach Diphtheritis 294.

Diabetes insipidus 126.

— mellitus 117, 125.

Diarrhöe 19, 54, 55, 106, 108, 110, 150—153, 302; im Wochenbett 454.

Diät der Amme 269.

— des Kindes nach der Entwöhnung 269.

Diätetik der Geburt 442.

— des Kindes 201, 269.

— des Neugeborenen 444.

— der Schwangerschaft 439.

— des Wochenbettes 454.

bei Psychosen 198.

Dickdarmkatarrh 55, 56, 242, 309.

Digitalisvergiftung 681.

Dilatatio ventriculi 51, 133.

Diphtheritis faucium 41, 163, 217, 294.

— gingivæ 214, 292, 362, 658.

— laryngis 4, 41, 166, 221, 277.

— meatus auditorii externi 628.

— narium 213, 290.

Diphtheritische Lähmungen 219, 298.

Distorsio 355; manus 395.

Dittel'scher Porte-remède 419.

Dolores osteocopi 569.

Doppelte Glieder v. Rhachitis.

Dorsalinieision 405.

Drainröhren 342, 373.

Druckbrand v. Decubitus.

Dünndarmkatarrh 55, 67, 237, 302.

Dupuytren'sche Sehene 409.

Durioz' Zealenta 330.

Dysenteria 108, 151.

Dysmenorrhoea 482, 505.

Dyspepsie 51, 155, 234, 298.

Dyspnoë 4, 10, 14, 126, 281, 286, 287.

Eczema acutum 255, 323, 496, 603, 623.

— chronicum 255, 323, 500, 624.

— ani 504.

— auriculæ 603, 623.

— capillitii 503.

— faciei 503.

— ad genitalia 469.

— impetiginosum 323.



- Eczema intertrigo 256.  
 — labiorum 503.  
 — mammae 504.  
 — manus 505.  
 — meatus auditorii externi 603, 623.  
 — palpebrarum 503.  
 — papulosum 497.  
 — pedum 505.  
 — perinei 504.  
 — scroti 504.  
 — squamosum 255, 323, 499, 624.  
 — marginatum 506.  
 Eicheltripper 534, 561.  
 Eierstockentzündung 481.  
 Eileiterentzündung 481.  
 Eingeklemmte Hernie 398.  
 Eingewachsener Nagel 410.  
 Eingiessungen in den Gehörgang 608.  
 Einreibungskur 536, 569; bei Kindern 262, 326.  
 Einspritzung in die Harnröhre 414, 548.  
 — in das Mittelohr per tubam 617, 619.  
 Eintheilung der Mahlzeiten bei Säuglingen 203, 269.  
 Eisensalzvergiftung 681.  
 Eitervergiftung 363.  
 Eklampsia 452; infantum 318.  
 Ellbogengelenks-Entzündung 394.  
 — Verrenkung 393.  
 Embolie der Gehirnarterien 80.  
 Emphysema pulmonum 13, 141, 286.  
 Endarteriitis 40, 137.  
 Endocarditis 31, 136, 233, 289.  
 Endometritis acuta 466; chronica 466; puerperalis 466.  
 Englische Krankheit v. Rhachitis.  
 Enteralgia 122, 235, 239, 300, 675.  
 Enteritis 53, 55, 150, 151, 152.  
 — follicularis 55, 242, 309.  
 Enterocatarrhus 53, 237, 302.  
 Entwöhnung 204, 269.  
 Entzündung der Aderhaut 600.  
 — des Bauchfells 66, 153, 245, 396.  
 — des Beckenbauchfells 480.  
 — des Beckenzellgewebes 478.  
 — der Beinhaut 368, 380, 569, 588.  
 — der Bindehaut 592, 593, 594.  
 — der Blasenschleimhaut 82, 402, 419, 556.  
 — des Blasenhalsses 417.  
 — des Blinddarms 56, 316.  
 — der Bronchialschleimhaut 5, 8, 132, 143, 225, 227, 283, 284.  
 — der Brustdrüse 389.  
 — des Brustfells 29, 153, 232, 289.  
 — der Corpora cavernosa 553.  
 — der Darmschleimhaut 53, 55, 150, 151, 152, 237, 242, 302, 309.  
 — des Ellbogengelenks 394.  
 — des Eierstockes 481.  
 — der Eileiter 481.  
 — des Endocardiums 31, 136, 233, 289.  
 — des Fusswurzelgelenks 410.  
 — der Gebärmutter 465.  
 — der Gebärmutter Schleimhaut 466, 466.  
 — des Gehörgangs 605, 627, 628.  
 — der Gehirnhaut 77, 209, 211, 319.  
 — von Haemorrhoidalknoten 61, 400.  
 — des Herzbeutels 31, 135, 153.  
 — des Herzmuskels 36.  
 — der Hornhaut 597.  
 — des Hüftgelenks 407.  
 — der Kehlkopfknorpeln 167.  
 — der Kehlkopfschleimhaut 1—3, 4, 164—166, 220, 221, 274, 277.

- Entzündung des Kniegelenks 470.  
 — den Knochenmarks 359.  
 — des Knochens 368.  
 — der Lederhaut 599.  
 — der Leistenröhren 565.  
 — der Lidrandröhren 590.  
 — der Lunge 17, 20, 130, 143, 230, 287.  
 — der Lymphgefäße 363.  
 — der Mandeln 41, 135, 162, 216, 382, 532.  
 — des Mastdarms 400.  
 — des Mittelohrs 614, 615, 618, 632, 636, 640, 641.  
 — der Mundschleimhaut 135, 214, 292, 362, 573, 658, 660, 690.  
 — des Nabels 247.  
 — des Nebenbodens 401, 554.  
 — der Netzhaut 600.  
 — der Niere 71, 72, 140, 248, 317.  
 — des Nierenbeckens 75, 475.  
 — der Ohrmuschel 626.  
 — der Ohrspeicheldrüse 43, 382, 532.  
 — des Parametrium 457, 475.  
 — der Regenbogenhaut 199.  
 — des Rippenfalls 29, 153, 232, 289.  
 — des Rückenmarks 83.  
 — der Schamtheile 250, 318, 449.  
 — der Schwellkörper 553.  
 — der Sehnenscheide 359.  
 — des Thränensacks 591.  
 — des Trommelfells 610, 630.  
 — der Venen 363.  
 — der Vorsteherdrüse 404, 553.  
 — der Vulva 250, 318, 459.  
 — des Warzenfortsatzes 635.  
 — von Weichtheilen (chronische) 365.  
 — der Wirbelsäule 81, 386.  
 — des Zahnfleisches 40, 135, 214, 292, 362, 573, 658, 690.  
 — des Zahnnerven 655.  
 — der Zahnwurzelhaut 657.  
 — des Zellgewebes 358, 376.
- Enuresis nocturna 250.  
 Epithelides 493, 506.  
 Epilidymitis 401, 554.  
 Epilation 535.  
 Epilepsie 95, 127, 128.  
 Epistaxis 346, 380.  
 Epistomie 442.  
 Epithelioma faciei 372.  
 Erbgrind 508.  
 Erbrechen der Schwangeren 440.  
 — nervöses 53, 127.  
 Erectionen 413, 545, 546.  
 Erethische Granulationen 372.  
 Erfrierung 376, 496.  
 Ergotinvergiftung 681.  
 Ergrauen der Haare 491.  
 Erkrankung der Amme 372.  
 Ernährung der Amme 372.  
 — des Säuglings 201, 202, 205, 269.  
 Ernährung n. d. Entbindung 204, 272.  
 Erosionen an der Vagina 467.  
 Erschütterung des Gehirns 491.  
 Erysipelas 111, 259, 363.  
 Erythema 507.  
 Esmarch-Heiberg'scher H. 338.  
 Essentielle Kinderlähmung 253, 410.  
 Excochleatio uteri 470, 471.  
 Excoriation von Narben 372.  
 Excoriationes papillarum 372.  
 Exsudatum parametrium 372.  
 — pleuriticum 29, 30, 147, 289.  
 Extraurethrotomie 417.  
 Extravasat 350.  
 Facialislähmung 93.  
 Falleucht 95, 127, 128, 129.  
 Faradisation, allgemeine 147, 148.  
 — des Darms 59, 397.

Faradisation der Gallenblase 316.  
 — des Ischiadicus 92.  
 — des Kehlkopfs 176.  
 — des Nervus phrenicus 93, 230, 338, 667.  
 Faradisation des Sphincter vesicae 434.  
 Favus 508.  
 Febris intermittens 111—113, 134, 261, 325.  
 Fehlgeburt 452.  
 Fettherz 36, 135.  
 Fibromyoma uteri 474.  
 Filzläuse 519.  
 Finnen 486.  
 Fischgift 682, 695.  
 Fischschuppenkrankheit 513.  
 Fistula corneae 599.  
 — gingivae 661.  
 Fissura ani 312.  
 Flechte, fressende 367, 515.  
 — nässende 255, 323, 496—506, 603, 623.  
 — scheerende 509.  
 Flecke der Hornhaut 598.  
 Flecken v. Masern.  
 Fleischgift 682, 695.  
 Fleischpankreaskestiere 48.  
 Fleischpepton 48, 49, 50, 243.  
 Fleisch-Solution v. Leube-Rosenthal 48, 49, 50, 152.  
 Flexiones uteri 470, 472.  
 Fliegenpilzvergiftung 652, 689.  
 Fluor albus 250, 318, 461.  
 Follicularentzündung des Darmes 55, 242, 309.  
 — des äusseren Gehörgangs 626.  
 Fractura 352, complicata 354.  
 — antibrachii 395.  
 — claviculae 391.  
 — colli femoris 408.  
 — costae 388.  
 — cranii 377.  
 — cruris 409.  
 — femoris 408.  
 — fibulae 409.

Fractura humeri 393.  
 — laryngis 383.  
 — malleoli 409.  
 — maxillae inferioris 379.  
 — nasi 379.  
 — olecrani 395.  
 — ossis hyoidei 383.  
 — patellae 409.  
 — penis 406.  
 — radii 395.  
 — tibiae 409.  
 — tracheae 383.  
 — ulnae 395.  
 — vertebrarum 386.  
 Fraisen 211, 253, 320, 693.  
 Fremdkörper im Auge 596.  
 — im Darmcanal 399.  
 — im Gehörgang 613, 628.  
 — im Kehlkopf 170.  
 — in den Luftwegen 385.  
 — im Mastdarm 399.  
 — in der Nasenhöhle 381.  
 — im Ohre 613, 628.  
 — im Schädelraum 378.  
 — in der Speiseröhre 385.  
 Fressende Flechte 367, 515.  
 Fricke'scher Verband 556.  
 Frostbeulen 357, 519.  
 Frühgeburt 452.  
 Frühjahrskatarrh 594.  
 Fungus der Gelenke 369.  
 — des Ellbogengelenkes 394.  
 — des Fusswurzelgelenks 410.  
 — des Kniegelenks 410.  
 Furunculus 358, 508.  
 Fussgeschwür 366, 411, 540.  
 Fusschweisse 511.  
 Fusswurzelgelenksentzündung 410.  
 Fütterung, künstliche, bei Geisteskranken 175.  
 Galactorrhoea 458.  
 Galactostasis 202, 458.  
 Gallensteine 68, 122.  
 Galvanisation des Facialis 89, 93.

- Galvanisation des Ichiadicus 83.  
 — des Kopfes 89.  
 — des Rückenmarks 84, 94, 147.  
 Gangraena 360.  
 — gingivae 214, 292, 362, 658.  
 — intestini 398.  
 — pulmonum 20, 132.  
 — umbilici 247.  
 Gastrocatarrhus acutus 43, 236,  
 300, 302; chronicus 45, 237,  
 301.  
 Gebärmutter-Ausspülung 444, 451,  
 455, 456, 457, 466, 468.  
 Gebärmutter-Berstung 448.  
 — -Blutung 449, 450, 457, 469—  
 470, 474, 476, 477.  
 — -Entzündung 465.  
 — -Geschwulst 474.  
 Gebärmutter-Hals-Katarrh 466.  
 — -Verengerung 478.  
 Gebärmutter-Katarrh 466.  
 — -Knickung 470, 472.  
 — -Krebs 477.  
 — -Neigung 470, 472.  
 — -Vorfall 478.  
 Geburt, Diätetik der 442.  
 — bei engem Becken 446.  
 Geburtshülfliche Masse 458.  
 Gefäßgeschwulst 371, 378, 490.  
 Gehirnblutung 79.  
 Gehirnerschütterung 377.  
 Gehirngeschwulst 80.  
 Gehirnhaut-Entzündung eitrige  
 209; epidemische 77, 211; tu-  
 berculöse 209, 319.  
 Gehirn-Syphilis 81, 185.  
 Gehörgangs-Entzündung 606,  
 627, 628.  
 Gehörnervenlähmung 650.  
 Geistesranke, Parere für 173 —  
 175.  
 Geistesstörung, alkoholische 18,  
 146, 182, 364, 669; bei Into-  
 xication 188; circuläre 179;  
 epileptische 187; paralytische  
 184; secundäre 186.  
 Gelbsucht 67, 246, 316.  
 Gelenkentzündung 119, 360; fun-  
 göse 369.  
 Gelenkerhenmatismus 101, 102,  
 131, 360.  
 Gelenkswassersucht 359, 370.  
 Genickstarre, epidemische 77,  
 211.  
 Geräusche, subjective im Ohre  
 614, 619, 641.  
 Gerstenkorn 591.  
 Gersuny'sche Compressen 341.  
 Geschwüre des Darms 60, 151,  
 152.  
 — der Haut 366, 369, 563, 566,  
 586.  
 — der Hornhaut 598.  
 — des Kehlkopfs 168, 170,  
 588.  
 Geschwüre des Magens 48, 139.  
 — des Mundes 214, 292, 666,  
 660.  
 — der Nase 161, 212, 263, 587,  
 640.  
 — des Rachens 163, 586.  
 — des Unterschenkels 366, 411,  
 540.  
 — der Vaginaiportion 467.  
 Gesichtsnervenlähmung 93.  
 Gesichtsschmerz 111, 259, 363, 506.  
 Gesichtsschmerz 89.  
 Gesichtswunden 378.  
 Gewichtstabelle 703.  
 Gewichtszunahme des gesunden  
 Kindes 333.  
 Gicht 119, 370.  
 Gingivitis 40, 135, 214, 292, 362,  
 673, 658, 690; crouposa, diph-  
 theritica, ulcerosa 214, 292, 658.  
 Glaskörpertrübungen 600.  
 Glaucoma 601.  
 Glisson'sche Schlinge 387.  
 Glottiskrampf 5, 166, 225, 281.  
 Glottisödem 4, 166.  
 Glotzaugenkrankheit 38.  
 Gneis 255, 489, 533, 561.

Goldene Ader 61, 400.  
 Gonitis 410.  
 Gonorrhoea acuta 413, 464, 545,  
 560, chronica 415, 464, 551;  
 bei Weibern 464, 560.  
 Granulationen, erethische 349.  
 Granulirende Wunden 349.  
 Gravedo 159—161, 212, 290, 639.  
 Graviditas 439.  
 Grippe 113.  
 Grubengasvergiftung 682, 684.  
 Grüner Staar 601.  
 Grünspanvergiftung 682, 684.  
 Gummata 548, 569, 586.  
 Gürtelausschlag 510.  
 Gypsverband 352.  
 Gypsbett 387.  
 — Mieder 387.

**Haare**, Ergrauen der 491.  
 Haarschwund 489.  
 v. Hacker'scher Bettuchspanner  
 361  
 Haematemesis 50, 121, 157.  
 Haematocoe retrouterina 481.  
 Haematuria 71, 248, 317, 404,  
 427, 557.  
 Haemoptoe 16, 156.  
 Haemorrhagia cerebri 79.  
 — nasi 346, 380.  
 — uteri 449, 450, 457, 469—470,  
 474, 476, 477  
 Haemorrhoiden 61, 400.  
 Hallucinationen 200  
 Hallucinator. Verworrenheit 183.  
 Hallux valgus 410.  
 Halsentzündung v. Angina.  
 Halslymphdrüsenanschwellung 384.  
 Halsverletzungen 382.  
 Hände, Desinfection d. 340, 374,  
 443.  
 Handgelenks-Verrenkung 395.  
 — -Verstauchung 395  
 Harnblasen-Blutung 404, 427, 557.  
 Harnblasen-Krampf 250, 431.  
 — -Lähmung 82, 185, 433.

Harnröhren-Injector nach Ultz-  
 mann 419.  
 — -Irrigation 417; tiefe 415, 551.  
 — -Katarrh 413.  
 — -Pinselung 415.  
 — -Tripper (acut) 413, 464, 545,  
 560; (chronisch) 415, 464, 551,  
 560.  
 — Verengerung 417.  
 — Verletzung 405.  
 Harnverhaltung 405, 417, 455, 546.  
 Hartenstein's Leguminose 380.  
 Harter Schanker 536, 566.  
 Hautgries 517.  
 Hautjucken 68, 459, 522.  
 Hautkrebs 379, 492.  
 Hautpflege bei Säuglingen 273.  
 Häutige Bräune 4, 41, 166, 217,  
 221, 277, 294.  
 Hebra'sches Wasserbett 356.  
 Heftpflaster - Extensionsverband  
 354, 407.  
 Heftpflasterverband nach Sayre  
 391.  
 Hegar'sche Eingiessungen 56, 63,  
 397.  
 Heitzmann-Leiter'scher Scheiden-  
 kühler 560.  
 Helkose, venerische 563.  
 Heil'sches Pulver 206.  
 Hemikrania 87, 122, 147.  
 Hereditäre Syphilis 261, 326, 597.  
 Hernia 398; incarcerata 398.  
 Herpes tonsurans 509.  
 — zoster 510.  
 Herz-Arythmie 32, 33, 36.  
 Herzbeutel-Entzündung 31, 135,  
 153.  
 Herzfehler 31—36, 135, 141, 233,  
 338.  
 Herzklopfen 32; nervöses 38.  
 Herzkrampf 37, 126, 137, 147.  
 Hiebwunde 347; des Gesichtes  
 348, 378  
 Hodenentzündung v. Epididy-  
 mitis.



Höllensteinvergiftung 671, 682.  
Hohlwarzen 202.  
Holzwollkissen 375.  
Hordeolum 591.  
Hornhaut-Abscess 598.  
— Entzündung 597.  
— -Fistel 599.  
— -Flecke 598.  
— -Geschwür 598.  
— -Trübungen 598.  
Hüftgelenks-Entzündung 407.  
— -Verrenkung 406.  
Hüftweh 92, 123, 147.  
Hühnerauge 539.  
Hydarthrosis 359, 370.  
Hydraemia gravidarum 441.  
Hydrocele 402; acute 555.  
Hydrocephalus 282.  
Hydrops 14, 15, 35, 72, 73, 136, 137.  
Hydrops articulorum 359, 370.  
Hyperaemia labyrinthi 649.  
Hyperaesthesia urethrae 43.  
Hyperemesis gravidarum 127, 440.  
Hyperidrosis 511.  
Hyperkinesis cordis 38.  
Hypersecretio continua mucosae ventriculi 52, 124.  
Hypertrophia prostatae 405.  
Hypertrophie der Tonsillen 162, 216, 382.  
Hypertrophische Rhinitis 160.  
Hysteria 5, 51, 91, 97, 147—150, 254, 321.  
Hypodermoklyse 110, 121, 308.  
Ichthyosis 513.  
Icterus catarrhalis 67, 246, 316.  
Idiotia 187.  
Ileotyphus 104, 129, 260.  
Ileus 62, 138, 397.  
Impotentia 435.  
Indicationen der Behandlungsmethoden bei Syphilis 568.  
Influenza 113.

Infraction 354.  
Infusion, intravenöse u. subcutane 110, 121, 347, 683, 684.  
Injection bei Blasenhalsskarrh 417; bei Cystitis 403, 404, 417, 422, 423, 424, 559; bei Endometritis 467; bei Otitis media (per tub. Eust.) 615; 617; bei Tripper 414, 548, tiefe 415, 548.  
Injection, subcutane bei Syphilis 536, 537, 568, 574—579; für Kinder 263, 328.  
Insectenstiche 541.  
Instrumente, Desinfection für Operationen 341, 374; für Augenoperationen 590.  
Intercostal-Neuralgie 90.  
Intermittens 111—113, 134, 261, 325.  
Intermittirende Geistesstörung 179.  
Intertrigo v. Eczema intertrigo.  
Intestinalkatarrh 19, 53, 55, 150 bis 152, 237, 242, 302, 309.  
Intestinalgeschwüre 60, 150, 151.  
Inunctionskur 536, 569; bei Kindern 262, 326.  
Invagination 397.  
Inversio uteri 473.  
Jodismus 185, 580, 682.  
Jodoform-Gaze 342, 344; klebende 344.  
— -Docht 342, 345.  
— -Stäbchen 352, 456.  
Jodoformvergiftung 682.  
Jodvergiftung v. Jodismus.  
Iridectomie 601.  
Iritis 568, 599.  
Irraein, circuläres 179.  
— Behandlung im Beginne 190.  
— Prophylaxis desselben 189.  
Irrigation des Blasenhalses 417.  
— des Darmes 56, 59, 63, 68, 70, 242, 300, 307, 311, 316.



Irrigation der Harnröhre (tiefe)  
415, 548.

— der Uterushöhle 444, 451,  
455, 456, 457, 466, 468.

— der Vagina 443, 462, 463,  
467, 560.

Irrigationskatheter nach Ultz-  
mann 551.

Ischias 92, 123, 147.

Juckblattern 322, 520.

Kalbsbrühe 206.

Kahlaugenvergiftung 668, 683.

Kalter Abscess 368, 389.

Kartoffelkur 399.

Käsegift 695.

Katarrh der Bindehaut 592.

— der Blase 82, 402, 419, 556.

— des Blasenhalsses 417; bei  
Frauen 419.

— der Bronchien 5, 8, 132, 143,  
225, 283.

— des Darms 19, 53, 55, 150 —  
152, 237, 242, 302, 309.

— des Dickdarms 55, 56, 242,  
309.

— des Dünndarms 55, 67, 302  
der Gallenwege 67, 246, 316.

— der Gebärmutter 466.  
des Gebärmutterhalsses 466.

— der Harnröhre 413.  
des Kehlkopfes 1, 3, 164—  
166, 220, 274.

— der Luftröhre 170, 171.

— der Lunge v. Kat. d. Bron-  
chien.

— des Magens 43, 45, 236,  
300.

— des Mastdarms 400.

— des Mittelohres 614, 686.  
der Mundschleimhaut 135,  
214, 658.

— der Nase 159 — 161, 212, 290,  
639.

— der Rachenschleimhaut 41,  
135, 162, 163, 640.

Katarrh der Scheide 250, 318,  
461, 560.

— der Vulva 250, 318, 459.

Katheterisieren bei Blasenparese  
434.

Kefir 271.

Kehlkopfbruch 383.

Kehlkopf-Croup 4, 41, 166, 221,  
277.

— Katarrh, acuter 1, 164, 220,  
274; chronischer 3, 165, 166.

— Krampf 5, 166, 225, 281.

— Syphilis 169, 588.

— Tuberculose 127, 167.

Kephalea 87, 122, 147.

Kephalhaematoma 378.

Keratitis 597.

Keuchhusten 12, 228, 284.

Kiefer-Abscess 380

— Bruch 379.

— Verrenkung 380.

Kindbettfieber 455.

Kinderlähmung, spinale 83, 253,  
410.

Kindernährmehle 207, 272.

Kinderzwieback von Oppel 272.

Klappenfehler des Herzens 31—  
36, 135, 141, 233, 338.

Klebende Jodoformgaze 344.

Kleesäurevergiftung 683, 687.

Kleienflechte 520.

Klencke's Proteinnährstoffe 272.

Kloakengas-Vergiftung 684

Knickung der Gebärmutter 470,  
472.

Kniegelenks-Entzündung 410.

Knochenbruch 352

Knochenbruch der Kniescheibe  
409.

— der Nase 379.

des Oberarms 393.

— des Oberschenkels 408.

— der Rippen 388.

am Schadel 377.

des Schenkelhalsses 408.

— des Schienbeins 409.

**Knochenbruch des Schlüsselbeins** 391.

des Unterkiefers 379.

des Unterschenkels 409.

des Vorderarms 395.

- des Wadenbeins 409.

- der Wirbelsäule 386.

— des Zungenbeins 383.

**Knochenentzündung** 368.

**Knochenmarkentzündung** 369.

**Knochenverkrümmungen** 369; der  
Wirbelsäule 387.

**Knötchenflechte, rothe** 513; der  
Scrophulösen 514.

**Kohlenoxydvergiftung** 634.

**Kohlensäure Überladung** 167, 296.

**Kolik** 70, 76, 122, 235, 239, 300,  
675.

**Kolpitis** 250, 318, 461, 462, 560.

**Kopfblutgeschwulst** 378.

**Kopfläuse** 323, 518

**Kopfschmerz** 87, 122, 147.

**Kopfumfang im Kindesalter** 335.

**Koprostase v. Obstipatio alvi.**

**Kothschmierer** 185.

**Krampf der Blase** 250, 431.

— der Scheide 461.

— der Stimmritze 5, 166, 225,  
281.

**Krämpfe** 211, 253, 320, 693.

**Krampfaderbruch** 402.

**Krampfadern** 411.

**Krampfkrusten v. Keuchhusten**

**Krampfwehen** 445.

**Kraske's Mastdarmoperation** 401.

**Krätze** 257, 324, 530.

**Krebs** 372.

**Krebs der Gebärmutter** 477.

— der Gesichtshaut 379, 492.

— der Haut 492

des Magens 50, 155.

— des Mastdarms 401.

**Kriebelkrankheit** 693.

**Kropf** 383

**Kuhlsonde** 436, 437.

**Kuhmilch für Säuglinge** 205, 269

**Künstliche Ernährung im**  
lingsalter 205, 269.

- Fütterung Geisteskranker

— Respiration 338, 445, 6

**Künstliches Trommelfell**  
648.

**Kupferrose** 485.

**Kupfervergiftung** 684.

**Labyrinth-Hyperämie** 649.

— -Syphilis 650.

**Lähmung der Blase** 82,  
433.

— des Gehörnerven 650.

— des Gesichtsnerven 93.

- von Kehlkopfmuskeln 17

**Lähmungen, diphtheritische**  
298

**Langenwachsthum im Kindes**  
332.

**Langlebert-Zeissel'sches Susp**  
rium 555.

**Lapisvergiftung** 671, 685

**Laryngitis acuta** 1, 164,  
274.

— chronica 3. 165, 166.

— crouposa 4, 166, 221, 27

**Laryngospasmus** 5, 166,  
281.

**Larynx-Fraktur** 383.

- -Stenose 167.

— -Syphilis 169, 588.

— Tuberculose 127, 167,

**Laparotomie** 376.

**Läuse** 323, 518, 519.

**Lebensschwache** 208.

**Leber-Cirrhose** 70.

— Syphilis 71

**Lederhaut Entzündung** 599.

**Leguminosen-Mischung v. Har**  
stein 339

**Leitondrüsen-Entzündung**

**Leube Rosenthal'sche Fleisch**  
lution 48 49, 50, 152.

**Leuchtgasvergiftung** 681, 68

**Leukaemie** 115.

Lichen ruber 513.  
 — scrophulosorum 514.  
 — urticatus 321, 540.  
 Lichtscheu 594.  
 Lidranddrüsen-Entzündung 590.  
 Liebig's Maltoteguminose 330  
 Liebig'sche Suppe 206, 235, 243,  
 271.  
 Ligatur v. Arterien 345.  
 Lithiasis 76, 122, 426.  
 Local-Anästhesie 339, 373.  
 — des Auges 589.  
 — des Kehlkopfs 169, 170.  
 — der Nase 160.  
 — des Rachens 162.  
 von Wunden 373, 496.  
 Localbehandlung bei Syphilis  
 161, 164, 169, 261, 262, 263,  
 326, 327, 536, 585—588.  
 Löfflund'scher Malzextract 207,  
 243.  
 Löfflund's peptonisirte Milch 271  
 Lösung des Zungenbändchens  
 215.  
 Lues v. Syphilis.  
 Luftdouche (Luftentreibung) nach  
 Gruber 611, 614.  
 — nach Politzer 630, 633, 635,  
 636, 640, 644, 648.  
 — durch die Tuba Eust. 617,  
 634.  
 Luftleere der Lungen 230.  
 Luftröhren-Katarrh 170, 171.  
 Luftverdünnung im kussenen Ge-  
 hörgang 620, 641, 648.  
 Lungen-Atelectase 230.  
 — Blutung 16, 156  
 — Brand 20, 132.  
 — -Dampf 13, 141, 286.  
 — Emphysem 13, 141, 286.  
 — Entzündung 17, 130, 143,  
 230, 287.  
 — -Infarkt, haemorrhagischer 35.  
 — Katarrh 5, 8, 132, 143, 225,  
 283.

Lungen-Oedem 15, 144.  
 Tuberculose 22, 133, 231,  
 287  
 Lupus erythematosus 514.  
 — vulgaris 367, 515.  
 Luxatio 355.  
 — claviculae 391.  
 — cubiti 393.  
 — digitorum 396.  
 — femoris 406.  
 — humeri 391.  
 — manus 395.  
 — maxillae 380.  
 — pollicis 395.  
 Lymphadenitis inguinalis 565.  
 Lymphangionitis, Lymphgefäßent-  
 zündung 363.  
 Lymphoma 384.  
 — malignum 371, 385.  
 Maasso, geburtshilfliche 458  
 Maculae corneae 538.  
 Madenwürmer 66, 245, 315.  
 Magen-Anaspülung 46, 51, 63,  
 133, 301, 306, 665, 667, 679,  
 685.  
 — -Blutung 50, 121, 157.  
 — -Drücken 47.  
 — -Erweiterung 51, 133.  
 — -Geschwür 48, 139.  
 — Katarrh, acuter 43, 236, 300  
 — chronischer 45, 237, 300.  
 — -Krampf 49, 52.  
 — -Krebs 50, 155.  
 — Schmerz 44, 49, 51.  
 — Wunden 398.  
 Mahlzeiten bei Brustkindern 223,  
 269.  
 Maizena 272.  
 Malaria 111—113, 134, 154, 261,  
 325.  
 — Kachexie 112, 154, 326.  
 Maligne'scher Haken 409.  
 — Stachel 409.  
 Malleolar-Fraktur 409.

**Maltoleguminose** 330.  
**Malzextract** von Löfflund 207, 243.  
**Mandel-Entzündung** 41, 135, 162, 216, 293, 382, 532.  
**Mangelhafte Milchsecretion** 202, 458.  
**Manie** 178.  
**Martin'sche Binde** 411.  
**Masern** 257, 324, 518.  
**Massage des Abdomens** 59, 139.  
 — allgemeine 148.  
 — der Cornea 598.  
 — der Prostata 554.  
 — der Sclera 599.  
 — der Ohrmuschel 603.  
**Massage nach Thure-Brandt** 471, 472, 480.  
**Mastdarm-Katarrh** 400.  
 — -Krebs 401.  
 — -Tripper 400.  
 — -Verengung 312, 400.  
 — -Vorfall 399.  
**Mastitis** 389.  
**Mastkur, Weir Mitchell's** 148—150.  
**Mastodynie** 91.  
**Maximaldosen** 697.  
**Medicinalgewicht, österreichisches** 703.  
**Mehlhund** 215, 293, 659.  
**Melancholia** 175.  
**Melaena neonatorum** 264.  
**Meningeal-Erscheinungen bei Pneumonie** 19.  
**Meningitis cerebrospinalis** 77, 211; purulenta 209; tuberculosa 209, 319.  
**Menorrhagiae** 483.  
**Menstruationsanomalien** 482.  
**Menstruation der Amme** 203, 298.  
**Menstruations-Kolik** 482.  
**Mercurial-Stomatitis** 362, 659, 690.  
**Mercurialvergiftung** 685, 689.  
**Mercurismus** 66, 67, 106, 306.

**Metritis acuta** 465; chronica 465.  
**Metrorrhagia** 449, 450, 457, 469—470, 475, 476, 477, 483.  
**Middeldorpf'sches Dreieck** 393.  
**Migraine** 87, 122, 147.  
**Milch, condensirte** 207.  
 — sterilisirte n. Soxhlet 205.  
**Milchkur** 23, 48, 71, 75.  
**Milchsecretion, mangelhafte** 202, 458.  
**Milchstauung** 202, 458.  
**Milchüberfluss** 458.  
**Milium** 517.  
**Mitesser** 496.  
**Mittelohr-Entzündung, eitrige** 615, 632, 644.  
 — -Katarrh 614, 636.  
 — -Sclerose 618, 640.  
**Molluscum contagiosum** 518.  
**Morbilli** 257, 324, 518.  
**Morbus Basedowii** 38.  
 — Brightii 71, 72, 140, 248, 249, 317.  
 — maculosus Werlhofii 117, 329.  
 — sacer, v. Epilepsia.  
**Morchelvergiftung** 685, 689.  
**Morphinvergiftung** 685.  
**Morpiones** 519.  
**Mumps** 43, 382, 532.  
**Mund-Fäule** 214, 292, 658.  
 — -Katarrh 135, 214, 658.  
 — -Pflege 653; bei Kindern 208, 273; bei Quecksilberkuren 571.  
 — Schleimhautentzündung 135, 214, 292, 573, 658, 690.  
 — -Syphilis 586, 660.  
**Muskelatrophie, progressive** 85.  
**Muskel-Rheumatismus** 103.  
**Mutterfraisien** 452.  
**Mutterkorn-Vergiftung** 686, 693.  
**Myelitis** 83, 84.  
**Myocarditis** 36.  
**Myoma uteri** 474.  
**Myomectomie** 477.  
**Myomotomie** 477.

Myringitis 610, 630, 631.  
Myringotomie 611, 612, 616,  
630, 634.

Nabel-Blennorrhöe, Nabelfluss 247.  
— -Brand 247.

— -Entzündung 247.

Nabelschnurvorfal 448.

Nabelschwamm 247, 317.

Nachtschweisse 28, 29, 128.

Nagel, eingewachsener 410.

Nahrungsverweigerung 175, 199.

Narben-Contractur 356.

Narkose 337, 373, 445.

— mit Bromäthyl 338, 373.

Narkosekorb nach Skinne-Es-  
march 337.

Nasen-Ausspülung 159, 161, 162,  
212, 213, 290, 639.

Nasenbeinbruch 379.

Nasenbluten 346, 380.

Nasen-Diphtheritis 213, 290.

— -Geschwüre 161, 212, 263,  
587, 640.

— -Katarrh 159—161, 212, 290,  
640.

— Scrophulose 161, 162, 212,  
290.

— Syphilis 161, 263, 539, 587.

Nässende Flechte 255, 323, 496,  
603, 623.

— des Afters 504.

— des Augenlides 503.

— der Brust und Brustwarze 504.

— des Gesichts 503.

— der Hände 505.

— des Hodensacks 504.

— der Kopfhaut 503.

— der Lippen 503.

— des Ohres 603, 623.

Nebenhoden-Entzündung 401,  
554.

Neigung der Gebärmutter 470,  
472.

Nephritis 71, 72, 140; bei Kin-  
dern 248, 317.

Nephrolithiasis 76, 122, 426.

Nervöser Gesichtsschmerz 89.

Nervöses Hautjucken 68, 522.

Nervöser Ohrenschmerz 649.

Nervöse Schwerhörigkeit 619, 650.

Nesselausschlag 321, 540.

Nestle'sches Kindermehl 207.

Netzhaut-Abhebung 601.

— Entzündung 600.

Netzvorfal 398.

Neugeborenen, Diätetik des 444.

Neuralgia 112, 122, 123, 510;  
intercostalis 90; trigemini 89;  
urethrae 430.

Neurasthenia 97, 147—150.

Neuritis multiplex 87.

Nicotinvergiftung 686, 694.

Nierenbecken-Entzündung 75,  
425.

Nieren-Blutung 71, 248, 317,  
427.

— -Entzündung 71, 72, 140;  
bei Kindern 248, 317.

— -Steine 76, 122, 426.

Nierensteinkolik 76, 122, 427.

Nieren-Syphilis 75.

Nitrobenzol-Vergiftung 686.

Nitroglycerin-Vergiftung 686.

Noduli haemorrhoidales 61, 400.

Noma 215, 293, 378.

○berarm-Bruch 393.

— -Verrenkung 391.

Oberschenkelbruch 408.

Obstipatio alvi 44, 46, 54, 55,  
57, 124, 137, 138, 154, 236,  
254, 261, 289, 299, 310, 454,  
457; habituelle 59, 60, 139,  
311.

Occlusio intestini 62, 138, 397.

Odontalgia 655; rheumatica 661.

Oedema glottidis 4, 166.

— palpebrarum 595.

— pulmonum 15, 144.

Oesophagus-Verletzung 383.

Ohnmacht 121, 347, 451.

Ohrblutgeschwulst 608, 625.  
 Ohren-Eczem 603, 623.  
 Ohrenfluss 616, 646  
 Ohren-Geräusche subjective 614,  
 619, 641.  
 Ohrenschmerz, nervöser 649.  
 Ohren-Syphilis 612, 618, 619,  
 643, 648, 650.  
 Ohrmuschel-Entzündung 626.  
 Ohrpolypen 629.  
 Ohrspeicheldrüsen - Entzündung  
 49, 382, 532.  
 Olekranon-Fraktur 395.  
 Omphalitis 247.  
 Onychomycosis 518.  
 Oophoritis 481.  
 Ophthalmoblehnorrhoea acuta  
 444, 594.  
 Opiumdosen für Säuglinge 303.  
 Opiumvergiftung 685, 687.  
 Oppel's Kinderzwieback 272.  
 Organtin-Verband 353.  
 Osteomalacie 155.  
 Osteomyelitis 359.  
 Ostitis 368.  
 Otalgia nervosa 649.  
 Othaematoma 603, 625.  
 Otitis externa 605; circumscripta  
 626; diffusa 627.  
 — — diphtheritica 628.  
 — — parasitica 607, 609, 628.  
 — media acuta 632.  
 — — catarrhalis 614, 636.  
 — — hypertrophica 618, 640.  
 — — perforativa 615, 644.  
 Otitis media plastica, sclerotica  
 618, 640.  
 — suppurativa 615, 644.  
 Otorrhoe 616, 644.  
 Oxalsäurevergiftung 687.  
 Oxalurie 431.  
 Oxyuris vermicularis 66, 245, 315.  
 Ozaena 161, 212, 263, 539, 587,  
 640.

Palpitatio cordis 32, 38.  
 Pannus 594.  
 Panophthalmitis 601.  
 Papeln 263, 509, 585, 586  
 Paracentese des Trommelfells  
 611, 612, 616, 630, 634.  
 Paralysis agitans 99, 146, 147.  
 — nervi acustici 630.  
 — nervi facialis 93.  
 — progressiva 184.  
 Paralytische Geistesstörung 184.  
 Parametritis 457, 478.  
 Paranoia 183  
 Paraphimosis 406.  
 Parasitäre Gehörgangsentzündung  
 607, 609, 628.  
 Parere für Geisteskranke 173 bis  
 175.  
 Paresis musculorum laryngis 179.  
 — vesicae 82, 185, 433.  
 Parotitis 43, 382, 437.  
 Partus praematurus 452.  
 Parulis 380.  
 Patellar-Fraktur 409.  
 Pediculi capitis 323, 518; pubis  
 519.  
 Pelveoperitonitis 480.  
 Pemphigus 519.  
 Penghawar-Djambi 346.  
 Penis-Verletzungen 406.  
 Pepton v. Fleischpepton.  
 Perforation des Kindesschädels  
 446.  
 Pericarditis 31, 135, 153.  
 Perichondritis laryngea 167.  
 Perimetritis 480.  
 Periodontitis 557.  
 Periostitis 368; maxillaris 380;  
 syphilitica 569, 588.  
 Peritonitis 66, 153, 245, 396, 480.  
 — tuberculöse 67, 246.  
 Perityphlitis 56, 316.  
 Periurethritis 553  
 Perniones 357, 519.  
 Pertussis 12, 228, 284; inflamma-  
 toria 285.



- Pessarier 471, 473.  
 Pfundnase 485.  
 Phagedänische Geschwüre 367, 564, 566.  
 Pharyngitis 41, 135, 162, 163;  
 — chronica 135, 163, 640.  
 Phimosis 405, 561, 568.  
 Phlebitis 363.  
 Phlegmone 358, 376.  
 Phosphaturie 430.  
 Phosphor Vergiftung 142, 687.  
 Photophobie 594.  
 Phthisis laryngis 127, 167.  
 — pulmonum 22, 127, 133, 231, 287.  
 Pigmentflecke 493.  
 Pilocarpinvergiftung 689.  
 Pilzvergiftung 689.  
 Pinselung der Harnröhre 415.  
 Pityriasis versicolor 520.  
 Placenta praevia 449.  
 — Retention 450.  
 — Verwachsung 450.  
 Playfair'sche Sonde 468.  
 Plaques muqueuses 539.  
 Pleuritis 29, 153, 232, 289.  
 Pneumatischer Apparat v. Waldenburg 13.  
 Pneumonia 17, 20, 130, 143, 230, 287.  
 Pneumothorax 30.  
 Pocken 258, 542.  
 Poliomyelitis anterior acuta 83, 253, 410.  
 Pollutiones 197, 437.  
 Polyarthritus rheumatica 101, 102, 131, 360.  
 Polypen des Ohres 629.  
 Porte-remède von v. Dittel 419.  
 Praecordialangst 199.  
 Priessnitz'scher Umschlag 1, 29, 41, 59, 73, 226, 457, 478.  
 Primäraffect, syphilitischer 536, 566.  
 Primärer Blödsinn 187.  
 Primäre Verrücktheit 183.  
 Processus puerperalis 455.  
 Proctitis 400.  
 Prolapsus recti 399.  
 — uteri vel vaginae 473.  
 Prostatahypertrophie 405.  
 Prostatitis 404, 553.  
 Prostatorrhoe 404, 554.  
 Proteinnährstoffe v. Klencke 272.  
 Prunigo 322, 520.  
 Pruritus analis 522.  
 — cutaneus 68, 522; vulvae 459, 522.  
 Psendarthrosen 354, 408, 409.  
 Pseudocroup 2, 220, 274.  
 Pseudoleukaemie 116.  
 Psoriasis 523; palmaris et plantaris 539, 585.  
 Psychrophor 436.  
 Puerperalfieber 455.  
 Pulpitis 655.  
 Puls-Arhythmie 32, 33, 36.  
 Purpura rheumatica 530.  
 Pyaemie 363.  
 Pyelitis 75, 425.  
 Pyrosis 44, 46, 47, 52, 124.  
 Quecksilber-Injectionen 574.  
 — Stomatitis 362, 573, 659, 690.  
 Quecksilber Vergiftung 689.  
 Querlage der Frucht 446; vernachlässigte 447.  
 Quetschung des Penis 406.  
 — der Weichtheile 349.  
 Quetschwunden 350.  
 Rachen-Bräune, -Diphtheritis 41, 163, 217, 294.  
 — -Katarrh 41, 135, 162; chron. 163, 640.  
 — -Syphilis 164, 538, 586.  
 Radius-Fractur 395.  
 Rahmgemenge 270; Biedert'sches 206, 235, 270, 330.  
 Ranula 381.  
 Regenbogenhaut-Entzündung 568, 599.

Respiration, künstliche 338, 445, 667.  
 Retentio placentae 450.  
 — urinae 405, 417, 455, 546.  
 Retinitis 600.  
 Retroflexio et retroversio uteri 470.  
 Rhachitis 155, 204, 225, 265, 281, 329, 369.  
 Rhagaden ad anum 504, 585.  
 Rheumatismus articulorum 101, 102, 131, 360.  
 — musculorum 103.  
 Rheumatischer Zahnschmerz 661.  
 Rheumatoide Schmerzen 122.  
 Rhinitis 159—161, 263, 290, 539, 587, 640.  
 Rhinophyma 485, 530.  
 Ringworm 509.  
 Rippen-Bruch 388.  
 — -Caries 389.  
 Rippenfell-Entzündung 29, 153, 232, 289.  
 Rothlauf 110, 259, 363, 506.  
 Rotationsmethode bei Oberarm-luxationen 392.  
 Rückenmark-Entzündung 83, 84.  
 — -Schwindsucht 85, 147.  
 Rückwärts-Knickung u. Neigung der Gebärmutter 470.  
 Ruhr 108, 151.  
 Ruptura uteri 448.  
  
 Saccharin 117.  
 Salpetersäurevergiftung 690.  
 Salpingitis 481.  
 Salzsäurevergiftung 691.  
 Samenfluss 437.  
 Santoninvergiftung 691.  
 Sarcomphalus 247, 317.  
 Säuerwahnssinn 18, 146, 182, 364, 669.  
 Säugling, Ernährung des 201, 269.  
 — Zimmer und Bett des 201.  
 Scabies 257, 324, 530.

Scarification 357, 371, 485, 490.  
 — des äusseren Gehörgangs 606.  
 — des Kehlkopfeingangs 5.  
 — des Rachens 162.  
 — der Vaginalportion 465, 466.  
 Scarlatina 258, 325, 532.  
 Schädelknochenbruch 377.  
 SchädelumfangimKindesalter 335.  
 Schafblattern 258.  
 Schanker, harter 536, 566.  
 — weicher 563.  
 Scharbock 116, 263.  
 Scharlach 258, 325, 532.  
 Scheerende Flechte 509.  
 Scheiden-Ausspülungen 443, 462, 463, 467, 560.  
 — -Blutungen 346.  
 — -Katarrh 250, 318, 461, 560.  
 — -Krampf 461.  
 — -Kühler von Heitzmann-Leiter 560.  
 — Vorfall 473.  
 Scheintod 4, 5, 338; von Neugeborenen 444.  
 Schenkelhalsbruch 408.  
 Schiefheilung v. Knochenbrüchen 354.  
 Schielen 602.  
 Schienbeinbruch 409.  
 Schlaflosigkeit 98, 145, 178, 180, 196.  
 Schlangengift 691.  
 Schluchzen 67, 93.  
 Schlüsselbein-Bruch 391.  
 — -Verrenkung 391.  
 Schmeerfluss 255, 489, 533, 561.  
 Schmierkur 536, 569; bei Kindern 262, 326.  
 Schnittwunden 347.  
 — des Gesichts 348, 378.  
 Schnupfen 159—161, 212, 290, 639.  
 Schrumpfniere 74.  
 Schuppenflechte 523.  
 Schulze'sche Schwingungen 444.  
 Schutzimpfung 259.

- Schutzverband des Auges 595.  
 Schwämme, Reinigung und Desinfection 341.  
 Schwangerschaft, Diätetik der 439.  
 Schwefelkohlenstoff - Vergiftung 692.  
 Schwefelsäure-Vergiftung 693.  
 Schwefelwasserstoff - Vergiftung 684, 693.  
 Schweissabsonderung, vermehrte 511.  
 Schweizermilch 207.  
 Schwellung von Bronchialdrüsen 227, 282.  
 Schwellung der Halslymphdrüsen 384.  
 Schwerhörigkeit, nervöse 619, 650.  
 Schwielen 539.  
 Schwindelaucht 22, 127, 133, 231, 287.  
 — des Kehlkopfs 127, 167.  
 — des Rückenmarks 85, 147.  
 Schwitzkasten nach Thursfield 73.  
 Schwitzkur 1, 4, 71, 73, 140, 600.  
 Scleritis 599.  
 Sclerose, multiple, inselförmige 85.  
 Sclerosis 536, 566.  
 Scorbutus 116, 263.  
 — gingivae 116, 367, 659.  
 Scrophulosis 22, 161, 162, 212, 265, 290, 365, 505, 514, 638, 648.  
 Scrophulöse Bindehaut-Entzündung 593.  
 Seborrhoea 255, 489, 533, 561.  
 Secalevergiftung 693.  
 Secundäre Geistesstörung 186.  
 — Syphilis 536, 568.  
 Sehnenscheiden Entzündung 359.  
 Sehnerven-Schwund 601.  
 Seide zu Operationen 341, 375.  
 Senfbäder 230, 241.  
 Seniler Blödsinn 186.  
 Septicaemie 363.  
 Septische Wunden 376.  
 Singultus 67, 93.  
 Skoliose 387.  
 Sodbrennen v. Pyrosis.  
 Sommersprossen 493.  
 Sondenkur 415, 417, 419.  
 Soor 216, 291, 659.  
 Sopor 72, 78.  
 Soxhlet'sches Verfahren zur Milchsterilisation 205, 270.  
 Spasmus glottidis 5, 166, 225, 281.  
 — vesicae 250, 431.  
 Spastische Spinalparalyse 84.  
 Spermatorrhoe 437.  
 Spinale Irritation 150.  
 Spinale Kinderlähmung 83, 253, 410.  
 Spitze Warzen 543, 562.  
 Spondylitis 81, 386.  
 Springwürmer 65, 245, 315.  
 Spulwürmer 65, 245, 315.  
 Staar, grüner 601.  
 Starrkrampf 100, 364; der Neugeborenen 253.  
 Status gastricus 124.  
 Stechapfelvergiftung 673, 694.  
 Steinbildung in der Niere 76, 132, 426.  
 Stenocardia 87, 126, 137, 147.  
 Stenosis intestini 64.  
 Stenosis cervicis 478.  
 — laryngis 167.  
 — recti 312.  
 Sterilisation von Instrumenten und Verbandstoffen 341, 374.  
 — der Milch 205, 270.  
 Stimmritzen-Krampf 5, 166, 225, 281.  
 Stinknase 161, 212, 263, 539, 587, 640.  
 Stomacace 214, 292, 658, 660.  
 Stomatitis aphthosa 214, 292.  
 — catarrhalis 135, 214, 658.  
 — mercurialis 362, 573, 659, 690; ulcerosa 660.  
 Störung der Compensation bei Herzfehlern 32—36, 135—137.

- Strabismus 602.  
 Strictura orificii uteri spastica 445.  
 — recti 312, 400.  
 — urethrae 417.  
 Struma 383.  
 Strychninvergiftung 694.  
 Stuhlverstopfung v. Obstipatio alvi.  
 Stupor 181.  
 Subjective Ohrengeräusche 614, 619, 641.  
 Sublimatvergiftung 689, 694  
 Suspensorium nach Langlebert-Zeissl 555.  
 Sycosis 533; parasitaria 535.  
 Syphilis, angeborene 261, 326, 597.  
 Syphilis cutanea 536.  
 — gummosa 538, 569, 586.  
 — hereditaria 261, 326, 597.  
 — papulosa 263, 539, 585, 586.  
 — ulcerosa 538, 569, 586.  
 Syphilis der Aftergegend 585.  
 — des Auges 568, 569, 597, 599, 600  
 — der Beinhaut 569, 588  
 — der Gelenke 588.  
 — des Gehirns 81, 185.  
 — der Haut 536, 585, 586.  
 — der inneren Organe 568.  
 — der Iris 568, 599.  
 — des Kehlkopfs 169, 588.  
 — der Knochen 588.  
 — der Kopfhaut 586.  
 — des Labyrinths 650.  
 — der Leber 71.  
 — der Lippen 586  
 — des Mundes 586, 660.  
 — des Muskeln 588.  
 — der Nase 161, 263, 539, 587.  
 — der Nieren 75.  
 — des Ohres 612, 618, 619, 643, 648, 650.  
 — des Rachens 164, 538, 586.  
 — des Trommelfells 612.  
 Tabakvergiftung 694.  
 Tabes dorsalis 85, 147.  
 Taenia 64, 125, 244, 313  
 Tamponade 346.  
 Tannin-Jodoformdocht 346.  
 — Jodoformgaze 346.  
 Taxis 398  
 Taylor'scher Apparat 408.  
 Teleangiectasieen 371, 378, 484, 490, 539.  
 Tendovaginitis 359.  
 Tenesmus 123, 244, 309.  
 Tertiäre Syphilis 568.  
 Tetanie 101.  
 Tetanus 100, 364; neonatorum 253.  
 Tetanus uteri 445.  
 Theden'sche Einwicklung 34.  
 Thermocauter 317.  
 Thoracocentese 233.  
 Thorax-Abscess 389.  
 — Umfang im Kindesalter 33.  
 Verletzungen 388.  
 Thränensack-Blennorrhoe 591.  
 — Entzündung 591.  
 Thure-Brandt, Massage nach 471, 472, 480.  
 Thursfield'scher Schwitzkasten 73  
 Tibia-Fraktur 409.  
 Tic douloureux 89.  
 Tobsucht 178, 179.  
 Tollkirschenvergiftung 673, 694  
 Tonsillarabscess 217.  
 Tonsillitis 41, 136, 162, 216, 239, 392, 532.  
 Tonsillotomie 162, 217, 382.  
 Torsion von Arterien 345.  
 Totalexstirpation des Uterus 477  
 Tracheitis 170—171.  
 Tracheobronchitis 282.  
 Tracheotomie 279, 383.  
 Trachoma 596.  
 Transitorische Tobsucht 179.  
 Traktionsmethode bei Oberarmverrenkung 391.  
 Transplantation der Haut nach Thiersch 411.

Trigeminus-Neuralgie 89.  
 Tripper der Harnröhre 413, 415, 464, 545, 551, 560.  
 — des Mastdarms 400.  
 — beim Weibe 462—464, 560.  
 Trismus neonatorum 253.  
 Trommelfell-Abscess 611.  
 — Entzündung 610, 630.  
 — Verletzung 609.  
 — künstliches 612, 648.  
 Tropfapparat nach Ultzmann 551.  
 Tropfen-Tabelle 701.  
 Trübungen des Glaskörpers 600.  
 Trübung der Hornhaut 598.  
 — des Trommelfells 612.  
 Tubage nach O'Dwyer 279.  
 Tubenverengerung 643.  
 Tuberculose des Bauchfells 67, 246.  
 — des Darms 60, 151.  
 — des Ellbogengelenks 394.  
 — der Gehirnhaut 209, 319.  
 — der Gelenke 369.  
 — des Hüftgelenks 407.  
 — des Kehlkopfs 127, 167.  
 — des Kniegelenks 410.  
 — der Lungen 22, 127, 133, 231, 287.  
 — des Mittelohrs 618.  
 — der Rippen 389.  
 — des Sprunggelenks 410.  
 — der Wirbelsäule 81, 386.  
 Tumor albus 369.  
 Tumor albus cubiti 394.  
 — — genu 410.  
 — — pedis 410.  
 Tumor cavernosus 371, 378, 490.  
 — cerebri 80.  
 Tussis convulsiva 12, 228, 284.  
 Tyloma 495, 539.  
 Tylosis 491.  
 Tympanites nervosa 239.  
 Typhlitis 56, 316.  
 Typhus 104, 129, 260.

Ulceræ intestinorum 60, 151—152.  
 — laryngis syphilitica 170, 588; tuberculosa 168.  
 — nasi 161, 212, 263, 587, 640.  
 — pharyngis syphilitica 164, 586.  
 Ulcus 366, 377.  
 — cervicis uteri 467.  
 — corneae 598.  
 — cruris 366, 411, 540.  
 — durum 536, 566.  
 — molle 563.  
 — phagedaenicum 367, 564.  
 — rotundum ventriculi 48, 139.  
 Ulnar-Fraktur 395.  
 Ultzmann'scher Blasen-Excitator 434.  
 — Irrigationskatheter 418.  
 — Tropfapparat 419.  
 Umbilical-Gangrän 247.  
 Umstechung der Arterien 345.  
 Unguis incarnatus 410.  
 Unterbindung 345.  
 Unterkieferbruch 379.  
 Unterschenkelbruch 409. [540.  
 Unterschenkelgeschwür 366, 411,  
 Uraemie 71, 74, 127, 137, 141, 248, 318.  
 Uraturie 431.  
 Urethritis catarrhalis 413.  
 — gonorrhoeica acuta 413, 462, 545, 560; chronica 415, 462, 551, 560.  
 Urethrotomie 417.  
 Urinretention 405, 417, 455, 546.  
 Urolithiasis 76, 122, 426.  
 Urticaria 321, 540.  
 Uterus-Blutungen 449, 450, 457, 469—470, 474, 476, 477.  
 — -Carcinom 477.  
 — -Entzündung 465.  
 — -Fibrom 474.  
 — -Irrigation 444, 451, 455, 456, 457, 466, 468. [472.  
 — -Knickung u. Neigung 470,  
 — -Prolaps 473.  
 — -Ruptur 448.

**Vaccinatio** 259.

**Vaginal-Blutungen** 316.

**Vaginal-Irrigationen** 443, 452, 463, 467, 560.

**Vaginismus** 451.

**Vaginitis** 250, 314, 451, 560.

**Valsalva'scher Versuch** 636.

**Vanilleisvergiftung** 695.

**Vaporisation des Auges** 559.

**Varicella** 258.

**Varicen** 411.

**Varicorele** 462.

**Variola** 264, 542.

**Vasa umbilicalia praevia** 448.

**Veitstanz** 94, 146, 251, 321.

**Venen-Blutungen** 246.

— -Entzündung 363.

**Venerische Helkose** 563.

**Veratrinvergiftung** 695.

**Verband bei Wunden** 342, 375.

— am Auge 590, 595.

**Verband bei Knochenbrüchen** 352.

— Fricke'scher 556.

**Verbrennungen** 355, 495.

**Verdaunungsschwäche, atonische** 46, 155, 312.

**Verengerung des Beckens** 445.

— der Harnröhre 417.

— des Kehlkopfs 167.

— des Mastdarms 312, 400.

— der Tuba Eustachii 643.

— der Vorhaut 405, 561, 568.

**Vereiterung eine Extravasatas** 850.

**Vergiftungen, Allgemeines über** 666.

**Vergiftung mit Aconitin** 667.

— — Aether 667.

— — Alkalien 668.

— — Alkohol 669.

— — Amylnitrit 670.

— — Anilin 670.

— — Antimonverbindungen 671.

— — Argentum nitric. 671.

— — Arsenverbindungen 671.

— — Atropin 678.

**Vergiftung mit Barytverbindungen** 672

— — Belladonna 673.

— — Bilsenkrant 673.

— — Blausäure 674.

— — Bleiverbindungen 90, 133, 674.

— — Brechweinstein 671.

— — Bromverbindungen 676.

— — Brucin 694.

— — Calabarbohnen 676.

— — Canthariden 403, 676.

— — Carbolsäure 677.

— — Chinin 677.

— — Chlor 678.

— — Chloralhydrat 678.

— — Chloroform 667, 679.

— — Chromsauren Salzen 67

— — Cocain 679.

— — Codein 679, 685.

— — Coffein 679.

— — Colchicin 680.

— — Coniin 680.

— — Crotonöl 680.

— — Cuprum 681, 684.

— — Curare 681.

— — Cyankali 674, 681.

— — Datura Stramonium 67

— — Digitalis 681.

— — Duboisin 673, 681.

— — Eisenchlorid 681.

— — Eisenvitriol 681.

— — Ergotin 681, 693.

— — Ferrum sesquichloratu

— — Fingerhut 681, 682.

— — Fischgift, Fleischgift 68

— — Fliegenpilz 682, 689.

— — Grubengas 682, 684.

— — Grünspan 682, 684.

— — Herbstzeitlose 680, 682.

— — Höllenstein 671, 682.

— — Hydrargyrum 682, 689.

— — Hyoscyamus 673, 682.



**Vergiftung mit Jod 682.**

- — Jodoform 682.
- — Juniperus Sabina 683.
- — Kali chloricum 683.
- — Kalilauge 668, 683.
- — Kalk 668, 683.
- — Kleesäure 683, 687.
- — Kloakengas 684.
- — Kohlendunst 684.
- — Kreosot 677, 684.
- — Kupferverbindungen 684.
- — Lapis 671, 685.
- — Leuchtgas 684, 685.
- — Mercurialien 685, 689.
- — Morcheln 685, 689.
- — Morphin 685.
- — Mutterkorn 686, 693.
- — Nicotin 686, 694.
- — Nitrobenzol 686.
- — Nitroglycerin 686.
- — Nux vomica 686, 694.
- — Oleum Crotonis 680, 687.
- — Opium 685, 687.
- — Oxalsäure 687.
- — Phosphor 142, 687.
- — Physostigmin 676, 689.
- — Pilocarpin 689.
- — Pilzen 689.
- — Quecksilberverbindungen 689.
- — Sabina, Sadebaum 683, 690.
- — Salpetersäure 690.
- — Salzsäure 691.
- — Santonin 691.
- — Scheidewasser 690, 691.
- — Schierling 680, 691.
- — Schlangengift 691.
- — Schwämme 689, 692.
- — Schwefelkohlenstoff 692.
- — Schwefelsäure 693.
- — Schwefelwasserstoff 684, 693.
- — Secale cornutum 693.
- — Stechapfel, Stramonium 673, 694.

**Vergiftung mit Strychnin 694.**

- — Sublimat 689, 694.
- — Tabak 694.
- — Tartarus emeticus 671, 695.
- — Tollkirschen 673, 695.
- — Vanilleeis 695.
- — Veratrin 695.
- — Weingeist 669, 695.
- — Wurstgift 695.

**Verkrümmungen bei Rhachitis 369.**

- der Wirbelsäule 387.

**Verkürzung des Zungenbändchens 215.**

**Verlängerung des Gebärmutter-Halses 473.**

**Verletzungen des Abdomens 398.**

- der Achselhöhe 392.
- des Darms 398.
- des Gesichts 378.
- des Halses 382.
- der Hand 396.
- der Harnröhre 405.
- des Herzens 388.
- des Kehlkopfs 388.
- der Leber 398.
- der Luftwege 388.
- des Magens 398.
- der Milz 398.
- von Muskeln 396.
- des Penis 406.
- der Schultergegend 392.
- von Sehnen 396.
- der Speiseröhre 383.
- des Thorax 388.
- des Trommelfells 609.

**Vermehrte Schweissabsonderung 511.**

**Verrückung 355.**

- des Daumens 395.
- des Ellbogengelenks 393.
- des Handgelenks 395.
- des Hüftgelenks 406.
- des Kiefergelenks 380.
- des Oberarms 391.
- des Schlüsselbeins 391.

- Verrucae 371, 543.  
 Verrücktheit, primäre 183.  
 Verschwammung des Zahnfleisches 40, 214, 292, 658.  
 Versiones uteri 470, 472.  
 Verstauchung 355, des Handgelenkes 395.  
 Verstopfung v. Obstipatio alvi.  
 Verwachsung der Placenta 450.  
 Verzögerte Callusbildung 354, 408.  
 Vitium cordis 31—36, 135, 141, 283, 338.  
 Volkmann'scher Schlitten 354, 407.  
 — Schiene 359.  
 Volvulus 63, 138, 397.  
 Vorderarm Fractur 395.  
 Vorfall einer Extremität 447.  
 — der Gebärmutter 473.  
 — von Haemorrhoidalknoten 61.  
 — des Mastdarms 399.  
 — der Nabelschnur 448.  
 — der Scheide 473.  
 Vorlagerung der Nabelschnur 448.  
 Vorhaut Verengung 405, 561, 568.  
 Vorsteherdrüsen-Entzündung 404, 553.  
 Vorwärts Knickung u. -Neigung der Gebärmutter 472.  
 Vulnus contusum 350, 495.  
 — contusum 350.  
 — granulosum 349.  
 — phagedaenicum 566.  
 — scissum 347; facies 348, 378.  
 Vulvitis 250, 318, 459.  
 Wachstums-Verhältnisse im Kindesalter 332.  
 Wadenbeinbruch 409.  
 Wahl der Amme 203.  
 Wahnsinn, acuter 179.  
 — chronischer 183.  
 — circulator 179.  
 Waldenburg's pneumatischer Apparat 13.  
 Wangenbrand 215, 293, 378.  
 Wangenfistel 661.  
 Warzen 371, 543; spitze 543, 562.  
 Wasserbett 356, 495.  
 Wasserbruch 402, 555.  
 Wasserglasverband 353.  
 Wasserkrebs 215, 293, 378.  
 Wassersucht v. Hydrops.  
 Wechselfieber 111, 134, 154, 261, 325.  
 Weichtheile-Entzündung 365.  
 Weichtheilquetschung 349.  
 Weir Mitchell's Mastkur 145, 150.  
 Weisses Blut 250, 318, 451.  
 Werlhof'sche Krankheit 117, 329.  
 Wilde'scher Schnitt 635.  
 Windkolk 122, 235, 239, 300.  
 Windpocken 258.  
 Wirbelbruch 386.  
 — -Entzündung 81, 386.  
 — Verkrümmung 386.  
 Wochenbett, Diätetik des 454.  
 — -Blutungen 457.  
 — -Fieber 455.  
 Wundbehandlung, antiseptische 340, 373.  
 Wunddiphtherie 362.  
 Wunden, granulirende 349.  
 — phagedaenische 566.  
 — septische 376.  
 Wunden der Achselhöhle 392.  
 — der Bauchhöhle 398.  
 — der Brusthöhle 398.  
 — des Gesichts 378.  
 — des Halses 382.  
 — der Hand 396.  
 — der Harnrohre 406.  
 — der Leber 398.  
 — des Magens 398.  
 — der Milz 398.  
 — von Muskeln und Sehnen 396.  
 — des Penis 406.  
 — der Schultergegend 392.  
 — des Trommelfells 609.

- |   |  |
|---|--|
| <p>Wundrose 111, 259, 363, 506.<br/>Wundstarrkrampf 100, 364..<br/>Wundverband 342, 375.<br/>Wurstvergiftung 695.</p> <p>Xerophthalmus 596.</p> <p>' Zahn-Entwicklung, normale 207, 273.<br/>Zahnfleisch-Entzündung 40, 135, 214, 292, 362, 573, 658, 690.<br/>— -Fistel 661.<br/>— -Scorbut 116, 367, 659.</p> | <p>Zahnfleisch-Verschwärung 40, 214, 292, 658.<br/>Zahnnerven-Entzündung 655.<br/>Zahnreinigungsmittel 653. [661.<br/>Zahnschmerz 655; rheumatischer<br/>Zahnwurzelhaut-Entzündung 657.<br/>Zealenta 330.<br/>Zellgewebs-Entzündung 358, 376.<br/>Zimmer des Säuglings 201.<br/>Zoster 510.<br/>Zuckerharnruhr 117, 125.<br/>Zungenbändchen-Verkürzung 215.<br/>Zungenbeinbruch 383.</p> |
|---|--|
-





LANE MEDICAL LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on  
or before the date last stamped below.

--	--	--



U122 Landesman, E. Therapie  
L256 and den Wiener Kliniken  
1893 30081

[illegible]

